





Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
4865/A





Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
4865/A



Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
4865/A



Early European Books. Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
4865/A

4865/A, A. XIX. 0

Z. 9

6

12

12

12

12


12

12

12

Jordan
Michael
Algeria

15
18A



Pauli Aeginetæ,
 MEDICINÆ TO
 TIVS ENCHIRI
 DION,

SEPTEM LIBRIS VNIVERSAM RE-
 ctè medendi rationem complectens,
 nuncq; denuò multo quàm antea & e-
 mendatius, & forma artis huius stu-
 diosis commodiore in lu-
 cem editum.

ALBANO TORINO VITO-

durenfi interprete, ex postrema eius
 recognitione.

Accessit rerum & uerborum toto opere
 memorabilium locupletiss.
 Index.

Cum Cas. M. priuilegio ad quinq;
 quennium.

BASILEAE.

PAVLVS EGINE
ta de se.

Nos lege, qui magni cupis aurea scripta Galeni,
Tramite difficili non remorante sequi.
Illius æquarunt immensa uolumina uires,
Omnia sed cursu nos breuiore damus.

nos lege qui magni cupis aurea scripta Galeni,
nos lege qui magni cupis aurea scripta Galeni,

REVERENDISSIMO

in Christo patri ac Domino, D. Sebastiano Ser-
ma, Monasterij apud D. Ergauia Vrbani
Abbati, omnib. regijs uirtutibus insigni, domi-
no suo summe obseruando, Alba-
nus Torinus S.



A mihi cum amplissi-
ma Celsitudine tua lu-
stris ab hinc quinque,
quum isthic essem, in-
tercessit familiaritas at
que necessitudo: ita me
incomparabili comitate, beneuolentia,
literarum ac uirtutum tuarum ornamen-
tis, uitaq; qua facile regnas, integritate
deuinxisti, summa ueneratione dignis.
Pater, ut tametsi haftenus nunquam mi-
hi contigerit faciem intueri tua, nullum
tamen neq; temporis neq; loci interual-
lum, nulla neq; priuata neq; publica, ne
que aulica deniq; ac ducalia (quib. con-
tinenter distringor) negocia, unquam tui
memoria potuerint expectorare. Quin
alta mente reposita, tua immensa in me
officia iugiter permanent. Admonet us-
que me tui, ac ueluti totum ante oculos
ponunt, litera tua perelegantes, & car-
mina mire pura, docta, arguta, & plane
Apollinea, abste iam olim exarata: in
quibus

EPISTOLA

quibus optimam tui partem animum, sic
 expressum conspicio, ut nullus Apelles
 corporis effigiem repræsentare queat e-
 uidētius. Vtebar autem eo tempore con-
 suetudine tua multum. Coniunctissimè
 quippe & amantissimè mecum uixeras,
 & iucundè de omni disciplinarum gene-
 re identidem differebas, eoq; à latere tuo
 nunquam discedebam. Plurima itaq; à
 te prudenter disputata, plurima etiā bre-
 uiter & commodè dicta memoriæ man-
 dabam: fieriq; studebā tua singulari pru-
 dentia doctior, utpote quo nemo ea æ-
 tate mihi uidebatur nec sapientior, neq;
 prudentior. Tuq; uicissim meam etiam
 qualemcunq; exilitatem, summa animi
 uoluptate semper uisus es exosculari, q;
 uidebar tibi ad bonas artes præclara ie-
 cisse fundamenta, utriusq; literaturæ pri-
 mordijs haud infeliciter ea adhuc ætate
 degustatis. Eoq; iā tū nihil non præclarū
 de meo profectu expectabas. Spem ipse
 tuam fefellerim, an uicerim, mea monu-
 menta qualiacunq; testabūtur. Quorum
 hic unum augustissimo nomini tuo, ceu
 manifestarium aliquod gratitudinis sym-
 bolum, consecrare uisum est, ut uigiliæ
 nostræ gratiam maiorem, ac splendoris
 non

N V N C V P A T O R I A .

non parum apud lectorem assequatur,
 sub inclyti nominis tui præfatione uel
 ti munite, in publicum edite, & quasi mu-
 tui ueteris nostri amoris redintegratio
 existant. In quo suscipiendo, si regiū Ar-
 taxerxis animum præstabis, abūde mihi
 satisfactum existimabo: neque pigebit,
 maiora sub nominis tui auspicijs (nimirū
 foelicibus) in lucem edere. Spes est quip-
 pe haud parua, ita cum primis candido
 lectori probatum iri lucubrationunculas
 nostras, si tu quidem eas animo haud in-
 grato susceperis, unice studiorum & stu-
 dioforum Mecœnas. nullo nāq; alio uer-
 bo nec breuius, nec absolutius, tuū istud
 tam singulare in literas ac literatos om-
 nes studium, tuorumq; summam præco-
 niorum comprehendam. Qui utiq; unus
 multa eruditione (ut cætera præteream)
 cum miro uitæ candore coniuncta, bo-
 nam Abbatum partem lōgè lateq; supe-
 ras. Quam hominū de te pulcherrimam
 opinionem, non modò frequentes illi,
 quos monachis tuæ curæ creditis, docto-
 res hætenus præfecisti, (qui animum eo-
 rundem optimis tum morib. tū discipli-
 nis imbuant) uiri undecunq; doctissimi
 satis declararunt: uerū, quod quidem
 æ 3 longè

E P S T O L A

Iōgè præstātis. duco, tui etiā præconiū fa-
 tis magnam fidē facit, quod tu cum pau-
 cis Germaniæ Abbatib. (fermè dixerim,
 ex omnibus solus) tua sponte caues, ne
 bona ecclesijs hinc inde tuis dicata dila-
 pidentur: sed quo in longè pientissimū
 usum cōferantur, omnia moliris. nullis
 quippe sumptibus parcis, quo minus iu-
 uenes tui cœnobij, tuæ fidei commissi,
 bonis literis cū sacris tū prophanis ita
 instituantur, ut illorū aliquis in republi-
 ca Christiana ingrauescēte pastorum pe-
 nuria usus esse possit. Videmus enim,
 proh dolor, hodie statum reipub. Chri-
 stianæ, nescio quorum culpa, ita habere,
 ut ecclesiæ passim aliquot Parochis de-
 stituantur: nisi ē monasterijs, tanquam
 ex scholis sacris, qui illis uerbum Dei
 prædicent, ministri fideles mitterentur.
 Proinde Celsitudo tua pro sua singulari
 prudentia intelligit, cœnobia olim non
 in hoc maximis sumptib. extructa, ut il-
 lic saginentur tantum, uelutī in hara por-
 ci, hominū corpora: sed magis, ut in his
 ad usum reipublicæ Christianæ maxime
 utilem foueantur uiri haud uulgari do-
 ctrina, equitate, prudentia, & pietate in-
 signes. Sed nolo tuarum laudum enco-
 miū

N V N C V P A T O R I A .

mium (cui scio q̄ nō sufficiam) in episto-
la, scriptorū more conscribere, qui bonā
præfationis partē, laudibus eorum quib.
suas nuncupant uigilias, occupant: hoc
ueræ uirtutis præmium arbitrati, ut eius
memoria posteritati isthac ratione conse-
cretur. Mihi uerò, tametsi citra fucū lau-
dandi cāpus pateat: quoniam aut et mea
simplicitas ab omni blandiloquentiæ spe-
cie est alienissima, et tua singularis mode-
stia ab omnibus eiusmodi laudibus ue-
hementer abhorret: his prætermis-
sis, de Aegineta pauca quædam adi-
ciam.

Paulus Aegineta illustris & compen-
diosissimus medicinæ scriptor, artis me-
dicæ peculiaria problemata omnia hac
Epitome perstrinxit, in quib. omnes me-
dicinæ partes, quantum compendio fie-
ri potuit, perspicuè, miro ordine & artifi-
cio docentur: unde nostræ ætatis homi-
nes medendi rationem, quam Practicē
uocant, breui condiscant. Congessit au-
tem ex antiquis excellentibus medicis,
tanquam flosculos, in hanc epitomen.
Neq; de suo quicquā, præterquā pau-
ca, quæ in operibus artis ipse obseruauit,
& expertus est, addidit. quemadmodū
ipse in præfatione sua pulchrè testa-
tur:

EPISTOLA

tur: ex qua omnia plenius hauries. Aui-
 cenna Arabicæ familiæ princeps, hunc
 authorem, in his quæ ad curationes, &
 præcipue ad partē chirurgicā spectant,
 secutus est. Allegatur à priscis simpli-
 citer Pauli nomine. Galeni simia haud
 iniuria à quibusdam appellatur. Sunt
 qui eum Aetio uetustiorē, aut eius tem-
 poris fuisse autument. Nec desunt, qui
 scholis eundem nostris accommodatio-
 rem, propter compendium, ordinem, &
 artificium contendunt. Hunc tam excel-
 lentem medicinæ scriptorem, olim pri-
 mus (etiam si rumpantur illa Codro) la-
 tinitate, in maxima temporis angustia
 & præcipitantia, ex unico uitiosissimo
 exemplari, utcunque donauī. Nunc ue-
 rò maiore tandem cura et fide totum de-
 integro, codicibus Græcis emendatori-
 bus, et ueritatis ipsius acriore iudicio ad-
 hibitis, recognoui, ac nitori deniq; suo
 tantum non ad unguem restitui. Restāt
 quippe nonnulla, quæ nec mihi faciunt
 satis: quibus de, si posthac compertius
 quippiam, uel posterior cogitatio (δευτέ-
 ρων ἢ ἀμεινόνων, iuxta prouerbiū) uel ube-
 rior meliorum exemplarium copia, uel
 amicorum admonitio suppeditabit, pali-
 nodiam

N V N C V P A T O R I A .

nodiam canere nequaquā pudebit. Qua
in re si quispiam me prauenerit, meaꝑ
uel castigauerit, uel meliorē, ut futurum
auguror, uersionem attulerit, tantum a-
berit ut ægrè feram, ut etiam illi gratiam
habiturus sim maximam. Quemadmo-
dum equidem eorum qui talia moliūtur,
diligentiam commendo, ita felicitatem
suspicio, qui ne in scriptis suis Momo
carpendum quippiam reliqui fiat, præ-
stare possunt. mea quippe tenuitas istud
ne per somnium quidem polliceri ausit:
in hoc potissimum scripti genere, quod
calumnijs est præ cæteris obnoxium: at
que hac ætate, in qua nihil à uilitigato-
ribus tutum, cauillis & mordicibus om-
nia patent. Hos igitur qualescunq; labo-
res nostros C. T. tanquam tutelari numi-
ni, cū memoratis, tū hoc potissimum
nomine offerimus, ut debita beneuolen-
tiæ memoria gratiam aliquam literato
munusculo reponamus. Dominus Iesus
seruet ac prosperet uitam tuam omnem,
unicum Abbatum decus: Albanumq;
tuum à longo iam tempore, toto pecto-
re tibi addictum, ames, foveas, ac tuea-
ris. Ex Monte Plusiaco. Prædie Calend.
April. Anno M, D, X L V I.

α 5

PAVLI

PAULI AEGINETAE RERVM
memorabilium Index.

A	Abdominis mēbranæ uul	ex Acinis uinaceis malagma
nera	468	732
abies	574	aconitum 555
ex Abiete acopum	736	aconiti potus 416
abietina resina	620	acopa ungenta 720. 732. di-
ad Abrasa	332	uersi generis 733. 734
abrotoni uis	550	acorum, acorus 559. 555
abscessus	450. 451. 453	acrides 555
abscessibus corporis exterioribus. 335. rīpendis. 336		acrochordon 333. 438. 502
emplastrum 704. 714		actē. 555 adarce. 552. 736
absinthium	564	adiantum 22. 552
absinthij diluto ebrietatem		adipis esus 55
arceri	60	adipes diuersorum animalium 626 adæon 553
acacia 554	pastillus 679	agilops. 172. 552 oculi. 442
acalis. 554	acalyphe. 554	Aegyptia faba 51
acantha	554	Aegyptia ori inferuiēs. 688
acanthobole	449	peſſus 750
acanthus, acanthes, acanthi		agyros 552
um	554	equinoctium uernum et autumnale 65
accipitrum fel	638	æra 554
Aceratus Galeni	712	aer salubris, aut uitiosus, cuiusmodi 25
acetabulum	760. 761	aeris corruptio, eiusdēq; correctio 102. 103
acetum	611	æreoli 760
aceti fex	632	as crematum. 636 eiusdem emplastris inferendi ratio 721
ex Achate lapide emplastrū		æris flos. 636 squama. eod. 599 quomodo ad emplastra
710		
achor. 131. ad achoras medicamenta. eod. inde		
achora	613	
achras. 564	achrades. 357	
acinorum uuae nuclei	569	

INDEX.

plastra coquendus.	721	sum saluberrimus	401
ærugo	582	ex Allijs ruptorium emplastrum	705
æruginis emplastro inferenda ratio	722	ex Alno acopum	736
æstate quali uictus ratione utendum	28	aloe 556 ex purgantib. fo la stomacho amica.	640
æthiopis herba	553	ex aloe catapotia	645
ætonychos	552	aloe quando emplastris indeda	724
602 agallochum	551	aloes usus	639.640.641
Agapeti antidotus	67	ex Aloe collyrium	698
agaricum. 551 eius sumptio uenenosa. 424. usus	551	alopecia	124.125
642 ageraton	551	alopex	557
ageratus lapis	198	alphi	593.610
agninus pulmo	616	atri	326.327
guis	553	alterationis procliuitas uirtuti magis quam uitio ad scribenda	26
agnus 551 agrostis	551	altercū	633. eius efus. 414.
aiuga	636	althæa	555. inde emplastrum
alabastritæ cinis	601	Strum	706
Alana gleba	569	circa Aluū astrictam aut lumbicam in febr. quæ obseruanda	118
ad Alarum graueolentias et sudationes	219	aluū quæ subducant bene ualentibus	22
alauda auis	594	alui excrementa, at q. hinc prasagia	88
albugines	178	alumen scissile	627. rotundum & stragalotes cod. placitis, plinthitis
alcibiadios	552.578	aluminis emplastro inferenda diratio	722
alcioniorum genera	556		
Alexandri cyphoides	668		
ex Albucis emplastrū	704		
Alexandria herba	571		
alica 50 alicacabū	627		
alimentorum facultates	46		
alypi seminis usus	643		
allium	49.625		
allij efus contra uiperæ mor.			

INDEX.

aluminis uires	627	amurca	558
alypias	643	amygdalinum oleum	742
alypij semen	556	amygdala. 53 amara	558
alyson 556. eius usus. 643		dulcia eod.	
amaracus	557	ex Amygdalis amaris pastil	
amaracini olei compositio.	745	lus. 676 amyllum	558
amarantum	557. 575	amylus panis	50 (709)
amaurosis	182	Amythaonis emplastrum.	
Amazonum pastillus	675	anabrochismus	436
ambe spatula	536	ex Anacardijs Theodoretus.	
amblyopia	182. 179	667 anagallis	559
ambrosia 557. 566. arcen		anagyris	559
dis febribus	732	anacollemata	692
ad Ambusta 330. ut pili res		anarrbinon	560
nascantur	331	anasarca	253. 643
amiantum	557	anchilops	172
ammanita 50 ammi. 557		ex Anchusa emplastrum.	708
ammoniacae guttae emplastris inferenda ratio.	723	anchusa species	551
ammoniacum thymiana. 557		ancyle, ancylotes	380
eius usus	645	ancylum	446
ammos	557	ancylloglosson	446
amomum	559	andrachne	559
amore insanientium morbus	356	andronius pastillus	677
remedia	569	androsarces	559
ampelitis	558	androsamon	559. 633
ampeloleuce	558	anemone	559
ampeloprasa 49. ampelos		anethina	732 (740)
prasum	558	anethini olei preparatio	
ampelos agrias 558. heme		anethum 559 eius decoctio	
ron. eod. melena 558		Etum	107
amphisbena morsus	402	aneurysma. 374. 454. 467	
	199	angina, eiusque differentia.	
		angiolo	

INDEX.

angiologia	429	tia.eod.procidentia.272
ad Angylas emplastrū.	709	ani perforandi ratio. 498
angylosis	739	aparine 560
anguis exuuia	569	apechema 509
anhelosis medendis	206	aperientia medicamēta.184
anicetos emplastrum	713	Aphace.563 aphrodes.606
animalium pedestrium car.		aphrodisiasticon clidiō.675
nes 54.	partes. 55	aphroditarium 682
animi defectio	120	aphronitrum 563
anisi semen	560	aphroselinus 602
anisotachys pulsus	78	aphtha.5 apiastrum. 605
anonis. 560	anorexia.222	apios 560
anni temporum ratio	65	apium. 622 montanum.612
anserina caro	54	palustre. 575 satium.
adeps	626	48.582 syluestre. 625
anthemis	636	apij usus 643
anthera. 311	antherū. 683	apum iētib. medendis. 396
anthraces	345	apochyma. 560 quomodo
anthyllis. z. eius genera. 559		emplastris inferēdū. 723
antias. 198	antiades. 447	apocymum 560
antidotorum differētia. 655		apollinaris herbæ esus. 414
diuersarum compositio.		Apollophanis malagma.
eod. inde	731	
antirrhinum	560	apomeli 689.690
antitosis	523	apoplexia 157
antrachosis	179	aposcarnismos 509
antylum	732	appetitus à cibis auersio.
ani condylomata. 498	ris 222. 665	
mæ.eod	(680	aprugnum iecur 580 (633
ad Ani dolores hypothum.		aqua coelestis optima 26.
ani fistulæ. 495. inflamma		aqua intercus. 252 quomo-
tio. 269 erysipelata. eod.		do educatur 463
dolores. 270. excrecens		aquæ inter cutem utilis pi-
		cre

INDEX.

era	666	Aristophanium emplastrum.
aqua, in qua ferrum extin-	709	armenia terra 53.
ctum	623	569 armeniacum 561
aqua mulsa	60	armeniacus lapis 602
aqua salubris aut uitiosa	arnabo. 561	arnoglossu. 562
quæz	(xius 424	arquatus. 258 arsenicu. 562
aquæ haustus quatenus no-	artaba Aegyptia 761	(562
aquæ uitia quomodo corri-	artemisia. 566.	eius species
genda	26(644	arteriæ sanguis flauior &
aquâ prolicientia pharmaca	tenuior	374
aquarum diuersa ratio.	633	arteriæ. 74. earum incisio.
aquagium purgatorium ex	429	(205
caryophyllo	645	arteriace hypoglossis. 204
aquilarum fel	638	arteriacus affectus 201. 203
arabicus lapis	601	arthritidis 298
araneæ ictus	397	ad Arthriticos emplastrum.
aranei muris morsus	399	719
aranei uires	560	articularis morbus 298
arbutus. 592	arceuthos. 561	articulorum contusiones. 332.
arcion. 561	arctium. 561. 566	hulcera. 372 incuruatio
Argæi montis lapides	601	nes. 713 obstructions. 716
argemō. 175	argemone. 560	tophi 304. 308
argentū uiuum. 633	eius	articulis luxatis 381
haustus	423	ad Articulos contractos, seu
argenti recrementa	575	ligatos. 380. cōuulsos 709
argenti spuma. 600.	potata.	ad Articulos emplastrū. 712
423	artos. 562	arum 561
arhythmus pulsus quis.	77	asarum. 562 asbole 562
Ariobarzantium empla-	ascalobotes	562
strum	707	ascarides 381. 386
aridorum mensuræ	761	ascites hyderus 253
arifarum	560	asciten solam inter hydro-
aristolochia. 31. eius species	pis species manu operā	postulare
560	usus	643

INDEX.

postulare	465	rium & sutorium. 604
asclepias. 562. smegma. 684		quomodo emplastris im-
ascyrrhon	559. 633	mittendum. 721. inde aco
aselli	540	pon
asy lapidis flos. 601. inde em		738
plastrum	718	atrecbilarius humor. sanguis
asininum iecur	580	nis fex
assalathi uires	562	atriplex
asparagi. 481. petræus, mya		48. 563
cantharus	562	atrophia
asphalax. 718. asphaltus. 563		180
asphodeli radix	563	attenuatis partibus quomo
aspidis senectus	569	do medendum
aspidis species. 404. et mor		32
sus. eod. non sine uolupta		attonitus morbus
te letalis	405	157
ex Aspidum cinere empla-		audiendi difficultati medica
strum	714	mentum
asplenium. 563. astaphis. 563		25
aster. 211. 674. Atticus. 344		in Auditorium meatu si qua
563. 566. Magni	697	inciderunt
asthma. asthmatici	205	443
astragalus	563	auditorijs meatibus non per
Atactos antidotus	672	uijs
athanasia dolorem sedans,		443
ad pleuritidem	662	auditus grauitas. 188. contu
athara. athera	552. (710	sio. eod.
athena ad hulcera sordida.		auellana. 53. 586. inde empla
atheromata	355. 453	strum
atrachelos pulsus	77	718
atractylis	360. 563	auena. 50. 567. eius coquens
atramentum Indicum. 604		dæ ratio
metallicum. eod. scripto-		51
		auium carnes sicca
		55
		auium in cibo facultates. 54
		auricula muris
		556. 608
		auricularia, & de aurium
		dolore
		184. inde
		auripigmentum. 562 eiusdē
		emplastris inferēdi ratio.
		721
		auripigmenti haustus
		423
		auris collisa
		516
		aures

INDEX.

- aures animalium concoctu Basilij acopum. 735 (409)
 difficiles 55 basilisci uirus, et morsus.
 aures cruore exudantes. 186 batrachos. 197. 565. eius spe
 uerminose 187 cies 565
 aurium calculis, aut alijs quæ batus. 565 bdellium eod.
 inciderunt extrahendis. 187 bdellij emplastris inferendi
 aurium humectationes. 6. 50 ratio. 724. eiusdè usus. 643
 nitus aut sibilus. 187 for. bechiu. 566 bechicon. eod.
 des. 621 & hucera, car. tussientibus utile 205
 nium excrecentia 186 bellaria ad renum & uesti-
 autumno quali uictus ratio cæuitia 671
 ne utendum 28 belulcum 504
 axillæ adustio 461 besafa 200. 609. 688
 azanite acopon 734 beta 47. 48. 630
 B betonica 565
 Bacharis 564 bilem atram purgatiâ cuius
 baium malagma 729 modi. 643 & quibus po
 balaninum oleum 743 tiff. exhibenda. eod. inde
 balanus myrepfica 564 bilem flauam purgatiâ sim
 balaustiū. 564 ballote. 396 plicia 639
 a Balneo potus liberalior, ue bilem purgantibus quando
 neni instar 411 utendum. 640. & quibus
 balnea calida frigidis salu. præcipue eod. inde
 briora 27 biliosi humoris fluxus in po
 balneorum sordes 570 dagra curatio 300
 balotes. 565 balsamum. 564 bifacutū. 48 bitumen. 563
 e Balsami succo collyrium. quomodo emplastris inse-
 699 rendum 723
 balsami unguento immitten blattæ 623
 di ratio 739 blepharoxylon 173
 barbara emplastrum 711 blitum. 48. 566 boleti. 50
 barbaricum acopum 735 bolus Armenius 569
 basilicum tetrapharmacū. botanicum emplastrū. 704
 bothrium

INDEX.

bothriū. 175	botrys. 566	cadmia quomodo emplastris	
bouis talus, & fœmora. 613		inferenda.	722
brachij fractura	522	cadmiæ species. 583. botryia	
brachialis luxatio	538	tis, placitis. eod.	
branchus	201. 203	ē Cadmia emplastrum. 708	
brassica. 47. 595. canina		cape 49	596
560	(567	calamagrostis	584
barathri. 566	bretanica.	calaminta	584
bromium acopum	734	calamus odoratus	584
bromus	567	phragmites. eod.	
branchoccele	455	calcanei attritiones ē longo	
bruchi	584	decubitu	312
bryon thalassion	567	calcaneorū rimæ. 311. 708	
bryonia. 567. eius cymæ. 49		calculus renū et uesticæ. 239	
uires	558	calculi in uestica, aut renib.	
bubo. 343	ad bubonesema	signa	475
plastrum	716	calculi excindēdi ratio. 474	
bubonium	344. 563. 566	475	(669
bubonoccele	262. 484	calculo laborantib. oxymel	
bubula caro	55	calida intemperies quomo-	
bubulum fel	637. stercus.	do emendetur	41. 42
593	a deys	616	caligatio
buccellatus catharticus. 646		calliblephara	174
buccinorum testa. 589. 613		callionymi fel	637
buglossum	566 (417	callus	312. 495
bulbus. 566. 49 syluester		calli fracturariū excrecena	
bulimos. 115	bunium. 566	tia. 531	concretio. eod.
638	buphthalmion. 566	callos adimentia	371
buprestis potus	412. 566	caltha	24
butyrum	566	caluaria fractura multiplex	
C		509. eius curatio. 511. inde	
Cacalia. 584	cachexia 252	calx. 631. eius haustus	423
cactus.	625	ē Calce lixiuum	592
		β	calyx

INDEX.

calyx	232	capillitij tinctura	127	au
cameli cerebrum	573.	ro similis	129	
um	613	capillorū glutinamentū.	175	
cameratio	508.509	ad Capillorū profluuiū.	127	
campe, bruchi	584	capillorum uitia	124.126	
canabrosis	208	capillos augens & nigrio		
canamū	583.	eius radix.	res reddens aqua	126.
cancer	348.463	capillos extenuantia	127	
cancer immedicabilis mor-		capistrum	517	
bus Hippocrati	316	capito marinus pisc.	58	
Cancrorum cinis	585	capnion	585	capnos. eod.
canis arcendis	128	capnistos trochiscus	205	
canis rabiosi hepar	579	capparis	48	radix. 585
morsus	592	caprea fel.	638	sanguis 554
do cognoscendus	393	caprificus	719.628	
ad Canum morsus empla-		caprillus adeps.	626	caro 55
strum	710	cornu.	588	fel. 637
entium	395	par.	579	lotium. 613
canina appetentia	113	guis	553	stercus. 593
canini stercoris usus	200	Caprino stercore mala		
231.592		gma	730	(gantia 23
cannabis semen	585	caput per os & nares pur-		
canopum	585	capitis ad ustio in lippientia		
cantharides	584	bus & elephātiāsi.	427	
eorum haustus	411	capitis dolor, cephalalgia.		
capillatio	509. (126	132 ex calore, aut frigo		
capilli quibus conferuentur.		re. 132 ex biliosis humori		
quomodo cirrati reddan		bus. 134 per consensum.		
tur. 127 & nigri. 128		eod. ex ebrietate. 135 ex		
si quomodo tingantur et		ictu. eod. in febris. 109		
flauescūt. 128 item nigri.		capitis exanthemata, bulcu		
eod. ut candidi reddan		scula densa et rubra. 130		
129		manantia 131		ficosa. 132
		capitis		

INDEX.

capitis figuratio	35	586	
capitis fractura	308 eius	cartilaginosa concoctu difa	
differentia, eod. inde. me		ficilia	55
dendi ratio	511	cartilaginosi pisces	59
capitis morborum praesagia		carya	586
63		carynon oleum	743
capitis pediculatio	132	caryophyllon	586 ex eo
capiti conueniens puluis	682	dem aquagium purgato	
carbunculus oculi	179	rium	645
carbunculi	334.345.347	caseus	632 eius esus 57
ad Carbunculos emplastru.		cassamon	586
716		castia	586
carcino des strumae	452	castaneae	54 glandes
carcinoma oculi	179	Sardoniae	418
cardami semen	585	castorium	587 coagulum
cardamine	624	619	
cardamomum	585	catachristi trochisci	673
carduus	48.624	catagmatica	702
caricae	52	catagmaticum emplastru.	
caries lignorum	621	719.720	
caris	585	cataphora	85.146
carnis in hulceribus excre-		cataphorae.62 curatio	109
scientiae	361.362	cataplasmata	680
carne nutriens emplastru		catarrhus	201.202.
strum	719	204	
carnebus procreantibus colo-		ad Catarrhosum caput smeg-	
lyrium	371	ma	685
carotides	453	catechomeni	145
carpesiae succus	416	cathartica puls.	648
carpesium	586	catharticae oliuae	646
carpobalsamum	564	catharticus buccellatus.	646
carpus 523 caros	146	catheter	246.161
cariradices	49 semen	catheterismus	474
		6 2	catoche

I N D E X.

catoche, catalepsis	145	si pelus. eod. eiusdem mem	
catochos. 85. 140. 144	eius	brana inflammatio	513
curatio	145	nigrefactio	514
caucalis	587. 701	cerebri temperamenti indicia	
caudatio	487 (508)	35. 36 uulnerati signa.	
caulatum ruptura cuiusmodi		506 cerion	131
causos febris	98	cerui cornu. 588. ex eo pastil	
causon 403	cecis. 538	lus	675 (608)
cedria	587	ceruina caro. 55	medulla
cedri differentia	587	cerui ocellus	574
e Cedri liquore emplastrum		cerussa. 638 eiusdem empla	
715	(404)	stris inferenda ratio	721.
cenchros. 587. eius morsus		708	(422)
centaurij minoris usus. 642		cerussa sumptae remedium.	
radix	587	cestros 410	cestron 565
centipes marina	624	chalastreon	602
centuncularis herba	570	Chalestra uicus.	eod.
cepaea	589	chalacia. 438	chalaciu 173
cephalea	48. 136	chalbanon	635
cephalalgia	132	chalcantion	636 chalcant
cephalica huiusmodi	360	thus. eod.	
cera. 589. eius modus ad ole		chalicitis. 607. 635. quomodo	
um in paradisi acopis. 720		ad coquenda	721
ceramium italicu 760. 761		chalcos	636
cerasia	52. 588	chamaecissus	636
cerastis morsus	405	chamaedaphne. 572. eiusdem	
ceratoma,	588	asparagus	49
ceratia		chamaedrops	637
ceratu 759	cercosis 487	chamaedrys	636. 637
cerebri diuersorum animan		chamelea. 357. 637. eius u-	
tium uires	573	sus	643
cerebri esus	55	chamaeleontis haustus	414
cerebri inflammatio. 142	ery	radix. 636	sanguis 553
		chamae-	

INDEX.

chamaeleuce	636	chrysolinon. chrysonema.	
chamaemelini olei præpara	516	chus	760.761
tio	740	cibarius panis	50
chamaemeli. 636 (usus. 643		ciborum appetitus auersio	113.114
chamaepitys 636. 417. eius		ciborum in uentriculo cor-	
chamaraphanum. 643. eius		ruptio	17(47
usus	653	ciborum uarietas insalubris	
chamaesyce	637	cicadae 630 inde medica	
characias	631	mentum	669
charta deusta	614	cicatricem hulceribus obdu	
e Charta pastillus	677	cetia 364.365. 708.715	
chelidonia aspis	404	cicatrices oculorum 177. ea	
chelidonium	637	rum tinctura	178
chema. 760 chemosis	171	ad Cicatrices atras	367
Chia terra	569	cicer 576 cicera. 51 eo	
chiacum collyrium	692	rum species	576
chironia hulcera. 366. ad ea		cichorium	414.590
dem pastillus	679	ciclamimum	413
choa 759 choenix	761	ciconiarum stercus	593
choerades	452	cicuta 597 eius potus	415
choeradicum	355	cimices 593 cinara. 48	
choeropelethum	704	cinnamalis herba	22
choerospelethos	233	cinerula	66. (69 c
chole 637 cholera	226	cinis alius alio uehementior	
chondri coquendi ratio	51	630 (strum. 717	
chondrilla	638	cinnabaris. 539. inde empla	
chondrus	50.638	cinnamomum	589
chrysanthemum	24	circeæ radix	589
chrysanthon	575	ciria 522 cissampelos. 575	
chryse enemos emplastrum		cissanthemon	597
719 chrysites	638	cissaros. 590 cissaris	589
chrysocolla	613.638	cissinum emplastrum	706
chrysocoma radix	638		
		β β	cissos

INDEX.

cissos, cisthos	590	colla. 591	colliquatio	107
citrageo	605	collisio		509
citrinum malagma	730	collyrium liquidum indolo-		
citrium malum. 2. 590. 408		rium		169
e Citrio malo purgatorium		de Collyrijs	690. inde	
646	citta	colobomata		445
clauicula fracta. 517	eiusde	colocyntha. 591	colocyna	
luxatio	534	this. 592	eius usus	641.
clauiculā inter animalia so-		642	colon	233
lus homo fortitus	534	colori corporis uitiatō me-		
clauus. 312. 502 oculi	176	dicamentum		15
clematitis	561. 590	colpos		368
Cleonis collyrium	698	columbinus sanguis		553
Cleopatrae mors	404. 405	columella. 447	eius inflam-	
clidium Oribasij aphrodisia		matio		198. 199
sticō 675 clinopodiū. 591		colymbades	53. 360. 556	
cluninum iecur	580	coma, uigil somnus		140
clysteris uestica immitendi		144	comaro	592
ratio	474	us	23	
encoron		644	comitialis morbus. 148. 149	
enici semen	591. 645	ex consensu stomachi	151	
enidium granum	681. 591	alicuius mēbri uitio. eod.		
eoaguli cuiusuis uires	619	ad Comitiali oppressos er-		
coccus 591 coccymelea. 591		rhinon		137
cochlearum efus	58	ad Comitiale scillae prapa-		
cochliae crematae	594	ratio		662
coelia	591	conceptui adiuuando reme-		
coeliaca affectio	227	dia		290. 293
coeloma	175	conchilia		591
colchicum uenenū. 410. 417		conchulae crematae quomo-		
colica aegritudo. 233 cuius		do emplastris inferenda		
modi Aeginetæ tempore		722		
337		conchularū Indic. testæ	611	
		ad Concoctionis difficultas		
		tem		

INDEX.

tem	666	cornulaca	631
condylomata 487 sedis	498	cornu uires	588
condylomata uulue	292	coronopidis radix	594
293		et Coronopodio confectio pur	
congius	750.761	gans	648
coni cortex et folia	597	ut Corpus suauiter spiret.	14
conia	592	corporis cuiusq. dimensiones	
Constantini sapa	685	tres 75 corruda	589
contrariorum usus in reme		coryza	201.202
dys adhibendis quatenus		costarum fractura	520
conueniat	304	costus	594
ad Contusiones	351	cotonea	53
conuulsio	152	ex Cotoneis medicamentum	
conuulsiones	162	665. inde purgatorium	
conuulsory pulsus	80.87	646 cotyla	759.761
conyza. 592 copros	592	cotyledon	594
copton ad stomachi duricie		coxa luxatio. 541 eius spe	
731		cies. eod. inde	
coracum emplastrum	709	coxarum adustio	492
coralium	593.671 (671	coxarum ossium fractura	521
et Corallio med. ad podagra		coxendicis affectus. 295 ad	
cordis affectus	216 inde	eudem emplastrum. 712	
condis esus	55	ad Coxedicum dolores. 672	
condis indicia	38	crambe	595
condis palpitatio	217	crataegonum	595
condis uulnerati signa	506	cremasteres	477
coremata	613	creta cimolia. 569 sutoria	
coriandri esus	414	604 crethmon	595
corianum. corion. corian		Cretica terra	569
drum	594	crimmon	595
coris herba	594	crinatum thymiana	747
corni fructus	595	crinon	595
corniculatum papauer	606	Criogenes pastillus	679
		crithe	173.595
		β 4	
		Critonis	

INDEX.

Critonis smegma	684	Etio	11
crium	576	cyamus	596
ad Cruenta emplastrū	711	cyathus	760.761
crocinū diathoron.	698.04	cyboides os	528
leum	746	cyclaminus	596
crocodes pastillus	674	cyclisci	511
crocodilus terrestris	671	cycnarium collyrium	693
crocodili iētus	406	cydonatum contusum	fra
guis 554 semen	596	gumentis integris	665
crocodilorum terrestrium ster-		cydonia mala	606
eus. 593		cygnus rubens, cādidus, etc.	
eod.		collyrium	693
crocomagmatis apparatus		cyma 48	cyminū 597
676 compositio	746	cynanche	199
crocus	596	cynocrambe	560
crotonum usus	643	cynomorum	560
cubiti fractura	525.	cynos batus	597
luxatio		cynos orchis	612
537 cucumis. 6. 51. 623		cyparissias	631
yluestris. eod.		cyperus	597
cucumeratim ruptura cuius		cypheos materia	747
modi	508	cyphi magnum, Iliacum, so-	
cucumeris yluestri corticis		larium 748. seleniacum,	
usus 643 succus	574	siue lunare. eod.	
cucurbita	51. 591	cyphoides ad iocincerosos.	
cucurbitula aenea vitreis		667. 668. 747	
efficaciores	460	cyphoides oppilationes.	250
cucurbitularum usus	460	cyphosis	539
forma	461	cypri folia	597
culices quib. arceantur	390	cyprinum oleum	744. 745
cupressus	597	cyrenaico succo pharma-	
Curei malagma.	730 (445	cum ad quartanā	648
curta aurium, aut labrorū		cytini	620
cutis cōstipatio, siue adstri-			

INDEX.

cytisi folia	597	diabacanu hepaticum	668
D		diabetes	89.245
Dacorum et Dalmatarum		diacaryon	687
tela	505	diaceratos collyrium.	697
dades	571	diachylon me.	269
damaſcena 53.571	pruna	diacodium	662
591		diacoralliu paſtillus	674
damaſſonium	571	diacrocū collyrium	701
daphne. 571.	herba.eod.	diadaphnidon	284
daphnoides herba. 571. 590		diadiētānu emplaſtrū	710
darti	477.481	diagigarton	228
daucus. 602. 49. eius ſpecies		diaiteum emplaſt.	224
571. 587		diamoron ſimplex. 686 cō-	
decamyron	728	poſitum	687
decretoriæ morborum no-		dianemonis emplaſtrū	716
tæ in initijs uitioſæ	72	diacenanthes	228
dedolatio	509	diaphanes	626
defluxionū epiphoræ	169	diapyrrhanu emplaſtrū.	705
delirium 139. dendrodes. 631		diarhodon collyrium	698
ad Dentes attritas	196	albō, crocinū, Nili. eod.	
dentes dealbans	196	diarhodos paſtillus	674
dentes quomodo à corrupte		diaroca remedia	169
la ſeruandi	15 (de	diaſmyrnon	695
dentium cruciatus	194 in	diaſtole	74
dentium euulſio	446	diaſtruthiu emplaſtrū.	704
dentium ſmegma	195.196	diathalias	695
ad Dentium ſtuporem.	196	diatonlotarion	270
dentib. aduerſa quæ	15	diatrion pepereon	223
ad Dentes quaſſatos	195	diaturpenes ceratū	718
dentitio infantum	5	dichromō emplaſtrum	714
derma	572	dicrotos pulſus	78.87
deſeſio	508. 509	diētamnus	572
deſtillatio	201	didonia	417
		6 5	dies

INDEX.

<i>diæ decretoriæ</i>	70.	<i>contem</i>	<i>cothienes.</i>	345.	<i>emplastrum</i>	
<i>platory</i>		71		704		
<i>digitorum collisio, siue fra-</i>			<i>drachma</i>		760	
<i>ctura</i>	525.	<i>luxatio</i>	538	<i>draconis marini ietus.</i>	406	
<i>digitorū pedis luxatio.</i>	545.			<i>c Dracunculo emplastrum</i>		
546				707	(cod. 572)	
<i>digitorum pterygia</i>	313.	<i>nio</i>		<i>dracunculi.</i>	387	<i>dracontia.</i>
<i>mæ</i>		310		<i>drimphagia</i>		629
<i>de Digitis adnatis</i>	461		<i>dropax.</i>	733.	<i>Gallus</i>	737
<i>Dioclis epistola de sanitate</i>			<i>drupæ oliuarum</i>		53	
<i>tuenda</i>	62		<i>dryimus, eiusq; morsus</i>	402		
<i>diomphacos malagma.</i>	727		<i>dryopteris.</i>	572	<i>drys</i>	573
<i>Dionysia medendis abscessi</i>			<i>dysenteria.</i>	130.	<i>iecoraria</i>	131
<i>bis</i>	336		<i>ad Dysenteriam hypothum</i>			
<i>dionysias</i>	572		680.	<i>pastillus</i>	675.	676
<i>diospolites</i>	666		<i>dysodes acopum</i>	735.	<i>epi-</i>	
<i>diphryges</i>	572.	<i>eius co-</i>	<i>thema</i>		216	
<i>Etio</i>	721		<i>dyspnœa</i>		205.	206
<i>diploe</i>	510	<i>dipsacos</i>	245		B	
<i>dipsaci radix</i>	572		<i>Ebeni lignum</i>		575	
<i>dipsadis morsus</i>	403		<i>ebiscus.</i>	555	<i>ebulus</i>	555
<i>districhiasis</i>	432.	435	<i>ecchymoma</i>		351.	352
<i>dydras collyrium</i>	694		<i>Echidnæ carnes.</i>	577.	<i>mor-</i>	
<i>dodecatheon medicamen-</i>			<i>sus</i>		400	
<i>tum</i>	214.	663	<i>echinus</i>		577	
<i>dolichi</i>	51		<i>echinorum efus</i>		58	
<i>doloris species et causæ.</i>	106		<i>echion</i>		578	
<i>dolorē sedantia.</i>	185.	<i>empla-</i>	<i>ecpiesmus</i>		183	
<i>strum</i>	709	<i>doracia</i>	53	<i>corythmus pulsus</i>		77
<i>dorcadizon pulsus</i>	78.	86	<i>ectropion</i>		172.	435
<i>dorias</i>	578		<i>elæomeli</i>		574	
<i>dorycnion</i>	411.	418.	572	<i>elate</i>	574	<i>clatine herba.</i>
<i>Dosibei catapotia</i>	668		<i>cod.</i>			

INDEX.

elateriū 136. 574. 623. eius	enetici trochisci	673
sumptio uenenosa. 424	engisoma	508. 509
usus 642	enema	702. 703
elca 573	eleon. eod.	entaticum emplastrum. 719
electrum. 579 ex eo pastil-	enterocele	262. 482
lus 674	enthusiastici 152	siue en-
eleliphacus 575	theastici. eod.	
eleoselinum 575	epheleis. 593	ephelis 557
elephantiasis 316 contagio	ephemerum. 577 eius uene	
sa 321	num	417
ad Elephantiasim catharti	ephialtes	154
capuls 648	epibole	154
elephantis ungues, ossa, den	epicauma	176
tes 575	epilepticorū & ephialtico	
elephantiorum capitis cō-	rum discrimen	155
bustio 427	epimedium	576
elaphoboscus 574	epimelis	576
elos 176 elymus 576	epinyctides	329. 330
empetrum 576	epipaetis	576
emphysema 171	epiphora	169
emplastella 703	epiplocele	483
emplastrorum uaria genera	epiploenterocele	483
702. 703	de Epithematis	724 inde
de Emplastris, eorūq; deco-	epithymbri usus	643
ctione 702. inde	epithymum 576 eius usus	
emplastris inserēdorum me	22. 643	
dicaminum elixatio. 721	epomphalium	652
emprosthotonus 164	epulis. 196	epulides. 445
empyema 212	equapium	625
encanthides 175. 438	equi fluuiatilis pellis	572
encephalos 573	testiculus	582
enneapharmacum 274	equinum coagulum	619
enneapharmacus pessus	equisetum	582
750	equorum sanguis	554
	erebino	

INDEX.

erebinthus	576	tis. 130	infantum	4
Ertria terra	569	excisio		508
eria 576 erice	576	exercitatio quid		7
ex Erica pastillus	676	exercitationis ratio pro æ-		
erigeron	580	tate habenda		7
erinacei terrestria fel, caro,		exercitationum genera		8
testa 578. item marini.		expressio		509
eod.				
erinos 577. errhina	136	Faba	596 (eod.	
eruca	48. 577	fabæ 51	fabæ Aegyptia	
eruca picearū haustus	412	faciei uitia	192	inde
erulicæ 51 eruum	612	fames uehemētiōr, bulmos		
ex Bruis medicamentū	663			115
eryngium	580	farinatum ruptura cuiusmo		
erysimi semen	577	di		508
erysipelis 341 cerebri	142	fastidium		222
erysipelis inflammatum, et		faucibus inseruiētes unctio-		
erysipelacea inflāmatio,		nes		685 inde
non idem	341	Faunorum ludibria		154
erysipelata 216. 269. 334.		fauum	131	fauus. 356
349. 551				494
erythrium malagma	719	febricitantium uigiliæ		108
erythrodanum	577	febris pestilentialis conside-		
Esdræ compositio	664	ratio		103
ethmoide ossa	202	febrium diariarum agnitio		
ethmoides meatus	157. 190	et medela 90. item pus		
eunuchū faciēdi ratio	486	tridarum 91. 92. tertia		
euodes medicamentum.	220	narum 93. notarum 94		
eupatorium	577	quartanarum 95. quotio		
euphorbium 577. eius usus		dianarū 96 hepiali. eod.		
644. ex eo acopum	735	continuarum. 97 astuan		
eurythmus pulsus quis	77	tium 98. ex erysipelate.		
eusomon	577	99 hecticarum eod se		
exanthemata 328. 613. capi		mitertianarum		101
		febrium		

INDEX.

febrium immoderatis frigo	699		
ribus & rigoribus	110	foenogracum	51. 640
fel diuersorū animalū	637	ex Foenograci succo collyri	
felis morsus	399	um	697
femoris fractura	526. 528	foetus nascentis figura natu	
intertrigines	6	ralis quæ	294
fera siccioris alimonie	36	foetus quum simul editi	294
fermentum	578	foetuum extractio & exci	
e' Fermeto emplastrum.	704	sio	489
ferrum aqua extinctum		fontinalis herba	617 (335
623		formica	502 formicæ
ferri recrementum	625	formicæ	332
squama	599	forniculans pulsus	30
ferula semen	609	fractura quid	508
fex uini. 632	aceti. eod.	fractura cum uulnere illatæ	
fex cremata	632	ratio	529
ad Flagellata	332	fracturarū differētiæ	508. et
flagris medendis	331	species. eod. inde	
flatus in uētriculo genera-		fractura quæ non occalles	
tio	225	scunt	531
ad Ficationes palpebrarum		fracturarum calli excresecē	
701		tia	531 ad eandem em
ficus 52. 628	arbor. eod.	plastrum	711
ficus capitis. & reliquorum		ad Fracturas emplastrū	715
corp. membrorum	132	719. 720	
ficus cinis	630	fraxinella	617
fici folia	628	fraxinus	605
filicula	617	frictio præparatoria	7
filix	618	frictionum genera. 9. disci	
fistula	370	mina. eod.	
de fistulis generatim	493	frigida intemperies quomo	
fistulæ ani	495	do emendetur	42
foeniculum maius	582	ex Frigore lasis	20
e' Fœniculi succo collyrium		frigorifici succi	20
		fronti	

INDEX.

frontis incisio	430	genista	625
in Fröte sanguinis detractio		genitalis membri affectus	
cuiusmodi	459	471. 472. inde. impoten	
fructus arborei. 52 horarij, si		tia. 267 praesidia. cod. do	
ue fugaces	51	lores 268 hucera 313	
frumentacea	50	683 thymi	473
fuligo 600 eius usus	562	ad Genitaliū uitia pastillus	
fumaria	585	678 emplastrum	709
fungi 50. 608 eorum esus		genitura nimietas 19 proflu	
420		uium	265
furunculus	43. 345	gentiana	568
ad Fuscédines	15	genu luxatio	545
fusus agrestis	48	genuū patellæ contusio, si	
G		ue fractura	527
Gagates lapis	601	geodes lapis	601
gala 567 galactites	600	geranium	568
galbani emplastris inseren-		geras	569
di ratio	723	gestatio	144
gale	567	gigarta	569
galenium malagma	729	gingidion	48. 570
galiancones	537	gingiuarum abscessus	445
galibidolon	568	fluxus 195 pruritus 4.5	
galipsis 568 galium	567	ad Gingiuas exesas	196
galla	588(638	Gingiuas restringens	196
gallinacei cerebrum. 573 fel.		glabrics 124 ad Glabre	
gallarum & gallinaceo-		ta	126
rum adeps	626	gladioli radix	610
gallarum sanguis. 553. ster		glans unguentaria	564
cus 591 uenter	591	glandes 54 earum usus. 23	
Gallus dropax	737	cibus	55
ganglion	333. 455. 607	glaucium	570
gangrana	338. 339	glaucoma	182
garum 568 geminalis	612	glaux herba	570
		glechon	

INDEX

glechon	570	gleos	cod.	H
gleucinum malagma	797	ad Habitudinem calfacien-		
inde		dam 14	hæma.553	
gluten simlagineum	591	hæmatites lapis	600	
glutinium ligni, & taurinū.		ad Hæmopticos emplaz-		
629		strum.	711.714	
glutinium piscosum	583	hæmorrhagia locellorū	275	
glycea bulcera	191	hæmorri morsus	403	
glycyrrhiza	570	hæmorrhoides	271.487	
glycyfide	570	497 uulua	292.293	
gnaphalium	570	halaria ad purgādum.	647	
gnidium granum	591	halecula manides	132	
gonchota	503	(fus 750 halimon	47.555	
gone, ad concipiendum pes-		halos anthos	556	
gongilis	570	halosachne	556	
gonorrhœa	265	harmala	609	
gorgylum	571	harmation collyrium	699	
gradus qualitatū quomo-		harmenia emplastrū	712	
do intelligendi	550	ex Harmenico lap. catapo-		
gramen arundinaceū.	584	tia 647	basilia.503	
granata mala	620	basilula regia	563	
granum cnidium	591	eius	hecatoëbe, ad cicatrices	696
usus	644	hectica febris. 99	eius speci-	
grauedo 201	grossi 611	es due	100	
gruaria deligatura	523	hecticus pulsus	80.87	
gruum caro	54	(449 hedera 590	terrestis.636	
gula infixis spinis, aut alijs		hederaceū emplastrū.	706	
gummi 592. eius usus	644	bedychroi theriacā ingre-		
gurgulio	198	dientis præparatio	656	
gutturis hernia	455	inci-	bedyosmus	579
sio	449	bedysarum	579	
Opsum	571	eius haustus	helcysmata.	575
422	Oris	571	helenium.575	beletis. 599
			helicbryon	

INDEX.

belichryson	575	hermodactyli radix	577
beliocaes	362.683	ex Hermodactylis podagri-	
belioscopios	631	ca	647
beliotropium	5.579	herpeta.334	herpes.340
belleborina	576	herpetes	552
belleborus	575	herpes miliaris	340
bellebori albi sumptio uene		hernia aquosa. 477	gutta
nosa	424	ris 455 intestinoru	482
belxine. 575. 622. eius uires		hernia species	483
556		heterorhythmus pulsus	77
hemerocalles	579	hiberis 599	hidros 581
hemicrania. 136	hemicrani	hienarum fel	637
aci.	eod.	hiera dicta antidota, eoruq;	
ad Hemicrania uetera. 138		compositio. 650	inde
hemicranicus pastillus	680	hieracites lapis	602
hemiectum	761	hippocampus	582
hemina	760.761	hippolapathon	582
hemionitis	579	bippomarathrum	582
hemiplexia. hemiplagia 157.		hippophaes. ippophaos	
hepar diuersorum animalis		582	
um	579	hippopotami pellis 572	testi
hepatis esus	55	culus	582
hepialos febris. 96 unde di-		hipposelinum	582.625
cta	97	hippuris	582
hepsema 578	heraclea 575	hircina caro. 55	iecur 579
heracleum	606	sanguis 554 ex eodem me	
heraclion	602	dicamentum	699
herculeus lapis	601	hircorum medulla	608
hermala	688	ad Hircum alarum	219
hermaphroditarum uitium		hirudines hausta	413
quadruplex	486	hirundinaria	637
hermodactylus stomacho		hirundinatum ruptura quae	
aduersus	303	lis	508
		hiruno	

INDEX.

hirundinatum ruptura qua lis	508	plastrum	712
hirundinis cerebrum	573	hulcera sordida quæ expur gent	360
hirudinum crematorum ci nis	637	ad Hulcera sordida emplas trum	710
hædinus sanguis	553	de Hulceribus cicatrice ob ducendis	364
holca 759 holocleros.	417	humeri summi luxatio.	534
Homeri locus	502	humorum uitioforum mul tæ species	29
hominis morsus	406	hyacinthi radix	632
hordeolū 173 hordeū.	595	hyalos	633
hordea 50 hordeaceus pa nis. eod.	horror 101	hydatides palpebrarum uesi culæ	437
hulcus simplex	357	hyderus ascites	253
hulcera articulorum	372	hydnon 633 hydor	hod.
hulcera caua	359	hydrargyros	633
Chironia, malefica, Te lephia	366	hydreterepiplocele	483
hulcera manantia	132	hyrocele	477
hulcerum lacunæ. 368 uera mes	361	hydrocephala affectio	427
ad Hulcera depascentia	362	hydromalum	689
363 & serpentia eod.		hydromelum ex libra	140
364 dolentia & inflā mata 538 humida &		in Hydrope, uinum purgans	647
foetentia 364 immatu ra, necdum purulenta.		hydrophobia	393
358 inueterata 332 male fica 349 rupta 372		hydropiper	633
ad Hulcera emplastrū.	719	hydrops 252 ad eundem	
pastillus	678. 679	malagma	730
hulcera glutinandi uim ha bentia	357	hydrorofatum	689. 690
ad Hulcera maturanda em		hydros	404 (28
		hyeme largiore cibo opus	
		hygidium Ammonij	695
		hydrocollaria	169
		γ hyoscyamos	

INDEX.

hyoscyamos	633	cia	39
hypocoon. 634.		hypericon. iecoraria dysenteria	231
594. eius genera	633	ignis sacer	341
hyperum 536.		hypochyma ad igne combusta emplastrum	708
181			
hypocisthis	634	ilambonis collyrium	694
hypoglossum. 634.		ilamon anodynon	176
tia. 112.		hypoglottides. ileos	234. 137
203. 204.		ileosi affectus stomachi.	225
hypophaes. 634.		hypophaestum	634
hypopyd. 177. 179. 440.		illitones sedis & umbilici	
193		purgantes	652
hyposarcidios hydrops. 257		imbecillitatis signa	68
hypospadiæ	471	imberbes seruantia	261
hypospatismus	430	impetigines	322
hyposphagma. 171. 181. 553		impotentia genitalium mē-	
hypothum ad dysenteriam.		brorum	267 (184)
680		incidentia medicamenta	
hyssopum	634	incuborum ludibria.	154
hyssopili quidi medicam en-		Indica emplastrum	714
ti præparatio	720	Indicus lapis	602
I		infantis educatio	4. 6
Iaspis	601	infantum morbi	4. 5
iaton oleum	741	inflammationes	333
Icesios ad strumas	712	inflatio 350 uteri.	286
ichius. 599		icthyocolla. 583	
icterus	258	inguinis ramex	484
idea radix	581	intemperies calida quomo-	
iecur diuersorum animan-		do emendetur 41. item	
tum	579	frigida 42. sicca. 43	
iecoris adustio	464. eius	intercus	252
dem temperaturæ indi-		intertrigines	332
		intestina terræ	569
		intesti-	

I N D E X.

intestinorum esus	56
intestinorum hernia	482 lœ
uor	227 tormina 230
exulceratio.eod.	671
intubus.	47 intybum 622
inula campana	575
iocinoris affectus	247 eorū
'que indicia	248.inde
ad locinoris duriciem mala	
ma	730.731
iocinoris inflammatio	214
	215
iocinorosi	247
ad iocinerosos Cyphoides.	
	667.668
ion	582. ios.eod
iridis illyricæ usus	642
irini olei præparatio	745
irionis semen	577
iris	582
ifatis	419 satiua.582
isca 465 ischias	295
isis cruentis dicata	710
isopyron	583
isotheum collyrium	700
ad Ischiadicos emplastrum	
	716
Italicum emplastrum	719
itea 583 utria	202
iudaicus lapis	601
iuglans	53
iugulum fractum	517
iuguli luxatio	534
iuncus odoratus	597.629
eius rotundi species.eod.	
iuniperus	561
ixie haustus	417
ixos	581
I.	
Labiorum fissurae	197
labruscæ flos	610
lac fissile	57
lac intus coagulatum	421
lac nutriceis quomodo pro-	
bandum	2.3
lactis coquendi ratio	57
lactis esus	56
lactis uitia quomodo emena-	
danda	3
lactis usus	567
lactipotatio	56
lacerta chalcidica	622
lacertæ caput	588 iccur
	579.621
lactuca	47.48.581
ladanum	598
lagophthalmi qui	434
	435
lagophthalmica affectio	
	434 inde
lagopus	598
lana cremata	619
lanæ ouillæ uires	576
lapathon	598
è Lapide Iudaico medica-	
mentum	670
γ λ	
è Lapide	

INDEX.

¶ Lapidē phrygio pastillus	678	lentiscus	629
lapides omnis generis quo		lentiscinū oleum.	743
modo emplastris inſe-		usus	194
rantur	722	leonum adeps	626
lapidū omnis generis uires		leontopetaliradix	599
600.601		lepidium	599
lapides confringens phusca		lepis	599
669. & conditum. eod.		leporis cerebrum	573
¶ Lapidibus collyrium	700	leporis marini potus	412
lappago	582	leporina caro. & coagulum	619
lapsana	598	lepra. 321	leptocaryon. 586
laſerpitium	623	letalialigna quæ	68
laſitudo exercitijs ſuperue-		lethargus. 142	cius curatio
ens 10 quadruplex. eod.		143	caros
inde		142	
laſitudines ſpontaneæ	12	leucacanthum	599
lateralis dolor	214. 216	leucas. 599	leuce. 325. 599
lathyris	598	leuca & alphi quid diffe-	
lathyridum uſus	642	rant	326
lauer	623	leucoion	599
laureola	571	leucographis	601
¶ Lauri baccis malagma.		leucomata	177. 178
731		leucophlegmatias	253
lauri folia, bacca, radix	571	leucus paſtillus	678
uſus	643	libanum collyrium	697
laurini olci preparatio	743	libanius peſſus	750
leæna emplaſtrum	714	libanotides tres	599
leguminum facultates	51	libanotus	600
lemnæſtis	736	liberis procreandis accom-	
(gis. eod.		modatum tempus	19
lænia terra. 568 ſiue ſphra-		libra	760
lemniſcum	451	lichen herba	598
lentes	634	lichenes equorum	598
lens	51	lichenæ feræ	323
lenticula paluſtris	634		
lentigines	193	leuis	

INDEX.

lienis adustio. 465	affectus. 258	lituncus. 476.	litrum 602
256 duricies	56	liuoribus tollendis	15
lienis esus	712	lixuiū. 592 ē diuersis. cod.	
ad Lienem emplastrum	712	ē Lixiuio emplastrum	716
malagma. 730	oxymel	locellorum affectus	272
668. pastillus	676	inde	
lienteria	227	locellorū calidiorum signa	
lignorum caries	621	291. item frigidiorū	290
lignys	600	humidorum	291
ligustici radix. semen	600	locellorum esus	56
lily flos	595	locellorum exulceratio. 281	
oleum. cod. 596	cuius præpara-	inflammatio 278 & deo	
ratio	741	clinatio. cod. inde	
limonij fructus	598	locellorum muliebrium thy	
linguæ caro	55	mi	487
linguæ scabrics	116 tu-	locustæ	555
mor	197	ē Lolys emplastrum	713
linguæ uenarum sectio. 459		lonchitidis semen. 602	usus
lini semen	602	644	
ē Lini seminis succo empla-		lordosis	539
strum	703	lotium. uide Vrina	88
lintheum crematum	619	lotij color ante exercitium	
liosporon	602	obseruandus	8
lippientium capitis combus-		lotium prouocantia	64
stio	427	lotium quæ cieant bene ua-	
lippitudo	168	lentibus	22
ad Lippitudinem siccā col-		lotus. 603 herba & arbor.	
lyrium	701	cod.	
ad Lippitudines auspican-		loti agrestis semen	603
tes monemeron	692	ē Loto syluestri pastillus.	
liquidorum mensuræ	76	678	
lithi. 600	lythospermō	602	
lithotomum ferrum	476	lumbrici, eorumq; differen-	
		tia. 381 teretes et rotun-	
		di	

INDEX.

di 382 lati	385	maï radices	606
lupinus.580	lupini 51	menides baleculæ	132
lupus pisc.	58	magnes	601
lupinum iecur.580 ex eo me		maiorana	557.621
dicamentum	667	malabathri folia	604
lupinum stercus	592.593	malachia	274
lusciosi	183	malacostraca	58
ad Luxata 351 (tia .532		de Malagmatis 724. inde	
luxatio quid, eiusq; differen		malum citrium, & media	
luxationes cū hūlcere. 546		eum	590
cum fractura	547	mala medica, citria	2.53
lycaon. lycanos. lycanthro-		malum terræ. 31 eius species	
pia	155	560	
lycopsi radix	603	mala diuersæ qualitatis. 53	
lychnidis semen	603.643	cotonea, punica. eod. dul	
lycium	603	cia, austera, acida, acer	
lycoctonum	555	ba. 606 persica, armeni	
lycopfos. 551 eius radix. 603		aca. eod.	
lygus	551	malorum omnis generis uis	
lynceus collyrium	698	res	606
lysimachium	603	malicoria	620
lysiponium acopum	735	malobathrinum collyrium.	
		700	
M		malleoli luxatio	545
Macedonicum emplastrum		malua syluestris 604 ex ea	
715		iusdem semine med. 670	
macer cortex	603	mamiras	604
Macris ligno globuli		māma marib. perinde ut fœ	
671	(716	minis turgescētes (464	
Macharionis emplastrum.		mammārū inflammationi	
macilenti quomodo renutri		349	
endi	32	mammillarum cibus	55
madanuda	718	māmillarum uitia 218 inde	
madarosis	174	mammæ	

INDEX.

mammis conseruantia. 219	um uires	550
mandragora. 604 eius pos- tus 416	medicaminum quæ empla- stris inferuntur, elixatio.	721
Manethonis puluis ex fece uini 682	medica mala	2.53.590
mania 152 eius curatio. 154	è Medico malo medicamen- tum	666
manna thuris 604	medimnus Atticus	761
manus collisio, siue fractu- ra. 525 rimæ 310	medullæ esus	55
marasmus 100	medullarum omnium uis ea dem	353
marathrum 604	medullarum uires	608
marina aqua 580	mel. 605 amarum, Sardoni- sachar. eod. Heraclia pontica	422
marrubium 618. nigrum 565	mel infanti præbendum 4	
è Marrubij semine medis- cament. 670	mel uino grauius 760 item oleo. eod.	
è Marrubio linctus. 663 cõ- fectura eod.	mellis esus	60
martianum malagma. 726	è Melle emplastrum	703
Massaliotæ aridum 684	melenæ Scrapionis	713
mastiche. 604 Chia & Aegyptia eod.	melamphyllon	554
masticinum oleum 743	melampycnon	608
Mastucha 749	melan	604
Masuaphium 749	melanchlorum emplastrum	706
matricis morsus 404	melanchlorus pastillus. 679	
maxilla inferior confracta 516	melancholia	152
maxillæ inferioris luxa- tio 532	melancholiæ mederi rem ue- neream	18
maza 50 mecon 605	melanteria	604
meconium 410	melanthium	604
medicamentorum simplicis	melca	222
	7 4	melia

I N D E X.

melia	605	menta	579
melij radix	605	menti ficosa exanthemata	
melicerides	355.356.453	132	
melilotum	605	mercurialis semen	602.
meline	576	usus	22
melini olei præparatio.	742	mergi iecur.	580 uenter.591
melissophyllon	605	mesopotamenon	746
melitera Oribasij	682	messila	53.605
melittites	600	metalli cuiusvis recremens	
melittomata	273	tum	625
mellisauiā 453	melō 176	ex Metallicis emplastrū.	713
melopepon	51	metasyncriticus pessus	285
meloplacuntij præparatio.	665	metopium oleum	742
memæcylus	605.eod	metrenchytes	276.387
membrorū amputatio	500	milax	607
memoriæ iactura	146	miliaris herpes	340
memycalum	592	miliū.50.587 miliū solis	
mendesium malagma	726	602 ex eodem medica-	
menidum capita 588	(24	mentum	670
mensēs muliebres trahentia		milphosis	174
mensium suppressio, eiūq;		millefolium	608
causæ	273	millipedæ	611
mensibus mouendis idonea		milui caput	588
quæ	274	mina attica, Aegyptia, Ro-	
menstruorum purgatio.272		mana 760 miniū.568	
quomodo incipiant, aut		minij emplastris inferendi	
desinant.cod.		ratio.722 misy	607
menstruorum purgatio ni-		mithridatios antidotus	408
mia	275	Mithridaticæ antidoti præ-	
mensura quid	758	paratio	659
de Mensuris.758 earum no-		Mithridatis mors.	408
ta	759	Mnasæi emplastrum	707
		mochelæa	740
		mochliscos	

INDEX.

mochlifcos	530	ad Morsus canum non rabi
modius Aegypt. & Italicus		dorum 395 (392
761.736		ad Morsus uenenatos. 391.
mola uteri	285	motophylax. 531 mucus 201
moly	609	muliebre profluuium 276
molybdæna	607	277
molybdos	607	muliebri membro imperfo
monemerom ad lippitudines		rato 487. eiusq. phimo.
692 mora	52	eod. (sio 289
morbis diutinus quibus no-		muliebrium locorū præclu
tis deprehendatur	69	mulsa aqua 60(631
morbis spem'ne an pericu-		mulus pisc. 58 eiusdem esus
lū ostendat, unde cognoscē		mulorum urina. 613 ex eadē
dum	68	emplastrum 718
morbi decretorium præsciri		murenæ morsus. 405. 406
quomodo possit	70	muria 556
morbi principium quale di-		muris aranei morsus 399
cendum	68	muris caput 588
morbi passim uagantes cu-		Musæ pastillus 676
iufmodi	102	muscerda 593
morborum capita quæ &		muscus marinus 567
quot inquirenda	67. 68	mustelæ cerebrum 573 ci-
morborū dies decretorij cu		nis 567 uenter 591
iufmodi	70. 71	mustum decoctum 578
morborū futura crisis quoa		è Musto medicamentū. 687
modo prænosceda.	72	myacanthinus 589
quomodo peracta iam,		myaces 607
optima agnoscenda.	74	myagri semen 607
mori fructus	607	myaron. 608 mycetes. 688
mororum decoctum. 687 ex		mydriasis 180
ru bis. eod.		myelos 608
morochthus	601	myeroxus 601 myita 503
morosis	146	myocephalon 176
		γ 5 myopes

INDEX.

myopes. 183	myopiasis. 183	nares fractæ & contusæ
myosote	608	514
myuri, & myurizantes pul	narium factor	191 bulce.
sus qui	78.79.86	ra.eod.
myracopa. 739	myrice 608	narium sanguinis profluvia
myrmecia	637 (eod.	quæ sistant 375
myrrha. 625. 608	myrrhis	narium uitia 190. inde
myrrhæ emplastris inferen	narphia	602
dæ ratio 724 (708	nartibex	609
myrsinatum emplastrum.	nascaphthon	609
myrsinites	631	nasturtium 48
myrsinoides	590	eiusdem semen 585
myrteti præparatio	690	nauiantium uictus ratio cu
myrtus. 608	myrtula, myr	iusmodi 30
tis	eod.	nausea febricitantium 117
ex Myrto syluestri medica	Naxia cos	602
mentum.	683	nephritici 239 nepita 584
myschlion	117	nera pastillus 676
myi quomodo emplastris	nerium 410. 610 eius flos	
immittendum	721	664
mystræ. 760. 761. myza. 608	Neronis emplastrum	712
N	nerui faucy	376
Nacaphthon	609	neruorum abscessus 337
napus 49	nasy 609	ad Neruorum uulnera em
narca	609	plastrum 706. 710
narcissi radix	609	neuras 610
narcoticorū usus nimius, no	Nicolai emplastrum	711
xius	301	nigella 604 eius esus. 424
nardinum collyrium	696	Nili diarhodon 698
nardus Celtica. 653. Cilissa	Nili malagma	730
429 Cicizine	728	nitrum. 602. eiusdem empla
gallica	609	stris inferendi ratio. 722
nardi spicæ radix	609	nitri spuma 564
		ex nis

INDEX.

ex Nitro emplastrū. 716. 717	fio. 18; . 440	sugillatio
noctuae sanguis 553	nes. 177	cicatrices. eod.
noma 268 ad nomas. 362	alia uitia. inde. suppura-	
714. 678 oris 683	tio. 440	aglyops 445
nucatum ruptura cuiusmo-	ad Oculorum caliginem. 16	
di 508	oculorum expressiones 183	
nuceum oleum 743	oculorum fluxione laboran-	
nuscitio 181	tiū agglutinamenta 701	
nuscitiosi 638	ad Oculorum bulcera 75	
nutrix qualis deligenda 2	inde	
nux arbor, eius cortex, fru-	oculorum perturbatio 168	
ctus, succus 586	inflāmatio. eod. unguis	
nux pinea. 52 persica. eod. in	439 uatio 439	
glans. 53 auellana. eod.	ad Odoratus uitia 190	
pontica 586	oa, oe. 610	cedema 349.
ex Nucibus decoctum 687	Oenanthe. 610. 746. ex ea-	
nyctalops 181	dem malagma 731	
nymphæ amputandæ ratio	cenanthia, cen antharia, eo-	
487	rumq; usus & præpa-	
nymphæa 580. 610	ratio 746 (610.	
Nymphodoti pastillus. 680	cenorhodium. 678	cenos.
O	æsypon 576	æsypos 611.
Obolus 760	oleæ germina 573	oliuitas.
obtusio 182	eod.	
ocbra 569	ocbri 18	oleæ radicis cort. usus 643
ocimastrum 554	ex Oleæ surculorum succo	
ocimū 48 ocimoides 639	collyrium 694.	
ocium perpetuum insalubre	oleago. 637	olearea cos 602.
47	ocularia 167	oleastrū. 573
ocularium medicamentorū	oleomel. 574	
diuersa genera 690. 691	olera esculenta quæ 47	
inde	olerum syluestrium succus	
oculi procidentia. 176	suffu pestilens 48	
	oletorum notæ 88	
	oleum	

INDEX.

oleum anethinum	12	Ophiafis	124
oleum melle leuius, uino gra		ophioscorodon	625
uius	760	ophites lapis	601
olei emplastro immittēdi ra		ophrioscus	541
tio	722	ophthalmia	168
olei lauacro uires deijci.	165	ad Ophthalmiā errhinon	137
olei usus	573.574 (710	opisthotonicis potio	166
ex Oleo et aceto emplastrū.		opisthotonus	164
oleorum compositiones ac		opium 606 letale	410
uires diuersæ. 738 inde		opobalsamum	564
oliuæ Aethiopicæ lachry		opopanax 614 quomodo	
ma	573	emplastris admisceatur	
oliuæ catharticæ	646	723	
oliuarum drupæ	53	opos 612 orchis 347. 612	
olostium. 611 olusatrum	48	oreoselinum	612
olympus. olympiacum	695	oribasy liquidum 708 clidi	
olynti	611	um. 675 melitera	682
omēti prolapsus	468. 470	origani species	612
omotribes	574	originatio	100
omphacini. 574 malagma		oris affectus 194 hulcera	
224		5. 195 columella	198
omphacion	611	oris iucundum odorem præ	
omphacitis	588	stans	196
omphacocarpos	560	ori inseruientes uncliones.	
omphacomeli	689. 690	685 inde	
onagra	611	orminon. 612 orobache	612
onobrychis	611	orobea 576 orobus	612
onochilos. 552 onoclea	551	orthocatheutos	522
704		orthopnoea 205 ortho	
onoma, onomis, ononis. 560		pnoici	206
611		oryza	50. 51. 612
onothera 611 onothuris,		os sacrum infestantis hulcea	
oni 611 onyche cod.		ris curatio	122
		osis	

INDEX.

osſis ſacri fractura. 521.522	paonia radix	152
oſſa cremata	613 paliuri fol. & radix	613
oſſiū rupturamultiplex 508	palma 635 palmulæ 53	
oſcheos	477 palmularum emplaſtrū 708	
oſtracites lapis	601 palpebram irritantium pilo	
oſtracoderma	58.2;7 rum euulſio	436
oſtreorum eſus 58	teſta palpebræ inferioris affe	
613. inde puluis 682	Etus. 435 ſuperioris con	
oſyris 613 othonna 610	ſutio	432
701	palpebræ inuerſio	435
ouilla caro	55 palpebræ coaleſcentes	438
ouillæ lanæ uires	576 ad Palpebrarum deſluuia	
ouillum ſel. 637. ſtercus 593	174 trichiaſin	175
cerebrum. 571. pellis. 572	palpebrarū pediculatio	173
oui albumen. 639. uitellus.	174 tubercula	438. uer
cod.	rucæ eod. ueſiculæ	437
oui uariuſ uſus	639 uſtio medicamētis facta	
oua fricta in ſartagine, noſ	434 & ſutura	435
xia	54 (54 palpitatio cordis	217
ouorum diuerſæ facultates.	palumbi uenter	591 ſter
ex Ouis emplaſtrum	708 cus	593
oxera emplaſtrum	712 pamphates emplaſtrū.	717
oxos. 611. Oxybaphū.	759 panaces Aſclepium & Chi	
oxycanthus	611 ronium	614
oxygalactinus caſeus	632 panax Herculeus	614
oxylapathon	598 panchryſon medicamen.	
oxymel Iuliani	645 ſim=	171.172
plex. 660 ſpleniciū	668 pancratium	613
ad calculum	669 panicum	50.576
oxiſchoenus	276.629 panis genera	50 uſus. 562
oxæna	190.191 pantolmios paſtillus	679
	panus	343
Paderota	554 papauer. 605 cornutum. ſi	
	ue cor-	

INDEX.

pepo	6	les, aut cōtra, quæ. 294
ue corniculare	419	spu. parulis 195. 445
mosum	614	parygron 138
Papaueris capitibus anti-		pasionis pastillus 677
dotus	662	pastillus purgatorius 646
papaueris succi emplastris		pastilli, eorumq; genera, cō-
inferēdi ratio. 724	eius	positiones, usus. 673 inde
dem potus	415	pastinaca 626. 49
papporum esus	424	pastinacæ marinæ morsus
papula. 328	papyrus 614	405. 406. radius 632
paracentesis	256. 466	patella 527 eius contusio,
paracynanche	199	sive fractura eod.
paralius	631	Paula emplastrum 716
paralysis	157	pauus concoctu difficilior
paralysis ex colico morbo	54	
contracta	162	paxillos extrahentia 373
pararhythmus pulsus	77	pectoris ruptura 519 ex-
parastata	477	pressio eod. suppuratio
parasyynanche	199	212
parasyrmata	332	pediculatio capitis. 132 palpe
pardalianches	555	brarum 173. 174
parefis	158. 160	pedum rimæ 310 (716
pariendi difficultas	293	peganera ad pleureticos.
parietaria	575	peganum. 615 pelaria. 176
parietariæ usus	334	pelarium ex argenti recre-
paristhmia	447	mento 706
Parnassi gramen	551	pelecynus 579
paronychia 312	parony-	pellarium ad hulcera 693
chie	614	pellis ouillæ usus 572
parotis	189	pentamyron 729
parthenion	575	pentomoros 570
parthenij usus	643	peplon. 614. peplion. eod. pe
parturiendi formæ natura-	ply usus	642
		pepon

INDEX.

pepon 51. eius semen. eod.	phagedæna quid	364
614	ad Phagedænas	362
peponatum Critonis. eod.	phalangiorum ictus	396
smegma	684 398	
perdicium	575 phalangites	634
perdicum fel	638 phalangosis	432. 435
peregrinantium uictus ratio cuiusmodi optima	phalaridis succus	634
29.30	pharicum	419
perichlymeni semē et folia	pharmaca simplicia bilem	
615	purgantia	639
periphimosi	472 phaseli. 51 phasganion.	610
peripneumonia	207 phasiolon	585
periscyphismus	431 phelli	634
perizomata	330 philagrianum malagma.	
perniones. 310	perone	527 726
persæa 615 persica	52 philanthropos	560
peborum usus & præparatio. 749 item differentie eod.	philetarion	616. 639
pebulus croceus. 749. item aurei coloris	Philippi pastillus	676
750	philocotyche	709
pebulus mollitorius	284 philonis antidotus	661
664	philoxeni medicamentum	
pebus quid	274 philyræ folia	634
pestis, siue febris pestilentialis consideratio	103 phimos. 289 phimosi.	472
615	pbimus muliebrium locello	
ex Petasone emplastrum	rum	488
717	phlaustini pastillus	677
petreum	628 phlegmone	333. 334
petroselini semen. 615 (615	phlogoses	248
peucedani succus & radix.	phlomi genera	635
phaci 634 phaa	575 phlomitis	611
phaum ad hypopios	693 phlyctæna	177. 329. 330
	phocæ coagulum	619
	phœnicine	

INDEX.

phœnicine emplastrum.	pinguedini abolendæ	31
703	piper longum. 614	album,
phœnix 635	atrū	cod.
phorimū alumen 360.635	piperis radix	614
phrenitis 139 eius curatio	ē Piperum tribus generibus	
140 phrenion 617	medicamentum	666
phrygius lapis 601	ē Piperibus duobus antido-	
phthiria 132	tus, ad pleuritidem	662
phthipsis 180.212	pirum sylvestre	564
ad Phthysim, ē marrubio lin-	piri uires	560
ctus 663	pirorum facultates	53
phu 635	piscium esus	58
phusca lapides confringens.	piscium recentium ius.	578
669 purgans, & stoma-	piscosum gluten	583
cho grata 647	pissellæon. 616	pistacia 53
phycos 635 phyllites. 635	pistaciorum fructus	616
phymata 343 pica 12	pisum	51
picea. 615 eius fructus 616	pituitæ in uentriculo supe-	
cortex cod.	riore abundantia	21
picea resina 620	pituitam naribus extrahens	
picearū crucæ haustus 412	errhinon	137
picra Galeni 45.666 ex oxy	pituitā purgātia. 643 quib.	
melite. cod.	exhibenda. cod. inde	
picris 590	pityides	616
pili cremati 632	pityocampe	616
pilorum palpebram irritan-	pityusa	616
tium euulsio 436	pix arida & liquida	615
pilis faciei tollendis 194	picis emplastro immittendæ	
pilos demoliens psilothrum.	ratio	723
261	placitis alumen	628
pilula ad feruores 715	plantæ hucera et rimæ. 311	
pineæ nux 52	platanus	616
pnigitis terra 569	plenitas cauenda, & quo-	
	modo	

INDEX.

modo ei medendum	16	pompholix.	617.678. quos
pleuritis	214	notha	215
plinthis alumen	628	modo emplastris in- sera- tur	722
plumbago. 607 eiusdem em- plastro immittendæ ra- tio	721	pomum sylvestre	576
plumbarium stercus	625	pomorum repletio uitæda. 28	
plumbi deusti emplastris in- serendi ratio	721	de Ponderib. 758. 759. 760	
plumbi uires	607	populeum oleum	742
pnigalion	154	populus alba	599
podagra 298. 299 ad ean- dem med. 714. 718. 647		porcinus pulmo	616
671. 672. 685. 706		pori. 299 porrigo. 129	
de Podagra euitanda 309		ex calceamentorum at- ritu	311
pæonia. 570 antidotus	668	porrrum	49. 618
polemonium	616	potamogiton	617
polenta	50. 595	poterium	610. 617
polium minus	617	potimi trochisci	673
pollen farinaceus	571	potiones suaves et frugi 688	
è Polline emplastrum. 704		præcocia	52. 53
polyarchion	725. 726	præcordiorum affectus	220
polycnemum. 617 polygalon		prægnantibus quæ accidunt, quo eis uictu uten- dum	1
cod. polygonaton 599. 617		præputium glandi adhærens	473
polygonoides	590	præputij circumcidendi ra- tio	473
polygonon	1. 617	præfion. 618 præfoides. 576	
polypodes aduenerem exci- tare	18	prester unde dictus	403
polypodium. 617. eiusdem ra- dicis usus	643	presteris morsus	403
polypus	190. 444	priapismus	266
polyporum esus	58	priapiscus. 488 primus. 618	
		procidentia uteri	288
		pro-	

INDEX.

profluuiū muliebre. 276. 277	puerorum educatio qualis
propolis. 618 eiusdē emplaz	optima 6. 7
stis inferendæ ratio. 723	pulegium. 570. eiusdem usus
propomata. 688. propto	643
sis 176	pulicaria herba 415. 638
profopites herba 561	pulmonis agnitio. 38 eius. 56
prosp̄h̄sis 477	uulnerati signa 506
prunum 591	pulmonum, diuersorum ani
pruni species 591	mantum usus 616
prurigo 314	pulsus quid. 74. duplex eius
pseudobunion 566. 638	usus. cod. 85 (83)
pseudocinnamomum 589	pulsuū causæ. 82 deprauatio
pseudodictamnus 572. 638	pulsuum genera & differē
psilothra 261. inde 278. 558	tia. 75. 76. inde
psimythion 638	pultationes 453
psitacium 707. psora 321	pumex. 589. eiusdē emplaz
psorici præparatio 639	stro inferendæ ratio. 722. 715
psorophthalmia 171	punici mali decoctum 687
psychotrophon 565	flores 620
psydracia 130	purgandi medicamenti qui
psilly potus 415	præcipue 640
ptarmicæ folia 618	purgandi tempus 640
ptelea. 618 pterygia. 178.	purgandorum qualis habē-
179. 313. 439 500	da ratio 648 inde
pterygomata. 487. pteris.	purgatiua pharmaca stomas
580. 618	cho noxia. 640. eorum
ptillosis. 174 ptisana. 595	cōpositio. 645. inde
ptisanæ coquendæ ratio. 51	purgatiuis nō operatib. 648
ptyas 404	purpuræ crematæ 617
ad Pudendorū dolores. 268	pusionum oleti usus 592
tumorem. 269 hucera.	pyrethri. 619. eius usus 643
349. 364	pyrites. 601 609
pudendorū impotentia. 267	pyros 619 pytia 619
	pytia

INDEX.

pyliriasis	129	resinae emplastris immittenda	
pyxis acopum	736	ratio	722
Q		resinarum omnium uires.	620
Qualitatum ordo et excessus	550 (648)	resolutio. 158. 160. canina	161
ad Quartanam pharmacum		rha	619
quercus folia, glandes	573	rha ponticum	1
cinis	630	rhacosis	485
querna filix	572	ragades. 268. uulue	292
quinquefolium	614	rhamnus	619
R		rhaphanus	619
Radices esculentae quae.	49	rheas papauer	605
radij fractura	525	rheum	619
radicula	49	ad rheumata. 664	679
ramex, eius quae species	262	rhigos	7
263. 480. 481. 483. 484		rhodacena	53
rana palustris deuorata. 413		rhodia radix	620
ranarum sanguis	553. u-	rhodia sanguinem compri-	
sus	565 (565)	mens	682
ranunculus. 197 eius species		rhododendron	410
rapa	49	rhodomali preparatio.	
raphanatum rupturam.	508	690	
rapum terrae	59	rhodostacti compositio.	
rapiradix & semen	570	eod.	
raucedo	201. 203.	rhœa	620
reçutiti. 471. reduuia	312.	rhœti preparatio	690
refractio quid	508	rhododaphne	610
regius morbus	256 358	rhus	635
reycula	619	rhus coriarii	620
renum esus	55	rhy. is	439. 175
renum mala. 238. 241. 242.		rhypos	620
245. 669		rhythmus. 77. eius differens	
reni sanguinis eruptio. 244		tix. eod.	
		2	ricini

INDEX.

ricini fructus. 589	foliū.	sabinum oleum.	574
eod. usus	643	sachar mel	605
ricinorum sanguis	553	sacra antidota quæ	650
rigor. 164	eius species. eod.	sapia testa	622
ad Rimas manuum, ac pedū.		sagapenum	621
310	(740	sagapeni emplastris inferen	
rosacei olei preparatio.		diratio	724
rosarum uis	620	sal indicum	117
rosatum thymiana	747	salis flos. 556 spuma. eod. ex	
rostra animalium concoctu		eo emplastrum	719
difficilia	55	ex Sale emplastrū. 717 pur	
rubeta deuorata	413	gatio	647
rubia tinctorum	577	salia quomodo emplastris in	
rubia herba	129	ferantur	722
ad Rubicundum uultum fa		salium uires	555
ciendum	194	salamandræ cinis	621
ē Rubrica pictorum empla		salamandræ haustus	412
strum	715	417	
rubricæ emplastro inferen		salicis folia, flores, cortex.	
de ratio	722	583	
rubus. 565	caninus	597	ē Salicibus emplastrum. 711
ad Rugas faciei	192	salina stomachi	222
rugoso corpori medicamen		salina humanæ uis	622
tum	14	salua	575
rumex	598	sambucus. 555. eius flos. 585	
ruptio	152	rad. cortex	645
rupturarum diuersa gene		samia terra	568
ra	508	samius aster	211
ruta agrestis. 609. 424. 615		ē Sampsucho malagma	731
ē hortensis. eod.	688	samsychon	621
ruta ueneri aduersa	18	sandaracha. 621. eiusdem em	
8		plastris inferendæ ratio.	
Sabina	566	721	

sandara

INDEX.

sandarachæ haustus	423	saphyrus	602
scandix	621	sarapias herba	361
sanguinalis herba	1. 617	sarcocolla	621. 702
sanguinei fluxus in podagra		sarcoma	190
curatio	302. 306	sarda terra	367
sanguis arteriæ & uenæ		sardonias herba	411. 418
quid differat	374	sardonias glandes	418
sanguinis diuersæ species et		sardonius risus	419
uires	553	satureia sylvestris	582
sanguinis e uena & arteria		satyriaca antidotus	671
eruptio	373	satyriasis. 265. satyrium. 621	
sanguinis eruptiones ex ore.		saura. 621	saxifraga 621
199 sanguinis esus. 56		scammonia. 624	eius usus
ad sanguinis excreationem		641	stomacho noxius
pastillus	675	223. 641. 647	
sanguinis per uenam euacu		scandix	624
atio, eiusq; causæ. 456. ac		scandulatum ruptura cuius	
ratio	457. inde	modi	508
sanguinis profluuium e nari		scaphoides os	528
bus	191. 120	scapulæ fractura	519
sanguinis redundatio du		schinos	629
plex	456	schistus lapis	600
sanguinis renu eruptio. 244		scilla. 624	eiusdem præparatio
sanguinis sputatio. 208.		ratio ad comitalem mor	
210. 209. inde		bñ 661	
sanguinis taurini potus. 421		scylliticum	662
sanguinem comprimēs rho		scilliticorum pastillorum	
dia	682	preparatio	656
sanguinem sistentia	375	scincus. 408	scingus. 672
e sanguinib. antidotus. 554.		scingi carnes	624
660		ad Scirrhomata emplastrū.	
sapo Constantini	685	705	
sapon. 621	saprotes 621	scirrhus	352. 557
		3	ad Scirrhus

INDEX.

ad Scirrhus emplastrum.	652		
717.718		sedis ulcera	267
scissile alumen	627	selachia	274
scleroma	284	selusina terra	569
sclerophthalmia	172	seminaria conceptacula	
scoliosis	539	477	
scolopendra. 624. scolopen		seminis prolifici incontinen-	
drion. eod.		tia	265
scolopendrae morsus	398	e Seminibus malagma	731
scolopomacherion	443	pastillus	674
scolymon	624	semodius	761
scordium	624	senecio	580
scordij usus	643	e Senecione emplastrum.	
scoria	625	707	
scorodon. 625. scarodropra		senectæ temperamentum.	
sum. eod.		13	
scorpioides	625	senum victus ratio	eod.
scorpius terrenus	eod.	seps	612
scorpij marini sel. 625. 637.		septi transversi uulnerati si-	
ictus. 406. 397. 398.		gna	506
392		serapias	612
scorpiuron	579	seriphum	622
ad Scrophulas. 714 emplaz		seris	622. 638
strum	704	serpillum	577
scrotum. 477 eius inflam-		ferratus pulsus	80. 87
matio. 263 laxatio. 485		fertula campana. 605. inde	
scrupulus	760	malagma	725
scytales morsus	402	serum lactis	567
sebi esus	55	sesaminum oleum	742
secundæ quomodo educendæ		sesamoidis semen	612
492		sesamum	622
sedigiti	462	seseli	571
sedis illitiones purgantes		seselis	622
		seselis	

INDEX.

seuotiones	453	sifari radix	623
seuum diuturnitate reddi ca		sifymbrium.	624
lidius	627	sifon	623
sextarius	760.761	Itas sitis febricitantium	116
licus	761	sium. 48	623
sicyonium oleum	744	smaridis caput	588
simplex & compositum.		smegma aridum, Asclepios	
eod. sicyos	623	684	
sideratio	338	de Smegmatis. 680. 682. in	
sideritis	417. 575	de	
sideritis Hera clea	622	smilax. 410. 625. eiusdē poe	
Achillea	eod.	tus	418
sideros	623	smilium ad abscessus	705
sigillum lemnium	568	smyrna. 625. smyris	601
signa in aegrotantibus leta		smyrnium 48	625
liaque	63	sole exustis	20
siligineus panis	50	solanum furiosum. 411. 418	
siliqua. 760	siliqua. 53	solanum hortense	627
sillybum. 623	silurus. 623	solani species. 627. soporife	
silphæ 623	silphium. eod.	rum, furiosum. eod.	
similagineus panis	50	solaris herba	5
simplicium medicamentorū		solastrum	2
uires	550	solearum ueterū coria. 572	
sinapi	48. 609	solstitium autumnale. 671.	
sinapismus	733	brumale, æstiuale	65
sinapismi præparatio	737	somnus quid, eiusq; commo	
singultuum uariæ causæ, &		da 60. 61 (144	
curatio	118	somnus uigil, coma	140.
sinopica rubrica	568	somni meridiani incommo-	
simus	368. 370. 493	da	61
siphonis uesicæ immittendi		sonchus. 625. sopor	62
ratio	474	soporifera	108
siraon. 578	siraon. 628	soporiferorum usus	61. 62
siriasus. 6.	siricum 621	sorba. 53. sorbus	610
	d 4	sordes	

INDEX.

sordes expurgans empla-	ad Sputum cruentum. 204.
strum 719	208 (644
sory. 607. 629 quomodo em	squamæ Cypriæ usus 643
plastris inseratur 721	squamarum omnis generis
sotira antidotus 663	uires 599
sparganion 625	stachys 626
sparti. 625 spathæ 520	stacticum prosechij 695
specillum. 280 specularium	staltica collyria 170
626. specularis lapis	staphylinum 571. 626
sp hacelos 338	staphylepartum 198
sphagitides uenæ 157	staphyloma 176. 439
spheclarion 626	steata. 626 steatomata
sphecle 206. 356. 632. 681	355. 453
sphincter 386. 496	stegnosis 11 stellio. 562
sphondilij 628	stellionis morsus 399
spinæ dorsî fractura aut cō	stercoris diuersorum animā
pressio 521 (539	tum uires 592
spinæ uertebrae luxatio	sterilitatis præsidia 290
è Spina Aegyptia pastillus.	sternutamenta in febribus.
675	113 (191
spinis gulæ infixis 449	sternutationes prolicientia
spinas extrahentia 373	stigmatis curandis 328
splanchnon 567	stimmi 627
splenia 703	stœbes semen & folia 627
splenis obturatio 256. 258	stœchas 627 (47
ad Splenem malagma. 730	stomachos, uentriculi os.
spodiaceum ad inflammatio	stomachi affectus 220 adu.
nes 694	stio. 465 cruciatus con
spodium 626. 695	uulsorij 225
spongia 626	ad Stomachi duriciem co.
spongiarum lapilli 601	pton 731
spuma argenti potata 423	stomachi saliuæ 222
sputi notæ 89	stomachi ulcus 224
	stoma.

I N D E X.

Stomacho quæ adhibenda cu ratio	110	de Sudoribus in febris. 111	
Stomachici	222.554	suffocatio	199 uteri. 236
ad Stomachicos picra	666	suffusio oculorum	440
Stomatica medicam.	607	sugillata	193
Strabismus	182.183	suillæ carnes. 54	humanis
Stragalotes alumen	672	similimæ	55
Strangulatis manus non adhi benda	201	suillum fel. 637. adeps. 626	
Strangulatio	199	sanguis. 553	sulphur 580
Stratiotes	627	superciliorū madarosis	174
Strigmentum	570	suppuratorum adustio. 462	
Strigmentorum uis	620.621	sura 527	surditas 188
Strobilon	597	suini olei preparatio	745
Strobilus	52	suspiriosorum potio	206
Strobolina resina	620	sutorium atramentum. 604	
Strophæ	354	sycæ. 628.	syce. eod.
Strumæ	353.447.452	sycamina	52
ad Strumas emplastrum.		è Sycamini succo emplas	
712.716	(354	strum	713
ad Strumas exulceratas.		sycamora	53.714
Struthocamelina caro	54	sycamoras	351.628
Sturnorum stercus	593	sycosis. 173	syluæ mater. 615
Stipteria. 627	Styrax. 628	symmetron	550
Styracis usus	643	symphyton	628
è Styrace bechicum	663	synanche	199
Subera	634	synchysis	183
è Subere pastillus	677	syncipitis incisio	435
Subluxatio	532	syncomistos panis	50
de Succedaneis medicamen tis. 751	succinum. 579	syncope. 217 ex crudis huma ribus. 104 tenuibus succis	
Succus Cyrenaicus, medicus,		105	
Syriacus, &c.	612	syncopes causa aliæ	106
Sudorifica medicamenta. 24		Syrica	53
		Syringotomata	465
		8 9	Syr

INDEX.

<i>Syrmaismos</i>	63	<i>tensionis lassitudo</i>	11	
<i>systematicus pulsus.</i>	77.78.	<i>tepia</i>	630	
86	<i>systole</i>	74	<i>terebinthina resina</i>	620.c.
<i>Tabes</i>	T	212	<i>iusdem usus</i>	643
<i>tali contusio</i>	528	<i>terebinthus</i>	629	
<i>tali suilli combusti usus</i>	613	<i>terminthus</i>	345	
<i>item bubuli</i>	cod.	<i>terræ cuiuslibet uires</i>	568	
<i>tamarix</i>	608	<i>terræ cuiusvis emplastris in</i>		
<i>tauri cornu.</i>	588	<i>serendæ ratio</i>	722	
<i>fel.</i>	637	<i>terræ rapum</i>	596.597	
<i>sanguis</i>	554	<i>medulla</i>		
608		<i>testæ ex fornacibus</i>	613	
<i>taurini sanguinis potus.</i>	421	<i>testiculus quid</i>	477	
<i>taurocolla</i>	629	<i>testiculorū hūlceribus.</i>	349	
<i>taxus</i>	411.418.625	<i>testiculorum topi</i>	481	
<i>tecolithos</i>	240.601	<i>testium esus</i>	55	
<i>tedæ</i>	571	<i>testium inflammatio</i>	263.	
<i>tedacea resina</i>	620	264.	<i>temperaturæ indi-</i>	
<i>tela quæ extrahant</i>	373	<i>cia</i>	40.41	
<i>telorum differentia</i>	503	<i>testudinis marinæ fel.</i>	638	
<i>telorum extrahendorum ra-</i>		<i>guinis præparatio</i>	406	
<i>tio</i>	502.503.504	<i>tetanus , eiusq; differentia.</i>		
<i>telis</i>	630	164		
<i>Telephia hūlcera</i>	366	<i>tetrapharmacū basilicū.</i>	703	
<i>telephium</i>	630	<i>tettiges</i>	630	
<i>Tellinæ</i>	629	<i>Teucrium</i>	630.637	
<i>temperamentorum ordo</i>		<i>teutlon</i>	630	
<i>excessus</i>	550	<i>Thaidis cerotum</i>	194	
<i>temperaturæ bonæ & ma-</i>		<i>thalasserus collyrium</i>	699	
<i>læ indicia</i>	33	<i>thalattion hydor</i>	580	
<i>temperaturæ ex saporis qua-</i>		<i>thalietrum. cod.</i>		
<i>litatibus</i>	549	<i>thapsia</i>	580	
<i>temulentia remedium</i>	17	<i>thapsiæ emplastris inseren-</i>		
<i>tenesmus.</i>	229	<i>udoris usus</i>	58	
<i>tensio</i>	164	<i>dæ ratio</i>	724	
		<i>thapsiæ</i>		

INDEX.

Thapsia sumptio uenenosa.	inferenda ratio	724
424	e Thure collyrium.	697 pul
e Thapsia pastillus	uis	682
680	thylacitis	605.609
Thapsus 129 theion	thymbra	581.643
580	thymelæa	581.591
thelypteron	thymiamatum usus	præ
theodoretus antidotus	paratio	747
250	thymion	410.411.418
theodoretus ex anacardijs.	thymus	487.581 thymi
667 et absq; anacardijs	269 genitalium	473
cod.	thymorum caro	629
theodotium collyrium.	tianus pessus	750
696	tibiæ eadem ratio cum cubi	
theriaca antidotus, eiusq;	to	527
preparatio. 656. & u-	tibiæ fractura	527.528
sus	tiliæ folia	634
657	tinctorum rubia	577
theriace contra uenena	titanos	631
392	tithymali cinis	630 140
theriacalium pastillorū præ	dix. eod.	
paratio	tithymalli species.	630.631
656	tithymalli usus	642
Theriaci sales	tonsillæ	447
658	tonsillarum inflammatio.	
thermarum ultro proueniens	197	
tium usus	tophi articularum	299
27	304.308. testiculorū.	481
thermus	ad Tophos emplastrum.	
580	717.718	
thlapsi semen	tormina	230 intestis
581	norum	671
thlasis	torpedo marina	609
188.509	toxicum	
thoracis morborum præsa-		
gia		
63		
ad Thoracis uitia Cyphoi-		
des		
667		
thridax		
581		
thronus Marcellius		
677		
thryallis		
635		
thus		
600		
thuris fuligo		
cod.		
buris lachrymæ emplastris		

INDEX.

toxicum 419	toxeumata.	tuberculum 498
cod.		ad Tumores emplastrum.
trachoma	173	717
tragacantha	631	turturum sanguis 553
tragium	631	tusilago 566
tragoriganus 631	tragoria	tusis febricitantes infestās.
goniflorum usus 643		112
tragositodes	631	tusis generatio. 201. curatio
tragus frumentaceus 631		203. 204
ad Tremores unguentum.		tusis inueteratæ maturati-
736		uum 205
de Tremoribus	166	ad Tusim, e' styrace medica
tribulus	631	mentum 664
triches	632	tylosis 173
trichiasis palpebrarum.		tympanias hydrops 252
175		tyros 632
trichocollia	cod.	V
tricoeca	605	Va 610
trifolium	603. 621	ualerianæ radix 635
triga	632	uari 193. 194
trigle	631	uaricosus rarnex 481
trigonus pastillus	674	uarix 498
triorchis	347. 361. 612	uarices 481
triphyllon	603. 621	uaricum excisio 498
tritium	50. 619	uasorum dissectio 429
trixago	636	uenarum plenitudo pericu-
trochisci	673	losa 16
trogloodites	240. 632	uenarum sectio. 456. eius-
tropolium	632	dem usus. cod. inde. et dis
tryblia	760	uersa ratio 458.
tryx	632	459
tuber terræ	633	à Venena eiaculantibus quos
tubera	50	modo cauendum 390
		uenenorum

INDEX.

uenenorum præseruatio. 407.	dicia	37
408	ueratrum alb. & nigrū. 575	
uenenorum quocunq; modo	e' Veratro utroque	pastila
sumptorum communis	lus	679
curatio 409	ueratri exhibendi	ratio.
uenenorum simplicium enu	652. 653. inde, usus	641
meratio 410	uerbasci genera	635
uenenis homini insidiantiu	uerbenaca	615
astus 407. 408	uere cuiusmodi uictus	ratio
ad Venenatos morsus 391	ne utendum	28
ueneris moderatus usus. 18. et	uermes hulcerum	361
opportunus quando 19	uermes terreni	569
ueneræ rei emolumenta. 17.	uermiculans pulsus	80
ueneri aduersa 18. 19. 20 (18	uergiliarum exortus. 650	60
ad Venerem stimulantia cu	casus. eod.	
ijsmodi 18. 19	uerruca	502
uenter quomodo sine medijs	uerrucæ	332. 333
camento molliendus. 64	uvertebrarum contusio et fra	
uentris affectus 220	ctura	521
uentris diuersorum anima	uerticilli	628
lium usus 591	uertigo, uertiginosi	147
uentris imi uulneratio 506	uesica per paraly sin exolu	
inflatio 225	ta	246
uentris morborum præsa	uesicæ exulceratæ indicia.	
gia 64	242	
uentris plenitudo damnosa	uesicæ immittendi clysteris	
16	ratio	474
uentris refarciendi ratio. 468	uesicæ inflammatio	241
uentricul. temperatus et in	uesicæ mala	238
temperatus cuiusmodi	uesicæ morborum præsa	
38	gia	64
uentriculi esus 56	ad Vesicæ uitia bellaria. 671	
uentriculi temperatura in	uesicæ uulneratæ signa. 566	
	7	ex Vesicæ

INDEX.

ex Vesicagine pastillus	676	741	
ex Vesicaria past.	679	uiperæ tam maris quam fœ	
uesparum ictibus medendis		minæ morsus	400
396		uiperarum ad theriacam	
uespertilionū sanguis	553	præparatio	656
ueteranus	62.142	uiperarum adeps	627
uictus ratio cuiusmodi sin-		cōtra Viperarū morsus.	392
gulis anni temporib. uti		uiperina pellis.	572
lis 28 negotiantibus			577
per peregrinantibus	29	uires demolientia	85
naugantibus	30	uiscum	581
uigilia febricitantes infe-		uiscum acutis collyrium.	698
stans	108		699
uigilia sanorum quomodo		uitex. 551	uutiligo 325
arcendæ	61	uitis candida.	558. nigra.
uinum. 610 in quo ferrū ex		eod.	
tinctum	623	uitis satiuæ & syluestris ui	
uinum liberalius à balneo		res 558	uitrum 633
potū ueneni instar	411	uitulina medulla	608
uinū melle et oleo leuius		ulmus. 618	ulophonon. 417
760. uinū purgans, in hy		umbilicus ueneris	594
drope	647	umbilici illitiones purgan-	
uini fex	632 (682	tes	652
e Vini fece cremata puluis.		umbilici procidentia	261
uini potus quatenus noxius		prominentia	466
424		uncia	760
uini uirtutes, & usus, 59. i-		undosus pulsus	80.87
tem abusus	60	unedon	576
e Vino collyrium	700	unguatum ruptura cuiusmo	
uiola	582	di	508
uiolæ albæ frutex, flores, ra		ungueta quid ab acopis dise	
dix	599	ferant	735
uiolacei olei præparatio.		unguentorum compositio a	
		nes	

INDEX.

nes ac uires diuersæ. 738	matio 278	exulceratio
inde	281.488	
unguis oculi 177.178	uteri cancer. 282	scirrhus et
ungues contusi. 313	cruenti.	duricia. 284. mola. 285 in
eod. scabri. eod.	flatio. 286	suffocatio. eod
unguium collisio. 501. ptes	uteri procidentia	288
rygia 500. uitia. 312	uua. 447	eiusq; inflammatio
uocis contentio. siue uociferatio	198	
ratio 10	uua. 52.	uua passæ. eod.
ad Vocem amissam 205	uuatio	439
uolucrum fel. 638	uulpinus adeps 627	pulmo
uoluulus 237	616	uulpis usus 557
uomitio biliosa 117	uulua amputata mulierem	
uomitione quibus utendum	superuixisse	289
652. 653	uulua sine mortis periculo	
uomitioria pharmaca. 652	tota adempta	505
653	(tia. 21	uulua hæmorrhoides. 292
uomitus difficultati meden	293 præclusio. 289	rha-
uomitus ieiuni ratio 63	gades 292	condylomata.
uomitus usus 16. 17. 21	eod.	X
uranium collyrium 697	Xanthion	610
urinæ obseruatio in renum	xerophthalmia	172
& uesicæ affectib. 242	xesta. 759. xiphij radix. 610	
urinæ stillicidium 245	xiris. xyris	610
urinæ usus 613	xylocolla	629
urinam non continentibus	xyster. 696	Z
remedia 246. 247	Zea	578
urinarum notæ 88(242	zingiberis radix	eod.
urinariarū partiū abscessus.	zomos	578
ursinum fel. 637	adeps 625	zopisa resina
sanguis 554	zopyrus antidotus	668
urtica 48. 554	zosimi unguentum	736
uteri abscessus. 280	inflammatio	zythus. 578

FINIS.

PAULI AEGINETAE
IN SVOS DE RE MEDICALI
broſ Præfatío, Albano Torino
interprete.

Pauli laborem me noſce, qui plurimum
Peragravit terræ, Aegina natus patria.



ON quí ueteribus, eorū quæ ad
artē ſpectant, prætermiſſum quic
quam putem, inſtitutū nobis hoc
opus eſt, ſed quí in compendiū do
ctrina redigatur. Cōtrā enim, nō
tam rectē, quā́m abſolutē etiā́, il
lis ad unguē omnia elaborata eē
ſeo. Rectiores uerò, præterquā́m quòd eos attingere nō cu
rant, etiam uanitatis accuſant. unde commentationis huius
conſilium cœpimus: his quidem cōmentariolum, quod ut ue
riſimile eſt, quærent, compēdioſum: nobis uerò exercitium
futurū. Abſurdū enim eſt, rhetoras forēſium rerum præ
ceptis breuibus, concinnisq; codiculis, ac ueluti coambuloni
bus (ſic enim uocant) quibus legum quidem omniū ſumma
quædam ad uſum expedita tenetur, uti: nos autē eadē negli
gere. quanquam illi non ſolum perexiguū, ſed iuſtū cogi
tandi, reputandiq; negocij tempus prorogare ſibi poſſūt: no
bis contrā, uel nūquam, uel perrarò ſanē ſacultas ea datur,
quando in morbis quibuſdam cunctari ſæpenumerò abſq;
graui discrimine nō licet. unde rectē admodū Hippocrates,
pernicē eſſe occaſionem docuit. Illos ſiquidem in ſolis pro
pemodum urbibus uſus occupat negotiorum, ubi magna li
brorum copia eſt: Medicis uerò nō in urbibus, agris' ue, aut
ſolitarijs locis tantū, ſed iam et mari, in ipſis perſæpe na
uib; repentiū morborū neceſſitas incidit, in quib; mora
uel interitum, uel extremū periculum adfert. Quādoquidē
autem

PRÆFATIO.

autem uniuerſas medendi rationes, uel omnem per ſingula
materiam memoria tenere, arduus & impoſſibilis conatus
eſt: Epitomen illam parauimus, e' priſcorum medicorū mo
numentis conſarcinatā. Neq; enim ex nobis natū quicquā
adiunximus, paucis quibuſdā exceptis, quæ in arte exercen
da notauimus, et experientia deprehendi. Pleriſq; uerò medico
rum illuſtrium ſcriptis congreſſus, Oribasij præſertim (quē
et ipſe ſua aliunde decerpiſit, unde uolumē, in quo uniuerſam
ualetudinis tuendæ rationem complexus ſum, tranſtuli: nā
poſt Galenum, et iuniores etiam Galeno fuit) præcipua ex
omnibus delegi, morbo nullo, quantū id fieri potuit, præter
greſſo. Nā illud in ſeptuaginta libros diuiſum Oribasij uo
lumen (Hebdomēcontabiblon appellatū) Medicinæ quidē
argumentum omne tenet: ſed parare tam immenſum opus,
haud cuiuſuis eſt. Epitome uerò ad ipſius filium Euſtathij
ſcripta, quæ ab integra morborū omnium tractatione mul
tum abeſt, etiam cæterarum rerum ſpeculationem imperfe
ctam habet: aliās cauſis, aliās notis, interdū etiam abſoluta
curatione, tanquam alia ſubierint, prætermiſiſis. Hoc uerò
quicquid eſt opuſculi, morborū omne genus, qui in ſimilari
bus, uel inſtrumentarijs corporis partibus, uel continui diſſo
lutione uiſuntur, cum notas, tum cauſas, tum curationes cō
plectitur: neq; in ſumma tantū, ſed ubicunq; res ipſa fere
bat, ſuſius etiam. Ante uerò hoc, de tuenda ſecūda ualetudi
ne perſcripſimus negociū totū. Poſtremo de ſimpliciū, cō
poſitorūq; medicamentorū facultatib. librū condidimus.

SEPTEM TOTIVS OPERIS (VNI
uerſum enim in totidem libros diductum
eſt) ſcopi.

In Primo uolumine, omnem quæ ad ualetudinem tuen
dam ſpectat, materiam comperies: et quā nam affectiones
ætatibus, anni temporibus, temperaturis, et alijs quibuſdā
peculiaribus

PAULI AEGINETÆ

peculiares, præcauantur, & emendentur, facultatesq; ac
usus omnium alimentorum, quemadmodum in capitibus ex
plicauimus.

In Secundo de febribus singulis docetur, præmissis quia
dem quæ huc spectant omnibus notis, uidelicet ab excremen
tis, diebus decretorijs, et alijs id genus: subiectis uerò, quæ fe
bres comitantur symptomatis.

In Tertio de affectionibus per singulas corporis partes,
à capitis coronide ad pedis usq; plantam, extremosq; un
gues grassantibus, agitur.

In Quarto, de his quæ forinsecus corpus impetunt malis,
& ueluti in aperto constitutis, quæ non in certis, sed in ple
risq; partib; insurgunt, sermo fit. In quo de lumbricis quoq;
& dracunculis tractatur.

In Quinto, de his quæ uenenū ictu, morsu'ue relinquunt:
inibi; de rabiosi canis morsu, et aquæ metu: deq; canis non
rabidi, hominisq; morsu. Inter quæ de uenenis pariter, &
contra uenena præsidijs docetur.

In Sexto, de omnibus quæ tam in carne, ubi & telorum
extrahendi ratio cõprehenditur, quàm in ossibus, in quibus
fractionum uitia, & artuum luxationes continentur, ma
nuum & scalpelli operam desiderant, disseritur.

In Septimo, omnium medicamentorum cùm simplicium
tum compositorum uires continentur, præsertim eo
rum, quorum discursim in superioribus sex libris facta est
mentio: maxime maiorum, et tanquã insignium præpara
tionum. Scimus sanè illic non omnes diffuse, ne doctrinæ
fieret confusio, explicari: ut quærens aliquis unã, plures ue
nobilium compositionum, facile reperiatur. Postremò addun
tur nonnulla quæ ad compositiones medicaminum conse
runt, item de succedaneis speciebus, ita ut totum uolumen
in ponderum & mensurarum disciplinam desinat. Exor
diemur itaq; iam primum commentarium.

HYPOT

LIBRORVM ARGVMENTA.

HYPOTHESIS LIBRI PRIMI.

Primum huius operis hoc volumen est, in quo uniuersam de
tuenda sanitate hypotyposim profecuti sumus, ceu iam pridem
in prefatione ostensum est, et deinceps denuo per capita dicitur.
Illud prius ingenue fateri libet, magnam partem eorum quæ pri-
mo & secundo libro tractantur, huc ex Oribasio traductam. no-
luimus enim propriam opinionem frueri, uerum ex omnibus
utilitatem deglubere. In reliquis quinque libris paucissima rãtun-
ex illius monumentis mutuata sunt.

CAPITA LIBRI PRIMI.

De his quæ in foetura prægnan- tibus accidunt, quoque nutrita tu alēdæ sint grauidæ. Cap. 1	Ad calfaciendā habitudinē. 26
De nutrice	Ad uitiatū corporis colorem. 27
De lacte nutricis probando	Ad liuores & fuscidades. 28
Quomodo lactis uitia emen- dentur	Quæ dentes præseruent. 29
De infantis educatione	Aduersus grauem auditum. 30
De exanthematis quæ puello oboriuntur	Ad oculorum caliginem. 31
De rufi & coryza infantis	De plenitudine. 32
De gingiuarum pruritu	De temulentia. 33
De dentitione	De iis quibus alimenta corrū- puntur. 34
De aphtha oris ulcere	De re uenerea. 35
Ad fœmorum intertrigines	De iis qui uenere uti non pos- sunt. 36
Cōtra aurium humectationes.	De iis qui uenerem immodice exercent. 37
De Siriasi	De nimietate genituræ. 38
Infantium & reliquarum dein- ceps ætatum, usque ad eā quæ uigorem transiisse uidetur, educatio	De iis qui ex frigore noxam contraxerunt. 39
De frictione præparatoria	De iis qui immodico ardore iniuria affecti sunt. 40
De exercitationibus	De pituita in uentriculo supe- riore abundante. 41
De exercitationū generib.	Quomodo quis facile uomitū promoueat. 42
De frictionum generibus	De iis quæ secunda uoletudine cōstitutis, aluum emolliunt, & lotium cient. 43
De uociferatione	De clysteribus. 44
Cuiusmodi lassitudines exerci- tationes excipiant	De glandibus. 45
De cutis adstrictione	De caput purgantibus per os apophlegmatismi dicuntur. & per nares, deque unguen- tis. 46
De spontaneis lassitudinibus.	Quæ menses trahant mulie- bres. 47
Cuiusmodi rationem uictus se- nectus postulet	
Ad rugosum contractumque cor- pus leuigandum	
Vesuanter spiret corpus	

Sudo

CAPITA LIBRI I.

Sudorifica medicamenta	48	in uētriculo, exempli loco,	
De aere	49	paulo uero post reliquarū	
De aquis	50	etiam intēperaturarū cor	
De balneis	51	rectio	72
De thermis sua sponte proue-		Quæ sint alimentorū uires.	73
nientibus	52	De oleribus esculentis	74
De uictus ratione singulis anni		De olerum asparagis	75
temporibus utili	53	De iis quæ edendo sunt radici-	
bus		bus	76
Victus ratio in negotio degen-	54	De tuberibus ac fungis	77
tibus		De frumentaceis	78
Victus iter facientibus obser-		De legumentis.	79
uandus	55	De temporariis fructibus	80
Nauigantibus quæ uictus ratio		De his quæ ex arboribus de-	
conueniat	56	cerpuntur fructibus	81
Quomodo purgandi & exte-		De animalibus, primitus q̄ de	
nuandi sint obesi	57	uolucris	82
Qui nam macilenti educandi		De ouis	83
sint	58	De quadrupedib. animalib.	84
Quomodo partibus attenuatis		De animalium partibus	85
medendum	59	De lacte	86
Optimæ tēperaturæ indicia.	60	De lactipotatione	87
Quæ sint male temperaturarū		De lacte fissili	88
corporum notæ	61	De caseo	89
Defiguratione capitis	62	De piscibus	90
Quæ sint temperamēti cerebri		De corio testaceo præditis.	91
indicia	63	De mollibus	92
Ventriculi temperaturæ indi-		De piscibus sine squamis	93
cia	64	De grandibus, cetaceis ue	94
De indicis pulmonis	65	De uiribus uini	95
De notis tēperaturæ cordis.	66	De melle & aqua mulsa	96
Iecoris tēperaturæ indicia	67	De somno	97
De notis tēporaturæ testiu	68	De uigilia	98
De iis quæ omissa sunt	69	De ueterno	99
Qui calidæ corporis distempe-		Dioctis epistola prophylacti-	
rantia corrigi possint	70	ca	100
Quomodo frigidæ intemperan-			
tia corrigantur	71		
Sic corū distemperamentorum			

FINIS.

PAVLI AEGINETAE

LIBER PRIMVS, AL-

bano Torino interprete.

De his quæ in foetura prægnantibus accidunt, & quonam illis uictu utendum sit. Cap. I.



Vum fœminas utero gerentes, eiusmodi magna ex parte casus affligent, redundatio stomachi, iugis uomitus, sputatio frea- quens, erosiones oris uetriculi, & horror deniq; cibi: operæ precii fuerit, documenta quibus eis subueniatur, tradere. Utantur itaq; præsentī commoditate, inambulationibus, obsonijs haud magnâ in partē suauibus, melini coloris quod pariter & ab odore cōmendetur uino, in primis lustrico, & potatione moderata. His quippe omnib. tum redundationi stomachi, tum crebræ uomitioni succurritur. Medicamentorū uerò prouinciâ subeunt, sanguinalis herba, quæ polygonō Græcè uocatur, aqua elixa & epota: pariter & anethū, radixq; pōtica, uernaculo ab indigenis gentis suæ uocabulo Rha appellata. hæc indiscriminatim tā dapib. alijs nondū gustatis, quàm secundū ipsas datur ingerere. Forinsecus autē præcordijs labruscæ, punicæ syluestris atq; satiucæ florē, smyrnijs comam, fœniculiq; semē, cataplasmatīs modo applicare expedit. Neq; interest quomodocūq; tēperes, cum palmulis ne, & uino ueteri, siue seorsim. Ad oris uetriculi lācinationes cōducit calidā potare, suauiter inābulare, & hypochondria molli lana tueri. Quæ ab edulys appetitus auersione laborant, diuersi generis, & ad uoluptatē cōparatis dapibus, amyloq; arido excitadæ sunt. Maximè uerò id grauidis cōfert, quæ telluris glebam deglutire gestiūt, quemadmodū in malatia, quā Græci citiā, id est picā indigitāt: quæ circa tertiū à conceptu mensem ideo plerūq; ingruit, quod nequeat tum cōceptus, ob imbecillitatē, omne quod à locellis nutrimentī ratioe

A recipitur,

PAULI AEGINETA

recipitur, cōficere: superuacanea idcirco ac uaria in stomas-
cho retrimēta ueluti strues congerūtur, unde tā diuersarum,
tamq̃ insolentiū rerū nascitur prægnañtib. appetitio. Verbi
gratia, carbonū extinctorū, creta cymolea, & aliorū cōplu-
rium. Ex qua ratiōe nomenclaturā hāc id malū inuenit, a pi-
durata illa scilicet pica auis uarietate: uel q̃ istiusmodi affe-
ctus illā subinde auē impetat. Cōducunt etiā exercitationes,
& lōgiuscula profectiōes. Si qua uerò in ocio genialiter ui-
uitare assueuerit prægnañs, hāc repētinas nulla cōmoditate
subibit motiones. Expedit præterea cibū abhorrēti nonnunq̃
acria, præsertim sinapi, degustare. Aduersus porrò laxos et
eximios pedū tumores, præsentiſsima cū utilitate, solastrū,
quā anthyllidē uocāt, in aceto maceratū superdeligatur, &
brassica folia latē distēsa. iuuat cretā cymoleā ex aceto pari-
ter, et alumē cū aceto inducere. Prosunt itē mala cognomen-
to Medica, quæ Citria dicūtur, in aqua fouēdis pedib. elixa.

De nutrice.

Cap. 2.

Vtrix igitur iudicio delectuq̃ paretur, nulli prætēr na-
turam afflictioni obnoxia, neq̃ natu grandior, neq̃ ados-
lescens admodum: ita tamē, ut minima quidē natu, lustra ad-
minus quinq̃ numeret, maxima uerò septimum nō excedat.
pectore sit latiore & māmofiore, papillis neq̃ cōniuentibus,
neq̃ auersis: reliquo corpore quadrato, quod est, neq̃ ualde
obeso, neq̃ supra modum gracilēto. Magnificē porrò iuuas-
bit infantiē, nō ita pridē peperisse nutricē, & præcipuē ma-
sculū. Fugienda sunt ei arefaciētia immodicē, salsa, acria, as-
cerba, acida, amara, uehemēter calorifica, graue admodū o-
lētia, odoreq̃ nimis insignitē fragrantia cōdimenta, aliaq̃ as-
credinem præferentia. A coitu præterea nutrix abstineat.
Manus ac humeros molendo texendoq̃: exerceat, infantem
ulnis huc illuc trimestrem iam & quadrimestrem baiulet.

De lacte altricis probando. Cap. 3.

Primum bonitatis honorem lacti tribues, crassitudine, co-
pia,

LIBER PRIMVS.

3
pia, colore, odoratu, & sapore moderato. Inculpatum item,
quod dum super pollicis unguem, nitoris contemplandi gra-
tia instillatur, flexo ungue, nec ocyus, nec lentius delabitur.
Quin istoc etiā modo examinari conuenit. Lac emulētū ui-
treo uasi inyciatur, cui momentum coaguli triti cum digitis
adiecū sit: dein quiescere quoad coaguletur, permittas. Si
tum minus casei quā serī in eo appareat, hoc parum frugi-
ducito. Ab hoc diuersum, concoctioni renititur. Laudatissī-
mum, quod intra utrunq; excessum mediocritatem obtinet.

Quomodo lactis uitia emendentur. Cap. 4.

Lactis uitiositas istac ratione corrigitur. Si crassius sit,
Luomitionibus pituita expellenda est, quæ acetoso mulso
pulcherrimè concitantur. Oportet etiā eandem ante cibum
laboribus extenuare, cui negotio origanum, hyssopus, satua-
reia, scandix, thymus, momentū raphani, & salsamentū ue-
tus cum oxymelite in cibo accommodatissima sunt. Sin au-
tem acrius & tenuius lac euaserit, tum laboribus numerosis
nutricem subleuare, sorbitionibus uerò, porcinisq; carnibus
ali, defruto & uino dulci potari cōuenit. Quod si lac parcius
reddatur, sorbitionib. ac cæteris epulis liberalius indulgen-
dum, merūq; suauius bibendū, pectus & ubera confricanda.
Quibus etiā cucurbitula agglutinata, quæ factio opus erāt,
opē præstitit. Medicamēta uerò, licet creando lacti aliquid
expedire intelligam, nolim tamen assiduū ipsorum usum,
quod uiolentiū colliquant, præcipere. Bius generis sunt foe-
niculi radix, semē cū ptisana decocta, cytisiq; folia in uino ni-
gro, aut ptisana et nigella anethūq; in passo, pastinacæ syla-
uestris tā semē q̄ radix: quæ calida prius macerata exhiben-
da sunt. Debet aut nutritrix quodlibet lac uitiatum, siue cras-
sum, siue acre, tetricūq; odoris fuerit, priusq; succu puellus hau-
riat emulgere, atq; ita mammā fellitādū porrigere. Cæterū
acre nunq̄ ieiuno propinandū est. Graueolētia ipsius uino
odoratiore et ferculis dulcibus corrigitur. Super lacte casei
A 2 modo coas

modo coactio lib. 3. cap. de Mammariū affectibus, differemus.

De infantis educatione. Cap. 5.

PRæ omni cibo mel infanti nuperrimè nato præbendum est. Mox etiā lac, bis cotidie, uel ad summum ter, offeratur. Vbi uerò alacer factus pròptius assumit, & cibū concoquendi spem exhibet, tum minus replētibus ipsum edulys uti expedit. Si uerò per imprudentiā nostrā repletus fuerit, somnolentiorq; cōfestim hebetiorq; euadit, uēter intumescit et inflatur, lotiū aquosius redditur, quæ plenitatē arguūt, nihil donec ingestū cibū cōfecerint, exhibendū est. Satis aut fuerit, biennio integro lac tantū pappare, posthæc deniq; initiari.

De exanthematis, quæ puello oboriuntur. Cap. 6.

Quæcunq; per summam pueri cutem efflorescūt, principio quidem æqui boniq; faciēda sunt: sed ubi in corporis superficiem probè eruperint, tum curationem lauacris ex myrto, lētisco, rosīs q; moliri: deinde rosaceo, aut lētiscino, cetratoq; cum cerussa uti, clemēterq; nitrīs abstergere cōpetit. uehemētiora nanq; uix tolerabit. Vtilissimum uerò fuerit, nutricem dulcioribus ferculis pasci, & puerum neq; pleniore, neq; nimis tenui cibo ali. Quod si aluus infantis astricta sit, mel cibo infusum simul elixabis: si ne tum quidē respondeat, resina terebinthina ciceris magnitudine inijciatur. Si plus æquo feratur, milium impendio quā cōpescendo prodest.

De tussi & coryza infantis. Cap. 7.

Quando autem tussis aut grauedo infantem impetit, melalutis utendum est. Pueri igitur multa prius calida abluto, caput ipsius liberaliore mellis copia perungi, postremò lingua digito molliter comprimi debet: mirum enim, quantam pituitæ uim ea ratione uomitu eijciat.

De gingiuarum pruritu. Cap. 8.

In pruritu gingiuarū puellus torqueatur, fotu & abundanti unctione ex oleo probè elixo, cum momento ceræ in co liquefacto, utendum est.

De

LIBER PRIMVS.

De pueri dentitione.

Cap. 9.

Circa mensem ferè septimum infrendibus dentes produ-
cuntur, quo tempore gingiuarum, maxillarū, tendinūq;
inflammationes, non raro neruorum etiam conuulsiones, im-
petunt. Tunc igitur pusillo nihil, quod mandendū sit, exhi-
bere cōuenit. Ceterum gingiua digitis in balneo assidua fri-
catione palpanda, gallinaccorūq; adipe, aut leporino cere-
bro emolliēda. Vbi uerò iā dentes profuerint, lana delicati-
or atq; syncera, ceruici, capiti, & maxillis applicāda: quæ
ex oleo quoq; dulci & calido fouere, auditorijsq; meatib. i-
dem instillare congruit. Quo tempore infantem uberiore ui-
tu nutrire, & calida lauare, confert. Si alui etiam fluore in-
festetur, eam epithematis, quæ comprimendi facultate præ-
dita sunt, compescere conabimur, inspergentes lanæ uel cys-
minum, uel anethum, uel apium. Profuerit etiam semen rosa-
rum inferere, & in uniuersum calorificis arefacere. Si uerò
alius defecta nihil deiciat, melle in glandis instar redactio le-
niter irritetur, aut nepeta cū melle lauigata intingatur. Pu-
to aut efficaciter cōuulsionibus puerorū, heliotropiū, quam
solarem Latini dicunt, aqua elixū opitulari, si eo puerulum
decocto laueris. Expedit, si oleo irino, cyprino, aut sicyonio
illitus, totus incaluerit. Si uerò ubi iam dentes eruperint, di-
gitos morsu sauciat, utile fuerit iridis radicē rasam, neq; ad-
modum siccam, ore continere. Id quod & ulcerib. quoq; præ-
sidio est. Butyrum pariter cum melle illitum confert. Gingi-
uarum postremò pruritus, salsamenti ueteris caro lenit.

Ad oris ulcera quas aphthas nominant. Cap. 10.

Locus quoq; oris, cui aphtha cognomentū est, nuper natis
Voboritur, aliàs quidem subcandido, aliàs in ruborem lan-
guescente, nonnunquā atro colore, qualis in adustorū crustis
uidetur, quod omnium periculosissimum & maximè letife-
rum est. Cui præsidio iris est cum melle, aut arida, si siccam
inspirare malis. Itidem & rosarum folia contusa, pariter

A 3 & ca-

Et earundem flosculi. Crocus, myrrhae momentum, galla, thus, cortex thuris, aut una simul, aut priuatim singula melle irrigata. Præterea aqua mulsa, et mali punici dulcis cremor subuenit.

Ad femorum intertrigines. Cap. 11.

Duersus intertrigines feminum, myrtus sicca, cyperus,

Atque rosæ magno commodo insparguntur.

Contra aurium humectationes. Cap. 12.

Uincta aurium uitia, lana ex alumine indita, uel uinum mulsum, uel uinum uetus instillatum, uel crocus uino exceptus, arefaciunt.

De Siriasis. Cap. 13.

Siriasis est partium circa cerebrum, eiusque membranas inflammatio. Cōcaui fit in ea sinciput, cōcaui itidē cū pallorē oculi, accedit etiā totius corporis ariditas. Succurrit huic malo luteū oui sincipiti cū rosaceo cōplicati pāniculi pigmenti ne modo impositū: sic tamē, ut assidua mutatione renouetur.

Aliud contra Siriasis!

Conuenit eidem loco herba, quam Græci heliotropion appellant, folia, cucurbitæ ramenta, cucumeris, quem pepo nem nominant, adiacentem carni pelliculam, aut bortenſis Iolani succum cum rosaceo imponere.

Infantium, et reliquarum deinceps ætatum, usque ad eam quæ uigorem transiuit, educatio. Cap. 14.

Bi ablactati fuerint infantes, relaxato animi freno, suo modo in hilaritate uitam ducere permittentur. Exercitia ludicra, et leuiore nutritus cōcedantur. A sexto uerò statim anno, primoque septennio, tam pueri quam puellæ præceptoribus mansuetis ac humanis tradendi sunt. Ei namque cum animi relaxatiōe ac gratia, tenellos animos cum literis tum moribus imbuunt. Et animorum securitas relaxatiōque; haud parum ad uegetam corporis educationē momēti adfert. Duo decimū natalē ubi peregerint, Grammaticos et Geometras uisitare

LIBER PRIMVS.

uifitare, corpusq; ipforum exercere neceſſitas eſt. A quarto & decimo anno ad uigeſimum uſq; primum. Mathematicis diſciplinis & Philoſophorum rationibus ſedulam nauet operam, compluriaq; exercitia propter corporis fortitudinem ſubeant, quod animum ac corpus iuxta exercitantes, a Veneris ſtimulo coerceantur. His etiã amplioris uini uſus contrahendus eſt. In ſummo uerò ætatis flore, abſoluta uictus ratio tum animi tum corporis obſeruanda. Proinde nullo non exercitiorum genere utendum, potiſſimum cui operam ſinguli dare conſueuerunt. Cibos abundantiores plenioresq; inculpatæ alimonie uſurpent. Quib. uerò iã ætatis ſua ſtatus declinat, iſs moderatior frugaliorq; tam animi q; corporis educatio conſert. Cæterum exercitationes omne genus pro ætatis ratione relaxandæ ſunt: deq; pleniore alimento ſubtrahendũ, habitu eorum iam ad frigiditatem uergente.

De friſione præparatoria. Cap. 15.

Exercitationem mediocris quedam corporis calfactio præcedat, friſione linteolis adminiſtrata, mox nudis etiam palmis oleo madentibus, tantisper dum abundè incaleſcat, & mollius reddatur corpus, iucundusq; rubor efflo-ruerit, & tumoris moles inducatur.

De exercitationibus. Cap. 16.

Vehementior corporis motus, exercitatio eſt: meta autem uehementiæ eſt, animæ ad ſpiſſitudinẽ alteratio. Exerci- tationes aut inſtrumētarias corporis partes morbis obnoxi- as minus, ad muniaq; obeūda inſectas: ad hæc, ut cibi uali- dius ab iſdẽ attrahantur, propius permutetur, & liberalius reſiciatur caloris beneficio uehementi motione excitato effi- ciunt. Meatus præterea expurgant, excremēta ob uehemen- tẽ ſpiritus impetũ euacuāt. Quoniã ergo diſtributioni in cor- pus particulatim opitulatur exercitatio, conuenit utiq; nullo- lam neq; crudorũ neq; incoctorũ ſiue ciborũ ſiue humorum multitudinem, neq; in uētre neq; in inteſtinis cōtineri. peri-

S PAVLI AEGINETÆ

culum enim est, ne prius in cunctas animantis partes rapiatur, quàm probè concoquatur. Liquet igitur, exercitationes oportere cibum præcedere. Opportunitatem porro obeūdi laboris, lotij color arguit: aqueum quippe, crudum etiam dum succum, ex uentre redditum præfert. Rubrum uerò ac biliosum, concoctionem iam pridem ad unguem absolutā in sinuat. Quod modicè pallet, peractam modò concoctionē portendit. Tum igitur exercitationibus manus ad mouendā, uesica prius, uentreque; retrimētis exoneratis.

De exercitationum generibus. Cap. 17.

Vniuersæ semel exercitationi commune est, quod naturæ
lis animantibus calorū augmentum excitat. Separatim
uerò considerando, Valens, hoc est uiolenta exercitatio est,
quæ musculis & neruis robur præparat: cuius farinæ sunt,
fodere, ingenti onere sublato, aut eodē in situ permanere, uel
paululū procedere. Huius quoque generis est accliuus inambu-
latio; item funem manibus apprehensum scandere, atque id ge-
nus alia multa. Velox autem exercitatio citra robur & uio-
lentiā peragitur. eius sortis sunt, cursus, umbratica armorum
meditatio, duorum summis manibus complicatis concertatio-
nes, & quæ uel coryco, uel exigua pila fit exercitatio. Vali-
dum uerò exercitium celeri non rarò componitur, si quis illi
perinde atque huic acriter innixus, festinas motiones addide-
rit. Porro exercitationū genera alia lūbos potius, quàm bra-
chia aut crura fatigant: alia spinā totam, aut thoracē modò,
siue pulmonem. Exercitetur autem quisque, donec corpus in tu-
morem eleuetur, & color ille floridus appareat, motionesque
promptas, æquabiles & cōcinnas edat: inter hæc etiam su-
dorem calidum cum uapore misceri cernes. Desistendum au-
tem ab exercitatione tunc primum est, ubi aliquid eorū quæ
memorata sunt, senseris immutatū. Verbi causa, si contracti-
or paulo corporis moles uidebitur, interdicienda cōfestim cor-
poris exercitatio. Nec minus, si floridi coloris gratia mar-
cescit,

LIBER PRIMVS.

cit, quiescendum est. Iam si motionis uigorem collabi senseris, protinus pausandum. Itidem si sudoris ulla uel quantitas, uel qualitatis alteratio, puta si minor uel frigidior fiat, exercitijs ualedicito. Mox oleo corpori circumfuso quiescere, & recreatoria deinceps fricatione uti cōuenit, ueluti puerorum exercitatores facere consueuerunt.

De frictionum generibus. Cap. 18.

EX frictionibus dura quidem astringendi, mollis uerò laxandi uim possident. proinde quæ æ quo laxiora sunt, duriter: quæ uerò astricta sunt, molliter fricare congruit. At si quis temperato sit corpore præditus, constat hunc neque leniter neque durè fricandum, sed summa ope ut uterque uitetur excessus. Multa enim & dura frictio gracilitatem præbet: pauca ediuerso, mollisq; in molem attollit; mediocris æ qualitas inducit. Tria porrò frictionum discrimina, quæ à quantitate sumuntur, si tribus quæ à qualitate ducuntur, copulaueris, nouem syzygias absolues, perinde atq; è subiecta liquet tabula. Vna siquidem quantitatis, uerbi causa, multa, tribus secundum qualitatem coniugata, duræ inquam, molli & mediocri, in duritia tres constituit differentias. Pauca e contrario, ternis eisdem iuncta, ternas producit alteras. Mediocris uerò qualitate, ijsdem tribus connexa, tres alias procreat, quemadmodum subscripta figura licet cernere.

QUANTITAS		QUALITAS	QUANTITAS		QUALITAS
1 Multa	} et {	Dura.	7 Mediocris	} et {	Dura.
2 Multa		Mollis.	8 Mediocris		Mollis.
3 Multa		Mediocris	9 Mediocris		Mediocris
4 Pauca	} et {	Dura.			
5 Pauca		Mollis.			
6 Pauca		Mediocris			

A 5 De

De contentione uocis, seu uociferatione. Cap. 19.

IN uocis exercitatione nihil quidem ad ualitudinis tute-
lam facit, concinna plausibilisq; uocum modulatio. So-
nituum autem grauiorum fragor conducit, eoq; intonādum
est. Sic quippe plurima aeris uis in corpus per inspirationē
attracta, non tam thoracem, quā uentrem, totiusq; corpo-
ris meatus expandit, atq; diducit: quapropter inter legen-
dum superflui etiam humores excernuntur, legentibus quie-
dem sonorosius magis & per sudores. Iis autem qui mansue-
tius uocem intendunt, per abditam uniuersæ molis exhalas-
nem, fit enim screando per attenuationem pluriū retrimen-
torum, puta, sputi, mucii, pituitæ excretio atque expansio.
Quod igitur aliud compendiosius præsidium, his qui præ-
algore recalcificationem desiderāt, adhibebimus, quā respie-
randi functionē? Legendū itaq; ijs subinde est, quod totius tū
corporis mole remissa, tū carne liquata, arteriā, reliquosq;
spirādi meatus in concinnam raritatē diducentes, per cæte-
ras uocum grauiiores functiones modulētur. Neq; istoc officio
temere, nihil pensi habētes, utemur, sed corpore prauis,
corruptisq; humoribus exorte, stomacho magnis euidenti-
busq; cruditatib. carēte, uocis exercitationē aggrediemur,
ne plures uitiosi uapores per corpus mēbratim distrahātur.

De lassitudinibus quæ exercitiis superueniunt. Cap. 20.

LASSITUDO ulceris sensum afferens, à retrimentorum tenu-
um simul & acriū copia prouenit. Tensionis uerò lassitudo
nullam, de qua ratio ulla sit habenda, superfluitatē cor-
poribus incumbere portendit. Verū in musculis & neruis,
affectio quædam qua tendi uidentur, residet. Inflammatoria
uerò, qua nimirū partes ueluti contusas, aut phlegmone ob-
sessas sentimus, tum incidere consueuit, cum musculi supra
iustum excalescent, quippiam ex circumfusus sibi retrimentis
attraxerint. Est & alia super has affectio quarta, quæ eue-
nit, dum plusquam par sit, musculi exiccantur, sic, ut squa-
lens,

lens, contrahiñq; corpus posito amicu appareat, atq; ad motiones pigrum. Caterum ulcerose lassitudinis remediũ est, si quæ redundat euapores, frictione multa molliq;, oleo non parca manu infuso, à quo omnis adstringendi uis absit. Altera uerò defatigatio, in qua tensio sentitur, hoc sanationis propositum habet, ut relaxetur. Laxatur uerò quod tẽsum est, frictione exigua pariter & molli ex oleo dulci & infusato, refocillatione item quauis, & quiete, lauacrisq; temperatis, & lenta deniq; in calidis undis morata ut bis etiam uel ter lauari, mirum in modum conferat. Tertia lassitudinum, quæ inflammationis speciem representat, sanationis treis sortita scopos est: superuacanei uidelicet excrementi euacuationem, extenti relaxationem, & accensi refrigerationem. Oleo igitur copioso, tepido, frictionibus mollissimis, in medijs temperamenti aquis diutina mora, illiusmodi lassitudinibus succurritur. Pari etiam modo, multa quiete, & unctione continua. Quartus affectus, primo quidem die nihil diuersum à superiori ratione, excepta calidiore aqua, quæ lentè adstringat. Postera die, recuratiuam exercitationem postulat, ac protinus in natationem gelidam exiliant. Omnes uerò defessi, boni succi alimento refici desiderant.

De cutis adstrictione. Cap. 21.

Cutis constipatio (quam stegnosin Græci nuncupant) uel meatibus obstructis, uel illis ipsis defatis accidit. Obstructio quidem è crudis, crassisq; humoribus originẽ habet. Densatio uerò modò ab refrigerantibus, uel ab astringentibus, uel plurib. ab arefacientib. cõciliatur. Protinus uerò istuc ex albicante pallore, uestibus exutis, cutis duritia et defatate deprehenditur, & quod inter exercendũ agrè incalescunt. Medetur huiusmodi affectioni calfactio. ualentiorib. itaq; exercitationibus, balneisq; calidiorib. utendũ est. In solio porro gelido mora diuturnior nõ sit, imò neq; aqua sit admodũ frigida. Inducendi uerò oleo prius aliquo, mediocrẽ calfaciendi uim

uim habente, dulci, tenuiumq; partium perungantur. Postremo, cutis densitati sanandæ satis efficax remedium oleū anethinum existit, præcipue si ex uiridi anetho confectū sit, & oleum quod ex populo nigra constituitur.

De spontinis lassitudinibus. Cap. 22.

Vandoquidē lassitudo ulceris sensum afferēs, ex acrium **Q**uætrimentorum uitio nascitur: siquidem momentum modò uitiosi humoris fuerit, sola apothericæ exercitatiōe corrigitur: si uerò multū et altius radices egerit, huic tum exercitationem, tum omnē penitus motionē interdicemus. quiete uerò, somnoq; refectō, cibi abstinentiam per integrum diem præscribemus: deinde aduentāte uespera, liberaliore oleo perunctum, & mediocriter tēperato lauacro lotum, alimentis optimi succi, sorbilibusq; tenuiter alemus. minimè tamē uino defraudauerimus, quoniā semicrudos, si quid aliud, humores concoquit. Si igitur memoratorū beneficio malum cessauerit, homo ad consuetas functiones paulatim reducendus est. Si uerò sequenti quoq; die perseueret, de ualentiore iam auxilio dispiciendum est. Si uirū robur permiserit, alterum ex duobus, aut uenā secare, aut euacuare, expedit: atqui utrū alteri præferendum potius sit, discernendum. Si uiribus imbecillus sit, à uenæ sectione prorsus abstinendum est: sed purgatio moderata molienda. Vbi uerò humores percrudi admodū extiterint, neq; uasa aperire, neq; purgare, neq; exercitationibus uacare, imò ne mouere quidē in totum, aut lauare, cōtulerit. Verūm omni in quiete hoc modo affecti seruādi sunt. Epulæ potionesq; & medicamina, quibus extenuādi, dissecādiq; potestas, absq; insigni calore, exhibenda. Eduliorum itaq; loco oxymel, ptisanæ exiguum, interdum aquæ etiam mulsæ aliquantulum exhibebimus. Cum aut cunctis in hac conditione constitutis, præcordia attollātur & inflentur, & quicquid offertur, promptè flatuosum redditur, præstiterit, dapib. piperis aliquid confundere. Vincit aut usus medicamenti Diospolitici,

spolitici, simplicis item dia trion pepereon. Vtilissimum eis fuerit oxymeli. Pro potu apomelite utantur, potissimum ubi in acorē transierit: uinoq; leuiter acescente. Nutrimētis præterea, quæ absq; calore extenuât: cuius monetæ habetur cap parisi, ex oxymelite, uel ex oleo & aceto pariter sumptus. Tēſionis laſitudo, quæ nō ab exercitatione proficiſcitur, humorum nimietatē ſolidas animantis partes expandentē, inſi nuat. Caterū luce clariuſ eſt, quōd, quādo cunq; ſanguineuſ humor nimia abūdarit copia, cum incifa uena detrabere, uel malleolos ſcarificare, præſentiſſimum eſt remedium. Spōta nea uerō laſitudo, in qua inflammationiſ ſenſuſ eſt, ne uniuſ quidem atq; alteriuſ horæ, nedum duorum triūmue dieſū in duciaſ ſuſtinet. niſi enim quiſ ſanguiniſ miſſione præuenē rit, febris illico ſuperueniet acerbiffima. Satiuſ autē fuerit, ſi nihil impediāt, ſanguen biſ eodem die detrabere, ac priorē quidem detractione non ad hominiſ uſq; deliquium auferre, poſteriore uerō ne animi quidem deſectionem formidare. Si qui in ea affectione conſtituti ſanguinem detrabere ſu perſederint, ſi bona admodum fortuna ad ſalutem indigent.

Vitæ ratio ſenium.

Cap. 23.

Rigidi & ſicci corporiſ temperamētū ſenectuſ eſt. Emen datur itaq; non calorificiſ ſolum, ſed humectandi calfaci endiq; uirtute iuxta præditiſ: proinde fricāda, ſed citra laſi tudinē eſt. Alimētū interdū imbecilliorib. ter adminiſtran dum: circa horam diei tertiam, pauxillum panis cum Attico melle. Septima poſt hæc hora, præmiſſiſ fricātionib. & exer citiſ, qualia ſenibuſ cōueniunt, balnei quoq; uſu adhibito, ante omnia ſanē quæ aluū deſiciant, mox etiā piſceſ atq; aliteſ offerātur. poſtremō in cœna, quæ inculpatoſ ſuccoſ pariāt, quæq; ægerrimē corrūpantur in ſtomacho, exhibenda ſunt. Vini mulſi uſum, præſertim hiſ qui uel calculoſ renum ſuſpe ctioſ habent, uel pedū affectioni ſubiacent, nō negauerim, ad ſiſciendo huic petroſelinum. Si quando ob pituitam in uentre contractam

contractam cogimur aliquid eorum quæ incidunt, seligere, confestim ad humectantem educationem transeundum, ficis quidem maturis ante alias dapes exhibitis. In bruma uerò tempore caricis, nullo mali sensu in dextro hypochondrio infestante. At quando serosa pituitosaque retrimēta in senio confectis corporibus suggeruntur, lotium singulis diebus mouere, et aluum subducere, oleo præsertim, cæteris dapibus nondum gustatis, absorpto, expedit. Constat uerò, quod ante alium cibum olerum omne genus cum oleo et garo, ex maria item oliuæ, et pruna Damascena edēda sunt. Quod si uehementius aluus suppressa non responderit, mercuriari et cnico succurritur: quibus non minus conducit et terebinthina, interdum unius modò auellance, nonnunquā duorum aut trium magnitudine sumpta. non rarè ex oleo clyster, aluo adstrictæ subuenit.

Ad rugosum corpus. Cap. 24.

Erugatam corporis cutē reddit erui farina, cum uite canedida mixta.

Aliud smegma indefinenter abstergens.

Ficus pingues cum bryonia conteruntur, eruique farina, uisitaque sepiæ testa, pauco melle excepta.

Vt suauiter spiret corpus. Cap. 25.

Sicca cupressi coma cōtusa, uel piceæ cortex unguento confusus, suaueolentem corpori inducūt odorem. memento tamen, ne quis matutino diluculo, unā cū indumētis iā corpori applicatis, momētū uel castiæ, uel sauinæ gustare detrectet.

Ad calfaciendam habitudinem: Cap. 26.

Quoniam autem habitum instaurare oportet, fricandum in lauacro corpus intrito calorifico, quod constat nepeta, sampsucho, hyssopo, baccis lauri, rore marino, lapide pyrite, sale, fece uini combusta, nitro, pumice, pro uniuscuiusque ratione momento sinapis, uuæ timiniæ, et grani Gnidij. Post balneum uerò calorifico utatur acopo, uino giluo ueteri, potu ex uino mulso, pipere, rutha, et consimilibus.

Ad

LIBER PRIMVS.

Ad uitiatum corporis colorem. Cap. 27.

Pallidus corporis color, uita amœna, suauibusq; dapibus corrigitur: miscere autem his radiculam porrumq; cum uiridi cicere oportet. Coloris quoq; gratiam inducit, dulcis mali Punici cremor absorptus. Vincit oleum, in quo diutius bryonia radix elixa. Hoc & cuticulam erugat, & corpus expolit. Expurgandæ cuti medelis, orbiculi qui ex aliqua abstergentium farina, & bullo narcissi, & bryonia radice constant, miscendi sunt. Amygalæ item amaræ, tum radix, tum fructus. si ad manum sint, ex aqua elixa, & pro lauacro adhibita, corpori nitorem conciliant.

Ad liuores & fuscédines. Cap. 28.

Enes à liuore uindicabimus, si cutem ipsorū spissam, & affectionibus minus obnoxia, habitudinemq; omnem longè calidiorem reddemus: quod quidem multo citius assequemur, si salibus in balneis super liuidas partes utemur: quas & spongijs, in raphani, absynthijq; iure submersis, fouere expedit.

Quomodo dentes ab iniuria uindicentur. Cap. 29.

Dentes à deuastatione, corruptelaq; asseruntur si ante omnia corruptiones ciborum uitentur, assiduus deinde uomitus. Horrere post hæc escas dentibus aduersas cōuenit: cuius generis sunt ficus arida, mel coctum, quoniā prædurum est. palmulæ frangi contumaciores, quæq; glutinosa sunt. omnia, adeoq; infragilia, ut dentes dimoueāt. Caueri insuper debent, quæ stuporem inducūt: præfrigida & marcida cuncta. Sunt item à cibo dentes semper accuratè purgandi.

Ad grauem auditum.

Cap. 30.

Aduersus audiendi difficultatem in primis conducit, auditorios meatus à sordibus expurgare. Tractu autem temporis, linimentum dropace madens, in ipsum demittere, & expressum extrahere. Vna quippe opera et meatus summè expurgatur, & auditus restituitur. Post hæc autem instar erui quopiam inserto, per diem obturabis meatū: quo postera die extrahes.

extracto, singulis diebus oleo amygdalino, aut nardino, aut chamæmelino, aut adipe anserino, aut modico felle bouino, perlinies. Rursum aliquo temporis interuallo imposito, ex sî napi & ficu leuigatis, conformatum peniculum horis duabus inferere: quo deinde exempto, oleum, in albuci radice excavata feruefactum, infundito.

Ad oculorum caliginem.

Cap. 31.

N habere expedit. Hinc enim robur speciei accedit. Cauendum uerò, ne lectione delassentur. Abstinentum à uino crasso, ac dulci, epulis item quæ diu supernatant, & concoctioni resistunt, atq; succos lentæ crassæq; materiæ gignūt, ab erucis, porro, & à quibuscūq; acris uapor sursum effertur. Iam uitare pariter expedit supinum decubitus, diurnum frigus, uentos ex aduerso obuiam flantes, fumū, atq; puluerem. Infunditur porrò præfenti remedio oculis perpeti mēse singulis diebus aqua, ad hunc modum præparata. Fœniculum uiride, cum aqua cœlesti testaceo uasi foris picato iniyce, dein de fœniculo exempto, reliquias in eum usum reponito.

De plenitate.

Cap. 32.

Summopere in alimentorū satietate delinquitur. nam etsi probe uentriculus suo fungatur in coquendo officio, uenæ tamen plus iusto refertæ afficiuntur, expanduntur, finduntur, oppilantur, flatu infarciuntur, & planè saburratæ pessum eunt. Nihil uerò in morbis pestilentius uenarum plenitudine existit. Ventris autem plenitas, quanquā in totum (quod redundantiæ ipsius nunc uomitu, nūc alui deiectione excernuntur) tolerabilior sit ea quæ uenis oboritur, tamen ea quoq; damnanda est. Attamen si quis se plus satis ingurgitarit, protinus uomitu eycere studeat. periculum est enim, ne cōcoctione obita, uenæ infarciātur, præsertim si quis iugiter per intemperantiam sese largius inuitans, nullam experitur euacuacionem. Vomendum est itaq; prius quàm cibaria sumpta in uentriculo

LIBER PRIMVS.

17

triculo corrumpantur. Si quid tamen uomitionem impédia-
t alui deiectione plerunque, somno prolixiori indulgeat, & cre-
brius in potu aqua utatur calida. Vbi uerò satis concoxerit,
potissimum si aluum deiecerit, lauare. fomētis uti, paululum
salsamenti gustare, potumq; dilutū haurire expedit. Quod si
neq; desederit, neque maturè obita sit decoctio, et corpus uni-
uersum graue, et ad motus inappositum, somnolentiusq; fue-
rit, mens quoque nulla ratione torpeat, uenarum plenitatem
poriēdit. Qui uerò præter hæc lassitudine capiūtur, eos quie-
ti permittere, donec uenterculus concoctionem absoluat, mox
deinde exercitationibus inanire satius est.

De temulentia. Cap. 33.

Maturus uomitus saluberrimum temulentis est remedium.
Expedit autem ubertim aqua et mulso epotis uomitum
elicere, quo benè multa proyiciātur, et uellicationes stomachi
hebetiores reddantur. Secundum uomitū uerò solio cum illi-
nitione abundanti uti, consilium est. Reliquo tempore tantis-
per sub stragulo conquiescent, dum id uilli edormierint.

Quibus alimenta corrumpuntur. Cap. 34.

Facta ciborum in uentriculo corruptione, quibus retrimen-
ta corrupta excernuntur, rectissima semita ad sanitatem
contendunt. Qui uerò nihil deijciunt, ijs quæ iucundè uen-
trem molliunt, irritandi sunt. In ea affectione constitutis, uo-
mitiones ante cibū, uini dulcis potu citæ conferunt. Ad hæc,
quicquid est uaporosum, quicquid fœtidum aut uirosū, atq;
in uniuersum omnia quæ ocys corrumpuntur esculenta ui-
tanda sunt. Sed ea quæ inculpatū succum generant obsonia,
cum delectu uenanda sunt. Iam ita habentibus per mediocria
temporis interualla alui subductiones, ex clemētibus cathar-
ticis præsentaneam opem adferunt.

De re uenerea. Cap. 35.

Emolumenta quæ uenerem comitantur, hæc sunt: Plenitudo
tem exhaurit, corpus agilius reddit, augmentū procurat,
B G uirile

Et uirile magis efficit. Quod uerò ad animū attinet, implici
 tam ratiocinationis uim extricat, iracundiā mitigat: qua de
 re melancholico appositissimū (si quicquam aliud) est præsi
 diū. Restituit hominem modestiæ, et aliàs quoquo modo de
 mentes, sapientiæ. Affectionibus quæ pituita proueniunt, effi
 caciter opitulatur. A cibis appetitus auersionem, in ciborum
 appetentiam reducit. Aliquot multos à libidinosis insomnijs
 uindicauit. Ad uenerē uerò naturæ calidiores et humidiores
 sunt idoneæ, et procliuiores reliquis ad libidinem. Viçtus ra
 tio siccificans et refrigerās huic militiæ alienior: Senilis itē
 dem ætas, tempusq; autumnī. Viçtus itaq; calidus ac humidus
 offerendus est. Esto itē mediocris tū laborū, tum alimentorū
 modus. ut enim moderati laboris, ita ueneris quoq; mediocri
 tas cōmendatur: haud enim ad opus modò excitat, uerū prō
 ptitudinem quandā ei qui assueuerit, præbet. Veneris ergo de
 siderium, præ cunctis alijs rebus, cupediarū irritat redundās
 copia. Proinde quæ plurimi alimēti sunt cibaria, ad hanc rē
 facta uidentur. Ex piscibus, polypodes (qui sanē ad uenerem
 stimulare haud uulgariter putātur) et omnes molliore carne
 præditi. Ex oleribus uerò, geminalis, erysimō, eruca, rapum:
 atq; hæc uice medicinæ exhibētur. Legumina uerò id genus
 sunt, fabæ, cicer, ochri, quas eruiliās dicūt, siliquæ, pisa, quo
 niam flatuosa sunt, et uberi alimenti. idcirco ruiha, eo quòd
 flatus dissipat, ac penitus demolitur, ueneris quoq; flagrantia
 am obtūdit. Vuas maximopere cōmendo: humectant enim, et
 spiritu sanguen infarciunt, quod in coitū stimulat. Qui itaq;
 ad uenerem accessurus est, caueat plenitates, cruditates, labo
 res, defatigationē, ne uomitus et purgationes proximè præ
 ceßerint: pari quoq; modo, ne repētinus fluor alui. nam diu
 turnum fluorem concubitus sæpe exiccat. Aestuantem porrò
 coñditi libidinē minimè probo, sed renitendum ei præcipio,
 maximè ijs qui ex ueneris usu morbo alicui obnoxij sunt. Sa
 tius itaq; fuerit, post exercitationes, balneas, atq; cibum me
 diocrem

LIBER PRIMVS.

19

diocrem, in uenerem congregari. Sic enim tum ad corporis robur, tum aduersus ingruentes frigoris iniurias plurimum habet momenti. Veneris autem opportunior occasio à cibo (ceu mox mihi dictum) et ante somnum, existit. Protinus enim à coitu somnū capienti lassitudo relaxatur. Adde quòd temporis id liberis procreandis longè cæteris accommodatius est, cum alijs nominibus, tum quòd mulier somnum capiens, semen genitale melius retinet.

De his qui re uenerea uti non possunt. Cap. 36.

VBrenda pinguitudine frequenter perūgenda sunt, cui modicū radicis narcissi, aut grani Gnidy, aut pyrethri, aut uua timiniæ, aut seminis urticæ, aut anisi adiectū sit. Proprianda sunt etiā piper, aut satirion, aut eruca, aut cnicū, aut uino etiā fasce omnia. Ante escas alias, bulbi tosti, fului et exiale, cum sale oleoq; aut scyllæ momentū marcidæ deglutiētur. Præterea in hanc militiam confectis medicamentorū præstis uti, ac res deniq; obscenas iugi lectiōe euoluere cōuenit.

De his qui nimium ueneri indulserunt. Cap. 37.

Quoniam ex immodica re uenerea, corpus rarius, frigidius, aridius, imbecilliusq; euadit, astrictoriæ, calorificæ, humectatricis, roborificæ que potestatis rebus uti ratio est. Quam ob causam libidinis assiduitate culcitraq; palæstra defatigatis impendit, stragulum calidū, tranquillitas, somni ad naturæ necessitatem, tantisper dum corporis contentio relaxetur, ipsi que tandem à debilitate refocillati sese recuperent, reficiantq;.

De nimietate genituræ. Cap. 38.

Quidā feruētis genituræ copia saburrati, petulātes, laxi habent in amabiles cōgressus ferūtur, qua semel in coitu effusa corpus debilitatur, stomachus resoluitur, gracilescūt et exucci efficiūtur. Verū si eam ob rem se uenere defrauderint, capitis grauedine capiūtur, ac ueluti ex repletionē

B 2

cibum

cibum fastidiūt. Deinde propter libidinis in somno imaginationes polluti, eadē patiūtur. Ea de re nihil quod genitale semē auctius reddat, propinandū est: sed cōtrā, quæ id corrumpunt potius, tum alimētis tum medicamētis, uti. Lumbos ubi lauerint, oleo rosaceo, melino et omphacino oblinire cōuenit. Præstātius uerò fuerit, ammixta ei crassitudinis gratia, cera inūgere. Adijciūtur etiā succi quidā frigorigici, Semperuiui in quā, solani, umbilici Veneris, et psylli: atq; hæc quidē æstatis tempore, sed cæteris anni temporibus, tum reliquorū, tum lactuæ succus, tum lini semen aqua elixū: quippe & hoc refrigerantem succum exhibet. Lamina porro plumbea lumbis supposita, ueneream imaginationē per somnū cohibet. Hoc ipsum præstant herbæ quædam frigorigicæ cum rutha, & teneriusculis nonnunquā uiticis turionibus substratæ. Semina quoq; uiticis atq; ruthæ comesta, idem efficiūt. Obseruare autem conuenit, ne dum tanto certatim studio lumbos refrigerare molimur, renes iacturam faciant.

De his qui ex frigore noxam contraxerunt. Cap. 39.

Algore plus æquo intenso affecti, locis calidioris unctulo, uel cyprino uel irino delibuti decūbant: deinde calore nō-nihil restituto, piperis quiddam, aut myrrhæ cum uino dulci odoris optimi, annoso, uel succum cyrenaicū, è mero siue aceto, uel pyrethrum, uel castorium ex aceto deuorent. Alimentum autem calorifica ui præditum offerendum est.

De iis qui in sole exusti sunt. Cap. 40.

Qui uerò æstu solis noxam contraxerunt, his, locis auræ expositis decumbendum est. Vultum præterea, manus, crura gelidis undis irrigare. Sitim potu frigida pro cōsuetudinis ratione sedare expedit. Hæc sanè non cōfertim semel, sed pauxillatim facere, alimenti item parum, facile in partes digestibile, liquidum potius quàm solidum assumere confert.

De

LIBER PRIMVS.

De pituita in uentriculo superiore superabundante: Cap. 41.

Quod si incidas in quempiam, qui ualentis nutrimenti oblationes auerſetur, quiq; ſi aſſumere impellatur, nauſeat, neque fortassis quicquam libenter, præter acredinem præſerentia admittat, & iſs quidem oblectetur, ſed uentriculus inflationem nauſeamq; experiatur, & ſolis ruſtibus aliquantulum recreetur, interim ipſa quoq; ſumpta cibaria, in acidam præſertim corruptionem conuerſa, uitiatur: omnino perſuaſum ſit, prima ſanationis præſidia exiſtere, ut uentriculus à pituita abſtergatur. Ipſe quidem in eiufmodi affectione cõſtitutum cognoui, qui radícula ex aceto mulſo ſumpta, fide maiorem craſſa pituitæ uim euomuit, atq; ita ſecundam extemplò ualeitudinem aſſequutus eſt.

Quomodo quis facile uomitum faciat. Cap. 42.

Quandoquidem uiolenter uomentes plurima ſæpæ comitatur abſurda, haud ab re fuerit, rationes quibus uomendi difficultas tollitur, præſcribere. Vomitus enim uero pituitam expurgat, caput releuat, neq; ea quæ quis turbicinando ingurgitauerit, incrudeſcere ſinit, noxãq; uino liberaliore madenti arcet, ſint quæ offeruntur neq; acerbæ, neq; admodum ſiccæ, uerùm partim dulcoris humorisq; partim acoris modum non excedant. B' quorum genere principem notã raphano debemus, erucæ, ſaſſamẽto perueri, origano uiridi, momento cepis, porriq;. Adiunat uomitum ex legumētis ptifana melle adiecto, pulſes ex lomento, et carnes pingues. Atqui nõ iura modo ſiue cremores, ſorbenda, ſed uniuerſa ſimul ipſarum moles deglutienda. Noli igitur, quiſquis uomere geſtis, diutulè mädicationi inſiſtere, ſed per elixationẽ cuncta molliora reddantur. Neq; te lateat, uina multi dulcoris ad eã functionem, quoniã diutius in ſtomacho ſupernatant, ſeligenda. Potus hic tepidior eſto. In cibo amygdalis, quæ melle maduerunt, utantur. Placentæ quoq; interdum deguſtadæ. Semen item peponis et cucumeris, maceratum atq; cõtuſum cum melle, necnon & cucumeris

cumeris radicem melle tritam sumere cōgruit. Qui ualentiora exigunt, narcissi bulbo aqua elixo merum diluāt. Quin et irinum quoq; unctulū uomitionem proritat, si quis digitulis eo delibutis irritet. Verū id etiā ad uomentes spectat, nihil pratermittere, nihil reliquū facere, sed hos ab ipso protinus colluere, faciemq; pari studio, aut posca, aut aqua abstergere. nam id dentibus prodest, et caput excitat, exoneratq;.

Quae sequunda ualetudine constitutis aluum subducunt, & lotium cient. Cap. 43.

PRiscis quibusdam ad secundam ualetudinem tuendā abundē uisum est, diebus singulis aluū atq; uesicam citra reprehensionis notam retrimentis sufficiēter, pro cibi potuq; sumpti multitudine, exonerare. Quod si illi oletum, huic uerō lotium respōdebat, probabant: Sin secus, lotiū quidem ciebant scandicā, apio, asparago, petroselino, aniso, nepeta, origano, absinthio, graminis, carduiq; radice, cytiso, herba cincinnali (quod adiantum dicunt) aqua elixis, quorum ius in potu cum uino subinde ministrabant. Hæc quippe per lotiū sanguinem expurgant, quod emolumentum adfert præsentiissimū. Aluo suppetias ferebant, terebinthinā, instar oliuæ sub somnū deuorandam exhibētes. Si uerō acrius aluū subducere animus est, exiguum rhei Barbarici admiscebimus. Cōueniunt etiam aluo emolliendæ, oua sorbilia. Ex oleribus beta, malua, ius cochleariū, et hæc fortasse satisfaciunt. Validiores in hac re uires habent, mercurialis, in aqua cū salibus elixa, et comesta, et ius eius epotum. Similiter et sambuci folia, polypodijq; radicis duo denarij salsamento insparsi, aut cum ptisana deglutiti. Eiusdem classis est serū lactis, triū aut quatuor heminarū mensura, cum sale et melle sorptū. Ius quoq; ueteris gallinaeci, tam per se, quā cū binis cnici denarijs acceptū. Aloē interim à cœna, quæ triū cicerū magnitudinē æquet, assumere expedit. Saluberrimus itidē fuerit epithymus cū uino post frugalē cœnā epotus. Verū si quis uehementiore euacuatione egeat, ueris tēpore epithymi drachmā ex oxymelite bauriat.

De cly.

De clysteribus. Cap. 44.

HAbent natura uentres quidam astrictiores, quorum præ debilitate stomachus medicamenta quæ per os sumpta aluum deiciunt, non sustinet: hys clysteribus succurrendum est. Qui si pituita quidem intestino fixius inhaeret, è iure caricarum, betarum, nitri, radicis cucumeris sylvestris, cum melle et oleo uel chamæmelino, uel anethino cõstant. Si ariditas acrius urget, uincit decoctum alibea, fœnogræci, chamæmeli, adiecto oleo et melle haud ita multo. Abundè nonnunquam oleum per se dimidiati acetabuli quantitate, per inferna immissum, facit. Neq; tamen id continuò agendum, ne natura ijs irritata, ultronea deiectionis obliuiscatur.

De glandibus. Cap. 45.

VSus quoq; glandium celebris est ad stercuris excernendum, et ad educenda quæ per clysterem iniecta nõ redduntur. Finguntur uerò glandes è sale asso, melle et nitro. Thymus quoq; non raro melli percocto leuigatus, assumitur. Formantur nonnunquam et è terebinthina, resina et nitro, et modico interim cocco Gnidio. Cæterum quoniam ferè lancinatio inde conflatur, partes oleo sunt obliniendæ. Porro dum pyrethrum, aut piper inseritur, opitulantur dissolutis, et præ algore inflatis. Additur item sæpius et centaurium, pici aut cerato implicitum, resolutioni uerendorum accommodatissimum præsidium. Puris uerò grumus salis inditur. Ex ficu deniq; adiecto nitro, nonnunquam collyria perficiuntur.

De caput per os & nares purgantibus, deq; unguentis earundem etiam. Cap. 46.

HVMores capitis per sputa uacuantur. Id si clementer facere fert animus, cõfundimus piper masticha. Si ualidius uacuare studebimus, aliàs pyrethrum, aliàs herbam pedicularem mandere præcipimus. Præterea utriusq; orcitunicæ cõmanducata radix, ad pituitam extrahendam efficax est. Capparis quoque radicis cortex. Retrimenta uem ferosa

rebus enumeratis euacuantur. Sinapi uerò cū oxymelite gar-
garizatum, aut defrutum in quo origanū uel hyssopū elixa-
tum sit, crassiorē pituitā excernit. Ipse uerò sapa sinapi cum
oxymelite cōfundo. At si à muco quoq; purgari cerebrū ex-
petat, cum per medicamēta quæ acorē obtinent, quorū bene
multa sternutatione eliciūt, euocabimus. Purgat itaq; per na-
res anagallidis utriusq; & cuiusuis orcitunica, ac betæ suc-
cus, foliorū quoq; syluestris cucumeris succus uel seorsim i-
ppius, uel cū decocto, uel betarū naribus infusus. Crudis uerò
humoribus in thoracis, pulmonis, capitisq; parte contentis,
sternutamentū nihil proficit. Quo autē os oblini debet, tale
est: Sapo cum betæ succo dilutū, partibus palati atq; colu-
mellæ illitum, optimē facit. Idem per nares quoq; purgandi
facultatē obtinet. Nigella porrò acquisitu facili, ad nariū il-
litionē subinde usus sum: quā equidē interdum peracri aceto
pridie maceratam, deinde posteriore die cum aceto denuò læ-
uigatā, naribus infundo. Interdū uerò nigellā oleo ueteri li-
quescio, atq; pari modo usui adhibeo. Ad hunc ferē modum
Archigenes quoq; in obturatione nariū eadem usus est. Prio-
ri autem ex aceto, Crito felle suffusis succurrebat.

Quæ menses trahant muliebres. Cap. 47.

Quæcunq; lotia proritant, eadem & muliebria impellere
solent. Verbi causa, brassicæ radicis decoctū potum, pera-
sicæ radix, rutha, calta (sic enim Romani chrysanthemō uo-
cant) dictānum, & semen crucæ. Reperiuntur etiam quæ ori-
locellorū subiecta, menses promouēt: ut rutha læuigata cum
melle, porri liquor, alliumq; contritum subiectum, myrrha
uino diluta, aut leporis deniq; coagulum.

Sudorifica medicamenta. Cap. 48.

Svdorem prouocant chamæmeli farina oleo inspersa, sum-
ma cuti ualidē infricata, seseli, pyrethrū, canchri, anisum
pari modo oleo inspersa, nitrum tostū haud ualde tenue cum
oleo: flos salis oleo tēperatus: liquor cyrenaicus, aqua dilu-
tus.

tus, corpori infricatus, cicerisq; quantitate haustus. Consimi-
liter & nepeta, tum si cum aqua mulsa sumatur, tum si foris
quoq; corpus ex eo fricetur.

De aëre. Cap. 49.

Saluberrimus aër est, exquisitè purus: cuiusmodi fuerit, quē
neq; stagnorum, neq; paludū, neq; alicuius profundi spe-
cus, pestiferam auram expirantis, exhalationes perturbant.
E' diuerso, qui latrina quapiam uastum aliquod oppidū ex-
purgante inficitur, pestilens est. Neq; etiam is qui nebulosus
est, frugi uideri potest. Vitiosus item, quisquis in conualli cel-
sis undiq; montibus circunsepta inclusus, nullum omnino re-
cipit perflatum. Ad hunc ergo modum aër infectus, omni pa-
riter atati, omni tēperamēto, iuxta tātopere noxius est, quan-
topere inculpatus ille uniuersos & amœnat & adiuuat. Sed
qui in qualitate, ardore inquam, algore, siccitate, et humidi-
tate aër uariis est, non omnes pariter afficit. Tēperatis nam
que corporibus aër temperatus: in temperatis uerò, qui con-
trarij temperamenti fuerit, utilisissimus est.

De aquis. Cap. 50.

Vae aquarum cū uirtutes, tum uitia sint, explorata ha-
bere conuenit, utpote quæ multiplicē in primis præ cæ-
teris omnibus ferè usum, ad quamlibet uidus rationē sugge-
runt. Latēre itaq; neminē debet, saluberrimam esse, quæ o-
mnis planè tam gustu q̄ olfactu qualitatis expers est, sed po-
tanti extēplō suauissima, intuen ti limpidissima uidetur. Quæ
etiā per præcordia maturimè descēdit, hac nullā potiore
aliam inuestigare conuenit. Quæ uerò præcordijs diutius im-
moratur, uentrē uexat, inflationes facit grauatq; deterrima
cēsetur. ea sanè neq; calefit ocys, neq; frige fit prōptius: quin
& quæcūq; in ea elixantur, longiore mora et malignè tan-
dem decoquuntur. Satiis itaq; fuerit, experimēto huiusmodi
aquam discernere. Qui uerò notis quibusdam talē deprehēde-
re studuerit, ex ijs quæ memorabimus faciat iudiciū. Enim.

B 5

uero

uerò quæ septentrionem uersus à sole auersa labitur, ea ut as-
 grè trāsmittitur, ita coctū difficilis et cōtumax est, et calefit,
 et refrigeratur lentius: quæ uerò ad orientem, per meatum
 quempiā siue tellurem excolatur, leuiq; momento calefit et
 refrigeratur, de hac summæ bonitatis spē cōcipias. Ea quoq;
 frugi putanda est, quæ æstiuo tēpore frigidior, brumali uerò
 calidior est. Nec desunt, qui aquæ bonitatē trutina explorāt:
 ei sanè leuiore cæteris præferūt. si id cū ijs quæ mox recense-
 fuimus, cōmune habet, probatur. Verū sola hæc, nisi et alijs
 fulciatur notis, exactæ bonitatis coniectura minimè satis est.
 Cœlestis porrò aqua, teste Hippocrate, leuissima, suauissima,
 limpidissima, tenuitate deniq; nulli secūda censetur, eo quòd
 à sole leuissimū tenuissimūq; trahatur. Idq; non ex alijs aquis
 modò, sed ex mari etiam, corporibusq;: proinde et omnium
 celerrimè putrescit, ceu è diuersis qualitatibus cōsistens. Ne-
 mo uerò citius putrescibilem aquam deterrimā esse iudicet.
 alterationis quippe procliuitas uirtuti magis quàm uitio ad-
 scribēda est. Quapropter quæ inculpatae aquæ indicijs præ-
 dita, facile cōputrescit, saluberrima censenda est. Atqui ubi
 alterari cœperit, sumentibus, raucedinis, tussis, grauitatisq;
 uocis occasiōē præbet. Cæterum ex pluuiialibus aquis æstiu-
 ua et tonitruosa, bonitate nimbose præpollet. Glacialis ue-
 rò, niualisq; omnium uitiosissima habetur, quòd eius cōgelatio-
 ne omnes tenuissimæ partes exprimātur. Vtile aut fuerit, li-
 mosam, teterrimi q; odoris aquā, uitiosa q; qualitate affectam,
 elixatione prius corrigere, et sic tandē propinare. Et uinum
 miscentes, aquæ uitia emēdamus, stipanti quidem dulcius, cæ-
 teris uerò acerbius. Nonnullas porrò aquas, uerbi gratia li-
 mosam, salsuginosam, bituminosam, excolare expedit. Valde
 uerò gelidā post cibū, sed ne tum quidem confertim raptimq;
 ingurgitandam iudico. Inuenerunt nonnulli cibos ac potus,
 quibus aquarū uitijs occurrunt: et alij quidem ciceris decoctā
 propināt, uel ipsummet deuorāt; alij pedes gallinacos cum
 piscicula

pisciculo quopiam elixatos, pariter edunt. Consimiliter & fœniculum. Quidam betam denique & cucurbitam sale conditam, cum uino diluto præsumunt.

De balneis. Cap. 51.

PRobo sanè lotionem frigidā, sed ita quidem, ut citra expedientem uictus rationem degentibus nihil conferre, ijs modò qui ad amussim uitam instituunt, laboribus item et alimentis còmodissimè funguntur, ex usu esse asseram. Pluribus uerò, qui copiosiore egent refrigerio, indulgisse nònunquam nationi æstatis tēpore abundè fuerit, iuuenib. maximè et quadratis. frictiõibusq; præcalsatis. Sint aut̃ neq; uenere, neq; alia quauis occasione defessi, neq; cruditatē experti, neq; uomitõe, uētrisq; fluore, aut uigilijs deniq; exhausti. Periculosum quippe, simpliciter gelido lauacro uti. Calidū aut̃ ut optimū, ita et tutissimū talib. existit. solatur enim lassitudinē, plenitates succorū balitu dissipat, calorē inducit, placat, mollicat, flatus ubicunq; radices egerint, discutit, somnū accersit, & corpulentiam inuehit. Est uerò utilissimū cuiq; tum uiro, tum mulieri, tū puero, tum seni, magistratibus atq; priuatis.

De thermis sponite prouenientibus. Cap. 52.

BAlnearum ultro scaturientiū quædam sunt nitrosæ, quædam sulfuginosæ, quædā aluminosæ, quædam sulphureæ, quædā bituminosæ: aliæ æris, aliæ ferri deniq; naturā æmulantur. Nonnullæ ex earundē rerū mixtura cōstant. idcirco omnes in uniuersum, quotquot ultro thermæ emergūt, uirtute arefaciēdi calfaciēdiq; præditæ sunt. frigidisq; ac humidis naturis in primis cōducunt. Cæterum quæ nitri salisq; naturā obtinēt, capiti, thoraci, destillationibusq; affecto, stomacho humecto, hydropicis, ædematis è morbo pullulātibus, & pituitosis cōueniunt. Quæ alumine cōstant, sanguinis excretionibus, uomiturienti stomacho, inordinatis fœminarū purgationibus, et ijs quæ identidē abortiūt, opitulātur. Quæ uerò sulphuris uim possident, neruos emolliunt, calfaciuntq; fatigas

fatigationibus subueniunt, stomachi vires non solum prote-
runt, uerum etiam subuertunt. Sed bituminis naturam imitan-
tes, caput replere, sensorijsq; sedibus officere solent, enixè ta-
men calfaciunt, tēporis progressu emolliunt. Quæ æris con-
fusione constant, os, tonsillas, columellā, & oculos adiuuant
eximie. Quæ ferri naturam retinet, stomacho leniēq; accom-
modatæ sunt. Oportet autem balnearū aquam sensim citraq;
tumultum ingredi, quod uis ipsius pedetentim irrepens, prom-
ptius in relaxatum corpus demergatur.

De uictus ratione singulis anni temporibus utili. Cap. 53.

Optimum fuerit quæq; anni tempora obseruando, uiuēdi
rationem instituire. Per hyemem quidem ualentius exer-
citari, & plenioribus alimētis uti oportet, præcipuè quando
aëris tēpestati Boreas imperat. Vbi uerò austrina tempestas
fuerit, pari quidē exercitationi, sed cibo potationiq; fruga-
liori indulgēdum. Et in uniuersum, ut madido tēpore siccus
omnino reddere corpus, ita & per frigidū tempus calidius.
Vesci carnibus oleribusq; calidis, atq; uinū prolixius bibere,
confert. Vere autē aduentante, hic quidē uomitionibus, alius
alui deiectionibus euacuetur, alius sanguinē detrahat pro re-
cepta cuiusq; cōsuetudine, et animi prōpta uoluntate. Aestate
uerò quies expedit, laborum item & ciborum subtrahio, qui
ex frigidiore genere sunt. potatione quoq; uberiore uti, atq;
omnia quæ refrigerium humiditatemq; conciliant, adhibere
cōuenit. In autūno exadiorē cautelam circa uictus rationem
res postulat: quoniam omnino inæqualis ac inordinatus, mor-
borum omne genus parturit. Ne quid circa frigus delinquas-
tur. A uenere impendit, potuq; gelido cauendum. Matuti-
nū porro aëris frigus, meridianusq; æstus utiliter declinatur.
Pomorum quoq; fugacium repletio uitanda, quoniam non sa-
turitate modò, sed quod uitiosum etiā succū flatusq; generat,
officit. Optima nanq; omnium fructuum ficus ac uua, flatus
excitant: & nisi ante alias efcas accipiatur, alimenta quoq;
corrumpunt

LIBER PRIMVS.

29

corrumpunt. Præ alijs uerò ferculis assumpti, neq; inflāt, neq; corrumpunt. Vbi frigidior redditur aër, pro algoris ratione corpus calfaciendū est. Omniaq; perinde ac hyeme iam obrepente peragēda sunt. Nec alienū fuerit, post æquinoctium ex cōmemoratis quibusdam rebus corpus inanire, ne quid superuacaneum in ipso per hyemem retētum, oxiam inferat.

Victus ratio uitam negotiosam transigentibus seruanda. Cap. 54.

Quisquis in negotio degit, speculare debet an superiore se uita exercitare cōsueuerit: an dum exercitationibus uacat, mediocriter illiusmodi cōsuetudinē sustineat, ita quidē ne morbis conflidetur, assiduo corpore perspirabili præditus. Huiusmodi quippe corporis natura ad aliam cōsuetudinem nullo pacto traducēda est. Sicuti nec eius, quod ex longis temporū interuallis aduersa ualetudine premitur. Verū si perpetim quispiā ægrotare soleat, idq; fertur plenitati acceptū, per uniuersam tuēdæ sanitatis rationē, hunc scopū tibi præfigas, ut humores iugiter moderatos possideat: sin humorū uitis, ut quā optime generentur succi, contendendū est. Quorumcunq; igitur corpus succis ex æquo redundātibus scatet, eos omnino lauare prius, mox fricari, leuiterq; dimoueri oportet. Qui autem hæc antea moliri anticipauerint, his quā dantenus eadem augere, cibum circuncidere, eundemq; haud magni nutrimenti ingerere, cōsulimus. Ceterū qui uitiosos humores accumulāt, neutiquam una sanationis intentione curātur, eo quod multiformes sint uitiosorum humorū species. Quidā enim frigidiores, pituitosioresq; quidā calidiores, biliosioresq; nonnulli atræ bilis denique maiorem aceruum cōgerunt. Abstinentum itaq; à cibis ac potibus, qui aceruatam facile succorum cōgeriem nati sunt gignere. Omnibus autem his commune fuerit auxilium, uentris deiectio.

Ratio uictus peregrinantibus utilis. Cap. 55.

Inineris iniurias facillimè uitabit obesus, maximè si lentius iter festinat. Per æstatem porrò mollis quādam fascia sex

aut

aut septem digitorū latitudine, nec minus quā quinq; cubito-
 rum lōgitudine, sinuoso uolumine lūbos ad illa usq; implea-
 cet. Pedum quoq; subsidij proficiscentibus plusculū praebe-
 rit. Per decliua enim prae missū corpus uacillās, ac per prae-
 ceptis ruiturum, ceu statumine quodam suffultum sustinet: sin-
 accliuē scandendum, faciliorem corporis motū eius prae sidio
 perfici constat. Præterea cum in perfectione ab itinere cessa-
 tur, inūgere, & exigū quiddam alimēti astui promere, po-
 tionemq; moderatam hoc tempore propinare, ex usu est. A
 prandio priusquā denuō iter arripiatur, ad tempus quiescen-
 dum est. Si quē necessitas dira proficisci impulerit, sitisq; prae-
 mat, tenuē polentā ex aqua cum salis momento bibat. Aestus
 porrō solisq; ardores cauendi sunt, neq; corpus nudū insola-
 re, sed ne ab itinere exiccatum indurescat, cooperire cōuenit.
 Hoc quippe pacto & labor minus afficiet, et nullus memora-
 torum affectuum hominem corripit. Hyeme quidē frigidā,
 ante arreptum iter, aluo subducta, et unctione admota, cibo-
 rum hyemaliū partem bene magnā, potionis uerō paululum
 sumere, fasciaq; proceriore nō lumbos modō, uerū spinam
 quoq; ac pectus, probē ac scitē inuoluere, expedit. Vbi uerō
 tranquillitati quis se crediderit, sub eiusmodiq; refectione fri-
 gus ingruit intensum, neq; ungi tum, cibū uel ac potum, neq;
 recreationē quāuis aliā, capere prae stat, si quis eo loco per-
 māsurus est. Post diutinā profectiōē cæterosq; labores uali-
 diores, etiā si q̄s nihil lassitudinis pcipiat, curari tamē fatiga-
 torū more nō dubitet: ita enim iniurijs minus erit obnoxius.

Nauigantibus qui uictus conueniat. Cap. 56.

Vomitionibus quæ nauigantibus obueniunt, initio quidem
 ut ægrē, ita inutiliter reluctamur: siquidem plurimū opis
 plerūq; ferre cōsueuerunt. Oportet autem à uomitione neq;
 multum, neq; sine discrimine quiduis alimenti offerre, sed len-
 ticulā aridam, et coctā, cum momento pulegi, aut panē uino
 aquoso atq; perodoro maceratum: potatione porrō modica,
 nempe

nempe uini penitus aquosi, uel aceti mulsi, utantur. Caterū len-
tes tātis per dum molliores euadāt, sunt elixandæ: mox in fa-
rinā terendæ, pōst arc faciendæ, ac deniq; in uas aliquod te-
staceū reponendæ. Cum uerō crebræ uomitiones diutius per-
seuerauerint, cibi maiore subtractione utēdum, exiguoq; po-
tu, puta aceto mulso, in quo thymus sit maceratus, siue pulegi-
um. Aqua itē cum hordeaceā farinā polline mixta, uel uino
boni odoris aqueo, quod tenuissimū polētæ florem adiectū ha-
beat. Aduersus porrō nauigiorum grauelentias, mala coto-
nia, aut thymum, aut pulegium odorari debent. Et quāminē
mum fieri potest, salum intueri oportet, donec quis nauigij
immorari assueuerit. Danda postremō est opera, ut aquæ lim-
pidæ sint, neq; fœdum odorem, neque salsedinem præferant.

De abolenda pinguedine. Cap. 57.

Cum supra iustum naturæ modum obesum euasit corpus,
Celi quandum ipsum & extenuandū est. Quum igitur osten-
sum sit, calidiorē siccioremq; temperiē corpus exilius effice-
re, hanc obesit quod ad mediocritatem reducatur, inducemus.
Didicisti aut, quod exercitationes festinæ, nutritus exte-
nuās, medicamenta item eiusdem facultatis, animiq; sollicitu-
dines, corporis temperamentum siccius ac calidius, atq; ob id
quidem corpus quoq; gracilius reddūt. Tenuis itaq; uicius ra-
tio iam omnibus perspicua est. Medicamēta uerō efficaciora
habentur, ruthæ semen, præcipuē syluestris, unā cum corym-
bis, malum terræ, quam aristolochiam dicunt, rotundum, te-
nue centauriū, gentiana, polium, & quæcunq; acrius impet-
lunt lotium, ceu petroselinū: horum nempe singula cū seor-
sim, tum adiectis simul alyis, humores abundē extenuant, &
corpus euacuant. Combustarum porrō uiperarum sales effi-
cacem attenuandi uirtutem possident. Theriaca ipsaq; di-
strahendi & attenuandi potentia regnat. Oleum inundum,
in quo cucumeris agrestis, alibæ, gentianæ, panacis, & a-
ristolochiæ radices, polium item ac centaurium elixa sint.

Oper-

Oportet autem alimentum non statim à balneis exhibere, uerum ut dormiant priusquam cibum capiāt, mandare. Satius autem fuerit, si aqua lauacri ex rebus dissipandi facultate præditis constituerit, præsertim si ultro emergētis copiam habere possumus, cuiusmodi Mitylenæ existit: Sin minus, salis flos aquæ marinæ commiscendus est. Vinū ad hoc tenue atq; candidū eligatur. Frictio insuper sicca, quæ panno crassiore ac rigidior sit, efficaciter extenuat. Cibi quoq; minus, quàm exercitationis ratio postulet, offerendum. Confert itidem ad pinguedinē abolendam insolatio. Vincit, nihil potare: et cīz baria semel dūtaxat die assumere, præstat. Frictione itē asperiore, nitro uidelicet & salibus, corpus perfricare. Multum etenim nitri, in lauacris extenuat: modicum uerò, corpus ad bonam nutritionē irritat. Macilentius etiam reddit hoc medicamentum, quod piperis ac petroselini duplum, asari uerò & anisi dimidiū continet. Id quod cū uescicæ, tum alui quosque retrimenta pulchrè promouet.

Quinam macilenti renutriendi sint. Cap. 58:

SI autem uesculos admodum reficere studebimus, uino utiq; scrasso, dapibus crassioris succi, exercitationibus lentis, frictioneq; mediocri, et ut simpliciter dicam, omnibus quæ sunt enumeratis contraria, utemur. Profuerit autem plurimum, trium aut quatuor dierū picatio. Si quis ieiunus lauetur, ante lotionem linteo ad corporis usq; ruborem confricandus est. Deinde dura quidem, non tamē multa frictione cutim astringendo, densam atq; solidiorem reddamus. His qui decolorati sunt, & alimenta non sentiunt, excandescentiam excitare, & animi affectus commouere, expedit.

Quomodo partibus attenuatis medendum. Cap. 59:

PLurima uerò macies, quæ membris quibusdā accidit, uel ob diutinam ipsorū quietem, uel ob deligationis modum quo fracturæ fasciantur, cōtrahitur. Quæ circa roborare partium extenuatarum uires, adq; eas sanguinis abundantia attrahere

trahere conuenit, frictionibusq; uti moderatis, motionibus concinnis, & fotu aquæ calidæ moderato. Hæc uerò tantisper peragenda, donec affectæ particule cum rubore intumuerint: & priusquam concidant, desistendum. Oportet autem tempicatis medicamentis partes commemoratas oblinire: quas ubi frigidiores senseris, sindone ac calorifico quopiam medicamine confricato. Vsus nonnunquam & thapsia sum, aliàs ex melle, aliàs cum cerato illinens.

Optimæ temperaturæ indicia. Cap. 60.

Optimi temperamenti homo est, ubi corpus ab omnib. extremis ad unguem pari distat spacio: uerbi causa, gracilitatis, obesitatis, molliciei, duriciæ, ardoris, algoris, humiditatis & siccitatis: atq; uno uerbo, cum non naturalia modò uerùm & animalia munia exactè, & penitus inculpate obierit, & exquisitissimè medium hispidi, glabriq; atri, item & candidi obtinuerit. Capillos puer rubicundiores quàm nigriores, adolescens uerò contrario planè modo habeat.

Malæ temperaturarum corporum notæ. Cap. 61.

Corpora plus æquo calidiora, dentes citius edunt, & ad augmentum celerius maturant, tactui calidiora pariter & pingua minus apparent, cutis rubicundæ, atri capillitij, me diocriter hirta, & amplioribus uenis, existunt. Si quis pinguis, crassusq; fuerit, ac uenas simul latiores sortitus sit, non est ea pinguedo naturalis, sed consuetudine acquisita. Frigidioris temperamenti notæ sunt, cum gelidum tangentib. corpus apparet, glabrumq; sit ac pingue. Color cutis unà cum pilis rufior est. Et si frigiditas plurima excesserit, liuidior, ac plumbeus, arctiores sunt uenæ. Si gracilitas huic temperaturæ accedat, neq; is necessariò, sed cōsuetudine talis euasit. Aridū uerò temperamentum durius est & gracilenatius medio temperamento, atq; hispidum: quandoquidē à sicca temperie inseparabilis omnino duricies est. Gracilitas uerò non congenitis modò temperaturis, sed etiam ex longa consuetudine

C

consuetudine

cōsuetudine contractas comitatur. Testatur uerò duriciem,
 si corpus a grè moueatur, & siccum interim ac squalidū ex
 qualibet arefaciente causa reddatur. Humidum, in reliquis
 quidem omnibus bono temperamento respondet, uerū mol-
 lius & carnosius est, à quo mollicies separari non potest. Si
 cuti crassities non insitam solum sequitur temperaturā, sed
 etiam ex diutina quadam consuetudine acquisitam. Peculia-
 re uerò maditatis indicium est, onerari ab humidioribus cor-
 pus. Quibus calidum atq; siccum fuerit temperamentum,
 ij extremè denso ac hispido sunt corpore, capitisq; casaries
 in prima statim ætate facile augmentabilis, quam atram &
 copiosam in iuuentute sortiuntur. Progressu uerò temporis
 caluities comitatur, uenæ latiores sunt, & arteriæ amplæ,
 quæ uebementiore idu percutiunt, uniuersumq; corpus robu-
 stum, dearticulatum, musculosum item, & adipe carens. Cu-
 tis durior & atrior. Gelidum uerò ac humidum tempera-
 mentū, thorax cum reliquo corpore angustus ac glaber ar-
 guit, cutis tenera & candida, capillitiū subrufum, præci-
 pue in adolescentia, in senectā non caluescunt. Sunt huius na-
 turæ statim formidolosi, pusillanimes, segnes, obscuris ue-
 nis, crassi, pingues, musculis, femoribusq; indiscreti, inarti-
 culati, & lingua plerunq; titubāte. Quod si modum mador
 frigiditasq; excesserint, color cutis capillorumq; rubens: si
 plurimum intendatur, luridus existit. Calidū, humidumq;
 temperamentū, & mollius est, & carne magis abundat, q̄ in-
 culpatum. Si uehementer augeatur, prōptius his quæ ex pu-
 trefactione proficiscūtur ægritudinibus, corripitur: Sin hu-
 midius paulo quidem, sed multo calidius existat, molliores
 paulo tales bene temperatis, & corpulentiores, nō uerò pau-
 lo hispidiores euadunt, & tangentibus longè calidiores ap-
 parent. Quod si frigidū unā cum siccitate exacta paritate
 intendatur, natura durius, gracilius, & candidum erit cor-
 pus, neq; musculosum, neq; articulatū ac depile, ad ta-
 cū ue-
 rō fria

rd frigidum: pinguedo tamen (etiā si tenuia sint eiusmodi corpora) inter carnes hinc inde intercalata cernitur: capillitium uerò & color, frigiditatis modulo proportionantur. Quod ad animi mores spectat, pusillanimes, meticulosi, moestitia semper percussi, eiusmodi tēperaturæ homines sunt: atque ut cōpendiō perstringā, in temperamentorū coniugatione semper dominantis qualitatis notæ superare consueuerūt.

De figuratione capitis. Cap. 62.

Exiguū caput, uitiosam cerebri fabricam peculiariter testatur: neq; tamen ob id grande, necessariū bonæ cōstructionis nota censetur. Nam si ex insitæ potestatis utilem ac plurimam materiam procreantis robore magnitudo euenērit, laudabile iudiciū est: sin ex solius materiæ copia, malū. Proinde distinguēda sunt hæc, forma scilicet capitis, & ijs quæ inde propagātur. Forma quidem, si concinna est, nunquam uerè mala hæc nota existit. Propagaginib; uerò capitis, si optimè consent, & neruosum genus bonum habitum, firmitatemq; obtinuerit, oculiq; perspicaci admodū acie præditi sint. Acuta uerò, & fastigiata capita, deficientē habēt frontis seu occipitij eminentiam, uel supra quā conueniat auā. Quemadmodum itaq; capitis cū magnitudo, tū paritas, sic hæc quoq; tam distortæ reprehendūtur figuræ: quarum nonnunquam, rarer tamen, nonnullæ ceu bonæ cōmēdātur, ubi formatrix scilicet facultas robustior extiterit.

Temperamenti cerebri indicia. Cap. 63.

Mediocris temperamēti cerebrum, functiones naturales moderatas, recrementorumq; mediocritatē cōtinet, minimeq; ab his omnibus quæ foris occurrant, offenditur. Capitis capillamentū talib; per infantia subrufum, per pueritiam subflauū, in adolescentia flauum, & medium quodāmodo inter exquisitè crispum & planū cernitur, nec tamē procliuius caluescunt. Quod si temperato calidius fuerit, cūcta quæ caput circūstāt, calidiora & rubicundiora uidentur,

C 2 oculo

oculorum uenæ uisum nō effugiunt, coma capitis mox in lucem editis promicat. Et si plurimum caliditas excedat, nigra, fortis atq; crispa. Quum uerò non multum, principio quidem subflaua, mox deinde nigricat: ætatum uerò progressu, caluitium facile admittunt. Retrimenta talium sunt modica, inculcataq; sanitate fruuntur. Implentur atq; aggrauantur eorū capita calorificis tum esculentis, tum poculentis, tum odoribus, tum ijs quæ forinsecus incidunt. Breues somni, minimeq; profundi, id genus temperamentis sufficiunt. Qui frigidius quàm par sit, cerebrum habent, his retrimento pluri peculiares ei meatus abundant: cæsaries recta, rubicunda, stabilis, præoptiq; à gelidis causis offenduntur, destillationibus & grauedinibus perpetuò confluantur: uenæ oculorum non conspiciuntur, somnoq; magis quodāmodo desediti sunt. Aridioris cerebri notæ sunt, nulla in meatibus excrementi redundantia, sensuum exacta consummatio. Vigiliæ, asperriimi statim in lucem editis capilli, crispique magis, caluities præcox. Humidioris cerebri indicia sunt, capillamentum planum, caluities nulla, sensus obtusi ac turbulenti, superfluitatum abundantia, somni plures, atq; profundi. Cerebrum calidum & aridum sortiti, excrementis uacant, sensibus regnant exquisitis, plurimū uigilant, celerrimè caluitium experiuntur: prima capillorum origo ocysima, plurimo abundans alimento. nigri sunt pili, & calidi tangentibus caput apparent, & usq; ad uigentem ætatem rubicundi. Sed ubi caliditati mador accesserit, & utraq; temperamentum modicè superant, ijs uenustus color & calor inest, prominentes in luminibus. uenæ apparent, superfluitatum copia moderatè concocta, capillitium rectum, uergens ad flauum, non ex facili caluent. Rebus tamen calfacientibus & humectantibus, eorum capita faciliè replentur et grauātur. Quod si uehemētior calor humiditasq; creuerit, caput morbidum & excrementosum euadit, multoq; celerrimè à calorificis humectantibus

humectantibusq; lædi consuevit, neq; diu uigilare eius temperaturæ homines possunt. cum autē somnus subrepserit, imaginationibus per somnia obruuntur, species oculorum caliginosa, sensus non exquisiti. Gelidum pariter & siccū cerebri temperamentum, frigidum & decoloratum caput testatur: quo præditi oculorum uenas latentes obtinent, & a causis frigidis prōptius offenduntur, eoq; inæquali sanitate fruuntur: sensus per iuuentutem exactissimos & inculpato possidēt, sed progrediente ætate maturimè tabescūt, atq; (ut compendiō dicam) celerrimè circa caput senectutem ostendunt. In lucē eiusmodi temperamento editis capilli uix erumpūt, prauè alimētis sustentantur, atq; rufescūt. Humidumq; cerebri temperamentum, ueternosos pariter & somnolentos homines parit: sensibus retusos, excrementis reūdātes, caput algori, plenitudini, destillationib. mucisq; narium peropportunum, neq; tamen caluicie obnoxiiū reddit.

Ventriculi temperaturæ indicia. Cap. 64.

Ventriculi natura siccioris notæ sunt, si quis uehemētius sit prematur: quæ exiguis potionib. extinguatur, à liberiorib. grauetur, et fluctuationes percipiat, eo q; superfluum est fluitate, cibarijsq; gaudeat aridiorib. Humidiore uentri culo præditi, minimè siticulosi sunt, et humoris copiam sine molestia tolerant, & edulys oblectantur humidioribus. Calidior natura uentriculus, exactius quidem concoquēdi, quàm appetendi functionē absoluit, præcipuè si dura et mutationi renitētia ingerātur: delectātur tum cibis, tum potib. calidis: neq; tamen gelidis, si moderatus ipsorū fuerit usus, læditur. Frigidioris naturæ uentriculus, ut appetēdi uirtute uiget, ita coquendi munere friget, maximè si ijs quæ suapte natura difficulter conficiuntur, & frigidis alimentis oneretur: prōptē enim in ipso acescūt. Amat uerò gelida, sed faciliè ab eorundē immodico usu offenditur. Prauæ uerò temperaturæ à morbo conflata, hoc ab insitis dissident, q; contraria non

sibi similia affectat. Quocirca si uenter decoquendo probe sua munia exequitur, temperatus dicitur: sin secus, intemperatus. Si nidorosas rudationes edat, immoderatum eius ignemque feruorem testatur: sin acidas, contra. At qui cibaria consequi contumacia facile conficit, caloris uehementiam arguit: si hæc minus, sed pisces facilius concoquit, imbecillitatem. Obseruandum tamen, propter humorem ne aliunde uentriculo admeantem id superueniat. Pituitosi namque acidum, biliosi nidorosum, uirosus, aut alias quaspiam qualitates extraneas rudant: utrosque autem communiter nausea infestat. At si in sinuoso uentriculi loculameto uitiosi humores fluitauerint, uomitu excernuntur. Si uero corpori ipsius impacti, tunicis eius adhærescunt, frustra ipsum inanibus nausea ad uomitum uellicant.

Agnitio pulmonis: Cap. 65.

Non uenter modo siticulosos, & siti uacuos reddit, et frigidi caliditæ potus appetentes, sed etiam quæ in thorace consistunt uiscera, cor, pulmo, & hepar. Qui igitur pulmonis calore sitiunt, etiamsi potauerint, non protinus leuatur siti: frigidaque potio sitim ipsorum magis restinguit, quam multa calida. Recreat eos gelidi aeris inspiratio, cum nihil solatij conferat ipsis, qui uentriculi ratione sunt sitibundi. Sic quodammodo affecti, à gelido inspiratu sensu perceptibilem læsionem percipiunt: quod insigne frigidi pulmonis indicium est. Quin et pituita excrementa cum sreatu et tussi expuunt. Quemadmodum aridi pulmones retrimetis atque pituita caret, ita humidi superfluitatibus abundant, uocem reddunt obscuram pariter et raucam, intercurrentibus ipsis identidem excrementis, quum acius impensiusque uerba facere contenderint.

Cordis indicia. Cap. 66.

Cordis feruentioris nota sunt, amplitudo respirationis, percussus arteriarum cum uelocitas tum frequentia, audacia, et furiosa temeritas, thorax hispidus, et pedus præcipue, et quæ sunt hypochondrijs partes proximiores. Magna uero ex parte

parte, et uniuersum corpus calidius, nisi iecur uehemētius ob-
stiterit. Quin & thoracis uastitas, caliditatis indicium est, nisi
et hic cerebrū magnopere repugnet. In frigidiorē uerō cor-
de percussus tēperatis paruiores edūtur: meticuloso sunt ge-
nio, eiusmodi tēperaturæ cor sortiti: pusillanimes itē, oscitā-
tesq; et pectore glabro. Cor siccius testatur duriores pulsus,
ira nō procliuius, sed ferox, et quæ nō facile placari queat, at-
que magna ex parte totū simul corpus siccius, nisi hepar cū
uicinis partib. renitatur. Humidius cor arguunt percussus
molles, mores ad iram quidē procliuiiores, sed ocys pacabi-
les, atq; uniuersum corpus humidius, si hepar nō reluctetur.

Calidum & aridum cordis temperamentum indicatur
percussu cū duro, tum magno, tum ueloci, tum deniq; den-
so. Itē respirationib. magnis, pernicipib. et crebris: et sunt om-
nes eiusmodi pectore pariter et hypochondrio hirsutissimo, ad
fūctiones expediti, iracūdi, audaces, morib. tyrannicis, iræ
præcipitis et pertinacis, ita ut facile pacari nequeat. Quod
si calor et humiditas iuxta excesserint, minus quidem prædi-
ctis sunt hispidi, uerū ad munia quæq; obeūda prōptissimi:
animo minimē quidē fero, sed ad irascendū duntaxat facili:
percussus arteriarū magni, molles, ueloces, atq; frequentes.
Si cum humiditate frigus uicerit, percussus quidem molles,
mores uerō pusillanimes, timidi et desides existūt: tales gla-
bro sunt pectore, et perinde ut irā nequaquā retinēt, ita ad hāc
haud facile cōmouentur. Cor deniq; gelidū & aridum, per-
cussus duriores edit ac paruos. Bi uerō præ omnib. omnium
minimē ad irascendū prōpti, sed semel perciti, mordicus irā
retinent, maximē uerō omnium pectus habent pilis nudissimū.

Iecoris temperaturæ indicia. Cap. 67:

Iecoris calidi notæ sunt, uenæ grādes, flauæ bilis abundan-
tia: in consistenti ætate etiam atræ: sanguis feruentior, &
ob hoc uniuersum etiam corpus, nisi quæ cordi attinēt, recla-
ment: uenter illis & præcordia hirsuta. Frigidioris uerō

C 4 iocinoris

iocinoris indicia sunt, uenarū angustia, pituitæ abundātia, sanguis, atq; totius corporis habitus frigidior, nisi à corde calor repēdatur. Vēter & præcordia glabra. Siccioris notæ sunt, sanguis crassior et paucior, uenæ duræ, uniuersusq; corporis habitus aridior. Humidioris uerò hepatis indicia sunt, sanguis copiosus et liquidus, uenæ molliores, pariter et uniuersum corpus, præterquam siccor obstiterit. Calidi & sicci notæ sunt, præcordia hispidissima, sanguis crassior & minus abūdans, amaræ bilis copia, atq; per uigoris ætatē astræ, uenarū latitudo et duritia, pari modo corpus simul uniuersum et calidū et aridū: quoniā calor à corde propagatus, frigiditati quæ ab hepate proficiscitur, facili dominatur, quemadmodū & caliditas à frigidity uincitur. Siccitatem uerò nequit cor humidius ad cōtrariam naturā trāsmutare. Liquet igitur, quod quā in idē utriusq; principij tēperamentis cōfluxerint, exactē corpus uniuersum iuxta illorū naturam afficitur. Calidius uerò et humidius iecur, minus quidem hirsutum reddit præcordiū, q̄ calidū et aridum, sed plusculū sanguinis, uenas amplas, habitudinē humidā ac calidā parit, nisi cor resistat. Si uerò permultus supra iustū naturæ modū fuerit utriusq; qualitatis excessus in morbos, q̄ ex putredine, uitiosisq; succis proueniūt, procliuiter prolabuntur. Idq; lōgē magis, si plurimū humiditas, calidū uerò paululū, augeatur. Vitiosis etiā humorib. laborāt. Humidius hepar ac frigidius, pilis nuda habet præcordia, sanguinē reddit pituitosiorē, uenas arctas, uniuersumq; corpus similiter afficit, nisi à corde in cōtrariā naturā traducatur. Frigidius et siccius iecur, parū sanguinis, uenas angustas, corpus frigidius, præcordiūq; glabriū reddit, nisi & hic quoq; cor impauerit.

De notis temperaturæ testium. Cap. 68.

Calidum testiculorum temperamentū salax, mariū opifex, et fecundum est: genitales partes protinus obsepit pilis, & circumiacētes quoq; locos contingit. Frigidius contraria

traria efficit. Humidum, semine multo, & humido abundat. Aridū paucae geniturae, sed crassae generatrix est. Calidū & aridum, semē moderatē crassum producit, & fecundissimū est, & celerrimē ad cōgressum mox à principio animal excitat. Proinde in obscenis uicinisq; partibus pilos praecociosimos, supernē umbilico tenus, infernē uerō ad media usq; femora. petulci tales cū impetu prolabūtur in uenerem, sed confestim satiantur: & si eniti uelint, ualetudinis iacturā faciūt. Si humiditas calori accesserit, hispidi quidē illiusmodi sunt, plus uerō semine abundant, sed reliquis in libidinem proniores nō sunt: ueneris autē praeter modum minori detrimento indulgent. Si uerō utraq; haec, calidum & humidum uehemēter excefferint, haud citra detrimentum à uenere abstinent. Si testiculi frigidae ac humidae temperaturae, uicinae partes glabrescunt, serius re uenerica uti incipiunt, neq; procliuēs in actū irruūt: aqueum et tenue semē emittunt, minus prolificum, muliebris modō sexus procreatiuū. Arida & gelida testium tēperies per cetera praecedenti ad amussim respōdet, sed crassius semē & omnino modicū procreat.

De his quae omissa sunt. Cap. 69.

Quae uis nostri corporis particulae priuato quopiam temperamento, effectu praeditae sunt: uerū de omnium in praesentia notis differere nō est operae precium, quā infinitae prope modum sint, & rem nobis omnem cōpendio perstringere sit propositum, illas duntaxat prosecuti, quae uniuersum potissimē corpus lege quadā cōsortij afficiūt. De ceteris eadem ratione ac uia ratiocinandū ducimus: nō ab excrementis modū, uerū ex reliquis tum functionibus, tū symptomatis, ipsarū temperamēta indagātes. Tēpus igitur est, ut conuersa oratione, totius corporis intēperies emendare aggrediamur. Quomodo calidae corporis intēperies emendentur. Cap. 70.

Quum igitur in calido temperaturae excessu, bilis exuret, si per inferna deferatur, nihil oportere negotij facere

C 5 cessere

cessere constat. Si ad superiorem uentriculum uergat, post exercitium, ante cibum, epota aqua, uomitione expellatur. Maiore autē cum utilitate tales exercētur, non citata exercitatione, aut ualida, sed deside, et molliore. Quidā uerō impē se calidi nulla exercitatiōe indigēt, sed inābulasse atq; lauasse sat habent. Gaudent tales à cibo lauare. Qui cum calore aridi sunt, humēti nutritu indigent, humidis cibarijs, balneis. Ab exercitationibus plurimis, et uehementioribus abstineant. Aestatis idcirco tempore citius lauare, et post cibum denuō, debent. Gelida his prodest potio. Siccioribus temperamentis infestissima uenus est: eis lassitudine, et stultitia, sollicitudinibus, uigilijsq; maximē abstinendum. Temperamenta humida in puerili etate affectionibus, quæ causæ rationem ex defluxione, plenitate, et putredine habent, tentantur. Quare exercitationibus multis, et exquisita uentris concoctione, atque per lotium secretionem, egēt. Hisce iterum atq; iterū prius quam cibum capiant lauare, et thermis naturalibus uti, plurimum subuenit. Eorum autem quæ à corpore desinunt, cura habēda est, tum balneis, tum exercitationibus multis, tum his quæ per uentrem et urinas excernuntur. Nihil etiam obstat apoplegmatis interdū atq; purgationibus, edulysq; boni succi, ac uino deniq; urinam ciente, uti.

Quomodo frigida intemperantia corrigantur. Cap. 71.

Gelidarum intemperierū tria habentur discrimina, quarum omnium quidem insaluberrima est arida. Nam quod in etatis processu grandioribus natu accidit, id ab initio statim tales infestat. Proinde humectandi calfaciendiq; sunt eiusmodi. id quod pulchrē quidem exercitationibus modicis, cibis humentibus ac calidis, uini calidioris natura potu, somnoq; prolixiore, conficitur. Nobis interim, ut omnes quæ singulis dieb. in corpore gignuntur redundantia euacuentur, prospiciendū. Venus aridiorib. uniuersis officit, potissimum si cum siccitate frigidi sunt: solis autem calidis et humidis

inno-

innocua. Vitiosæ quoq; temperaturæ censentur, cum humiditate frigida, & agrotationibus, quæ ex defluxionibus oriuntur, sunt opportuni. Talibus balneorū abstinentia, exercitationes crebræ, tenuior nutritus, & unctiones moderatè calfaciētes, prosunt. Qui aut frigidiores natura existunt, modū uerò sicca ac humida tēperaturæ iustū obtinent, horū calor tū excitandus, tū roborandus est. In humiditatis uerò siccitatisq; specie, uniuersa uiuendi ratio mediocris eligatur.

Siccarum intemperierum in uentriculo, exempli loco, mox reliquarum etiam intemperaturarum curatio. Cap. 72.

Aridorum dissemperamentorū, aliud in similaribus solide essentia partibus siccioribus redditis cōsistit, quod deploratum curationē non recipit. Aliud uerò, partiū quæ ex substantia ex humore cōcreta constant, existit. Est etiam et tertium præter hæc, quum propria humiditas unde partes aluntur, penitus absumpta est, quæ in omnibus animantis partibus consistunt, roris instar eis inspersa, quæ sine cibo in partibus reponi non potest: quapropter difficilima est omnium talium affectuum curatio. Siccitatibus uerò, quæ in exilibus cum arterijs, tū uenis consistunt, succurrere expedit: uictus ratione humectante, quæ singulas similarium partium peculiari humore impleat. Non alienū itaq; fuerit, agrotantē in aqua balnei mediæ tēperaturæ diutulè immorari. Post lauacrum illico lac asininum recens emulctum propinare, mellis tepidi nōnihil lacti confundere: deinde quieti ad secundum usq; balneum permittere: tum moderatè ac pinguius confricare, si exhibitum lac exquisitè fuerit cōcoctum. Id quod non ex rutib. modò, uerū ex uētriculi etiā mole, licet colligere. Modicū uerò temporis interuallū, quatuor uidelicet aut quinque horarum æquidialū, inter primum atq; secundum balneum interponatur, si tertio hominē lauare institueris: sin uerò minus, pluriū. Porro à singulis quibsq; balneis, oleo, priusquā uestib. amiciatur, obliniendus est homo. Quin à secundo quoq; balneo

balneo lac magna cum utilitate exhibebitur. si eo delectetur: sin secus, ptisana accuratissimè elixata, uel chōdrus ptisanæ modo cōfectus. Deinde trāquillitate denuō interposita, uel ad tertium lauacrū, uel ad cœnam illico ducemus. Panis autem egregiè præparatus, probeq; in clibano assatus, & sincerus esto. Obsonij loco sumātur pisces saxatiles, siue asellus è iure candido. Atq; ut summatim cibariorum caput perstringam, cōcoctioni non renitātur, nutrimentū sint exquisiti, neutiquam glutinosa, aut plurimū retrimēti. Potus sit uinū aquosum, colore candidū, purum, quod paucā aquæ mixtionem tolerat, modica adstringendi facultate donatū. Summæ quidem siccitatis remedia hæc sunt. Mediocris uerò, non tam exactam uicū rationē desiderat, nec pleniorē nutritiū abhorret. Ponatur autem in medium ariditas, superiori neutiquā absimilis, cui mediocris quædā fuerit copulata frigiditas, in qua ad calfacientium materiā transeundū est, prædictis iam adiuciendo, lactis quidem usui, plusculum mellis, uinū uerò meracius quā prius exhibebimus. Quin & cibaria calidiora non naturalibus modò temperamētis, sed nuper etiam accersitis qualitatibus, administrare cōuenit. Nardinum insuper, aut mastichinum unguentum iugiter illiniendum est. Si uerò plurima frigiditas cum siccitate excesserit, temperamentum ut multò difficillimum iudicatur, ita cum primis correptioni renititur. Verū eisdem ei medicamentis, uel melle per se elixato despumatoq; succurritur. Vinum quoq; admodum uetus eligendum est. Saluberrimum ita affectis medicamētum est, quod picatores iugiter usurpāt, si uentriculo illitū auellatur, priusquā refrigeretur: dormire præterea cum puerulo habitiore, ita ut abdomen perpetuò attingat, proficit. Vbi uerò ariditati mediocris caliditas cōmiscetur, in hac intemperie primam educationis rationem obseruare conuenit, ne mellis uel tantillū degustetur, uinū uerò minimè uetustū hauriatur. Cæterū edulia tepida ac lactea offerre, et uentrem cum omni phacino,

phacino, tum melino perlinire conducat. Verum immodicæ eos qui ita afficiuntur in frigidare, fonticū est: quoniam febris quodāmodo naturā, hic status, ubi calor modum excesserit, æmulatur. Supponamus ediuerso calidam intemperie excedere, sed ei humiditatem annexi. Huic intemperamēto, aquæ gelidæ potu opitulabimur. Salutaris etiam huic cōstringentium esculentorū usus, sed quæ absq; calfaciendi potentia sint austera. Si humidum distemperamentum solum fuerit, arefacientia alimenta, quæ neq; insignem calfaciendi, neq; refrigerandi uirtutem habent, præsidio sunt. Cōsuetæ itē præstat potionis defraudatio. Humidæ intemperiei cū frigore copulatæ, optima subsidia sunt, quæ acrimoniā præferūt, admixtis interim sine euidenti uirtute frigorifica adstringētibus. Eximium quoq; talibus auxilium, modica potio, uinorum præsertim apprimè calfacientium. Eiusmodi igitur sunt intemperierum, quæ in qualitatibus cōsistunt, remedia. Quoniam aut humor qui in sinuoso uentriculi loculamento continetur, uel tunicis ipsius impactus est, distemperamentum subinde procreat: haud absurdum fuerit, de ijs quoq; sermonem facere. Quare si prior affectus semel cōstitit, euacuato uomitu humore facile compefcitur. Si rursus ex alia quadam, aut alijs proueniat partibus, ad amussatā cognitionē requirit, quam protinus curatio excipit. Eam quippe uniuersam affectæ parti adhibere oportet: suscipienti uerò interim prospicere, ne proclinē quod influit, suscipiat. Quam quidem prouinciā non adstringentia solum, sed ea etiam quæ bonam corporis totius habitudinem cōciliant, pulchrè absoluunt. Vitiosos uerò in uentriculi tunicas absorpos humores, medicamentis molliter purgantibus educere expedit: è quorum numero est aloë, & quod inde præparatur medicamentum amarum, pīcra appellatum. Lentus uerò simul humor pituitosus uentri impactus, primò incidētibus diffecāndus, deinde expurgandus est. Si quis accommodus uidebitur, citetur uomitus radícula.

Sin neq;

Sin neq; glutinosus, neq; crassus humor infestat, satis fuerit uel ptisanæ cremore, uel mulsæ uomitione ciere, aut absinthij succū ex mulsæ sumere. Pari insuper ratione & reliquorum deinceps membrorum intemperaturis medendum est, humoribus ad commodos meatus deriuatis. At si qui sensu percipi queat, meatu pars destituatur, redundantes in ea cruores saniosos siue humores, ueluti spiritū quoq; flatuosum, inibi contentum, in halitum redactos, discussosq; uacuare conuenit.

De alimentorum uiribus. Cap. 73.

Super alimentorū facultatibus orationem, quæ bona pars operis, corpori hominis tuendo dicati, esse uidetur, rebus iam memoratis subnectere cōsentaneum est, si antequam eius cōmemorationem membratim aggrediamur, pauculis antici paucrimus. Oportet etenim alimentorū uires, si quicquid aliud, pernosse. Epulæ igitur quæ extenuatoria facultate polent obstucos recludunt meatus, lētores impactos extergunt, crassa diffecāt, attenuātq;. Diuturnior tamē eius facultatis alimēturū usus, cum serosa, tum biliosa excrementa cōgerit. Quæ si largius ingerātur, atrebilarū sanguinē efficiunt. A iugi propterea ipsorū usu tēperandū est, præcipuē ijs qui biliosiorē naturæ statū sortiti sunt. cōducunt namq; his tantūmodo, qui pituitæ, crudiq; uiscidi et crassi humoris struicem acceruarūt. Cæterū quæ impinguātis naturæ sunt, sufficiens nutrimentū suggerūt. Et si in uentriculo et iocinore expeditē cōficientur, inculpatum sanguinē pariunt, lienis uerō iocinorisq; meatus obturant. Horum uerō alia quidē crassioris duntaxat succi existūt: uerbi gratia, lens: alia uiscidi, uel uti maluæ: nōnulla utriusq; sunt participes, cum crassi, tñ glutinosi humoris, ut quæ testa integriuntur. Ad tuendā igitur ualetudinem tutior extenuans uiculus est, quā qui crassiore succo impinguādū uim possidet. Sed quoniā exiguē alit, nihil neq; firmitatis, neq; roboris corporibus præbet. Et oportet nōnunquam cum inedia quēpiam pressit, escas quæ plurimum nutriunt.

triunt, mediocriter offerre. Potissimū uerò absq̃ discrimina-
 tali uicū utentur, exercitationibus additi, & qui ex sentētia
 sua somni quantū uidetur, capiunt. Quibuscunq; autem ani-
 quā cibum sumant, exercitationibus operā dare non est in-
 tegrū, dapes crassioris succi uitent. Neq; ocio dediti, unquam
 id genus alimenta admittant. Porro ut perpetuū ocium ad tu-
 telam sanitatis summè officit, sic agitatio cōmensurata ad tu-
 endam ualetudinē summè proficit. Mediæ uerò materiæ ci-
 bi, omniū præstātissimi iudicari debent, utpote qui mediocris
 essentiae sanguinē generāt. Vt igitur eius farinæ corporibus
 nostris cōmodissima sunt esculēta: ita quæ uitiosos humores
 procreāt, summo sunt dispendio, eoq; semper uitari debent.
 Arcenda etiam, tanquam cōcoctioni rebellis, eduliorū uarie-
 tas est, potissimum si cōtrarijs fuerint facultatibus prædita.

De oleribus esculentis. Cap. 74.

Lactuca liquidò cū refrigerandi, tum humedandi facul-
 tatem obtinet, quo nomine etiam somnum conciliat. Hac
 ut inter olera eximie nutrit, ita egregie etiā succi sanguinem
 producit. Intubus refrigerandi quidem & humedandi fa-
 cultatem, sed lactuca inefficaciorem, possidet. Malua frigo-
 rificæ quidem uirtutis est, sed obscuræ: efficaciorē uerò ha-
 bet humedandi potentiam, unde & propter genuinū lentorē
 aluū facile subducit. Beta abstergendi facultate aluum
 irritat: proinde si largius estur, uentriculi os, qui stomachos
 Græcis appellatur, lancinat: iecoris & lienis obstructiones
 aperit. Brassica recocta si edatur, aluum cōprimi: semel ue-
 rò, ac ne tum quidem impensius elixata, cum oleo & garo, sa-
 le ue comesta, uētre potius lubricat: perinde atq; succus i-
 psius, lentis cremorē purgandi facultate præcellit. Hac uerò
 brassica marina aluū adhuc euidentius præmollit: nam salsē
 laginem, subamarulentum que saporem præfert. Halimori
 idem facit, sed amplioris salsedinis cōpos, uentrem subducit.
 Cæterū quā brassica stomacho accommodatior, eo quod
 medio

mediocris astringentis uirtutis particeps. Lac porro semper
prolificum auget. Blitum et Atriplex humidiora quidem
sunt, aluumque molliunt, sed paucillum alimentum præstat. Acu-
leata omnia, cuiusmodi carduus, fuscus agrestis, et huius clas-
sis alia, stomacho summopere conueniunt, depta cinara, pra-
ui namque succi, quum durior euaserit, habetur. Quare præsta-
tissimum fuerit, elixir oleo, garo, et coriandro comedere.

Apium satium, olusatrum, sium, smyrnium, omnia quidem pro-
ritandi et impellendi lotij potestate obtinet. Cæterum smyr-
nium odore et acrimonia præstantius est, et urinam pariter
ac menses commouet. Apia suauiora sunt, ideoque stomacho ma-
gis idonea. Bruca magnam excalfaciendi uim obtinet, et
genituram efficit, et ob id in ueneris stimulos addit, capitisque
eum dolor, quam cephalicam nominant, inducit. Nastur-
tium, ocimum, sinapi, calida quidem sunt et acria, præsertim
nasturtium: concoctioni resistunt, stomacho noxia, et prauos
humores pariunt. Vrtica maxime tenuis est partium, uen-
trem subducit, et parcius alit. Bisacutum, quod gingidion
appellant, scandici non absimile, plusculum astringentis quali-
tatis, amaritudinisque retinens, aptius est stomacho: ita quidem,
ut cibum fastidientibus appetentiam reuocet, cum aceto sum-
ptum, sed exiguum corpori alimentum præbet. Quæ uero syl-
uestria olera dicuntur, pestilentissimum omnino succum gene-
rant. Capparis quoque cibi appetitum excitat, meatuum io-
cinoris et lienis oppilationes recludit, pituitam educit. Vsus
eius ante escas alias ex oxymelite, uel oxelæo commendatur.

De asparagis: Cap. 75.

Blitum, lactuca, atriplex, malua, betaque, stirpem quidem huius
modi habent, asparagum uero (cymam Latini uocant)
siccum. Raporum contra sinapis, radice, nasturtij, pyrethri,
brassicæ, et omnium aliorum caloricam uirtutem habentium,
planta quidem arida, cyma uero humida est. Cæterum à spi-
nosissimis plantis, hortensis, et quæ in harundinetis, uliginosis ue-
locis

nascuntur cymæ, quæq; à bryonia decerpuntur, stomacho quidem accommodatæ sunt, et lotium cient, parū tamen nutriunt: et si probè concoquantur, olerum asparagis in nutriendo efficaciores sunt. Pari etiam modo & chamædaphnes asparagus.

De iis quæ edulibus prædita sunt radicibus. Cap. 76.

Napus atq; rapa denuò elixæ, non minus alimēti quàm reliquæ stirpes præbent. Cum uerò assidue eduntur, crassum succum generant. Bulbi, astringentis abstergentisq; naturæ sunt, appetentiam cibi proritant, stomachū roborant, uiscidos è thorace humores educūt. Si bis decoquantur, uberius quidem nutriunt, sed nihil educūt. eo enim pacto ipsorum propulsatur amaror: semē præterea prolificū producant, libidinem accendant, si crebrius sumatur, inflationes cōciliant, torminaq;. At qui ex garo, oleo, et aceto comesti, dulcissimi sunt: flatu carent, optimi alimenti, faciliq; decoctionis sunt. Pastinacæ, dauci, cari radices, minus alimenti, quàm rapæ præstāt: præcalidæ uerò sunt, & euidenter odoratæ, lotiūq; impellūt. Si abutare, prauos succos generant: cōcoctioni rebelles, cōmuni radicū ratione, existunt. Sunt qui syluestre pastinacam, daucum nunc cupent, quòd multo uehementiore ui lotiū promouet. Radicula, attenuandi adurendiq; potestatem habet: edenda in prima mensa est, ex aceto, seu garo, uentris subducēdi gratia: in secundis uerò mensis nequaquam. Cape, allium, porrū, acredine prædita, corpus calfaciunt, extenuant & dissipant crassos in ipso humores. Bis quidem elixa exigū, cruda uerò nihil alimenti sufficiūt. Alliū acrius obstructiones discutit, dissipādīq; potētia regnat. Efficaciores porris arefaciēdi uires habēt ampeloprassa, ueluti syluestria. In summa, olera simul uniuersa, coctionē non experta, si edātur, deterioris succi sunt, quàm elixa, multoq; magis superflua humiditate participāt. Quæ uerò muria uel oxyhalme cōdita reseruātur, stomacho magis cōueniūt, et cibi cupiditatē excitāt. crudos humores disijciūt, ægrè uerò conficiuntur. Et abutētibus uitiosos humores procreant.

D De tū

Tuber nullum manifestae qualitatis ex seipso liquore, frigidiorem uerò & crassiorē exhibet. Fungi autem gelidi, pituitosi, & uitati humoris sunt. Omnium innocentiores habentur boleti, qualitatis expertes, probè elixi. Qui uerò ammanitae uocantur, secundum post boletos bonitatis locum obtinent. Ceteri omnino uitandi sunt, pars quippe magna ex ipsis lethalis est: quinetiam ipsi quoque boleti, nisi exquisitissimè elixi edantur, auctores periculi subinde existunt.

De frumentaceis. Cap. 78.

Ex eis quae frumentacea dicuntur, chondrus egregiè nutrit, et glutinosos parit humores: sed ablutus pestilens est, eo quòd pròptè crassescēs incocta permanet. Praefertur potius cremor ex integro chondro exactius ptisanæ instar decocto expressus.

Alica in ceteris quidē chondro similis est, sed aluum intensius moratur. Triticum, elixum, comestū, ægerrimè conficitur, flatus generat: ubi autem concoctū fuerit, alimētum praestat ualidissimū. In panem uerò redactum, inflandi facultatem, & concoctionis difficultatē exuit, eo quòd fermenti salisq; particeps sit. Siligineus, uerò panis omnium firmissimus est, post hunc similagineus, deinde cui secerniculo nihil ademptum est, quem syncomiston Graeci uocant. Sordidus, hoc est, cibariorum panis, minus quidem alit, sed promptius per aluum deijcitur.

Amylus, minimi alimenti, non aliter atq; panis elotus est.

Hordea frigoris et absterforia sunt potentiae: elixa instar ptisanæ, humectant: fricta ad modū polentæ, arefaciunt.

Polenta in aestate ante balneū cum aqua pota, siti subuenit.

Hordaceus panis frigidior, et exigui alimenti est. Maza ægrius conficitur, & amplius quàm hordeaceus panis inflat: cum melle uerò subacta, per aluum facile descendit. Avena calida est, & parum nutrit. Milium ac panicū refrigerandi, siccandiq; & exiguas in nutriendo uires possident, aluumq; morantur: praecellit autem per omnia milium panico.

Oryza
concocta

LIBER PRIMVS.

51

concoctionis rebellis, & exigui nutrimenti est, & aluum com-
pescit. Coquitur autē ptisana hoc modo: Vna eius pars in quin-
decimaquæ partibus, pauxillo olei adiecto, elixatur: et cū ebul-
lierit, aceto: ubi iam ad unguē decocta fuerit, sal friatus supers-
inijciendus est. In quibusdam ei porrum et anethū admiscetur.
Caterū auena chondrusq; , perinde atq; ptisana coquuntur.

De legumentis. Cap. 79.

Inter legumina lens uitiosi liquoris est, humoremq; melan-
cholicum gignit, aluum compescit, potissimum bis cocta. Ius
uerò ipsius cū oleo & garo sumptum, uentrē soluit. Admiscerē
autem lenti, quoniam inflat, uel satureia, uel pulegium debet.

Fabæ leues sunt, flatus pariunt, & abstergerendi potestatem re-
tinent. Aegyptia uerò faba, nostra humidior censetur, & plus
retrimenti relinquit in corpore. Pisum laxum quidē, sed non
adeo flatuosum. Cicera inflationes pariūt, abstergunt, semen
prolificū gignunt, libidinē excitāt, lapides comminuūt: fricta
inflandi uim deponunt, sed uix in stomacho cōficiuntur. Lu-
pini quoq; concoctioni resistunt, & ægrē transmittuntur, cri-
dumq; succū procreant. Fœnogræcum calfacit, uentremq;
subducit, ante dapes ceteras sumptum. Eruiiæ & phaseli
macerati, quoad radices promicant, si ante cibū ex garo edun-
tur, aluum soluunt, & maiores alendi uires quàm fœnogræ-
cum obtinent. Phaseli & dolichi integri cum lobis, uiridesq;
sumpti, excrementicij magis euadunt.

De fructibus horariis, fugacibus ue. Cap. 80.

Curbita refrigerandi & humedandi uim obtinet, uen-
tremq; subducit, sed alimentum præstat perexiguum.

Pepon prauo omnino succi, gelidus, uisus, ac uomitorius est
non concoctus, affectum cholericum inducit. Semen eius ciēdæ
urinae, & frangēdis renum calculis natum, atq; in totū abster-
git abundē. Melo pepon minore efficacia omnia hæc possi-
det. Cucumis minore frigiditate & humiditate quàm pepon
prædita est, sed maiore ui lotiū proritat, difficilis cōcoctū: et si

D 2

CONGO-

concoquatur, uitiosum tamen corpori succum præbet. Vno uerbo: Omnes fructus temporarij, frigorigificæ et humentis naturæ, imbecillis alimenti, prauiq; succi sunt.

De arborum fructibus. Cap. Si.

Ficus & uuae primas inter fructus autumnales meruerunt, quando succus ipsorum culpa tantum non omni uacat, et alimenti ualentioris sunt. Cæterum ficus honore & bonitate succi, uuas præcellit, & ualentius nutriunt: aluum urinamq; cient, et renes purgant, præcipue exactam cōsecutæ maturitatē. Pari etiam modo caricæ, et si flatus interim sanguinemq; uitiatum pariunt, ideoq; pedunculos assiduis earundē usus conciliat. Uuæ retentæ, non conficiuntur in uentriculo, & crudum succum faciunt: deiectæ uerò, moderationes redduntur. In uuis passis maior calfaciendi uis est: conueniunt etiā magis quam uuæ stomacho, neq; tam exigui alimenti sunt, sed imbecillius aluum deiciunt.

Mora, quæ & sycamina dicuntur, uehementē humedandi, mediocrem refrigerandi facultatē obtinēt: ante alios cibos deuorata, aluum subducunt: neq; admodum stomacho aliena, sed nutrimenti ferè nullius. Ex cerasijs dulciora aluum quidem subducunt, sed stomacho officiunt. Quæ uerò acerbitati participant, stomacho minus ob sunt, neq; aluum promouent. Atq; hæc ratio nō tam uuis ac moris, quam alijs compluribus congruit. In summa, si adstringēdi ui prædita, in prima mēsa eduntur uel bibuntur, aluum cōprimunt. Quicūq; aluum ob imbecillitatem astrictū nati sunt, hos quod eam lubricet, uerbi gratia, oleræ, siue pisces, siue eiusdē farine cætera, præmittere: deinde quod conspissandi facultatē habeat, sumere oportet: quæ dum aluo robur adferunt, deorsum impellunt, atq; ad deiectionē excitant.

Nux pini, quæ & strobilus appellatur, probum crassumq; succum continet, edendo quidem, sed difficilis decoctionis est.

Persica prauī aciditq; succi sunt, & corrumpuntur ocysimè: proinde in prima mēsa sumantur, quod deiciantur promptius, neque diutius cunctando uitientur in uentriculo. Præcocia porro,

LIBER PRIMVS.

53

porrò, & doracia, seu Rhodacena, & armenia, potiora sunt persicis, quoniã neq; acescunt, neq; similiter corruptionem sentiunt, & gustu delectant amplius. Ex malis, dulcia quidem maioribus reliquis in calfaciẽdo uiribus pollẽt, facile trãsmittuntur, maxime assa, uel elixa. Acida magis refrigerant, et humores in uentriculo diffecant. Austera stomachum roborant, aluũ suppressunt, cãteris tamen magis cotonea. Piorum pari etiã modo grandiora atq; matura, eandem quidẽ facultatẽ seruant, sed uberius nutrimentũ sumẽtib; suggerunt.

Mala punica frigoris uirtutis sunt, & paululũ alimenti præbent. Mespila & sorba uehementiores in astringẽdo uires retinent, idcirco lubrica aluo accommodata sunt. Palomula stomacho utiles sunt, nisi præpingues extiterint: uẽtrem cohibere, crassos, glutinososq; humores gignere, & capitis dolorem inducere solent. Oliuarum drupæ stomacho officiant, & crassum succum pariunt. Muria condita, & colymbades ante alia edulia comestæ, appetẽtiam cibi reuocant, aluũ difficile leniunt, idq; magis cũ uel aceto, uel oxymelite præparentur. Ex nucibus iuglãs auellanis minus alit, stomachoq; utilior est. Virides nuces humidiores sunt, uentremq; subducũt.

Aridæ in aqua macerate, & ab interiore putamine purgata, recentioribus potẽtia nihil cedunt. Amygdalæ diffecadi, extenuãdiq; uirtute præditæ sunt: quocirca tum uiscera, tum thoracem, sed efficacius amara, purgãt. Assimilem sanẽ potestãtẽ habent & pistacia, sed hepatis cõstipationes maiore efficacia laxant. Damascena, si in prima mēsa edãtur cũ cruda, tum in mulsæ elixa, uentrẽ molliunt. Syrica concoctũ difficilia sunt, stomacho hostilia, & exigui nutrimenti. Siliquæ ægerrimẽ coquuntur, aluũ cohibent, & uitiosum succum possident. Sycomora euidenter refrigerant, & humedant.

Medici mali extrema pars acedine sapit, & concoctioni resistit: instar carnis, & si edẽdo sit, tamẽ æquẽ cõcoctioni resistit. Medulla uerò, siue acida, siue aquea fuerit, abundẽ infri-

D 3

gidat.

gidat. Glandes non inefficaciores frumentaceis in alendo, sed ad coquendum contumaces, & crassioris succi sunt, lenteq; transeunt. Castaneæ per omnia glâdibus præstatiores existunt.

De animalibus, primitusq; de uolucris. Cap. 82.

Aves imbecillius quidem quadrupedibus, potissimè suis, alunt, sed concoctrici facultati præptius obtèperant, præcipuè perdix, attagena, columbarum pulli, gallinæ, & phasianus. Sed turdi, merulæ, passeruli, et inter hos pyrgitæ, solidiorem alimoniâ præstant; & his etiam magis turtur, palumbus, & anas. Sed multo ad coquendum contumacior, durior, ac fibrosior pauus est. Anserina porro & struthocamelina caro excrementosa magis, omnibus prædictis difficilius cõficitur: exceptis alis, quæ succi bonitate reliquis auibus minimè cedunt. Gruum caro referta fibris, et durior est. In summa, iuniora ueteribus semper humidiore sunt, minus concoctioni resistunt, plus alimenti præbent, & per aluum procliuius descendunt. Elixæ ab assis, & in sartagine fixis pari interstitio dissident. Quæ in arenis atq; montanis regionibus degunt, ijs quæ in uliginosis aluntur, concoctioni minus obluantur, & minus superfluitatum relinquunt.

De ouis. Cap. 83.

Gallinarum & phasianorum oua, primi meriti sunt, sed anserum & struthocamelorum ultimi. Longè autem recentia ueteribus præstant. Tremencia magis nutriunt, sorbilia facilius descendunt, & gutturis asperitates leniunt. Reliqua ad unum omnia cõcoctioni obstinatè repugnant, & lentius permeant, crassiq; omnino succi sunt, demptis ijs quæ præfocata dicuntur, quæ fiunt dum cruda in garo, uino, et oleo irrigata, in uase ad moderatam consistentiam densantur: nam hæc cõcoctio facilia, succiq; inculpati creduntur. Fricta autem in sartagine, omnium sunt nocentissima.

De his quæ pedibus fidunt animalibus. Cap. 84.

Pedestrium animalium, suillæ carnes omnium aliorum esculentorum efficacissimas in nutriendo uires obtinet, eo quod cum

cām gustu, tum odoratu peculiarem quandam germanitatem humanae carnis æmulantur: ueluti à quibusdam qui per imprudentiam, humanam carnem degustauere, animaduersum est. Nutrimētū quod inde contrahitur, glutinosum est, et ægrè in corpus dissipatur. Ouilla excrementosa est, perditosq; succos generat. Caprilla, acredo succusq; minimè bonus inest.

Hircina deprauatissima est, siue succum eius malignū, siue concoctionis difficultatem respicias. Bubula atram bilem efficit. Leporina crassum quidem succum habet, uerū in hoc à bouina & ouilla uincitur. Ceruina duri & coctū difficilis alimenti est. In uniuersum, recentiora omnia ueteribus humidiōra, molliora, & coctū faciliōra sunt. Pari modo et castrata, testiculatis: & bene habita, strigosius præferuntur.

De animalium partibus, & eorum quæ pedibus
fidunt sanguine. Cap. 85.

EXtimæ animalū partes neruosæ sunt, pinguedine carneq; uacant: quapropter & uiscida sunt, & exigui nutrimenti, & alui ciendæ efficaces: demptis autē (quod impendit sicca sint) partibus. Rostra & aures cartilaginosa, concoctūq; difficilia sunt. Lingua laxa exanguis, & alimenti exigui est. Glandulae suaves sunt atq; tenues. Suauiores uerò mamillae sunt, præsertim fucularum, dum uidelicet lacte infarciuntur, neque imbecillius quàm carnes alimentum præstant. Renes atq; testes uirosi, et ad coquendū pertinaces sunt. Sed gallinaeorum alutium testiculi suaves sunt, & inculpatum corpori alimentum præstant. Taurorum econtrario, hircorumq; et arietum testes, uix tandem concoquuntur, & improbum succum faciunt. Cerebrū pituitosum, crassi prauiq; succi, lenti transitus, concoctioni renitens, stomacho infestum, & nauseosum est, coctū uerò exatius satis alimenti præbet. Medulla, pinguis, & suauior est cerebro, in cæteris nullo ab eo discrimine disidet. Sæbum & adeps parum alunt, & uentriculo obsunt. Cor et hepar crassum habent succum, ægrè coquuntur.

tur, lentè transmittuntur, sed suillum iecur bonitatè reliquis præstat. Lien prauī succi est, & atram bilem generat. Pulmo utrisq; cū laxior, tum coctū facilior, pituitam auget, & minimum alimenti præbet. Ventriculus, locelli, & intestina, dura sunt, & cōcoctioni obducantur, pituitāq; pariunt. Vno uerbo: Ferā sicciōris semper sunt alimonia, quā cicures, neq; tantum retrimenti relinquunt. Sanguis uniuersus coctū difficilis est, maximè uerò crassus, atq; atrebilarius, cuiusmodi iudicatur bubulus. Leporis autē, utpote suauissimus, primi meriti est, quem multi cum iocinore coquere solent, nonnulli uerò simul cum reliquis quoq; uisceribus. Estur & à quibusdam iuuenis porcelli sanguis. Caprillum quibusdam esculentum fuisse, ab Homero proditum est.

De lacte. Cap. 86.

Lac coctum egregiè quidem alit, sed gingiuas et dentes afficit: proinde simulatq; ingestum fuerit, primum quidem mulsū, deinde uino acerbo os colluendum est. Præterea capitis dolorem infert, præcordiorum & uentriculi, quæ ex flatibus oritur, distentionem conciliat, renum calculos procreat. Lias quidiū imbecilliter quidem alit, sed intentius uentrem soluit: crassius contra efficaciores nutriendi uires habet, & grius uerò per inferiora descendit. Caprinum mediocris essentia est. Ouillū ediuerso crassioris, statimq; post partum tenuius, progressu temporis crassius, deteriusq; euadit.

De lactipotatione. Cap. 87.

Qui lac potaturus est, à reliquis esculentis abstineat, donec in uentriculo conficiatur, & per inferna deiciatur. Satius autē est ipsum recens mulctū circa aurorā ingurgitare: & insuper non à cibis modò, uerū ab exercitationibus uehementibus temperare, eo quod in laborantibus necessariū acescit. Sed lentè obambulare præstat, et uigiles interim quiescere. Ad istum enim uero modum patranti, statim per aluum decedit, post deiectionem aliud repetendum est: quin si illud quoq; deiciatur, aliud.

LIBER PRIMVS.

57

aliud. In primis enim non sine utilitate purgat, haud ita sanè multum ex reliquarum corporis partium mole, sed quæ in uentre deprehendit. Post hæc uenas illico subit, et alimentū præbens præstantissimum, non amplius descendit. In biliosis præterea fluxionibus, & ubi colliquamenta corporis ad uentrem confluunt, lac coctum propinabimus. Atqui ad hanc rationem decoquendū est. principio quidem leniter sensimq; ita ut partim exhalet, partim concoquatur: mox incunctatè etiam atq; etiam coquito. Prospiciendum uerò, ne uel uestionē sentiat, uel in caseum coalescat. Optimè id fiet, si clementer lac ipsum coxerimus, & agitando, quod abscefferit, circūquaq; detraxerimus. Ferula autem polita ac tereti agitandum: & si quid in labys ollæ efferbuerit, id sponsia purgandum: inde nanq; non raro reliquum lactis corrūpitur. Quapropter lac quemadmodum docuimus coquito, quoad crassius, & crudo lacte suauius reddatur. Silicibus porro marinis candentibus lacti immisissis, quicquid in eo tenue est ac serosum, ebibitur, insumiturq;. Idq; uentris fluoribus, potissimè uerò biliosis conducit.

De lacte fissili. Cap. 88.

Silac ad immodicum ignem citra fumum impensius decoquatur, serosum eius à caseaceo discernitur. Mox exactè per colum panniculum ue coletur. Confunditur autè sero mellis, uel aceti mulsi, uel aliorum modicum, & alui subducendæ gratia exhibetur: adultis quidem usq; ad duorum sextariorū mensuram, minoribus uerò non minus sextario. Quod calculis marinis ignitis, aut candenti ferro immisissis, incrassatū lac fuerit, contra dysenteriam & alui profluium rectè propinatur.

De caseo. Cap. 89.

Caseus omnis acris & sitificus est, concoctioni renititur, prauum humorem & calculum creat: minus autem officit non uetus, laxus, minimè durus, suauis, & modici salis compos. Qui aliter habet, perniciosissimus est.

D 5

De

OMnes pisces frigidioris humidiorisq; temperamenti esse, perspicuū est: saxatiles uerò appellati, reliquis salubriores habentur, quia cōcoctioni minus aduersantur, & probum succū relinquūt: moderatè humectāt, nisi solidiore carne consistant. Non autē saxatiliū, maritimi plurimum discrepāt ab ijs qui in limo degunt, aut ubi flumina irruunt. Sed omnīū insaluberrimi stagnatiles atq; palustres sunt. Speciatim uerò capitō, si marinus sit, mediocris suauitatis est, et coctū minus difficilis, succiq; minimè mali, sanguinē uerò tenuiorem atq; imbecilliozem gignit. Eiusdē clāssis lupus est. Mulus quoq; in pelago nutritus, durior, et friabilior cāteris piscibus est, ad coquendum promptus, plurimi nutrimēti, suauis, et pinguedine carēs.

In uniuersum, pisces quibus testaceū opcrimentū est (ostracoderma à Græcis dicti) salsum crudumq; succū generant. E quorū numero, ostrea mollissima carne constant, et promptius per aluum decedunt. Chamæ præterea, & purpuræ, ungues, spondyli, buccinæ, cochleæ, & alia quæcūq; id genus durat, & quæ malacostrata uocantur, utpote grāmari, paguri, cancri, locustæ, squillæ, ualentis sunt materiæ, sed concoctioni resistunt, aluumq; cohibent, si subinde in aqua dulci elixentur. Cremor omnium quæ testis integuntur, uentrem promouet, quamobrem terrestis quoq; cochleæ: sed quum dura carne, coctūq; difficili sint, mensis quidem conueniunt, prauī tamen humoris efficaces. Sunt qui iure ipsorum cum oleo garoq; condito, alui deiectionem moliuntur. Echini modicè frigorifici, exiguūq; alimenti sunt, & lotium proritant.

Molles tergores pisces, puta polypi, sepia, lolligines, duri, atq; coctū difficiles sunt: præ cāteris uerò polypi. Salasī uerò succi momentum habent: sed cōcoctionem experti, nutrimentum non exiguum corpori præstant.

Planorum pisciū, quos cartilagineos dicunt, torpedinibus, pastinacis, mollis persuavisq; caro est, quamprimū subiectis, coctū facilis mensisq; idonea, & alimentosa. Raia, leuiraia, squatina, atq; huiusmodi alia, duriora sunt, coctioniq; renituntur, et uberius alūt. In summa: Duræ carnis animalia, ægrius concoquuntur, & ualentius nutriunt. Concoctionem uerò experta, plenius solidiusq; alimentum suggerunt.

De grandibus, cetaceis ue. Cap. 94.

Ingentes, uerbi gratia, balenæ, phocæ, libellæ, delphines, thunniq; immanes, durā, coctūq; difficilē, et crassi humoris carnē obtinent. Quum uerò sale condiuntur, ad mediocritatem reducuntur. Ex piscibus humidiores, excrementitūq; magis, ad succidiam accommodatiores sunt. Salsamētorum porro diuersitas, piscium ē quibus conficiuntur, differentias imitatur.

De uirtutibus uini. Cap. 95.

Voletudinis secundæ studiosum uini potestas fugere non debet. In totū igitur: Omne uinū alit, sed rubrū ac crassum magis: sed deterioris succi est efficax. Suaue uerò, nutrimenti quidē alicuius est, stomacho uerò minus conuenit. Austerū stomacho quidem amicum, sed lentī meatus, neq; tantū nutrimenti præbet. Atq; adhuc etiam minus candidum. Primū omniū bonitatis honorē obtinet, quod colore uermiculū est. Peruetustū plus caloris ariditatisq; insitū habet, quā recens. Sūmatim quidē uini potētia hæc est. Omnino uerò uinū, insitū corporis calorē suscitāt, unde & cruditas corrigitur, et sanguis emendatur, alimentū (quandoquidem prōptē penetrat) per uniuersum corpus deducit: cuius ergo ex ægritudine aliqua emaciatis bonā corporis habitudinē restituit, fastidiosis cibi appetētiā reuocat, pituitosum humorē extenuat, bilē per lotiū euacuat, coloris gratiā inducit, animo lætabundā alacritatem iucunditatemq; conciliat, corpus quoq; robustius efficit. Eiusmodi igitur commoditatū autor est uinum, moderate ingestum. Inurgitatum

gitatum uerò præter modum, incommoda contraria adfert, inde ebrij evertuntur, furiunt, et sopore impetuntur. Vitanda itaq; est immodica uini potatio. Quanquã per longã id temporum interualla liberalius potare, cõmoditatem adferat: nam urinas largius proritat, sudoresq; profundit. Optimũ uerò est protinus aqua mulsa sumptã ipsum uomitu eicere, ne uel paululum noxiæ inferat. Quisquis igitur sese mero prolixius inuitare uoluerit, ab aliorum ciborũ satietate abstineat, atq; inter potandum brassicã codã, bellariaq; sumat, maximè ex amygdalis confecta. Hæc quippe capitis laborẽ mitigant, neq; ulla uomentes molestia afficiunt. Vincit autẽ absinthij macerati dilutũ ante potationẽ bibere: omnium enim maximè hoc crapulam arcet. Quod si quos uinũ uellicet, gelidã hauriant, postera die absinthij dilutũ repetãt. Deambulationibus præterea, frictionibus item ac balneo, exiguoq; nutritu reficiuntur.

De melle & aqua mulsa. Cap. 96.

MEL coctum ualentius alit, quàm aluum subducit: Crudum econtrariò. Gelidis præterea ac humidis tẽperaturis magis expedit, calidis in bilẽ uertitur. Aqua mulsa, biliosos nihil ferè adiuuat, quoniã in ipsis facile in bilẽ transit. Utile sit igitur, ipsam illiusmodi naturis dilutiorem miscere: nec ijs qui aliquo modo uiscerũ affectibus obnoxij sunt, satis cõuenit. Sed hac ratione mulsa cõficitur: Octuplũ aquæ melli miscetur, et quoad nihil amplius spumæ eiciat, decoquitur. Oportet autem spumam è medio, simulatq; exoritur, identidem tollere.

De somno. Cap. 97.

Consequens est, ut posteaquàm de ratione uictus omnia tradidimus, de somno quoq; nonnihil perstringamus, eo quòd hic omnium postremus cætera plerunq; suscipiat. Somnus itaq; (ut nõ citra formulã eloquar) nihil aliud quàm animalium facultatum requies est, à bono humore cerebrum irrigatè proficiscēs. Huic qui rectè indulget, eum plurima comitatur emolumenta. Nam alimenta cõficere, succos digerere, dolorẽ mitigare,

LIBER PRIMVS.

61

gare, lassationes solari, distenta relaxare, animi ægritudines obliuione abolere, menteq; captos emendare cōsuevit. Tempus autē somni opportunissimū à cibo est. Sed meridiari haud omnibus expedit. Nō enim sufficit ad exactū ciborum concoctionem tempus in quo somnū capiūt. interrupta namq; ante suam horā cōctione, meridie experrecti, sæpius acetosa eructatione infestantur: sæpius itē spiritibus infarciuntur. quin et fluctuationibus tētantur aliqui, nisi uel ex consuetudine. uel quia satissisterint, eiusmodi casus nō eueniāt. Nocturni somni omnium innocētissimi sunt, siquidem nox humiditate et quiete sua somnum inuitans, cōctionem omnibus numeris absoluit. A somno quippe nocturno plerūq; ad alui oneris excretionē urgemur. Esto autē debiti somno temporis limes, absoluta ciborum cōctio, quæ non tam eructationibus, quàm uentris cōniuentia deprehenditur. Post quam uigilantia perutilis est, quod concoctionis retrimenta ad secessum proritet.

De uigilia. Cap. 98.

Quoniam pacto uigilys, quæ aduersa iam ualeitudine correptos, uel præ dolore, uel febris, uel quocunq; alio acutiore casu molestant, succurrendū sit, in uolumine de Febris persequemur. In præsens de ijs modō uigilys quæ bene habentes infestant, agendū est. Quocirca si quis uel ex mœrore, uel solitudine, seu alio quouis animi affectu somnū subire nequeat, ante omnia quidē mœritia quæ affligit, pro uirili profliganda est: mox suauū sonorū auscultationibus mētis cōsiderationem proscribere expedit, id quod lenibus aquarū susurrīs quidam machinantur: qui ita permulsi sunt, somnū facile subeūt. Balneis præterea sub uesperam maximè, peracta iam cōcoctione, utantur, edulysq; humectantibus, puta lactucis, et id genus alijs. Papaueris etiā atri uiridia folia obsonijs nonnunquā adijciāt. Piscibus, qui cocturæ nihil obsistunt, uesci: uinū tenue, minimè uetus potare cōgruit. Somnū inituri, caput rosaceo, aut oleo in quo uel papaueris capita, uel mandragoræ elixa fuerint, perungant.

ungant. Quin & anethinum non antiquum, somnificum est. Scimus porro quibusdam à labore statim facta tranquillitate, somnū obrepisse. Coitus quoq; moderatus hunc ipsum nō raro conciliauit. Nec desunt, qui capite ac pedibus infrigidatis somnum accersunt. Si qui ob alimentorum copiā, uel uitiū, stomacho onerato uigilauerint (id quod usuuenisse comperi) ueluti contrā alij præter consuetudinē inedia usi, aut cibis parcius indulgentes, somnium oculis non cernunt, considerare id, & causam abscindere conuenit.

De ueterno, siue sopore. Cap. 99.

SI contrā, profundi ac ueternosi sopores, quæ cataphoræ à Græcis dicuntur, infestarint, lauacra continua, undioniq; frigorifica interdicienda sunt, apophlegmatismis utendum: & in totum nutritio cum calidior, tum siccior, tenuis in nutriendo potestatis offerenda. A' gelidiore quippe & humidior cerebrum madefaciente materia, eiusmodi affectus plurima ex parte contingit.

Dioclis epistola, de sanitate tuenda. Cap. 100.

DIOCLES ANTIGONO REGI.

QVandoquidem tibi Antigone, maxima omnium regū eruditio, atq; grandæua iam ætas, omnisq; philosophiæ peritia, & mathematices deniq; studiū palma contigit, haud alienam à regia maiestate fore putavi, eā philosophiæ quoq; partem, quæ incolumitatē tueri docet. Eoq; tuæ maiestati hac epistola uolui, undenam mortalibus ægritudines proficiantur, quibus præcedentibus notis, & quibus remedijs talibus succurrendum sit, describere. Quemadmodū enim cæli tempestatem nunquam nō signa quædā manifesta præcedūt, quibus nautæ ac cæteri multarum rerū periti homines, quid ipsis agendum, quod tutiores sint, colligūt: sic neq; ullus præter naturā affectus unquam hominis naturā nullis præcedētib; præsagijs tētat. Tu itaq; nostris hisce præceptiunculis cōfusus, absolutā earum rerum cognitionem assequeris. Diducimus hominis corpuscula
lum in

lum in partes quatuor, caput, thoracem, uentrem, atq; uesicam. Cum igitur aliquid morbi caput laesum est, hæc portenta solent magna ex parte præcedere, uertigo, dolor capitis, superciliorum grauitas, murmur aurium, stimulatio temporum, oculi matutino lachrymant et caligant, odoratus hebetatur, dentium gingiue attolluntur. Cū ergo eiusmodi quiddā præsenferis, caput cōfestim euacuandū ducito, nullis sanè medicamentorū præsidys, uerū sumptis hyssopi aut orygni capitibus tritis, et in aulula ebullitis, cū passo uel defruti hemina dimidiata, quibus os ieiunus abluito, atq; quoad pituita deducitur, gargarizato. Hoc quippe affectionū capitis facillimum est præsidium. Saluberrimum quoq; fuerit, sinapi aqua mulsa calida maceratū in ieiuno sorbere, et gargarizando à capite humorem deducere. Oportet autē caput antea tegumēto calfacere, quod liquefacta pituita sine impedimēto effluxioni obtēperet. Quū hæc floccipenduntur indicia, eiusmodi ferè morbi succedere consueuerunt, ophthalmiæ, glaucomata, aurium eruptiones, strumæ in ceruice, cerebri tabes, grauedo, angina, nocturna, teredines, uua, profluium capillorū, ulceratio capitis, dentium cruciatus.

Cum autē mali quid thorax passurus est, his signis portenditur: sudor toto corpore manat et thorace, lingua crassescit, sputum falsum eijciunt, uel amarū, uel biliosum, in lateribus ac scapulis dolores citra occasionē oriūtur, oscedines crebræ, uigiliæ, suffocationes, sitis ex somno, animus tristior, algores pedoris, brachiorū et manūū tremor, infestant. Quibus non imprudēter ad hunc modū succurritur: Vomitus à cœna nō crapulosa quā probè fieri potest ciere cōuenit, absq; medicamento. Prosunt etiā ieiuni uomitus, quos aliqui syrmaismos nuncupant. Cui igitur sic placet uomere, radículas tenues, nasturtiū, erucam, sinapi, portulacā deuoret, deinde aqua tepida hausta, euomat. Qui dicta præsagia spreuerint, has affectiones metuant: pleuritim, pulmonariā, melancholiā, febres acutas, phrenitim, ueternū, et cū singultu febrem ardentē. Siquis uentrem

morbis

morbus occupaturus est, his signis praesagiri potest. ueter pri-
 mitus conuoluitur, & in sese ipso turbatur, esculenta cum po-
 culentis amaritudine praefertunt, genuum grauitas, lumborum
 rigor inflebilis, uniuersae molis corporeae lassitudo, sine occa-
 sione, crurum stupor, febriculae exiles, afficiunt. Vbi haec notae
 apparuerint, ueter nullo medicamento, sed uictus ratione molli-
 ficandus est. Tutius est enim ijs uti, quibus delinqui facile non po-
 test: e quorum numero sunt, beta aqua malsa decocta, allia elixa,
 malua, rumex, mercurialis, et ex melle dulciaria. Cuncta enim
 haec alium deiciunt. Quod si praesagiorum aliquod intendatur,
 enici liquor omnibus decoctis confundito: suauior namque, et tus-
 tior est. Vtilis ite fuerit leuis brassica in copiosiore aqua elixa,
 eiusque succus quatuor heminarum mensura cum melle ac sale po-
 tui datus. Ciceris aut erui decocti aqua in ieiunio epota, eundem
 effectum obtinet. Haec signa paruipendentibus, huiusmodi affe-
 ctiones superuenire solent: ueteris fluor, tormina intestinorum
 & lauitas, uoluulus, coxendix, febris tertiana, podagra, apo-
 plexia, haemorrhoides, cruciatus articularis. Quando autem
 uesicae malum imminet, his notis deprehenditur. post exiguum
 etiam cibum pleni uidentur, inflationes, cruciationes, uniuersi
 corporis pallor, somni graues, lotia lurida, & aegerrime ema-
 nantia, & circa pudendi tumores affligunt. Quum haec appa-
 ruerint, odoratis lotia impellentibus opere ferre sine periculo con-
 uenit. Sunt uero, scaenicali apijque radices in uino albo odorato
 macerandae, unde ieiunus in matutino quotidie duos sumat cya-
 thos cum aqua dauci, smyrni, enulae campanae, quodcumque horum
 ad manum sit, iuxta enim singula iuuant: cicerum quoque mace-
 ratorum aquam si cum uino potauerit, idem consequetur. Qui uero
 dictas notas negligenter praeterierit, hos morbos expectet: hy-
 dropem, lienis magnitudinem, hepatis dolorem, calculum, renium
 affectionem, lotij stillicidium, distentionem uentris. Caeterum in
 omnibus his quae haecenus proposuimus signis, infantibus qui-
 dem clementiores, gradioribus uero natu acriores medelas ex-
 bibebimus.

bibebimus. Anni porro solstitia, in quibus omnia eiusmodi incidere consueuerunt, & quibus in unoquoque alimētis sit Tuae Maieitati uel utendum uel abstinendum, perstringemus, à solstitio brumali exorſi.

Solstitium brumale:

Solstitij brumalis tēpore augetur in hominib. catarrhus, & humiditates, usq; ad uernum æquidiale. Calidiora itaq; esse, meracius prolixiusq; atq; ab origano bibere, ueneriq; indulgere cōuenit. Sunt aut usq; ad æquidiale dies nonaginta.

Æquinoctium uernum.

Ab æquinoctio uerno usq; ad uergiliarum exortum, pituita & dulcis sanies sanguinis mortalibus, crescunt: idcirco quā maximè succosis acribusq; utendum est, corpus exercitandum, concubitus indulgendum. Numerantur uero usq; ad uergiliarum ortum, dies sex & quadraginta.

Vergiliarum exortus.

Hoc tempore crescit in hominibus bilis fulua, et amara sanies, ad solstitiū usq; æstiuale. Tum suauia, alium cōscientia ingerere, & ueneri minimū indulgere conuenit. Numerantur autem ad solstitiū usq; æstiuum dies quinque & quadraginta.

Solstitium æstiuale.

Solstitij æstiuī tempus, atram bilem in hominibus, usq; ad æquinoctium autumnale procreat. Utendum itaq; gelidis uindis, odoratisq; omnibus: uenus uel omnino uitanda, uel innocentius saltem quæ de ipsa tradita sunt, admittenda. Sunt autem ad autumnale æquinoctium dies tres & nonaginta.

Æquinoctium autumnale.

Hoc anni tempore pituita, & tenues fluxiones in hominibus abundāt, ad uergiliarum usq; occasum. Oportet ergo humores ex alto deducere, seu fluxiones cohibere, & acerrima quaq; succosissimaq; esitare, quā minimum uomere, exercitare, & concubitus fugitare. Numerantur autem ad uergiliarum occasum dies triginta sex.

Vergiliarum occasus.

Sub uergiliarum occasu in hominib. humor pituitosus ad

B solo

solstitium usq; hyemale augetur. Sumenda sunt igitur quæq;
acerbissima, uina dulcissima; utendum pinguibus & exerci-
tio. Sunt uerò ad brumam usq; dies quadraginta quinque.

LIBRI PRIMI FINIS.

HYPOTHESIS LIBRI SECUNDI.

In hoc uolumine totius operis secundo, de Febribus potissimū
agitur. Primò quidem de iis, quæ ad notas, uniuersamq; ipsa-
rum curandi rationem animaduertenda incidunt: deinde su-
per uniuscuiusq; febris speciei origine atq; curatione: tertio de
iis quæ febrem comitantur symptomatis.

CAPITA SECUNDI LIBRI.

Præfatio libri de febrib. Cap. 1	tredine humorum accensas a-	17
Quotnam & quæ principalia in	gnoscamus.	17
morbis præcipue febrilib. di-	Curatio febrium, quæ in humo-	18
scutienda sint.	rem putredine accenduntur.	18
Quale nam morbi principium di-	Tertianæ indicia.	19
cendum sit, ex monumentis Ga-	Quo pacto tertianæ mededum	20
leni.	lit.	20
Vnde, tutus ne sit, an periculo-	Tertianæ nothæ curatio.	21
sus morbus, cognoscatur.	Quartanæ indicia.	22
Quibus noris acutum & danti-	De quartanarum febrium cura	23
nū morbum deprehendamus.	ratione.	23
Quemadmodū præsciri possit,	Quotidianam febrem quib. in-	24
quo pacto morbus soluendus	dictis deprehendere possis.	24
sit.	Curatio febris quotidianæ.	25
De diebus decretoriis.	De febre Epiala.	26
Decretoria signa si in principis	De continuis febribus.	27
morborum appareant, mala esse	Qui continuæ febres deprehen-	28
Quemadmodum futura crisis	dantur, quibusq; præsidis cu-	28
prænoscentia sit.	rentur.	28
Instans morborum iudiciū quæd-	Æstuantium febrium cognitio	29
modum sit agnoscendum.	Æstuantium febrium curatio.	30
Qui ratione optime iam pera-	Febrium ab Erysipelate notifi-	31
ctam crisin agnoscamus.	catio atq; medela.	31
De pulsibus, ex Galeno.	Quemadmodum hæcicæ febres	32
De alui excrementis.	deprehendantur.	32
De urinarum significatione.	Hæcticarum febrium medela.	33
Quid circa sputum consideran-	De semitertianis febribus.	34
dum.	De publice grassantib. morbis	35
Diariarum febrium agnitio at-	De peste, ex monumentis Ru-	36
que medela.	phi.	36
Quemadmodum febres ex pu-	De	36

LIBER SECVNDVS.

De his qui plenitudine crudo-	De sternutamento.	67
rum humorū mentis deliquio	De ciborum auersione.	49
tentantur.	37 De bulimo, quod est fame pre-	50
De his qui pretenuibus humo-	grandi	52
ribus defatigati concidunt.	38 De canina appetentia.	52
De aliis occasionib. in quibus	De siti.	53
contingunt syncopæ.	39 De lingua salebrosa.	54
De dolore.	40 De nausea.	55
De liquefactione.	41 De uomitione biliosa	56
De uigiliis febricitantium.	42 De singultibus	57
Curatio cataphoræ.	43 De aluo dura ac lubrica in fe-	58
Medela doloris capitis in febr-	bribus.	58
bus.	44 De stillicidio sanguinis, & eru-	59
De curatione stomachi.	45 ptione eiusdem ex narib.	60
De immoderatis februm frigo	De animi defectione.	60
ribus rigoribusq̃.	46 Medela exulcerationis quæ os	61
De sudoribus.	47 sacrum infestat.	61
De tussi q̃ febricantes infestat	48	

FINIS.

PAVLI AEGINETAE

LIBER SECVNDVS, DE FEB-

bribus ex Galeni, cæterorumq̃ complurium

monumentis depromptus. Albano

Torino interprete.

Præfatio libri de febris. Cap. I.



Ostquam tuendæ sanitatis disciplinā per-
strinximus, quemadmodum malè iam ha-
bentibus succurrendum sit persequemur:
sumpto à similarib. ueluti simplicioribus
morbis auspicio. Cuius generis potissimè
habentur, qui cognomento Febriles appellantur. Rursus igi-
tur et nos cōpēdiaria scribēdi ratiōe utentes, Oribasij Epito-
mæ ex Galeni præsertim, et cæterorū insuper plurimorū li-
cubrationib. decerptæ, paucula q̃dā illi præterita addemus.

Quotnam & quæ capita in febrilibus præcipue morbis
discutienda sint. Cap. 2.

Nte omnia quidē indagare conuenit, salutaris ne, an exi-
A tialis ægritudo existat. Deinde si salutaris, num acuta, an
diuturna.

diuturna. Hæc quippe in alijs quoq; morbis uehementibus inuestiganda sunt. Tertio, unânè uice decernat, quod febribus peculiare est, an particulatim soluatur.

Quale morbi principium dicendum sit, ex Galeno: Cap. 3:

Neq; sanè capitis dolores, & febres idem sunt: sicut neq; uigilia, à cibisq; appetitus auersio, & uniuerſi corporis grauitas, aut lassitudinis sensus. Sed unumquodq; horum à febre diuersum quippiam existens, eandem tamen præſagit. Febris dum quempiam inuadit, præsertim acuta, neq; nos latere, neq; quenquam uel imperitum potest. Bsto autem, si uidetur, quod lateat: mirabor utiq; si diutius hora laborantem latuerit. Proinde illud tempus principium morbi appellamus, cum iam manifestò febrile orſi, decubuerint.

Vade, spem ne, an pericula morbus ostendat, cognoscendum. Cap. 4.

Igna quidè lethalia dicuntur, uultus cadauerosus, nasus acutus, oculi concaui, & alia ab Hippocrate commemorata: nisi uigilijs hæc, aut uehementi uentris solutioni, aut inedia deniq; succedant. Lucis præterea fuga, lachrymæ partim citra aliquam occasionem externam, partim oculis nulla peculiari affectione correptis, fusæ. Ad hæc, si alter ex oculis minor appareat: quæq; in ijs alba esse oportebat, rufescunt, pallescent, & nigricant: sordes concretæ angulis inharēt, & per somnos oculorum alba cernuntur, palpebris extrinsecus nō commixtis, nisi uehemens alui fluxio præceſſerit, uel id quis facere consueuerit. Dentibus stridere, mētis inopem esse, flocos stragulis auellere, & festucas paleasq; excerpere, perniciem denunciant. Attendendus item est decubitus. Nam supinum & tanquam resolutum cubare, perq; cubile deorsum ad pedes delabi, summæ imbecillitatis est indicium. Adbuc uerò magis exitiosum, gelidus cūm ex naribus, tum ex ore elisus spiritus. Pulsus obscurus, densus, & intercisus, sudor item animi deliquium inducens, periculosi sunt. Quocirca si uel uniuerſa quæ recensuimus indicia, uel ex his pluriâ cōpareant, ſine

sive pauciora quidē, sed peiora, nulla saluari nota comitante, mortem præsentiſſimā portendunt. E diuerso expedita spiratio, pulsus inculpatus, mente constare, & bene se ad illa quæ offeruntur habere, uultus inde & cubatio bene habentium neutiquā dissimiles, nullā perniciē, sed salubritatē præsagiunt. Vno uerbo: Quæ à naturali habitu maxime sunt aliena, pernicioſa: quæ uerò amica, salubria sunt. Porro q̄ à lotio, oletulo, spūtoq̄; sumantur præsagia, paulo post exequemur.

Quibus notis diutinum morbum deprehendamus. Cap. 5.

Diuturnitas ægritudinis quatuor notis deprehenditur: motu morbi, languentis habitu, pulsu, & febriū specie. Ex motu quidem morbi ad hunc modū: Si quatuor particularis accessionis tempora, ocys minimoq̄; temporis momento inuasierint, morbus acutior erit, cuius extremus terminus est septimana: magna uerò ex parte die quarto soluitur. Quod si longius quidem procrastinetur, neq̄; tamen duodecim horarum spaciū excedat, acutum esse morbum indicat, qui intra diem decimumquartum plerunq̄; decernit. At si pluribus horis prorogatur, ita ut principium duntaxat & incrementum longiore diei ac noctis tempore absoluat, eiusmodi morbus diutinus adpellatur. Sin exacerbationē morbus particularem nullā obtinuerit, uerū ab initio ad finē usq̄; tāquam una ac perpetua exacerbatio infestat, ceu in continuis, et hoc quodammodo indicium dicitur esse acuti. Ex habitu uerò ægri hoc pacto deprehenditur, siquidem uultus confestim, aut reliquum etiam corpus uniuersum collabatur, acutum morbum præsagit. Si omnino nihil macrescit, diutinū. Materię enim longo tempore concoquendę, copiam significat. Ab arteriarū motu hoc pacto cognosces: Pulsus magnus, uehemēs, uelox, densusq̄; acutum morbum indicat: cōtrarius uerò, longum. Ex febrium deniq̄; specie, quatenus calidę & urentes, morbum acutum testantur: mitiores uerò, quasiq̄; languidiores, diuturnum.

Quo pacto præsciri possit, an decretorium siue solut ionem
morbus habiturus sit. Cap. 6.

ID quoq; ex his quæ mox enumerauimus, constat, è febris
um uidelicet specie & tempore: præptius tamen omnino à
febris specie. Calidæ namq; et perurētes febres breues sunt,
& per excreta libenter decernunt. Clementiores uerò mitio
resq; diutinae sunt, et magna ex parte in abscessus finiuntur.
Ita liquet ex his quæ dicta sunt, non modò quando, sed quo eti
am pacto morbus soluetur. Vt enim in acutis per excretiones
decretoriū magis perficitur, ita in diuturnis per abscessus.

De diebus decretoriis. Cap. 7.

EX diebus decretorijs quidam sanè crebrò, cum fide, salus
briter, exactè, euidenter, & insignitè admodum soluant.
Quidam ratione his admodum diuersa. Tertiusdecimus medi
um inter utrūq; dierum genus, ordinem seruat. Sunt uerò ex
ipsis, qui simul atq; exiguum modò naturæ impetum adepti
sunt, decernunt. uerbi gratia, septimus & decimus quartus.
Pleriq; tamen in uehementioribus naturæ motib. morbos sol
uere nati, aliter decernere nequeunt. Cæterum neq; qui probi
sunt, omnes iuxta probi sunt: neq; omnes qui prauī, omnes
pari ratione prauī; uerū neq; certa cum serie bonitatē pra
uitatemq; obtinent. Qui primæ sortis, hoc est, ex bonorum
sunt catalogo, isto pacto se habent. Primum ac præcipuum
bonitatis locum possident, septimus & quartusdecimus. Se
cundum, nonus, undecimus, & uigesimus. Proximi his boni
tate sunt, septimusdecimus, atq; etiam quintus. Sequitur hos
quartus, hunc uerò tertius & duodeuigesimus. His contrarij,
secundæ sortis sunt. Nocentissimus omnium, qui cum discri
mine & obscurè morbos iudicat, tanquam ex diametro septi
mo oppositus, sextus est. Eiusdem notæ sunt octauus, deci
musq;. Post quos deinde sunt duodecimus, sextusdecimus, &
undeuigesimus. Tertiusdecimus mediam inter hos ordines ra
tionem obtinet, neq; perinde repudiandus, ut hi qui secundi
sunt ordinis; neq; utiq; sic morbos soluere potest, sicut ij qui
prio

primæ clāssis esse censentur. Et hunc quidem dignationis indicatoriorum ordinem Galenus usurpauit. Secundū numerorum seriem boni iudicantur, tertius, quartus, quintus, septimus, undecimus, quartusdecimus, decimus octauus, & uigessimus. Mali uerò, sextus, octauus, decimus, duodecimus, sextusdecimus, & unde uigessimus. Mediā sibi inter bonos prauosque sortem decimustertius uindicat. Indicatoriorū porro alij aliorum indices sunt, quos contemplatorios nuncupauit Hippocrates, eo quòd, quæ sequenti decretorio die futura sunt iudicia, præ sagire ac contemplari in ijs possumus: quemadmodum quartus, futurum in septenario decretum de morbo prædicat, puta sudores quospiam aut madores, uel particulares huiusmodi inanitiones nonnullas excitans, uel significationes insolentes, uel cōcoctionis denique indicia, portendens. Verum Galenus sexti etiam (quāquam mali) quartum indicem esse asserit. Undecimus quartumdecimum præ se fert, & decimus septimus uigessimus. Et ad quartumdecimum usque, effecacissima redduntur super morbis decretoria. Proxima his sunt, quæ usque ad uigessimum sequuntur iudicia. Quæ post uigessimum usque ad quadragesimum, pedetentim uehementiam remittunt. Primum tamē honoris locum uigessimus septimus, trigessimus quartus, & quadragesimus obtinent. Post hos succedunt uigessimus quartus, trigessimus primus, & trigessimus septimus. Qui inter hos à uigesimo ad quadragesimum usque indicatoriorū dierū numerus habetur, totus iudicij expers est: quemadmodum à quadragesimo ad unum omnes planè sunt languidi, concoctura magis & abscessibus, quàm iudicationibus morbos soluentes. Quare alios omnes, qui post diem quadragesimum succedunt, Hippocrates negligere uidetur. Sexagesimum tamen & octogesimum, centesimumque respicit. Post hos alios quidem morbos septem mensibus, alios septem annis iudicari asserit: alios, ut uerisimile est, binis & ternis annorum septenarijs.

B 4 Quod

Quod decretoriæ notæ, si in morborum initiis com-
pareant, uitiosæ sint. Cap. 8.

Igna concoctionis nunquam in auspiciis cernuntur: quæ om-
nis concoctio natura uictrice perficiatur, eoq; nunquã non
salutaris habetur. Sed decretoriæ notæ aliquãdo sinistrè cõ-
parent, quoniã iudiciũ ambigit, nunc quidẽ bonũ, nunc edi-
uerso malum succedẽs, ceu mihi iam antè de iudicatorijs die-
bus ostensum est. Quapropter neq; in morborũ principijs, ne-
que incrementi tẽpore dextrè conspiciuntur, sed in declinatio-
nis tẽpore, quum uidelicet natura ualentior morbũ superat.

Quemadmodum futurum iudicium prænoscen-
dum sit. Cap. 9.

I morborum exacerbationes intenduntur, & sese antici-
pent, multoq; uehementiores reddantur, ac per tertium
quenq; diem significationem sui exhibeant, indicia præterea
concoctionis in lotio, oletulis, & sputo appareant, omnium
ocysimè morbus decernet. At si exacerbationes cunctanter
moueantur, eodemq; tempore aggrediuntur, singulisq; diebus
infestent, post longius temporis spaciũ de morbo iudicium
expectabis. Qui porro cum concussione cõmotioneq; corpo-
ris, quod Græci rhigos uocant, maximè febricit, fieri nequit
ut prius his morbus finiatur, quàm rigor mitigetur. Nã hic
si nihil remittat, fieri non potest ut iam ad uigorem morbus,
nedum ad inclinationem peruenerit.

Imminēs morborũ crisis qua ratione agnoscenda sit. Cap. 10.

Ravis omnino atq; molesta nox, omne decretoriũ, quod
interdium aduētabit, semp præcedit: quod uerò noctu age-
tur, dies antecedit inquieta. Supueniunt uerò casus: capitis do-
lor, qui nunq̃ antea fuit, ceruicis dolor, præcordia ad super-
na trahuntur. Spirandi difficultas derepẽte oboritur: necnõ &
alia quedã molesta symptomata, quæ ægrum prius nunquã
affligerũt, apparẽt. Quin si ijs incidentibus pulsus non conci-
dant, sed altius attollantur, et uehementiores reddantur, symbo-
lũq; decretorius dies sup̃sũs exhibēs, maximè ex bene iudi-
cantium

LIBER SECVNDVS.

73

cantium numero existit, non futuram modò iudicationē, ue-
rū salubrē etiam sperato. Percussus aut in his minimē fue-
ris, neq; si desipere hominē, aut exilire cōspexeris. Nam hæc
superiora humores petere indicāt: ueluti ecōtrariō alia signa
sunt, quæ succos inferiora subire portēdunt: suminis scilicet
morsio, circa umbilicū torsio, lumborū dolor, et uētris mur-
muratio: sæpius alia quoq; his cognata indicia apparent. Ad
hæc si ægotās per hæmorrhoidas euacuari cōsuevit, eiusq;
uacuationis periodus incidit. Pari modo in mēstruis purga-
tionibus, si mulier est quæ lāgueat, nihil absurdū, per illius-
modi uacuationē morbi crisi cōtingere. Porro sudores non
ex corporis modò, qui antecesserūt madorib; ut par est, præ-
sertim in die contemplatorio, sed etiā meatuū laxatione præ-
scire cōuenit. Decretoria uerò quæ supernis euacuationibus
perficiuntur, ex ijs potissimum deprehendes. Contemplan-
dus quippe præter hæc, quæ mox retulimus, laborātis etiam
uultus: Et si quam eius partem palpitare, uel uenas tempo-
rum percutere, genas, nasum, oculumq; solito magis rubesce-
re cōspexeris, per superna potius uacuationem expectabis.
Quod si præter uoluntatem illachrymant, uel splendores se
intueri imaginantur, manusq; ad nares ceu scalpēdi gratia
tulerint, tū haud amplius morari, sed iam manantē sanguinē
cernes. Semel enim atq; iterū uel leniter fricantibus, prorum-
pit. Rosio oris uentriculi, inferiorisq; labij tremor, iudicium
per uomitum fore multotiens insinuant. Sed de his hæcenus.
Accedunt etiam quæ spem nostrā confirment, ægotantis æ-
tās, natura, Et insuper anni tempus, Et præsens aëris consti-
tutio. Vbi enim adolescens fuerit ægotās, aut aliās naturæ
calidæ, aut sanguineus, tū maior habenda spes est. Si iam an-
tea eidem siue benè, siue malè habenti, sanguinis uacuatō fa-
cta est, ceu suprā retulimus, hoc uel solum ad profundēdi san-
guinis spem exhibēdam, abundē est. Si uerò anni tempus æ-
stas sit, uel si æstas quidem non sit, sed aliās præsentis status

E 5

aëris

aëris calidus, & sæpe illo tempore sanguinis fluore iudicati sunt, refertūq; sanguine corpus, et solēniū excretionū retēsiō sit, hæc quoq; maiorē tibi spē exhibuerint. Pariformiter in reliquis quoq; euacuationib. ratiocinandū est. Quod si horū nihil conspiciatur, sed æger in aliquo iudicatoriorum, qui a uigesimo maximē sūt, dierum, discruciat, ac morbo in summo iam incremento existente, dolores in aliquo articulo-
 lorum, aut circa aures, aut in alijs quoq; partibus hæcant, uel nulli quidem dolores, sed sudores particulares in mēbris aliquot iugiter exudāt, per abscessus iudicium fore sperabis. Qui ea corporis præcipuē particula prorumpet, quam sudores, dolores tumoresq; exercuerunt.

Quemadmodum optimam iudicationem peractam agnoscamus. Cap. 11.

Si expediens à cōcoctione euacuatio peracta est, et febris iudiciū expertus liberatur, ab alijsq; accidētib. uindicatur, et maior colori pro uacuationis ratione gratia accessit, uegetiorq; pulsus, ac sese erigēdo robustior est redditus, quodq; in primis periculo uacat, facilis hæc mali toleratio comitatur, saluberrimū hoc sanē decretoriū habetur. Verū si quo horū deficiat, tātū aberit ab optimo, quātū præ pollet id quo deficit.

De pulsibus, ex Galeni commentariis. Cap. 12.

Pulsus est cordis et arteriarū motus, qui insurgēdo cōciden-
 doq; cōfiscitur. Vsus ipsius duplex est. Bleuatione etenim (Græcis diastole uocatur) quasi expāsiōne quadā extēsiōeq; arteriæ, gelidus aër ingreditur, qui robur uitale, unde spiritus quoq; animalis gignitur, excitat et recreat. Cōtractione autē (systolē Græci nuncupāt) qua arteriæ extremis ad medium sui subsidentib. et cōnuiuentib. fuliginosarū superfluitatū excretio fit. Sunt autem arteriæ oblōga quādā uascula, uenarū modo cōcaua: uerū propter memoratā motionem, & quoniā sanguinem cum spiritu cōtinent, duabus tunicis munita. Quæ è corde quidē originem trahūt, sed per singulos corporis artus mēbratim diffunduntur ac propagātur. Omnes itaq;

itaq; arteriæ pari percutiendi ratione, sibi inuicē et cordi re-
 spondent. Quare ex unaquaq; ipsarū, cæterarū etiā omnium
 modus colligi, non tamē uniuer sarū æqualiter motus percipi
 potest, sed prōptius quidē in partibus corporis carne exorti-
 bus, obscurius uerō in carnosīs partibus. Nullas quippe decen-
 tius, aut usu cōmodius, quā quæ brachialia perreptāt arte-
 rias attigeris. Est igitur primū pulsū genus, quod motus tē-
 pore tā in extēsiōe, quā remissiōe arteriarū perpēditur.
 Differētiæ ipsius sūt, citus, lētus, et mediocris. Quicquid enim
 motui accōmodatum est, aut præcipitāter, aut cūctāter, aut
 maturē pro tēporis ratione mouetur. Citus autē est, qui breui
 tēporis curriculo, motu plurimū emittitur spaciū. Lentus autē,
 qui lōgo admodū tempore, modicū absoluit interuallū. Me-
 diocris uerō, qui mediū quendam motū inter utrunq; cōficit.
 Alterum uerō pulsū genus in quātitate extēsiōis cōsistit.
 Quum enim quoduis corpus tribus dimensionib. constet, lon-
 gitudine, latitudine, et profunditate, arteria autē sit corpus,
 necessum est, ut eadē quoq; tria sortiatur interualla. Verūm
 in animante secundum naturā se habēte, mediocriter ipsam
 undiq; eleuatā reperiēs. In eo autem quod præter naturam
 affectum est, interdū quidem in aliquo horum interuallo defi-
 cit, interdū uerō excedit. Vbi recordari congruit, cuiusmodi
 naturalis arteriarū fuerit pulsus. Nā si latitudine excellere
 deprehēdatur, ab eadē distātia Lati nomen adipiscitur: si lon-
 gitudine, Lōgi: si in altitudine, Alti nomine gaudet. Liqueat autē,
 quod illis cōtrarij et naturalib. exiliores percussus, compari-
 modo, alius angustus, alius breuis, alius humilis deniq; appel-
 landus est. qui uerō in singulis dimensionib. ex æquo à natu-
 rali cōstitutiōe in cōtrariū permutātur, ex ijs alius ita dimi-
 nutus, paruus, alius uerō aduētus magnus nūcupatur. Terti-
 um uerō pulsuum genus ad robur uirtutis exigitur. Differen-
 tiæ ipsius tres sunt, uehemēs, debilis et mediocris. Vehemens
 est, qui uiolenta percussione ferit tactum medici. Debilis, qui
 inuali-

inualidum atque imbecillū percussū efficit. Mediocris, qui mediā quandam proportionē seruat ad utrūq; quem quidam naturalē esse autumaere. Nam ira et exercitationib; pulsū qui naturæ modum excedit, uehementiorem fieri produnt. Quibus Galenus utiq; occurrit, pulsū inquiēs, qui ex causis non naturalib; uehementior euadit, non firmum, sed promptē mutari. Quisquis igitur uehementior pulsus haud incunctanter transmutatur, is naturalis & moderatus a stimandus est. Quartū pulsū genus à statu instrumenti, arteriæ inquā corpore sumitur. Sunt uerō et huius generis differētiæ tres. Aut enim durius, quā natura ferat, instrumentū est, et durus appellatur pulsus; aut mollius, & ob id mollis dicitur; aut proportionē ex æquo habens ad utrūq;, et inde moderatus nuncupatur. Quintum genus pulsū à quantitate infusionis humoris arteriæ cōstituitur. Et hoc quoq; tribus defferētijs dirimitur. nam alius plenus est, alius uacuus, alius moderatus. Quandoquidē totū uasculū aut plenum est, aut uacū, aut humore mediocriter refertum. Plenus itaq; pulsus est (quemadmodum definit Archigenes) qui pleniorē præ se fert arteriā, et submissionē succo impeditā. Vacuus autē, qui bullæ instar arteriæ eleuationē efficit, ut impressione digitorum uacuitas quædā loci subsidat. Hæc igitur quinque pulsuum genera uno arteriæ motu cōstituuntur. Quoniam autē caloris qui in corde cōtinetur qualitas, uidetur quodāmodo euidentius ex arteria apparere, cōsuerunt hoc sextū etiā pulsuum genus inter prædictorū seriē cōnumerandum. Reliquorū uerō generum, quæ tū uno, tum pluribus percussib; cōstant, aliud sanē tēpore quietis, aliud numero, aliud æqualitate et inæqualitate, quodam etiā ordine et ordinatione constituitur. Quod igitur secundū tēpus quietis septimū à primo est, partitur in densum, rarū & mediocrē. Nam quā arteria gemino agitetur motu, ex contrarijs motionibus cōposito, necesse est duplicem contingere quietem: alteram quidem post eleuationem ante compressionē

pressionē, alteram uerò post compressionē ante eleuationem, quā pleriq; sensu percipi nō posse autumauerūt, ut inter duos motus quies aliqua intercipiatur. Cui itaq; longm quietis est tempus, hic appellatur rarus: cui breue, densus seu creber: cui mediocre, moderatus. Octauū genus pulsum ad rhythmum spectat. Est uerò rhythmus in summa quidē, habitus, siue tēporis ad tēpus proportio. Ceterū in pulsu, secundū quosdam, temporis motus, ad tēpus quietis, puta distentionis, et cōtractionis ad aliquā quietē intercedentē. Iuxta alios uerò, tēporis motus ad motionem, ueluti distentionis ad cōpressionē, siue quietis ad quietem, utpote interioris ad exteriorē, proportio. Differentie aut rhythmi principes sunt duæ. Eurhythmus, et Arhythmus, quasi pulsus boni rhythmi et nullius rhythmi dicas. Arhythmō, non sanē nullū rhythmū habentē, hoc quippe fieri nequit, sed inconcinuū rhythmū, ceu aphonō et atrachelon, id est mutū et truncum, dicimus, hunc qui uitiatā ceruicem, illū qui uocē sortitus est obscurā. Iam uerò arhythmus trifariam dirimitur. pararhythmus enim alius est, qui medio crē boni rhythmi peruersionē habet. alius heterorhythmus, qui lōgus à bono præuaricatur. tertius uerò ecrhythmus, qui omnē concinnitatē rhythmi corrūpit. Veluti cum pusionem indicas. Peculiaris quippe puerili ætati pulsus iuxta rhythmū eurhythmus nuncupatur. Vigenti aut ætati, heterorhythmus. Qui uerò huius penitus nihil seruat, ecrhythmus appellabitur. Nonū genus pulsuū est, quod in omnibus generib. supradictis deprehēditur, iuxta æqualitatem et inæqualitatem prognatū, quod uel in uno dūtaxat pulsu, uel in plurib. contēplatur: quod etiā systematicū nuncupāt. Quo de in primis, ueluti de lucidiore, differēdiū est. Aequalis pulsus est, qui ordine par est, siue magnitudine, siue robore, aut celeritate, aut reliis quorū aliquo, siue etiā omnib. Inæqualis, qui seriæ impar est. nā si deinceps uniuersi magnitudine qualicūq; pares incidērint, æqualis huiusmodi pulsus appellabitur. Quod si pri-

mus et

mus et secundus atq; tertius pares uidebuntur, quartus uerè impar, is nimirū inæqualis secundū magnitudinē pulsus nomen habet. Cuius generis sunt, deficientes et intercidēs. Haud enim in uno solum, aut plurib. etiam magnis unus minor apparet, sed nonnunquā penitus omnis motus aboletur, et uocatur pulsus deficientes: quemadmodum alter cōtrarius huic intercidēs, cū in medio expectatæ quietis percussio quædam ueluti superflua incidit. Sin autē secūda paulo minor quā prima facta sit percussio, tertia uerò exilior secūda, quarta, tertia æqualitate, et sic deinceps usq; ad quamplurimas, huiusmodi pulsus myurizōtas et myuros appellāt, de figurarum ratione, quæ in mucronē definiūt, appellationē mutuātes. Ex his uerò qui perpetim diminuūtur, neq; unquā ab eiusmodi defectiōe cessant, in absolutā deniq; immobilitatē finiūt, hos uulgò deficientes nuncupamus, myuros. Quotquot uerò cessāt, duplex habēt interstitiū. Quidā etenim initā semel paruitatē, semper ueluti mordicus obseruāt. Quidā uerò augētur denuò, aut scilicet in parem priori magnitudinē, aut in minorem aut in maiorem reuertentes, quos myuros recurrentes uocitāt. Fiunt autē pulsus myuri, nonnunquā in unius pulsus inæqualitate, super quibus haud multo post præstius agetur. Eiusmodi utiq; pulsū quædam inæqualitas est, quæ systematica appellatur. Quæ uerò uno percussu, aut una etiā arteriæ parte, aut diuersis deniq; accidit, quemadmodū in motu, unius sanè arteriæ partis inæqualitatis nomē sortietur. cum sub uno digito aliter cæperit, aliter uerò defierit agitari arteria, incipiēs multo quidē celerior, finiēns uerò segnior, uel è diuerso. Accidit autē hoc trifariā: aut motu indefinenter persistente, at euanescente, aut reuertente, et quasi geminato percussu feriente. Quapropter si cōtinuò perseverans et nō intercisus à ueloci in segniore aut cōtrā, permutetur, eiuscemodi pulsus à re et nomine anisotachys, id est, inæquiuelox existit. Sin autē interuallatus conquiescat, cætera uelocior appareat, dorcadizon, quod est, caprisans

prisans uocatur, à caprea animâte sumpta metaphora, quæ
 saltando sublimis in aëre hæret, atq; alterū quēpiam inopi-
 natum priore celeriorē perpetratsaltū. Quod si percussus à
 diastole recurat, et priusquam omnino cōtrahatur, rursus
 tactū feriat, dicrotos à Græcis, à Latinis bis pulsans talis ap-
 pellatur. Huius rei imaginē quandā uidere licet in incudibus,
 cum uidelicet mallei semel quidem per manū sublatis in ipsas
 uerberant, refrabrâtes ex incudis renixu iterū atq; iterū per-
 cutiunt. Cæterū non solū in motus tempore, uno in iāu, unaq;
 arteriæ particula possibile est inæqualitatē cōtingere, uerū
 in robore etiam uirū, non tamē in quantitate interuallorū.
 nequit enim idē pulsus in eadem particula magnus ac paruus
 fieri, neq; etiā in alio genere, sed in diuersis partib. In uarijs
 porrō particulis, unoq; pulsu inæqualitas fit duplex. Nunc
 quidem cū motus perpetuū manet, et arteria sub aliquot digi-
 tis ocyus, sub aliquib. uerō cunctātius mouetur. Nūc uerō mo-
 tu intercepto, ita ut digiti quidā motū apprehendant, nōnulli
 uerō minimē. Secundū item quantitātē distētionis, in permul-
 tis partib. inæqualitas euidenter apparet: cuius farinæ sunt
 myouri, uno in iāu nutantes et circūnutantes, à Græcis epi-
 neneucotes et perineneucotes appellati. Nam si iuxta interio-
 rem digitiū magnus pulsus incidens, et curuatus ex ratione dē-
 minuatur, ita ut ab exteriorē arteriæ parte, qua laborātis
 pollicem spectat, minimus appareat, myuros nuncupatur, ad
 instar caudæ animalculi muris, id est, τὸ μυρὸς, aut meiuros,
 quod in modum caudæ minuatur. Sin atem sub medijs digitis
 magnus subincidens, atq; eleuatus, utrobique minuatur, minor
 apparens, hūc Archigenes nutantē et circūnutantem appel-
 lauit: uolens perspicuē significare breuitatē diastoles, cum ea
 quæ est ab utrisq; limitibus, puta inclinatione, haud enim tam
 quā abscisis statim, sed perinde atq; inflexis utrinq; partib.
 in arcū contractus est, cū sit myuros magnitudine ex utrisq;
 partib. Si inæqualitatem iuxta magnitudinē modō celerius
 modo

modò tardius assumpserit, pulsus undosi et uermiculâtes oriuntur. Sin aut et eam quæ in situ existit, acceperint, conuulsorij et turbulenti appellati, cõstituuntur. Ordinandum itaq; ab undosis, in quibus nõ simul in istiusmodi inæqualitate, tota arteria apparet disticta, sed pars illius alia primũ, mox alia, dein tertia, postremò quarta, motu cõtinuo perdurante, instar sese eleuantium undarũ. Nonnulli quidẽ in rectum omnino fluctum meantẽ habet, aliqui uerò in obliquũ declinãt, aliqui in breui longitudinis distantia altitudinẽ magnã obtinent, quidam aut ediuerso. Quidam latitudinem, quidam item angustiam. Pari etiã modo et iuxta celeritatẽ atq; robur inæqualiter se habent. Undosus totus in paruitatẽ decrescens, uermiculans nũcupatur, uermiculari incessui persimilis. Quẽadmodũ uerò pulsus undosus minorẽ effectũ uermiculans excipit, ita uermiculatẽ formiculans, quãdo uidelicet abolitis motionib; permultis, in unam atq; eandẽ perquã exiguam omnino finierit. Inditũ aut et huic pulsui à similitudine formicæ animantis nomen est, cùm propter paruitatẽ, tum propter motionis speciẽ. Est enim uehementer pusillus formicans, ut quo nõ est minor alius, cõsimiliter et omnium obscurissimus, frequentissimusq;, minimẽ tamen, iuxta Archigenis sententiam, uelox. Cõfinis huic pulsus est heclicus. Quemadmodũ enim febrium una species est heclica, ita et pulsus habetur heclicus, qui nullã ingentẽ mutationẽ admittit, sed perpetim in eodem tenore persistit, trahitq;, ut ab initio cõpit, neq; unquã soluitur, toto habitu in morbu cõuerso. Pulsus aut conuulsorij utrinq; ex finib; extremitatũ retrahere, extẽdere, et cõuellere uidetur, instar chordæ alicuius extẽsæ sensum præbẽtes. In turbulentis aut nihil istiusmodi reperitur. Sed maior in his est eleuatio, ut partiũ quædã arteriæ sursum ferãtur, uno eodẽq; tẽpore: motumq; ipsarũ iaculis rectissimẽ assimulaueris, quæ uiolẽter emissæ ocyssimẽ ferũtur uibrata. Serratus pulsus est, cũ alia quidẽ arteriæ pars elata, alia non, ob duritiẽ nimirũ suam esse

esse apparet. Habet autem quandam etiam turbulentiam pulsus iste, & celer quidem creberque, non semper tamen magnus, existit. Decimum pulsuum genus ex praedictis est, quod ex inaequalitate iuxta ordinem & inordinationem nascitur. Ordinatus enim & inordinatus, secundo inaequali in aequalem pro ratione circuitus, atque omnino etiam in disparem, ex utraque sectione, originem ducunt, puta ex circuituum paritate ordinatus: ab exacta uero imparitate, inordinatus. Aequalis enim uero pulsus ad unguem etiam ordinatus est, siquidem imparem subsequencia ipsum diximus. Inaequalis autem non omnino inordinatus est. Si enim aequalitatem corrumpit, circuitum uero aliquem seruat ut in quantitate dilationis si forte contigerit duos fieri magnos & unum paruum, inde uero rursum duos paruos et unum magnum, & sic consequenter, nuncupari possit eiusmodi inaequalis quidem, sed ordinatus. Sin autem praeter hoc quod aequalitatem destruat, nullumque inaequalitatis ordinem seruet, praeter imparitatem, inordinatus etiam talis existit. Pari modo & in alijs horum generibus se habet. Ex inordinatis porro nonnulli sunt per omnia inordinati, ne pusillam aliquam seruantes periodum: alij uero secundum periodos ordinati. Quatenus enim continenti ordine destituuntur, inordinati uocentur: quatenus autem periodum seruant, secundum periodos ordinati dicentur: ueluti si contigerit duos magnos fieri atque duos etiam paruos, inde tres magnos et totidem paruos, ite quatuor magnos et totidem exiguos: et rursum tanquam reflectentes duos magnos, et duos paruos, et tres magnos cum totidem paruis, et sic deinceps in alijs similiter. Sciendum autem, quod inter alios contrarios singulos est aliquis medius, aequali autem & inaequali nullus est medius. Neque inter ordinatum etiam & inordinatum quispiam habetur medius, nisi uolueris secundum circuitus ordinem seruantem, medium inter ordinatum & inordinatum dicere. Et ceterorum quidem medij sunt secundum naturam, praeterquam eius qui in uehementia et obscuritate, quem admodum ostendimus, constituitur. Ex eorum autem albo solus

F aequalis

æqualis secundum naturam est, reliqui præter naturam, tum
 inæqualis, tum ordinatus, tum & inordinatus. Hæc itaq; sunt
 genera pulsuum uniuersa, & generalia ipsorum discrimina.
 Quidam tamen his & alia duo adnumerauerunt. Primum qui-
 dem à situ arteriæ pendet, quatenus sursum ac deorsum, in de-
 xtram aut sinistram deducta uidetur. Alterum genus quo ma-
 turius, uel lentius moueatur: è quorum numero esse undosos &
 turbulentos pulsus diximus. Hactenus quidem simplices tantum
 breuitatis causa pulsuum differentias perstrinximus: è prædictis
 autem, si coniungamus has, facile & compositas inueniemus. Dein-
 ceptus uerò super causas, quæ pulsibus cõueniunt, differendū est,
 quas comitatur etiā præsagium ab ipsis desumptū. A magni-
 tudine igitur, quæ cæteris magis est perspicua, exordium sume-
 mus. Magnus itaq; pulsus efficitur aut propter necessitatē ur-
 gentē, quæ est utiq; in corde plus iusto redundans caliditas ex-
 ternum gliscens refrigeriū, et ueluti stibellū: aut propter cor-
 poris gracilitatem, quemadmodū paulo post indicabimus. Au-
 getur uerò calor uel ex causis naturalibus, puta ætate florida,
 aut puerili, aut simpliciter calida, anni tēpore, regione, tēpera-
 tura calidiore: aut causis non naturalib. ueluti aëre, qui nobis
 circūfunditur, calidiore, lauacris calidis, exercitationib. escu-
 entis, poculētis, medicamētis, calfaciendi facultate præditis.
 Vel causis naturæ cõtrarijs, uerbi causa, distemperatura calida,
 aut humorū putrefactione, aut ira, aut id genus alijs. Discer-
 nes aut singulorū pulsuum hoc interstitio, q̄ causæ naturales
 magnitudinē ipsius faciunt stabilē & ægerrimē mutabilē. Cæ-
 teræ uerò, quæ procliuius permutari queat, ut etiamdū manu
 pertractate, aut certē nō multo post subsidat. Iam magnis qui-
 dem pulsibus, qui ex calidis balneis proueniunt, mollities acce-
 dit: quemadmodū etiā his qui ex calido, præsertim cū aridita-
 te, distemperamento magni sunt, durities. Qui aut exercitationi-
 bus moderatis nauant operā, et perfricantur, medium quēdam
 statum habent inter duritiē & molliem: sed quæ pectori sunt
 uicina,

uicina, calidiora sunt, id quod etiā ira percitis usuuenit. Non-
 nullis uerò propter cibi aut uini usum, aut furorē, ad magnitudinem et uehementiā pulsus accedit. Porro qui iram, aut aliud quoduis cōtra præsriptū medici facinus celare conatur, uerbi causa, calidū medicamentū sumptū, et medicū, cum manum mittit in carpum sciscitantē, occultare cupiunt, ijs præter magnitudinem etiam euident inæqualitas accedit. Ad hoc autem et languentis ingenium, moresq; et consuetudo non parum opis ad pulsus cognitionem ferunt. Consuetudo quidem, si uehemēter erga medicamēta affectus sit. Ingeniū uerò, stupidum ne nactus sit, an callidum, et opinionis eximēdæ peritus sit. Quā uerò pulsus magnus ē putredine humorū factus est, præter magnitudinem systolen etiam magis acceleratētem habet. Sed quod pulsus magnus reddatur, nō satis sunt quæ ad usum tantummodo spectant, uerū oportet etiam uirtutis ministeriū, et instrumēti symmetriam inter duritiem et mollitiem accedere. Cum igitur cordis auctus fuerit calor ex quacunq; prædictarū causarū, primū quidē pulsus redditur magnus. Vbi uerò ad usum magnitudo non suffecerit, protinus ei uelocitas quoq; accedit. Quod si etiam tum quippiam desiderabitur, crebritatē quoq; assumit. Parui uerò et tardi, et rari pulsus itidē à contrarijs fiunt. Cæterū quotiescunq; à magno, celeri, ac crebro, in oppositos fit trāsmutatio, usu uidelicet postulāte, neq; amplius quod primū in pulsu factū est, primū quiescit, sed quod posterius entum emicuit, id primū abijcit, redditurq; protinus rarus, deinde tardus, postremò etiā paruus. Quod si ad maiorē tarditatem paruitatēq; peruenerit, rursus raritas in frequentiā demigrat, ut per ipsam, quæ usui sunt, absoluatur. Hæ igitur magnitudinis, uelocitatis, crebritudinis, et contrariorū ipsis pulsuū habetur causæ. Annectēdæ etiā his, quæ una dūtaxat dimēsiōne constat pulsus deprauatio. Latitudo itaq; nō nisi per humorē plus iusto superabundantem augetur, siue id secundum naturā, siue ab externis occasionibus contingat. Quemadmodum altitudo

F 2 propter

propter instrumēti tantum mollitudinē, addita in hoc interim etiam uirtute. Lōgitudo autem ab ariditate et carniū circum iacentiū liquefactione palām innotescit, alijs dimensionib. collapsis: neq; enim fieri potest, ut prolixior, quā natura fert, ipsa reddatur arteria, & magis propriē quis gracilē huiusce- modi appellet pulsum: quamadmodū huic cōtrarium qui latitudine modō auctus est, & profunditate plenum. Affectionibus uerō horum cōtrarijs pulsus interdū incidit, & secundum aliam quam aut aliquas distātiās prohibetur, humilis aut strictus, aut breuis apparens, cū tamē talis nō sit, sed propter pinguedinis cuiuspiam, aut carniū, aut membranarum oppositarū crassitiem. Nonnunquā etiā totus exiguus uidetur, cum nō sit uerē exiguus, et obscurus similiter. Quid hæc recēseo? sæ penumero quibusdā nullus omnino in omnib. arterijs uidetur esse motus: cum tamen re uera minimē sit, & præcipuē ijs qui minus accurate tangūt, uerūm si propter copiā carniū latitat motus uerē obscurus. Nemo itaq; sibi persuadeat exactā asphyxiā homine etiam dum superstitē unquā usuuenire posse: quēadmodū ediuerso in mēbris excarnibus, etiā exiles pulsus magni uidentur.

Emaciato igitur uehemēter corpore, arteria quæ spinā excurret, sæpe tāgentibus abdomē, motū præ se fert: nōnullæ etiam earum, quæ in mēbris prius obscuræ latebāt. Proinde singulæ causæ sunt exactā diligentia rimandæ, ne nos ipsorū subterfugiat cognitio. Vehemens aut pulsus à potentia uirium prouenit, nulla alia cōtrā moliente causa, usu nēpe dissoluto, aut instrumēti duritie. Obscurus uerō pulsus imbecillæ atq; infirmæ uirtutis, & huiusce etiam solius proles est, etiam si nihil aliud præsto sit. Vehemens etenim pulsus omnibus eget ad sui generationē causis. Obscure sola etiā debilitas parens est. Qui ergo ab initio statim uehemēs existit, ætates, anni tēpora, regiones, moderatasq; tēperaturas comitatur, obscurus autem immoderatas. Sed qui ex obscuritate transilit in uehementiā, à uirtute cōualescente ex præterita uoletudine aduersa efficitur: conualescit

lefcit autem uel beneficio eorum quæ in ipfo corpore continen-
 tur, uerbi caufa, humorũ cõcoctione, aut excretionẽ, aut furo-
 re: uel quæ foris adueniũt, puta uino, cibo, exercitationibus, et
 alijs quæ intemperaturã corrigunt. Vires porrò demoliuntur,
 inedia, uigilia, euacuationes immoderatæ, mærores, curæ, et
 dolores, præfertim animæ deliquiũ inducẽtes, & quæcunq; id
 genus uitiofum tẽperamentum conciliant. Quidã imperiti &
 inexercitati pulfum durũ, uehementẽ exiftere putauerũt, quod
 exercitatũ cum ratione, tum taũtũ minimẽ potest effugere. Ve-
 hemẽs etenim magna ex parte cum magnitudine in altũ attol-
 litur, taũtum ualidẽ ac uiolẽter feriens. Durus autem, magnitu-
 dinem nullus, propter contumaciam arteriæ, admittit. Durum
 igitur pulfum instrumenti duritia maximẽ reddit: quã quidẽ
 uel frigus supra modũ intẽsum, uel ariditas, uel tẽsio ab inflam-
 matione profecta, aut conuulſio deniq; procreat. Protinus au-
 tem duritiæ paruitas quoq; et celeritas interdũ, & crebritudo
 magnitudinis loco, propter uſum ſuccedit, quemadmodum &
 mollis pulſus humiditatẽ arteriæ comitatur, quã humidiorẽ
 efficiunt ex rebus quidẽ non naturalibus eſculenta liquidiora,
 lauacra frequentia, ſomni prolixi & immoderati, uidẽs præ-
 terea ratio delicatior, et animi delectatio. Ex ijs uerò quæ præ-
 ter naturã ſunt, maligni ſopores, ueterni, aquæ inter cutem, et
 reliqua pituitofa. Plenus autẽ pulſus, aut humorum plenitudi-
 nem, aut nimiam cibi aut potionis uini præfert redũdantiã:
 quemadmodũ uacuis contraria, puta famem aut inanitionem.
 Porrò ſi corus arteriæ calidius occurrit, uehementẽ cordis cas-
 liditatẽ, reliquo corpore refrigerante, aut conuulſoriam quan-
 dam arteriarũ uiolenta cõmotione incaleſcentiũ diſpoſitionem
 inſinuat. Archigenes autẽ aſſerit locũ arteriæ peculiariter in
 grauioris ſomni ſopore (quod mali genus catochon dicunt) ca-
 lidiorẽ inueniri, quemadmodũ in ijs qui cataphora, id eſt graui
 in ſomnum delatione conſiſtantur. Pulſus autem quem ſecun-
 dũ rhytmũ fieri diximus, ſi in motu & quiete fuerit æqualis,

in culpatam totius corporis temperiem significat: quantum in semetipso, uel exiguam à bono deprauationē ceu in ætate puerili, & alijs tēperatis corporibus. Sin autem plus temporis in quiete quā in motione cunctetur, calorē superare portendit, quemadmodū & in ætatis flore, aut huic etiā ætati proximis, liquidō datur cernere, nō aliter quā in senū corporibus æqualiter gelidis diutius multo moratur in quiete tempore. Illud uerō latere neminem debet, quōd rhythmī inæqualitas, intra modū celeritatis et frequētiæ consistit: hæc uerō solū materiæ rationē ad rhythmū obtinet. Deficiētes porrō et intercidentes pulsus, oppressa et tanquā grauata uirtute, redduntur. Intercidentes quidē minus nocuenti, deficientes uerō noxiam maiorem faciunt: et in uniuersum, uirtus oppressa grauataq; pulsus ad inæqualitatē & inordinationem traducit, cū quācūq; aliam, tum eam quæ in uehementia & magnitudine sita est. Ex pulsibus autē myuris, quos duplices genere esse demonstrauimus (aut enim in ea inæqualitate, quæ systematica appellatur: aut in ea quæ uno idū deprehenditur) deficientes quidē extremam uirtutis internecionē declarant. Repetētes uerō et recurrentes, & hi quidem imbecillā sed etiamdum repugnantē, resistentem, et renitentē uirtutem præfagiunt. Myuri autē unica plaga, & inclinātes, qui epineneucotes, uel perineneucotes appellātur, potissimum vs fiunt, qui sensim contabuerūt non solutis inflammationibus. Iam uerō & in plurimis quomodocūq; emaciatīs, dū partes quæ circa arterias sunt, emarcescūt. Cæterū inæquieloces, et caprizantes, maxima ex parte feruores febricitantium, comitātur. Quōd si primordia diastoles pulsus dissolueris, prope extremū ipsius, et systoles exordium maturauerit, putrefactionis abundantia innuit, ad excretionē fuliginosa recemēta impellente natura. Si autem cōtrā, systoles quidem principiū soluerit, sed ad diastolen magis festinet, scito calorē supra modū auctū refrigeriū affectare. Est autē horum in febre plerūq; frequētia comes, nonnunquā etiā magnitudo, nisi

nisi uirtutem durities instrumenti impediatur. Quando autem arteriæ durities uirtute integra & robusta intenditur, pulsus dicuntur crotos, id est bis feriēs, accidit. Fluctuās insuper, siue undosus, humidus plurima ex parte ægritudines comitatur: sed ex his potissimū, Anasarca aquæ intercurit, ueternum, & peripneumoniā. Verū ubi iam uirtus languere cœperit, sed etiā dum paululum resistit, fluctuans in uermiculantiē transilit. Vbi extremē collapsa fuerit, etiā hunc formicās excipit. Hæcicis peculiariter aliqua tabescentibus parte, et aliās liquefactis præsidet. Conuulsorius, quādo neruorū origo, inflāmata quadam affectione infestatur: quemadmodū in phreneticis, morbo comitiali grauitè correptis, dum uidelicet in eo malo cōstituti, etiā dum calidi uitā in mortē cōmutant, cōtrario planè modo ijs qui animi deliquio cōcidunt, illi sanè uehementer gelidi, superstites tamen permanēt. Turbulētus aut pulsus fit, cum usus magnā diastolen expostulat, & robur uitale functione sua defungi potest. Nihil autem præter arteriæ corpus, quo minus possit præ duritia in magnā extolli eleuationē, sicut in magnis inflāmationibus, et diutinis obturationibus, impotens refragatur. Serratus uerò pulsus in uniuersum inflammationis index est, et præcipuè neruosarum quarundā partiū: maximè uerò costali morbo proprius, remittēs quidem mollis & coctus facilis, extensus uerò difficilis et cōcoctioni renitens. quæ cum uirtute quidem debili, subitò in periculū præcipitat: robustis uerò uiribus longo temporis spacio cōcoquitur. aut enim in suppurationem purulentā subinde transit, uel marcida tabes ipsam excipit. Neque ignorandum, quod inæqualitates comitatur inordinatio: rarè enim pulsum inæqualem ordinatū reperiēs. Inæquales itaq; & ordinatos pulsus, minores offensus inæquales & inordinatos, maiores faciunt. Hæc quidem simplices pulsum causæ, & præcognitiones sunt. Ex his uerò et cōpositas (quemadmodū in sermone de ipsorum discrimine docuimus) haud negotiosum est assequi.

Diectionum optima quidem mollis est et compacta, et tempore quo in secunda uoletudine deijci consuevit, oletata, Cuiusmodi fuerit subrufa, cum conuenienti crassitudine, neque admodum odore foedo: quae talis non est, insalubris iudicatur. Quae igitur his quae assumuntur colore respondet, tenuis, liquidior, aut nimis foetida, ocysimeque transiens, cruda censetur. Rufum oletum et meracum, per exordia quidem bilem morbi parentem: ubi uero declinationis quoque tempore eiusmodi egeritur, pulchre corpus expurgari portendit. Viride, eruginosae bilis: nigrum uero cum atrae, tum sanguinis cuiuspiam indidem torrefacti indicium est. Liuens algorem quendam, uiscerisque alicuius mortificationem notabile denunciat. Pingue oleaginumque, liquefactionem pinguedinis quae in corpore continetur significat: quemadmodum et glutinosum, pingui deterius, animantium partes tabe consumi insinuat. Graueolentius ualde, non exigua putrefactionem declarat. Inter omnia autem haec, si qualitas excrementorum his quae ingesta sunt edulis non conueniet, tum pari modo dispositio quoque consideranda est. Omnium deterrimum letiferumque habetur atrum, liuidum, pingue, et celeriter descendens.

Quae sint urinarum notae. Cap. 14.

Perinde atque in oletulis, sic in urinis quoque regula sanorum usi, agitata etiam uoletudine degentium, notulas exequemur. Lotium itaque saluberrimum est, quod urinis sanorum simillimum, cuius generis subrufum et subflauum ducimus: confestim uero hoc a mictione, crassitudine moderata possidet. Quum uero lotiorum turbidorum tria sint discrimina, (aut enim mixta talia paulo post resident, aut quam diutissime similia manent: aut limpida quidem eminguntur, postea uero conturbantur.) perniciosum est quod tertio, salubre quod primo loco posuimus: medium inter utrumque locum, secundum obtinet. Extremum autem crudum exacte aquosum, ceu deploratae coctionis uicinosi generis accensum est. Quando uero ocys prorumpit, impotentia lotij retinendi,

mendi, qui affectus diabetes appellatur, nascitur: uerum omnium ex crudis lotijs illud multo deterrimum est. Post hæc tenue admodum, et instar aquæ candidum succedit. His uicinum est alterum lotiū, quod plerisque in morbis apparet, tenui alboque perquam propinquum. Post hoc sequitur subpallidum, quod pallidum atque leuiter rufum modò reddetur, concoctionē iam quandā colore præfert. Est autē, quod crassitudine tantū ab aqua, quantum & colore secedat, si probè cōctionis munus absoluere debeat. Quod si urinae colore nihil ab ea quæ secundū naturā est recedenti, sedimentū candidum, leue, æquale, et multum denique insit, absolutæ cōcoctionis indicium puta, plurimū autem crudi humoris expurgari portendit. Non tamē si crassior modicē cum sedimine aliquo fuerit, crudam iam prorsus iudicabimus. Nā si crassiusculæ farinae, aut squamulis similia, aut furfuræ, aut atra, aut lurida, aut uiridia, aut graueolentia denique in lotio subsideant, præterquā quod unumquodque tale cruditatem notat, etiā letiferū est. Cæterū boni coloris lotia, in quibus uel candidæ, leues, & æquales hypostases, aut nebulae aliquot pares, aut sublimia cōtinentur, omnium saluberrima sunt, præsertim ubi subsidens fuerit istiusmodi. deinde si suspensa: tertio, si nubeculae, & ut simpliciter dicā, quæ urinæ probè innatant, tantumque bonitate præstāt, quāto magis ad inferna subsident.

Quæ sputi sint notæ. Cap. 15.

Putā subflaua, subrufa, subspumea, & tenuia, nihil præter cruditatem insignis præferunt exitij. Sed exactè flaua, rufa, spumosa, porracea, uiscida, rotunda, & omnium maximè atra, perniciose censentur: præter enim sanguinē, quicumque reliquorum humorū syncerus fuerit, improbum statum ex feruido calore prægnatū insinuat. Cruenta igitur sputa, moderata sunt: flaua, aut atra bile tincta, periculum minatur. Cōsideranda est præterea screddi ratio. nam si procliuius excreentur, liquidò iam cōstabit, eiusmodi sputa minimè mala: cōtraria uerò, perniciose existere. Bxactæ porro cōcoctionis augurium est, spuz

F 5 tum leue,

tum leue, album, æquale, consistentia neq; liquidum, neq; uehementer crassum: cruditatem uerò summam testatur, si ne tantillum quidem expuitur. Quod si excreetur quidem, sed tenue, concoctionem imbecillam fatetur: si autem sincerè quod screatur rufum aut flauum fuerit, malum. Si liuens deniq; aut rubiginosum, aut atrum, perniciosissimum est.

Diariarum febrium agnitio atq; medela. Cap. 16.

Diariarum autè febriū peculiaria atq; inseparabilia signa sunt, urinarum in primo statim die cōcoctio, suauitasq; calor. Atqui post primā febris solutionē fidelius earū signum exeritur. Nā arteriarum motio in hac febre per omnia sanorum motui respōdet, nulla aliarum febriū in naturalem dispositionem reuertente. Et quod tolerat facile morbum ægrotus, summum diariæ febris habetur indicium. Prōptius autem id genus febribus corripuntur, in quorum corpore quod transpirat, halituosum non est, sed acre & mordax, quasiq; fuliginosum: è quorum classe dicuntur, calidæ & siccæ temperaturæ, & in summa biliosi homines. Qui igitur ex lassitudine febricitant, pinguius et molliter confricādi atq; lauādi sunt. Sed qui ob ariditatem ephenera infestātur, hos minus quidē fricare, sed liberalius lauare expedit. Quibus ex sollicitudinibus, mororibus, uigilijs, ira, febris oboritur, lauādi ij quidē rarius, sed oleo copiosiore tepido, minusq; adstringēte, tum pauxillulum perfricādi, tum etiā pro cōsuetudine lauandi sunt. Quibus febrem æstus intulit, his maturrimè ab initio statim frigorificis, lauacris quā plurimis, minimè uerò abundanti oleo, neq; frictione crebra, succurrrendum est. Sinto aut quæ refrigerent, rosaceum, omphacinumq; oleum, sine salibus. Quib. uehementer refrigeratis sinciput perfundatur: inclinante uerò febre, lauare conuenit. Si uerò quisspiā algoris iniuria affectus, febricitet, & is in declinationib. in balneum ducendus est. Si autem febris unā cum catarrho & grauedine accendatur, ante horum concoctionem lauacrum uitare expedit. Quibus æstus febris

bren

bre excitat, ei his etiamdū præsentiſſimis lauandi ſunt. Algor
 re autem quicūq; febricit, modicè calorificis caput eorum, pu-
 ta, irino uel nardino unguine irrigato. Quib. uerò ex cutis den-
 ſitate febris cōtrahitur, his dulcium aquarum temperatarū la-
 uacrum cōfert: necnō & ea quæ rarefaciendi uim obtinet fri-
 catio: exercitationes, uicūq; boni ſucci & alimenti. Si uerò
 ex ſurſigine cibiq; abſtinentia febris originē habuerit, hi pri-
 ma ſtatim acceſſione remittēte, in balneū ducantur. tepenteq;
 oleo largiſſimè perſuſi, leni manu perfricentur, in calidaq; ci-
 ſterna multum diuq; uerſari debent. A balnei ſtatim exitu, re-
 uocatis uirib. denudò in balneum ducendi ſunt: deinde aqua cali-
 da potui exhibenda: piſana item cremor, nonnunquā & la-
 ctuca, & aliquid piſcium mollioris carnis, ex albo iure. Com-
 munis autem omnib. eſto uicūſ ſpecies, inculpati ſucci, & fa-
 cilis concoctionis, & quæ nuſquā in meatibus hæreat. Vinum
 cū aspectu, tum potentia aqueum, miſcendū eſt. Oportet autē
 nonnunquam in ipſa ſtatim primæ acceſſionis inuaſione, ægro-
 tantes aliquos cibare, in quib. ſcilicet corporis intemperatura
 ad calidum & ſiccum cōuerſa, febres accendit. Qui ex ingui-
 num inflammationib. febrem contraxerunt, ne medicum qui-
 dem quid agendum ſit, conſulāt, ſed ulceri quod in inguinibus
 ortum eſt, proſpicientes, circa remiſſionem acceſſionis, lauāt.
 Ex re illis uſuq; fuerit, uinum, donec inflāmationes ſolutæ fue-
 rint, interdicare, & tenuiorem uicūſ rationem præſcribere.

De putridarum febrium agnitione. Cap. 17.

Ebres ex putredine euenientes deprehendimus, quòd nulla
Fipſas extrinſecus cauſa initiatrix præcedit: et quòd à rigore
 inchoant, neq; à ſtu neq; frigore uehemēti prægreſſo, quod
 peculiare febrium, quæ ex putredine humorū accendūtur, in-
 diciū eſt: quemadmodū & pulſuū oppreſſio. Sic autē nomināt,
 quādo auſpicāte acceſſione, uegrādes admodū atq; inæquales
 pulſus obtinēt. Priuatim quippe huic febrīū generi hoc præci-
 puū exiſtit. Maximū autē febrīū putridarū indicatiū eſt, calor
 qualitas,

qualitas, tam fuliginosa, ut tactum erodat. Singularis etiā harum febrium nota est cruditas urinæ, hebesq; concoctio. Magnum uerò & memorabile concoctionis signum, in primis locis nunquam in huiusmodi febribus apparet.

Curatio febrium putridarum. Cap. 18.

Cum uires eius qui ex putredine febricitat, ualidas exploraueris, incunctanter uenam incidere conuenit, nisi uentriculum cruditas infestet. Vbi uerò robur imbecillum, uel ætas impedimento fuerit, à missione sanguinis abstinendum. Sanguine euacuato, putridi humores per urinam, aluum, & sudores expurgentur. Si ultro impetum in uentris hostiolum fecerint, etiam per uomitum. Alioquin non conuenit ea præter naturam irritare. Eligendæ uerò sunt materiæ, quæ citra ualidam calfactionem & exiccationem dictarum euacuationum munus subire ualeant: cuius farinae sunt, ptisanæ cremor, mulsa, oxymeli, apomeli, & apij radix. Si alius non respödeat, ex aqua mulsa cum oleo clyster inijciendus est. Vniuersum corpus, nisi prius euacuatum fuerit, rarefacere non expedit. Euacuatum uerò, rarefacere tepidi caloris oleo conuenit: cuius classis chamæmelinum existit. In hoc tempore uinum aquosum potui datum, uniuersas excretiones promouet. Lauacrum item temperatum ex aqua dulci. At si febris magnitudo obstiterit, neq; uino, neq; balneo, neq; rarefacientibus ungentis utendum est. Aqua frigida in his febribus hausta, nisi quippiam hanc quoq; prohibeat, utilis est. Proinde siquidem uires quæ corpus regunt, omnes robustæ fuerint, & febris ardentissima, & concoctionis notæ euidenter appareant, frigidam cum fiducia exhibebis. Si uerò qui laborat, corpore quadrato sit, cōstitutioq; cœli calida & sicca, si hunc in frigidam natationem posueris, nequaquam offendetur. Modica autem febre infestante, si uires non ualidæ, cum probæ coctionis indicijs, talibus bálnea, uiniq; potus, & quæcunq; arefaciendi uim obtinent unguenta, conducunt.

De

De cognitione tertianarum. Cap. 19.

Febbris tertiana, flauæ bilis agitatae soboles, circa primordia statim cum uehementi rigore inuadit, à quartanae rigore sic dissidēs, q̄ pun gere et corpus sauciare uideatur. In quartanis uerò, accessionis insultus perfrigerationem uehementem habet. Quotidianas autem nullus omnino rigor præcedit, sed perfrigeratio sola infestat. Est etiam in tertianis pulsum exactus ordo. Eadem fitim circa summum uigorem magnam inducit, & hominem exurit, neq; multo post in uigore consistit, & calor æquabiliter quaqua uersum extenditur. Quod si manum apposueris, primo quidem contactu calor ingēs et acris, ueluti cum uapore quodā elatus, occurrit: qui paulo post à manu superatur. A potu uerò, continuò permultum uaporis calidi per cutē emergit, sudoris nunciū. Bilis uomitio superuenit. Aut uenter soluitur, & uesicæ excremēta prorumpunt biliosa. Præter hæc ad integram febris quietem finitur, cum exacerbationis tēpus duodecim, nō plurium horarum, expedierit. Febrem ergo quæ intra duodecim horas desinit, exactā tertianam appellabimus. Quæ autē diuturniorē accessionē habuerit, illi simpliciter tertianæ appellationē indemus. Quæ uerò longissimè productum paroxysmum seruauerit, paululum uerò interualli, hanc rursus tertianam extensam nominamus.

Quomodo tertianæ medendum. Cap. 20.

Tertianæ exquisitæ, tanquā morbo à flaua bile originem habenti, humedantibus & refrigerantibus occurrendum. Quicquid in uentriculum repit, per uomitum: quod uerò ad inferiora, per infernā excretionem euacuandū. Idem per lotia quoq; & sudores eliciendū. Alium itaq; molliētibus enematis ciere, lotia cum apio et anetho proritare expedit, in potionibus simul maceratis. Quod si cōcoctionis apparuerint indicia, cū fiducia iā absinthii præbeto. Balnea ex aqua quæ bibendo sit calida, congruunt, quib; neq; nitrū, neq; salia, neq; sinapi adicias: sed oleo ægrū summo pere calido perfusum, in lauacrum descendere

descendere iubeto. Bos autem qui præcupidi sunt lauandi, si bis in die laueris, non delinques. Si cōcoctionis notæ ostendantur, tunc etiam si pluries laueris, nihil errabis. Vno autem in totum, quoad morbus concoquatur, interdicito. At ubi concoqui iam cœperit, tenue, aquosum, parçè primùm cum edulys, quæ cum humedandi, tum refrigerandi facultatem obtinent, utiliter exhibetur. Abstinentum à melle, sinapi, salsamento, et acribus cundis, et uinis perquàm antiquis, et natura calidis. Nihil porro mirum, si in hominib. qui se olim exercere, et frugalissimè uisitare consueuerunt, nunc autem ordine conuerso, ocio uentriq; deditis, pituitæ bilis plurima ex parte cōmixta deprehendatur. Proinde complures tertianæ aut sine rigore, aut cum perquàm exiguo rigore inuadunt, et propriâ medendi rationem requirunt. Neq; enim lauacrum, neq; plenior aliquis cibus ante concoctionem tertiana laborantibus congruit: quoniam ne micæ quidem panis, et oua, et consimilia.

Tertianæ notæ curatio. Cap. 21.

Lauacra in tertianis spuris circa initia statim non probantur, sed dum iam ostenduntur cōcoctionis indicia. Neq; singulis dieb. sed alternis tantum alendi sunt. Quies ipsis, et circa præcordia fatus confidunt. Facilis itē cōcoctionis sorbitiones, clysteresq; non admodū molles aluo inditi. Et si etiā sanguinis detractio desideretur, caue ne prætermittatur. Vniuersa uerò uidus ratio neq; frigorifica ex toto, neq; humedans esto: sed modus q magis incidat potius, assumatur. Sūmè uerò profuerit ipsis ptisanæ cremor, adiecto piperē, aut hyssopo, aut origano, aut spica nardi. Mulsam etiam aquā, in qua piper elixatū sit, potui dare expedit, et alia quæcunq; lotij proritandi naturam habent, exceptis uehemēter calidis et aridis. Maximè uerò à septimo die, aquā in qua absinthium maduerit, administrabis. Iam uerò et oxymeli epotum, multis manus auxiliares præstitit, et aliqd eorū quæ leuiter aluum deiciunt. A cibis statim uomere, in hac febre diutius perseverante præsentis, est præsidio.

Quarta-

LIBER SECVNDVS.

Quartanarum deprehensio. Cap. 22.

Quartana multo cum frigore impetuose ingruit, ut quæ ex gelido atræ bilis humore originem ducit, sed feruorem æstumq; febrilem instar tertianæ non habet: quin nec bilis uomitus eandem comitatur. Inter hæc si tenuia, cædidi coloris, et aquea lotia compareant, quartana erit febris. Præcipuum autem eius indicium est, pulsus paruus atq; rarus. Autumni uerò tempore potissimum oritur, erraticis succedens febribus. Certe nonnunquam in quartum diem maximè typum constituit. Sed non rarò plurium dierum interuallo, secundum quasdam periodos accessionem habet.

Curatio quartanarum febrium. Cap. 23.

Quartana laborantes, leniter tractare cõuenit: neq; medicamentum ullum uehemens admouere, neq; euacuationem moliri, nisi fortè sanguis insigniter redūdare uideatur, tum uena aperienda est. Vidu flatusosum ac utilem minimè offerre, cõsuetisq; uentrè emollire expedit. Si hæc nihil cõferant, clysteribus inter initia quidè mollibus, posterius uerò acriorib. utendum est. A porcinis carnibus, & ab omnib. quæ uiscida et tardi transitus sunt, infrigiditantib. item et humectantibus edulys omnibus abstinendum est. Vinum tenue, album, & moderatè calidum, salsamentumq; et sinapi ex usu sunt. Medicamentum item quod è tribus piperum generib. cõstat, aut diospoliticum diebus aliquot assumendū. Et si diebus singulis pipere sine adaditamento ex aqua utatur, rectè fecerit. Si ægrotās in summo morbi uigore sit, nutriendus fuerit q̄ tenuissimè: protinus uerò ut quiescat quàm diutissimè, præcipietur: uiscerib. ad hæc per mollificantia renitentiaq; consulendum. Deinde medicamentis quæ urinam proritant, utendum: mox cõcodionis notis apparentibus, magna cum fiducia ijs quib. atros humores exhauriunt: nō semel modò, sed crebrius utere. Post uerò uehemētē purgationē, etiā pharmacum ex uiperis exhibendum est, et id genus alia, quæ aduersum eiusmodi febres approbātur. Inter-

quæ

quæ in solenni usu habemus præ cæteris laudatissimum, quod
 è liquore Cyrenaico constat.

Quemadmodum quotidiana cognoscatur. Cap. 24.

Quotidiana nunquam cum rigore, primo statim die inua-
 dit, sed progressu temporis alior potius quàm rigor infe-
 stat. Cum difficultate calor in ea accenditur, et diuturnum ha-
 bet augmentum: uerùm tamen non comburit laborantes, neq;
 ad multam ac crebram respirationem cum angustia quadam
 compellit, neq; efflare aut gelidam bibere cogit. Accidunt au-
 tem uomitus pituitosi, & quæcunq; per aluum euacuantur, fri-
 gidiora, crudiora, & aquosiora in his febribus reperiuntur.
 Sudores circa primos dies minimè erumpunt, neq; ad infibri-
 citationem desinunt, color cum pallore albicat, urinas emit-
 tunt tenues & albas, uel crassas, turbidas atq; rufas.

Curatio quotidianæ. Cap. 25.

Quotidianam curantes, oxymelite primis statim diebus uti-
 mur, & ijs quæ lotiū egregiè proritant: uniuersa ad hæc
 uictus rationis forma incidendi facultate sit prædita. Circa
 summum uerò morbi uigorem prouidendum est uentriculo,
 præcipuè ipsius hostiolo: deinde ægris, ut radiculis, cibarijsq;
 sumptis, euomant, præcipiendum. His item quæ pituitam sub-
 ducunt, tantisper dum febris cessauerit, utendum.

De febre Hepialo, & rigore qui difficulter incalescit. Cap. 26.

Vum pituita uitrea, omnium aliarum frigidissima, cruda,
 Quæcum putrefacta uniuerso redundauerit corpore, tan-
 tum nō inexpugnabiles ullo calore, cum tremore algores sine
 febre excitat. Nam in febrib. quæ ex humorib. accenduntur,
 putrefactio maximè febrilem calorem suscitatur. Quod si tota hæc
 pituita cōputruerit, quod tamē propter immensam frigiditatē
 rarenter cōtingit, quotidiana febris causa fit. Si uerò nō tota
 æqualiter, sed ex dimidio, aut aliquæ partes putruerint, ali-
 quot putredinem non sentientibus, hepialum febrem hanc effi-
 cit, in qua rigescunt simul, & febricitant. Partes quippe hu-
 moris

LIBER SECVNDVS.

moris eius quæ nondum putruerunt, per uniuersas corporis uenas, aut reliquam corporis molem sparsæ, rigores excitât, sed putredinem expertæ febrem accendunt. Sortita autem nomen est hepialos, uel trāslatione à sale; dico autem mari, quod hepîo quidem, id est, tranquillum uidetur, ab initio autem turbulentum fuerat, mutuata: uel ab ἥπιος, quod est leniter, et ἀναίειν, hoc est excalfacere, ac si dicas, quoniam teporem tantum inducit. Et hæc febris de quotidianarum genere existens, ueluti à pituita ordiens, illarum curationi speciatim subiicitur: nisi quòd tanto cōmemorata quotidiana calidioribus, magisq; incidentibus indiget præsidijs, quanto et pituita frigidity illam excedit. Cæterum in hepialo rigor calore inextinguibilis fermè, adhuc multo uehementioribus calorificis opus habet. Quocirca quod è tribus concinnatur piperibus medicamentum, et diacalaminthe, item quod succum Cyrenaicum recipit, his accommodatum est. Iam uerò et quæ ex castoreo, et id genus alijs præparantur auxilia, competunt. Prolixior rem autem horum curationem comperies capite quadragesimo sexto, quod de febrium rigoribus immodicis et frigoribus est. Lypyræ insuper, ac Tiphodes, et quæcunq; alia præter memoratas dicuntur febres, cum sint ex relatarum grege, distas in illis, dicendasq; remediorum suppetias expetunt.

De continuis febribus. Cap. 27.

Febres continuæ intermittentibus singulis congeneres sunt, tertianæ quidem exquisitæ, ardens: quotidianæ uerò, eaque singulis diebus accessionem habet, neq; ad integram febris quietem desinit. Pari etiam modo quartanæ, quæ quarto quoq; die ingruit: quandoquidem exactus causos omnia tertianæ exquisitæ alia indicia seruans, non alio discrimine ab eadem dirimitur, q̄ quod neq; cum rigore accedit, neq; ad infestationem peruenit. Qui uerò singulis diebus accessionem facit causos, omnes similiter absolutæ quotidianæ febris notitas obtinet. Sed quod cum integra febris quiete non cessat, à cognata

G cognata

cognata quotidiana dissidet. Eadem ratione et quæ quarto quoque die accedit, nec tamen ad integritatem finit, quartanæ finitima est. Continua igitur febris est, quæ non antequam ex toto fuerit soluta, desinit ad infebricitationem. Cæterum quæ nullam remissionis notam præ se fert, confinis hæc ardentibus est, à quibus sola acrimonia discernitur.

Agnitio & curatio continentium febrium. Cap. 28.

Continentes febres ex sanguine oriuntur, nunc quidem ex feruesfacto duntaxat, nunc uero ex putrefacto etiam propter obstructionem: quapropter accessio ipsis ab initio ad finem usque una est. Notæ uero sunt, pulsus maximi, uehementes, ueloces, frequentes, æquales, minimè mordaces. Lotia non multum à naturalibus urinis deficiunt. Curatio est, sanguinis usque ad animi deliquium detractio. Quicumque enim in hac febre constituti, uenam secare superfederint, in summum uitæ discrimen perueniunt. Quod si euacuationem quæ incisione uenarum fit, res prohibeat aliqua, alijs certandum est præstidijs, quæ meatus recludunt, multitudinem materiei euacuant, feruoremque febrilem placant. Si quando autem in talibus concoctionis humorum indicia conspexeris, neque in principe aliqua corporis parte phlegmone quædam, aut tumor œdematis speciem præferens, aut scyrrhus fuerit, neque aliqua particula adeo gelida, ut in hanc nocumentum incidat, magna cum fiducia frigidâ exhibeto, præsertim si gelibibulus ægrotas fuerit.

Æstuantium febrium agnitio. Cap. 29.

Æstos, id est, ardentes febres hæc comitantur symptomata: lingua arida, scabra et nigra, rosio uentris, alui excrementa pallida, sitis uehemens, uigilia, quandoque etiam desipientia.

Æstuantium curatio. Cap. 30.

Ad perfectam huius mali solutionem, alterum fieri necessarium est: aut biliosos humores excerni, aut extinguui. Excernuntur itaque per sudores, aut uomitus, aut uentrem inferiorum.

LIBER SECVNDVS. 99

rem. Extinguuntur autem frigida potu, quo nos semper ar-
dentes febres curauimus. Nutriendi autem sunt hac febre cor-
repti, nō aqua dūtaxat, neq; mulsa solum, sed diluta mulsa co-
cto propinata. Oportet enim eos q̄ his morbis cruciātur, solis
potionib. enutrire. Lauacrum uerō his tantūmodo expedit, q̄
nullo tumore inflāmatorio, aut erysipelatoso infestātur. Quod
si cōcodionis etiā notae compareāt, multo magis ex re atq; u-
su fuerit. Qui uerō ex salso humore, ardēti febre conflātur,
eis aliena sunt balnea. Hi & ptisana cremore sustinendi sunt.

Febrium ex erysipelate medela atq; cognitio. Cap. 31.

Febres quae ex erysipelatoso uiscerum affectu originem tra-
hunt, tum ex interno feruore immodico, dolore q̄ uehemen-
ti, tum ex siti & aestu immoderato, & ut summatim perstrin-
gam, acerrimae bilis notis, cum exiguo sanguine putrescentis,
agnoscuntur. Medendum uerō ad hunc modum. abstinere a
balneo oportet penitus, aqua gelida uigente morbo horridis-
sima, quod est frigidissima, utendum, inter morbi uerō initia mi-
nimē. Extrinsecus frigorifica applicentur: quae si nihil contie-
lerint, intra corpus sumere cogentur. Praecipue uerō expedia-
unt lactuca, & quae his compari potestate respondent. Foris
ipse quoq; lactuca succus idoneus est. Quin & semperuiui, &
quaecunq; alia frigorifica sunt potētia. Sed preciosissimo ma-
gna ex parte utimur: liquorem enim in frigidantis alicuius ex-
pressum, pilae cum portulaca inycimus, deinde contusum ex-
primimus. In usu uerō momento polenta admixto, & in aqua
frigida merso, refrigeramus. Linteolū praeterea duplicatum
in eo iure rigatum a foris hypochondrys superintēdimus, non
sinentes perēnare diutius, sed aliud frigidius imponentes. Con-
fundimus uerō nonnunquam & oleum omphacinum.

De agnitione febrium hecticarum. Cap. 32.

Hedica febris non in humoribus modō ac spiritu, sed in so-
lidis etiam partibus consistit, doloris q̄ expers existit: quae
occupati, nequaquam se febricitare autumāt: neq; enim ardo-

G 2 rem

rem sentiunt, omnibus ad unum corporis partib. iuxta nō admodum calentibus. Duplex uerō heëticarum febrium species est. aliæ quidem ardentibus febribus ut plurimum superueniunt, quæ tantum prorogantur, ut longitudine temporis mado rem qui in cordis corpore existit, consumant, uel plurima ipsius parte seruata adhuc permanente. Quæ uerō persistente adhuc humiditate generantur, ubi corpus cordis occupauerint, hinc maximè accenduntur. Iam una quidem heëticarum febrium dicta est originatio. Reliqua est, quum à principio statim inuadunt, primā originem febrib. diarijs minimè dissimilem, ex tristitia, ira, lassitudine maiore, unā cum aestu solis sortitæ. His quippe non est arduum mederi: atqui si in marcorem, quem marasimum nuncupant, heëticæ perueniant, nullo medicamento uincuntur. Hæc sanè febris heëtica coincidens marasmo, præoptissima est cognitu. Oculi namq; perq̃ immensam cōscauitatem præferunt, & hærent lemæ in circumferentia siccae, & squalida quædam elucet dispositio. Vitalis flos coloris ipsorum emarcuit, frōs arida est, atq; intenta: hac detenti, dormituri entium more identidē cōniuent. Nec est affecto somnus, sed uigilandi impotentia: tempora collapsa sunt, et quid aliud q̃ ossa & cutem præferunt: aded ut si nudato corpore in partes ad uentrem attinentes oculos intendas, neq; ex intestinis, neque ex uiscerib. aliquod superesse censueris: præcordiaq; uehementer sursum cōuelluntur. Cutis summè resiccata est: pulsus tenuis, frequens & durus. Calor autem, cum primū manus inijcitur, obscurus est: paulo uerō pōst, asperitatem & rosionem exhibet. Quandiu igitur humiditatis quippiam superest, heëtica modō febris appellatur. Cum uerō piculum est, ne tantillum humoris supersit, exquisitus iam marasmus cōstituitur.

Heëticarum febrium curatio. Cap. 33.

Hæc febre correptos inter initia statim, propter mordacem humorem, ali oportet. Saluberrimum uerō his præsidium, humectans ratio uicinis, est. Cōgruit itaq; in primis cūm ptisanæ

ptisanae cremoris, tum alicae sorbitionibus, et pane postea oblato, moderatoque frigida potu languentem mederi: si neque phlegmone, neque humorum ulla putrefactio complicatur. At si plurimum inde periculi fore conieceris, frigida abstinere conuenit. Foris uero epithematis frigorificis utendum. Et balnea in hac affectione constitutis, quouis tempore conducunt.

De semitertianis. Cap. 34.

Quoniam tertia cum rigore, quotidiana uero citra illum ingruit, ex ambarum mixtura constans, horrorem inducit, qui tanto mitior quidem est rigore, quanto uehementior est perfrigidatio. Cum igitur horror ex utriusque extremis simul conueneris constat, haud ab re semitertianae nomen huiusmodi febris est inditum. Modus autem generationis duplex est. uel enim duabus exacerbationibus, simul cōgredientibus, aut inter initia statim utrisque inuicem conueneris efficitur. Quum igitur tertia superat, horridior febris inuadit, et per accessionem aliquid rigoris assumit: statim uero et calidior est eiusmodi febris, et ardentior, atque bilis quendam uomitum, aut aluum, aut madidi uaporis exhalationem adfert. Sed cum altera pituitosa praecelluerit, frigus extremitatum praepollet, horroresque pauci exercent: neque sitis premit, neque ardor affligit. Cum uero aequales magnitudine tertia intermittens, et quotidiana cōtinua existunt, insultus accessionis cum horrore fit. Vbi uero quae ex pituita est, praualuerit, pulsuum cōtractiones atque horrores accidunt. At si calidior praedominetur, protinus incallescunt uehementer. Talis quidem exquisita semitertiana est, ex aequè pollente duarum febrium temperatura, tertia uidelicet intermittente, et quotidiana cōtinente proficiens. Sed quae exquisita non est, aut bile, aut pituitam exuperantem possidet, quae sanè facilius medelis eliditur. Promptius quippe paucus humor, copiosioris excellentia artisque praesidio uincitur. Si pituita praepotentior fuerit, remedijs quae in quotidiana rebussumus, potissimum utemur. Sin flaua bilis praualuerit, ure

genti necessitati in totū incumbētes, ys quorū in tertiana mentionē fecimus. Sed ita, ne alterius curam prorsus abijciamus.

De passim uagantibus morbis. Cap. 35.

Morbos publicē in plurimos grassantes, populares, et communes appellant. Quorum quemadmodū origo, ita et causa communis est. Cōmunis itaq; alimentorū prauitas istius modi ægrotudines generat, publicus itē aquæ uitiosæ potus, labores uel nimii immoderati, uel præter consuetudinē omiſsi, fames ob penuriam, et satietas quæ ingentē annonæ prouentum succedit, et regionum naturæ, communes morbos sæpe numero intulerunt, quæ interdū paludem uicinā, interdū uerò barathrum finitimum habentes, letalē uaporem et perniciōsum expirāt. Hæc igitur frequenter euenire solent. Cæterum circumfusus nobis aer, tēperaturas corporū euerit, plus æ quo uel calidior, uel frigidior, aut humidior redditus. Cæteris nāq; causis nō pariter omnes obijcitur, neq; uniuerso die in ys uersamur: sed quia nos continens aer, omnibus circumfusus est, et per respirationē attrahitur, necessariō pro temperamenti immutationibus animantiū corpora simul afficit. Qui igitur hæc cognouerit, non solū morbos ex quacunq; aeris dispositiōe futuros præcognoscet, uerū etiam ne fiāt prohibebit, contrariam distemperatis circumflui aeris dispositiōibus uictus rationem constituēs. Quæ igitur ob suam intemperaturā morbis uicina sunt corpora, hæc à simili circūdātis nos aeris temperamento arguuntur. Sed quæ cōtrarij quā cælum temperamenti sunt, præter hoc quod nihil læduntur, adhuc meliora euadunt, ametriam temperamenti cæli contraria ametria castigante. Quisquīs hæc percalluerit, optimus incolumitatis custos habebitur, corporibus contraria semper accommodās: nonnunquam refrigerando uidelicet: interdum, si ita oportuerit, calfaciendo. Aquæ inductionibus aut superfusione refrigerans, ocio item et ciborū abstinentia, prolixiorēq; potus calfaciens uerò amictu ac tegmine. Exercitationibus item et cibo abundan-

abundantior, quandoq; etiam tenuiore. Porro si quispiam in gentem lignorum struem accenderit, egregie quidē udum aëra in calidum & siccum poterit conuertere, quemadmodum & Acronem Acragantinum fecisse perhibent.

De peste, ex monumentis Ruphi. Cap. 36.

Ebrem pestilentialem uastissima quæq; urgēt, nihilq; in ea, quemadmodū in alio quouis morbo, latet. Accidūt enim deliria, bilis uomitiones, præcordiorū intensiones, labores, exuberantes sudores, extremarū partiū perfrictiones, fluores alui biliosi, tenues, flatuosi: urinæ aquosæ, tenues, biliosæ, nigrae, sedimentis prauis, suspensionibus deprauatissimis: stillicidia narium, ardores pectoris, linguæ combustæ, sitibundæ, anxij mœrores, uigiliæ, cōuulsiones uiolentæ, et alia praua compluria. Quod si quis uenturam pestilentia præuiderit, contemplando pernicioſa anni tēpora, et studia quæ secundæ ualeitudini non conducunt, & brutorū quæ antea perierūt obseruatione. Quibus in animo cōsideratis, et illud perpēdito, cuiusmodi sit præsentis temporis status, simul & uniuerſi etiam anni, è quib. sanè optimè licebit uniuerſam uictus rationē odorari. Verbi gratia, si tēpus anni quod pro suo naturali statu oportebat esse siccum, humidius est redditum, neceſſum fuerit ratione uictus, ad siccitatē cōuertere, quo exuperās humiditas exiccata cōsumetur. Cura etiā adhibenda est uētri, si in superiori uētriculo pituita sit, uomitionibus euacuato: quibus sanguis exuperat, uena secta sanguinē detrahito. Confert & per urinas ductio, & quæcunq; aliæ ex toto corpore purgationes. Quod si febre ardente ferueat lāguidus, flāmaq; thoracē obsederit, haud alienum fuerit refrigerantia pectori admouere, atq; gelidam positionem nō paulatim offerre (incendit enim uehementius) sed cōfertim, ut flāma obruta extinguatur. Si æstuēt ardore interioribus, extimæ uerò partes, cutisq; superficies frigeſcāt, præcordia cōtendātur, uenter colliquamenta aliās per superna, aliās per inferna eiciat, uigiliæ infestāt, deliria itē, & linguæ scabri-

cies, his calorificis opus est, quo caliditas per totum corpus diffundatur, & si qua alia ratione calor è profundo ad corporis superficiem reduci poterit. Utendū præterea propinatione, quæ aloes partibus duabus, ammoniaci thymiamatis partibus totidem, myrrhæ parte una, constat; hæc simul in uino fragranti læuigata, dimidio quotidie cyatho propinantur. Haud scio, inquit Ruphus, an quispiam hac potione usus, pestē non euaserit. Hæcenus quidem Ruphus. Galenus uerò tradit, cōtra pestilentes putredines rubricā armeniacam potu sumptam, excellentissimum esse remedium. Pari etiam modo ex uiperis theriacam magnū. Graßāte quippe Romæ pestilentia, quibuscunq; inquit, horum alterū non profuit, ad unum omnes perierunt.

De his qui ob crudorum humorum multitudinem in syncopem delabuntur. Cap. 37.

IN nonnullis febres ob ingentem crudorū humorū collectio-
nem, ore uentriculi simul offenso, accenduntur. Intumescunt his præcordia, & in grauiorem q̄ secundum naturam sit molem, uentris osculum augetur. Color quidem ad albidius, & æqueum magis, quibusdam uerò in nigrius mutatur. Nemini horum sanguis absq; summo dispēdio detrahitur. Inanitione quidem indigent, sed neq; sanguinis missionem, neq; expurgationem sustinent. Vtpote qui etiā sine his syncope subitō periclitantur. Succurrendū est igitur talibus cum frictione. Auspicandum autē confestim à morbi exordio. Principio quidem à summa crurū parte deorsum, cum linteis modicè asperis, deinde et tota brachia à supremis ad infimas usq; partes fricanda sunt. Vbi uerò artus satis calere uidentur, et lassitudinis sensum metuimus, oleo relaxante utendum, ab adstringentib. cauendum. Hyberno tempore etiā aliquo quod per halitū digerat, uti expedit: cuius generis est sicyonium atq; chamæmelinum. Confrictis uerò iam eximie membris, oleoq; insuper deterso, ad spinam inde dorsi totū te conferas, et hanc pari modo cōfricato. Post hæc rursus ad crura, inde denuò ad brachia, mox ad scapulas,

pulas, tergiq; spinam remeandum, idem tota die repetendum.
 Aqua mulsa in qua hyssopus ebullierit, his est commodissima.
 Porro neq; alimentū, neq; sorbillamentū, neq; aquam propi-
 nabis: neq; omnino liberalius bibēdi potestas permittenda. Ve-
 rū abundē est mulsam solū, per primum triduum præbuisse,
 ordine quemadmodū tradidimus perfricando, Si autem firmi-
 tudinem mediocrē adhuc ægotās pulsu moderato præferat,
 & alius sua spē nequiter respondeat, clysterem confidenter
 per aluum infundito. Si uerō maior quā conueniat retrimen-
 torum ad imum uentrē impetus fiat, principio quidē amplius
 mulsam decoquito, quoniā sic minus subducat. Si autē largius
 quā par sit alius deiciat, sistenda quidem nō est, sed exhiben-
 dus mulsæ loco ptisanæ cremor est. Quod si pergat fluxus, a-
 licæ sorbitione alito. Si uerō per imbecillitatem pulsus etiam
 collapsam uirtutem deprehendimus, panem ex uino diluto of-
 ferre expedit, si neq; uenter, neq; iecur phlegmone infestetur:
 qua si laborarint, corpore crudis humoribus referto, deploras-
 tus erit ægotās. Vbi uerō crassiores omnino humores adesse
 conieceris, oxymeli pro aqua mulsa assidue propinabitur. Si
 tempestas fuerit æstiuā, & calidus gelidæq; potator lāgidus,
 huic oxymeli frigidum misceto, hyeme uerō calidum. Infestissi-
 mæ sic affectis sunt balneæ. Ad eos autem quos iam syncope
 oppressit accersitus, partibus, de quibus modō mētionem feci-
 mus, non inflammatis, panis buccellam ex uino præbeto. Illi-
 coq; inde ad frictionem accedendum, modoq; iam tradito uten-
 dum. Quibus uerō ob flauam bilem ore uentriculi affecto, syn-
 cope accidit, his gelidum assumere potum, uinumq; tenue, co-
 lore uermiculo, atq; uetustum, alienum non est.

De his qui præ tenuibus succis syncope periclitantur. Cap. 38.

Vi humorum tenuitate exoluuntur, superiorum contrarijs
 Omnino præsidijs medendi sunt. Enimvero signa quibus di-
 scernuntur, illorum deprehendes contraria. Alendi igitur
 sunt paulatim iugiter, illos autem nullo remedio curari posse
 ducito.

ducito, quorum uirtute iam languente, hepar aut uenter in inflammatione laborat. In eiusmodi affectionibus, breui cada uerosa in uultu constitutio apparet. Tum quidem nutriendus est æger necessariò. Extremaq; cutis perinde densanda, atq; priora rarefacienda, cubiculiq; aër refrigerandus. Adstringentes præterea inundatione illinendæ sunt. Alimentis quæ non tam promptè diffluunt, utendum. Exhibendus itaque panis, & ex chondro sorbitiones, & fugaces fructus, austeri, & corruptioni resistentes, non tam ipsi per se, quàm cum ipso etiam pane. Vinum item aquosum statim inter initia à cibo sumptum, is accommodatissimum est.

De aliis occasionibus e quibus contingunt
syncopæ. Cap. 39.

Sunt porro aliæ occasiones quibus syncopæ succedunt, quatuor: dolor uehemens, uigilie, uacuatio immoderata, & in his qui in sermone errant interdum commotio. Quintam, si uidetur, distemperaturam uidelicet principiorum, adijce. Celerissima itaque internecio, corde, mox cerebro, neq; ita multo post etiam iocinore affecto, accidit.

De dolore. Cap. 40.

Reditur itaq; dolor è gelido affectu stupidus. Pulsatorius uerò, immani phlegmonæ peculiaris est. Si uerò tanquam palo infixus, aut ueluti à terebro perforari locus uideatur, crassus intestini doloris species est. Punctuosus, circa mēbranas consistit. Cū impetu uerò discurrens dolor, in uehementissimis non solum hemicranis, sed & cephalæis accidit. Est aut impetuosus discurrens dolor, cum tanquā à radice primitus affectæ particule ordiens, curriculum ad uicinas defertur. Distendentes aut ueritq; neruorum dolores sunt, quum & laborant, et ad utraq; extremitatū fines tenduntur. Minimè uerò afficiuntur nerui, in latitudinē distracti. Extensorios porro et stupidos dolores, infert mēbrana sub cute distēta: quæ uerò inter carnē existit, ueluti dilaniantē dolorē. plures nāq; sunt, quæ inæqualiter in
hære-

herescunt, & carnem ipsam amplectuntur. Osium uerò membranas obsidētes cruciatus, in profundo delitescent, ipsorumq; osium ueluti dolentium opinionem inducunt. Quando igitur nulla foris occasio doloris ostenditur, præcedentem uictus rationem considera, num insolenti ocio emarcuerit: aut cibus largioribus, maximaq; in nutriendo potestatis, usus fuerit homo: aut solita excretio remoretur. Nam si quid horum, aut omnia appareant, repletio doloris causa est, & proinde homo extemplo inaniendus. Ita namq; licebit remedijs, quæ fluxus dolentium partium repellant, summa cum securitate uti. Sanguinis igitur copia adeò ut distendat, peccāte, uena sine mora, maior, affectam propè particulam, secanda est. Si uerò deprauati duntaxat humores affligunt, expurgandi sunt. Coëuntibus autem utrisq; utraque euacuatione, sanguinē prius detrahentes, utemur. Quòd si his peractis, dolor persistat, constabit, mēbro affecto noxium humorē impactum esse. Liquet etiam, curationem cum his quæ per halitum digerunt, esse molliendam. Pari curandi ratione ex flatulēto spiritu prognato dolori medemur, in ipso opitulantes potius attenuantibus edulys. Infusis item per anum, & cataplasmatibus, adspersionibus, fomentisq; ambiens ipsum corpus rarefacientes. Quòd si tumor grauans aut contundens dolorem causauerit, tumori succurrendum est, sin permordax humor cruciatum excitet, aduersissima huic sunt, quæ attenuandi & excalfaciendi uim obtinent. Anethum oleo elixum, & dolorem sedat, & somnum conciliat; & uiride efficacius, quàm aridum.

De colliquatione. Cap. 41.

Cum per aluum quippiam excernitur, quod neq; ex alimentis, neq; ex his quæ bibita sunt, sed ex humoribus è corpore in aluū defluentibus, procedit, asimile quidē flauæ bili, quæ tū per uomitū, tū per alui secessus iugiter reijciuntur. Dissidēs tamē ab ea, quòd grauiter olet, et quòd rufius sit excrementū, et crassitudine strigmetitia uiscidū, nōnunquam & oleagineum, tum

tum pinguior et recentior caro, à febre urente resoluitur atq; liquefcit. Si malum in uetustatē incidit, nonnihil etiam solidarum partium tabescit. In hac difficillima febre, exhibenda gelida potio est, ex fonte frigidissimo. Eiusdem etiam qualitatis esse oportet cataplasmata, & epithemata, thoraci atq; præcordijs applicata. Bsculēta adhuc frigorifica exhibēda sunt.

De uigilia quæ febricitantes infestat. Cap. 42.

SI uigiliae exceſſerint, crura manusq; uincire, hora maximè somno capeſſendo consueta præcipimus, et excitari. Cogimusq; interdū genus aperire, uel cōnuere, donec abundè defatigentur. Extemplō inde uinculis solutis, lucernaq; sublata, si lentius altum mandamus. Grauius autem persistente uigilia, facies calycū atri papaueris decocto in acceſſionis declinatione lauanda est. Odoramentum præstat, papaueris candidi calyx torrefactus atq; friatus, & mandragoræ radicis trita tantum cum uino. Ex rosaceo quoq; malagmate concinnato, frontem oblinito, & serpyllo cum meliloto in passo elixato. Quo quidem & in acceſſionibus utendū: aut læuigatis papauerū capitibus pane exceptis, cum rosaceo aut cerato applicamus. Nutricatus itē accuratior quodāmodo, ac magis exquisitus probatur. Adiciatur aut sorbitionibus capitum nitidi papaueris, quantum capiūt cochlearea tria: sed holeribus cōmisceatur papaueris nigri, si folia quidē fuerint uiridia, quantum tribus digitis cōprehendi potest: sin minus, tum tria aut quatuor papaueris capita arida simul elixa seligantur. Si ne sic quidē profecerimus, lachryma papaueris aut mandragoræ succo obliniatur. Ex papauerū calyculis cōfectū eclegma, præcipuè ex defruto epotū mēſura cochlearij unius aut dimidiati, potiū, somnū sæpe numero illexit. Si caput alicuius destillationibus obnoxium non sit, huiusmodi utendū in febris remissione suffitu. Accipe folij amomi, costi, arnabo, singulorū uncia, carpobalsami libra, styracidis, amomi, ammoniaci, bdellij Scythici, mandragoræ radicis, lachrymæ papaueris, suffitū sup lignis cupressinis facito.

Catac

Cataphoræ, id est, improbi soporis curatio. Cap. 43.

Abstergenda est facies posca, modicè lactis instar tepida. Extremæ corporis partes ualidè ligamētis cōprimendæ. Narib. odoramēta quæ dissecādi uim habeāt, adhibēda. In remissionib. cucurbitula scapulis atq; spinæ strenuè adglutinentur. Morbo perseverāte, sternutamēta in accessionū remissionē, admoueantur. Alimentorū materia, incidēdi ac diducendi facultate sit prædita. Ceu libro de tuēda ualetudine exposuimus.

Curatio doloris capitis in febribus. Cap. 44.

Si caput febris ratione dolet, post conuenientē febrium euacuationē, in accessionū remissionibus obliniatur. Principid cōmuni oleo, è nondū maturis oliuis expresso, aut rosaceo cum momento aceti tēperato: in æstate quidē, & febris ardente, frigidus: hyeme uerò, & febre non æstuante, calido aut tepido. In oleo nonnunquam tum serpylli, tum polygonij succus elixetur. In æstate etiam papaueris capita, aut papauer ipsum, quæ admodum hyeme peucedani moderata portio. Perseuerāte uerò dolore in frōte nudo pilis sincipite, cataplasma huic ex ueteri polenta et poligano, aut ex pane pariter et rosis, aut exigua myrto, siue serpyllo, inducendum. Nōnullos pulegium magis, emplastri modo adhibitū leuauit: neq; desunt quibus igneo etiam sensu existente, psyllium cum polenta temperatum auxilio fuit. aut ipsum per se elixatione in uiscum redactum, & identidem mutatum. Facit idem coriandrum polentæ permixtum. Aloë præterea cum aceto illinitur. Myrrha item et amoniacum, pari modo & crocomagma. Pulsatiles autem dolores, ruta & mentha cum pane, rosaceoq; adiecto discutiunt. Quod si cōmemoratis remedijs dolor manum non dederit, primum quidem caput ad cutem usq; attondendum est, deinde pinguioribus embrochis totum inspergendum: post hæc cucurbitula occipiti imponendæ, partes insuper extremæ ligandæ, et manibus palpandæ. Prosunt præterea birudines affixæ. Si quis ad destillationē aut grauedinem capitis dolorē refert, ijs quæ

quæ suo loco describitur, succurrēdum est præsiidijs. Si à regiōs
nibus oris uētriculi, uapores sublatis caput afficiunt, his etiam
quemadmodum subordinauimus, prospiciendum.

Quæ stomacho adhibenda sit curatio. Cap. 45.

Imbecilli stomacho, cataplasmatibus roborandi uirtute prædi-
tis cōsulendum, qualia ex palmulis, uino, polenta, croco, ma-
sticha, et aloë componuntur. Oleris item ex absinthio, melino,
mastichino, nardino, uino irrigare conuenit. Si plus satis inca-
lescat, refrigerantium quiddam admisceatur: uerbi gratia, suc-
cus cucurbitæ, lactucæ, portulacæ, solani, sereos, labruscæ.
Quod si inflammatio in uisceribus appareat, relaxandi facul-
tatem habentia adiuciantur: aspersioibus nempe, oleum cha-
mæmelinum, cyprinum, adipem gallinæ aut anseris, et bdel-
lium, uel ammoniacum, et consimilia. Cataplasmatibus uerò ses-
minis aliquid, apij, fœnogræci, floris altheæ, et chamæme-
lorum, atq; ut summam eloquar, compositam habeant potentis-
simam, relaxantem tenuium partium, amaramq; et stypticam.

De immoderatis febrium frigoribus et
rigoribus. Cap. 46.

Algoribus cum tremore qui diebus decretorijs accidunt, neq;
occurrere, neq; naturæ certamen dirimere cōuenit. Et fri-
gus quod ex sudore cōtrahitur, promptè remittitur, neq; quic-
quam infert molestiæ. In solo autem rigore, uel frigefactione,
quæ ex gelidiorē atq; copiosa maximè pituita accidit, princi-
piò quidem membra multis modis constringenda sunt: deinde
oleo chamæmelino, aut cyprino, aut irino inungenda. Quod si
uehementiore opus sit præsidio, piperis aliquid oleo cōfundito,
aut cæchryos, aut adarcæ, aut castorei, aut frictione molli uni-
uersum corpus demulceto. Ne autem procliuius oleosum illud
auxilium defluat, haud absurdum fuerit et ceræ pauxillum
colliquefacere. Si uerò algor cum tremore, nullo calore uinci
possit, adhuc etiam efficacioribus ex his factis acopis, atq; dro-
pacibus et sinapismis utendum est: aliæq; fomentationes affa-
bre

bre machinata, ad mollienda: & acutiora odoramentis peridonea, nepeta, pulegium, hyssopum. Propinanda ante accessionem mulsa, in qua elixa sint piper & ruta. Adhuc praterea succum cyrenaicum quantitate milij melli decocto formatum, duabus horis ante paroxysmum exhibebimus. Pari etiam modo liquorem silphij, item quod in quartanis cum succo cyrenaico temperatur, multis manus prestatit. Iam uero in oleum largius percalidum descendentes aliqui, contumacissimos rigores abegerunt, quemadmodum tradit Archigenes. Ceterum Galenus ante initium accessionis, cutem abrotono, aut nepeta sicca, aut cunila tum folijs tum floribus, aut costo, aut pyrethro, utroque horum cum oleo, perfricandam edocet: atque ita uel omnino nunquam, uel certe minus rigore infestabuntur.

De sudoribus. Cap. 47.

Sudores decretorios excipere conuenit, usque ad sufficientem seuacuationem: adiuuare item fotu mediocri, et quiete. Cuius ergo non abstergendi: alius enim alium quoque proritat. calido item clystere, sorbimento, & somno. Ceterum in remissionibus sudores erumpentes simile iudicatorijs subeunt ministerium. Atqui de his quae sudorem eliciunt praesidijs, in superiore uolumine, capite duodequingagesimo satis est proditum. Vbi uero sudores largius eruperint, absterge, & subleua ad refrigerandum operimenta. Nam si plus iusto promanauerint, adeo afficiunt, ut & animi defectionem saepenumero inducant. Leui igitur stragula, udaeque operiantur: admittatur aer frigidior, somnus, & flabello uentulus. Myrtus nigra in farinam trita, corpori inspergatur, et galla consimiliter. Cortex picea, electrum praterea, et polenta, cum uino adstringente, membris sudores recipientibus imponantur, spongiaque posca madefacta facies permadescat. Archigenes uero calcem uiuam, et flocces uini combustas, tum in his, tum in nullo calore expugnabili rigore suscipit: ambo enim, inquit, igne fota exarescunt. Irrigare porro media corporis loca praecipit succo plantaginis, aut coriani, aut portulacae

tulacæ, aut brassicæ, quò astricla sudores intus coherceat. Tempore uerò somni, creta cimolia in aqua dissoluta, dorso atque thoraci subdita eximie prodest. Vniuersum præterea corpus rosaceo, aut melino, aut myrteo, aut lētiscino oleo, aut quæ ex illis concinnatur ceratis, delinendum est. Accommodatiores his quippe sunt iniunctiones, quia abditos meatus obturant, et humoris transitū impediunt. Neque quæquam fugere potest, quòd talibus alimentū aridius summo pere conducit, et uina moderate. Verum à copiosis ingurgitationib. et præcipue humidioribus, frequentib. itē clysteribus abstineat. Quod si fieri potest, gestationibus indulgeat in gelidiore aëris constitutione. Extremaque his corporis partes quàm maximè infrigidetur. Qui compressu uerò, quasiq; per pelisum sudores fiunt (istiusmodi aut in dolorib. aut in cōuulsionibus eueniūt) deligatura et fotu extremorū, et refrigerio, reſculis laneis accersito, leuiter curatur.

De tussi quæ febricitantes infestat. Cap. 48.

TUssi quæ in febribus accidit, maximè uerò cum rigore ingruentibus, occurrendum est. nam tussis intensione, febris declinās erigitur. Aduersus quod malū hypoglottia, id est, globuli qui sub lingua tenentur, ex melle cocto et coacto porrigenda sunt: lingua uerò subiecta liquefiunt, et impedimēta facili spiritus discutiunt. Tempus uerò exhibendi opportunum circa summos accessionū uigores, et usq; ad imminētem accessionis articulum, existit. Præbeto quoq; hydromeli excoctum. quibus autē de neruoso genere non timetur, his temporis progressu, cū fiducia et oxymeli propinato: si hoc displiceat, hyssopi decoctū, quod ipsis etiam cū tremore algorib. subuenit. Præterea castoreū, si febris non fuerit ardēs, hoc neruosoq; generi auxiliatur. Eclegmata adhuc è pineis cōfecta, et earundē nucleis, iride, semine lini, amygdalis amaris, et urticæ semine. Eiusmodi plurima ex parte alimentis quoq; simul adijciuntur. adhuc resinam et terebinthinā in ouo exhibere, utile est. Foris uerò thoraci et partibus ad arteriam attinentibus lanam sulphure suffitam

suffitam imponito. Et pingue præterea, uel oleum rutaceum, aut irinū, aut anethinum esto. Quin et deligatura ualida in longum exactè porrecta, tusses cohibeti dico aut, per medias extremasq; particulas. Nec præter rationē fuerit, si utrouis herbae pedicularis genere, uel syluestri uel satiuo commanducato cum mastiche, tussis profligandæ gratia utare. Adhæc partes extremas cōfricare, demulcere, atq; ligare expedit: deinde rursum retractionē soluere. Quod si propter febris asperitatem tussis concitetur, utendū anagargarismate ex aqua tepida: sed et frigida sæpenumerò inuit. itē ex posca et palmularū decocto, aut rosarum, aut dulcis radiculæ. Ad hæc uisceribus et cordi ipsi moderata refrigerandi facultate prædita inijciuntur.

De sternutamentis. Cap. 49.

Affligunt subinde quum febribus incidunt sternutamenta. nam caput implēt, et uires arguunt: nōnullis sanguinē eliciunt, et alias id genus molestias inferunt. Occurrendū igitur ipsis est. Cohibet autem irruentem sternutationē, narium, frontis, & oculorū perfricatio, item oscitatio, palati accurata fricatio, eruatuatio, contentio iliorum, capitis in altum eleuatio, conuersio in latus, mollis extremitatum cōtrectatio, musculorum maxillæ inunctio, calidi olei in aures infusio, ligaculum calidum mento subiectum. Fugere oportet repētīnam ē somno excitationem, fumum, puluerem, acutiora odoramenta, piperris, castorei, sinapis, & mentæ. Confert ad sternutationem malorum, et polentæ odor: obtundit enim sternutationū eruptionem. Inanes etiam spongiæ marinæ. Cum autem irritus ad sternutandum impetus oboritur, neq; sternutamentum in uociferationem prorumpit, quies labij idonea est. Continua item acriorum odoramentorum experientia, & animi relaxatio.

De ciborum appetitus auersione. Cap. 50.

Sio uitiosos succos stomachus quæ offeruntur respuit, exhibenda sunt tum esculenta, tum poculenta, quæ illiusmodi humores uel per uomitionem, uel per alui inferioris deiectionem

H elidere,

elidere, aut temperando emendare, comparata sunt. Quarum rerum sylua in superiore huius operis uolumine comprehensa est. Si propter uirium imbecillitatē cibum horreant, quoniam ex praua intēperie particularum, imbecilla quæuis facultas redditur, oportet distemperaturæ speciei cōtrarijs succurrere. Plurifariam igitur de escarum horrore sermonē libro tertio de stomachicis, faciemus. In febricitantibus autē, protinus inter initia odoramentis conabimur appetentiā restituere. Potissimum uerò polenta aqua madefacta, aut posca, uino copiosiore aqua diluto, aut quorundā fragrantium aut adstringentium fructuum decocto. Illito porro leni, mediocri item corporis totius frictione, blanda cōtraactione, collutioneq; uulnus, et exigua aquæ sorbitione, appetitus reuocatur. Sed lancinatus immisione digitorum stomachus, cibi quodammodo fastidium in oblatæ alimonie desiderium conuertit: præsertim sublata sursum quadā biliosa aut acida materia. A primis affectionis diebus cataplasmatibus quæ foris applicantur, stomachus fastidiosus ad cibū sollicitabitur: ex palmulis, malis cotoneis, cœnâthe, absinthio, & aloë cōformatis. Amplius, alimenta adornentur compluria tum simplicia, tum frumentacea, & alterius materię uarietatem quandā sortita, quæ tamen non multum ab ijs quæ febricitantium usui cōueniunt, discrepēt: inter quos fructus etiā fugaces numerentur, qui non facile acescūt, neq; nimium dulcescunt. Maturi uerò, non usq; ad satietatē tamen admittuntur, sed quantum duntaxat in alia edulia appetitum excitant. Adhibeantur autem ad reficiendū cibis familiares mansuetissimi, qui ægros obiurgare et sollicitare possint. Cæterū febribus solutis, perseverante in refectionibus inappetentia, conuenientissimum cum oxymelite coctū, & lactuca, & oliuæ sale conditæ, et capparis, & salsamentū, & bulbi, et quicquid stomacho conducere cognoueris, memoria repetitis illis ipsis dapibus, quibus sospites maximè usi sint. Deambulationes porro & gestationes, uociferationes, & dropacismi, & frictiones, & exercitia

LIBER SECVNDVS.

115

ercitia adhibeantur. Propinationes item succi absinthij, aut aloës. Aceti postremo scyllitici mystri mensura absorpta, bona fide & efficaciter operatur.

De pergrandi fame, quam Græci boulimon, nostri bouinam & uaccinam nominant. Cap. 51.

Si uero in uehementem & intolerandam famem ex cibi fastidio incidant (dico autem illam insatiabilem famem, qua affecti cibum non sentiunt) hisce restituemus, tum alijs perodoratis, tum suillis carnibus assatis, tum etiã hœdinis: et ut summam expediã, omnibus ingenij odoris suauitatẽ, nidorisq; fluxum emittentibus, præterita uidelicet febriũ sæuitiã. Oportet præterea extremas corporis partes constringi, ipsosq; suscitare, maxillas pungendo, capillos item uel aures uellicando: recreatis, panem ex uino supra modum diluto, aut aliud quiddam, quod facile digeritur, exhibebimus.

De canina appetentia. Cap. 52.

Quanquam hoc symptoma febribus non adeo superueniat, sed nonnunquam post ipsas, ob eam tamen quam cum cibi fastidio contraxit cognitionẽ, operæ precium fuerit, de nimia quoq; & inexpugnabili eduliorũ appetentia sermonẽ texere. utrinq; enim naturæ modus exceditur. Quoniã igitur à pituita frequentius acida hæc affectio prouenit, erit ipsa incidentibus & abstergentibus oppugnanda: cuius farine cum primis esse creduntur dulcia, salsa, & quæ alioqui absterget caloris fica. Vinũ itaq; ipsis propinandum largius, impense calidum, cuiusmodi sunt colore uermiculo, uel rufo sine acerbitate: sed dulciora potius porrigenda, etiã si nulla siti premantur. Oportet autẽ talibus ubi ad prandium peruenerint, primò quidem pinguia, atq; alia etiã omnia oleo copiosiore cõcinnata, omnis austeritatis astrictioris expertia offerre. Hæc quippe, etiamsi palam contra causam non pugnent, extremũ tamen ad cibos impetum discutiunt. Horũ uero penuria crassitudinem pituitæ quæ in stomacho hæret, cõminuit. Iam et alimẽta sale macera-

H 2

ta mi-

ta ministranda sunt. Post hæc uina cōmemorata liberaliter pōtent. His lōgiori tēpore perpetratis, canina appetētia sedatur.

De siti. Cap. 53.

Sitim admodum longam ex ariditate uel caliditate particularū, per quas humor ex ore in uentriculum defertur, nasci putabis. Et ariditatis quidem remedium somnus est: caliditatis uerō, uigilantia. Nonnulli autē ē uino sitibundi, esculentorumq; caliditate redduntur, quibus præsidio habetur gelida potio. Vitiosas uerō potiones affectant, perinde atq; etiam cibos, qui præpollenti humoris malitiæ respondeant: unde aliquot tanta siti oppressi sunt, ut inde etiā perierint. Noui qui cum dipsadas serpentes aliquando deuorassent, & qui uino sese ueteri ad temulentiam usq; inuitalent, & nauigātes qui aqua potabili in nauigio deficiente, maris aquā bibere non dubitātes, ad unum omnes mortem oppetierūt. Sed quæ in febribus nascitur sitis, placari potest irrigatione capitis ex gelidissimo oleo, aut rosa ceo uniuersim torrētis modo cum strepitu in caput deturbata. Nigræ porrō lactuæ semē manducatū, optimē siti succurrit. Prodest cōsimiliter & quæ glycyrrhiza appellatur, et cucumeris semē in ore retentū. Exhibe præterea, quod sitim sedat, hoc catapotiu: cucumeris satiui drachmæ octo, tragacanthæ drachmæ quatuor, dissolue tragacanthum ouorum crudorum recentium albore: et ubi dissolutū fuerit, tritumq; semini cucumeris prius friato adiūge: quibus subactis, globulos cōformato, deinde in umbra siccato, ē quibus unū sub lingua sitibundus contineat, atq; inibi dissolutum humidum deglutiāt. Postremō dilutum malorū cydoniorū, uel pirorū, uel mespilorū, uel clauicularum uitis, sorbendum præbetur, aut mali punici succus.

De linguæ scabritie. Cap. 54.

Si lingua salebrosa scabrescit, humectetur, lini seminis decocto laborantibus in ore continendum porrecto. Efficacius autem operatur, si myxa cum semine lini decocta, digitoq; in eo iure infecto, lingua confricata, aqua limpida ablatur, aut
spongia

Spongia abstergatur, deinde rosaceo illiniatur. Verum rosa
cū ipsum melle temperatū id efficacius præstat. Succus item
portulacæ ore detentus. Et rhus qui in obsonijs usum habet,
mulsa tēperatus, probè succurrit. Item Damascena, & mys-
chlion, hoc est, myxæ ossa ore retenta, et linguæ circūuoluta.
Facit idem lactucæ cauliculus. Archigenes autem docuit et sal
Indicum, quod colore quidem & substantia nihil à communi
dissidet, sapore uerò mellitum est, lentis instar, uel ad sum-
mum fabæ quantitate comestum, affatim humectare. In latus
insuper decumbant, quoniam supina cubatio exiccat. Nec sint
ore hiantes. Hiatus enim exuccū reddit. Sternutationes deniq;
accescit, linguas quouis alio largius humectant.

De nausea. Cap. 55.

Quando citra assumptionem cibi ægrotantem irritus ad uo-
mitum conatus torquet, coniectari cuius, puto, licebit,
prauos humores uentriculū afficere. Quidā lancinantur qui-
dem, sed euomunt nihil, humore in uētriculi tunicis imbibito.
Si itaq; humores pituitosi existunt, coquendi sunt, seruando ho-
minem in quiete, inedia, & somno. Cæterū tenuiores, uomitus
ejcit, nonnunquā ptisanæ cremore excitatus, aut mulsa. Gluti-
nosi uerò & crassi humores tenuibus, attenuadiq; uirtutem ha-
bentibus, indigent, cuius generis est oxymeli, & similia. Humi-
ditate uerò praua tunicis imbibita, picra ex aloë, accommodata
est. Adstringētia uerò impendit nocēt. Quemadmodū rursus,
humoris ingenti copia citra malitiā occupāte, cōstipantia pri-
mā utilitatis habēt æstimationē. Atqui medicamentū ex aloë,
marasmū inducit. Quod si frigiditas humiditate copuletur, mi-
scēda sunt adstringentibus etiā calorifica. Sed frigida cōstitu-
tionis indicium est, nihil sitire, neq; calorē ullū sensu percipere.

De uomitione biliosa. Cap. 56.

His qui uomitu bilem ejciunt, cataplasma ex palmulis, ma-
licorio, galla; uino decoctis, aut posca, panibus simul læ-
uigatis, applicandū est. Acacia & hypocistis, & balauftium

H ; & rhu

Et rhu cataplasmati admiscendum. Et cucurbitula appposita magnificè iuuat, cum flamma multa. Cibū uerò sæpenumerò paulatim exhibebimus. Sed qui bilem atram uomūt. Et stomachi inflationem experiuntur, his spongiæ aceto acerrimo calidoq; irrigatas impone. Vel hederæ folia uino elixa, cataplasmatibus instar, adglutinabis.

De singultibus. Cap. 57.

Singultuum alius ex repletione, alius inanitione, alius erosione ab acrioribus humoribus stomacho prouenit, quibus uomitu eiectis sedatur. Plures uerò medicamentum ex tribus piperis generibus assumentes, si protinus uinū superbiberint, singultu infestantur. Quod uerò nonnulli corrupto in stomacho cibo singultiunt, ex his quæ neminē fugiunt, existit. Neq; desunt, qui in algoribus cum tremore singultū experiuntur. Vomitionem igitur ijs qui singultu ex repletione uel erosione stomachi torquentur, sufficiens præsidium cōperimus: calfactionē, ijs qui propter frigiditatē. Quando uerò ex humorum plenitudine singultus oritur, uiolenta opus habet euacuatione, quā sternutatio molitur. Sed ex euacuatione singultibus prognatis, sternutamentum non medetur. Exhibenda autē singultientibus ruta cum uino, aut nitrum in mulsa, aut feseli, aut daucum, aut cymīnū, aut zingiber, aut nepeta, aut nardus Gallica. Hæc quippe singultibus corruptione ciborum, uel perfrictione, uel plenitatibus deniq; cōtractis, sunt auxilio. Sed qui singultum multitudini frigidorum ac uiscosorum humorum acceptum referunt, his castoreum trium obolorum pondere ex posca propinandum, idem cuti unā cum oleo ueteri sicyonio applicatum, conducit. Ex re quoq; fuerit acetum scylliticum, aut oxymeli haustum. Detentio deniq; spiritus, magnificè opitulatur.

Quæ in febribus circa aluum astrictam & lubricam obseruanda. Cap. 58.

Quæ aluum siccam excitent, libro superiore, quantum res postulare uidebatur, memoratum est. Quoniam autem & humectari

humectari hanc in febribus contingit, de ea quoque in presenti differendū arbitror. Bona quippe hominū pars non febris ratione, sed ex hoc duntaxat symptomate mortua est. Principiū igitur fluxum dimitemus, nullo remedio resistentes, quoniam à corruptione et praua cōcoctione accidit. Ultra uerò naturæ modum euacuatione facta cohibere aluum expedit. Atque si acriora quidē egeruntur, oportet alimenta quæ offeruntur, boni quodammodo succi, et aliàs crassioris esse: e quorū numero sunt chondri et ptisanæ sorbitiones. Lauacra in hac cōstitutione post morbi concoctionē non sunt aliena. Quum uerò pituitosiora et ualde fluida deiciuntur, ediuerso cibi aridiores et calidiores sunt, quatenus febres admittunt. Eius generis sunt, quæ ex condimentis calidis cōstituuntur. A balneis uerò illis abstinendū, nisi quid aliud cogat. Debilitata uerò facultate coctrice, alimentis et remedijs stipticis utendū est. Alimentis sanè, quibus maximè mala punica aut poma cydonea aut pira, aut mespila admixta sint, uel illis ipsis, et uino tenui fragrante, adstringēte. Remedijs uerò, cataplasmatibus puta ex polentis et palmulis, absinthio, rosis, myrtis, et eiusdem generis materia. Considerandum autē uenit, quibus nam potissimū locis adhibenda sint cataplasmata. His inquam, quæ ad stomachum, uel inferiorem uentrem attinent. Nonnunquā et lumbis imponimus. Cruentis porrò deiectiones compescunt medicamenta è thure, atque desiccant. Aut tenuissimus farine flos, aut pollen, cū thure, uel māna, in uino macerata, aut posca. Acriorem uerò humiditatē, etiam cœnemate edulcato, quādoque aqua, quādoque ptisanæ cremore, aut chondri, aut oryza, aut tragi herbe, non semel quidē, sed identidem. In posterum uerò rosæ quoque aride, aut myrti attexentur. Nonnunquam et galli, ouum item unā cum rosaceo, aut uino tenui adstringēte, aut rosarum decocto infusum, uel sedi modo impositum, excernendi promptitudinē retundit. Vbi uerò crebrior desidēdi libido impetit, agathiū è spissamētis calentib. sedi conformatū inycito.

Quoniam distillatio uniuersi corporis uel capitis redundan-
tiam notat, ex cōpressu, aut densitudine proueniens: largio-
r quoq; excretio ad laxādam atq; diminuendam succorū mul-
titudinem idonea est. Cōsonum uerò est, inde ipsam moliri, un-
de natura proruperit. Hæc accurata mecum perpensione re-
uoluens, in quartanarum distillationibus non dubitavi narium
uasa de more cum typhe sauciare: neq; tamē exiguo sanguinis
effluxu contentos esse oportet, sed habita uirtutis ratione au-
ferre. Spontaneas uerò in febribus nariū sanguinis profusio-
nes decretoriè quidē factas, boni consulito, sed immodicè per-
manentem sanguinem cohibere tentato. Extremæ itaq; ante
omnia partes uinculis ualidè excipiantur, æger sublato in ala-
tum capite figurabitur. Videtur etiam præputij illigatio pecu-
liariter sanguinis ex naribus eruptionem cōpescere. Noli au-
tem uel emungere, uel locum irritare. Sed in grumos sangui-
nem coalescere finito. Nares uerò spongia in posca macerata,
infrigidentur. Cuneolum ex panniculo, medicamēto quodam
sanguinis cōpescendi uim habente illitum, naribus stillantibus
inserito. Sed horum materiam, & aliam curationem de locis
affectis, sequenti uolumine fusius prosequemur.

De animi defectione. Cap. 60.

Vi ex cholera, alui fluoribus, alysq; permultis, ac subitis
euacuationibus, anima deficiunt, gelida aqua aspergēdi, et
naribus apprehendendi sunt, os uentriculi perfricandum. Vo-
mitū præcipere, stomachū uellicare uel digitis, uel pannis im-
missis expedit. quin & pluribus uinculis ualenter uinciri de-
bent: facta euacuatione per inferiores particulas, manus per
superiores, crura. Prospicere etiā sanguinem fundentibus for-
mam situs sine dolore sublimē conuenit. Cucurbitula, contra-
rijs quæ euacuātur partibus, retrahendi gratia, adglutinetur.
Medetur & uinum aqua dilutū resolutionibus ex immodicis
euacua-

euacuationibus ortis, nisi uiscerum inflammatio, aut dolor capitis uehemens, aut stupida quædam mentis affectio, aut febris adurens, in morbo crudo, prohibeat. Nam in his uinum ingentia adfert nocumenta. Quod si æstus fuerit, & temperaturæ calidæ, & potare laborans frigidum potum assuetus, frigidum exhibendum est uinum: sin contraria, calidum. Ex sudoribus uerò nimietate animo deficientebus, cutem, ueluti antea mihi dictum, densare oportet, & aeris perspiratum aliquem frigidum præparare. Cæterum defluxionibus in uentrem nihil horum congruit, præterquam quæ uentri, stomachoq; firmando sunt, adhibere, & affectos lauare: quoniã illiusmodi in uentrem fluoribus lauacra, ut omnium sunt accommodatissima, ita & sanguinis eruptiones atq; sudores ubertim proritât. Qui præ multitudine, animi deliquio corripuntur, uino ciboq; abstineant, & lauacris si febricitent. Mulsa autem potionis loco propinatur, in qua aut thymus, aut origanum, aut pulegium, aut hyssopum elixum sit. expedit præterea oxymeli. Quod si ex prauis humoribus in stomacho contentis animæ deliquium inciderit, hydrelæo digito uel pinnula ori immisso, uomitionem elicere impera. Si uerò nequeant uomere, oleum quodq; præstantissimum potui exhibendum. Hoc sanè per aluum quoque sæpenuerò euacuat. Absinthii item talib. succurrit. Deinde si propter stomachi imbecillitatem animam perdiderint, ijs stomachum corroborantibus utendum, quemadmodum iam pridem mihi in capite eidem dedicato proditum est. Extremas adhæc partes confricare oportet. Exustos in balneum ducere. Perfrigeratis uerò diatrionpipereon, uel ipsum piper exhibere. Iam uerò ex immodico calore siue æstu, siue diurniore in balneo mora, animam perdentibus, medetur aqua gelida aspersa: mox si aeris flatibus exponantur, deinde fricatione stomachi, ab hoc uini & cibariorum usu. At si quis ob uasitatem inflammationis, aut malignam febris affectionem in accessionibus, animo fathiscit, & perfrigerantur artus, acriter ualida

H 5 fricione

frictione fricato, foueto atq; uincito, uigilias cibiq; abstinentiam indicito: hæc quippe & ante paroxysmum sunt exequenda. Quos propter siccitatem animus deliquerit, his duabus aut tribus horis ante accessionem alimentum exhibendum est, aut chondri cremor, aut panis ex aqua, unà cum mali punici nucleis, aut malis, aut piris. Quod si ingentis alicuius discriminis periculum sit, uinum etiam ministrandum. Iis qui subito anima destituuntur, hoc pacto subueniendum: & ubiq; causam deliqui reputare conuenit, atq; huic unicè reniti. Nonnunquam uerò & symptomatis maior habenda est ratio, quod quum aliàs periculum, aliàs mortem quoq; minitatur.

Hulceris os sacrum infestantis curatio. Cap. 61.

Ebbribus, præsertim diutinis, etiam hic affectus, ex diuturno decubitu superuenit. Cum igitur sacri ossis regio incipit rubescere, rotam egregiè magnam ex lana facientes, loco supponemus. Post hæc rosaceum uel myrtinum cerotum, cui spuma argenti, aut cerussa misceatur, superaccommodabimus. Phlegmone autem oborta, panem cum solano, aut sanguinali, aut plantagine, aut brassica tenella, emplastri modo applicabimus. Quod si exulceratio depascendo serpat, lenticulam cum malicorio cataplasmatibus more imposito.

LIBRI SECUNDI FINIS.

HYPOTHESIS LIBRI TERTII.

In hoc uolumine uniuersi operis Tertio, de morbis secundum locos affectos sermo instituitur, qui à summo capitis uertice auspicans, ad infimum pedis calcaneum receptui canit.

CAPITA TERTII LIBRI.

De alopecia ophiassi, & caluitio.	unt malis	3
Cap.	1 De cephalalgia, quem capitis do-	
Quomodo capillitium cirratum	lorem uocant	4
reddatur, & tincturæ eiusdem,	De cephalæa & hemicrania	5
ex Cleopatrz de crispitudine	De phreniride	6
inducenda commentationib. 2	De phlegmone cerebri	7
De his quæ capitis cutem infici-	De erysipellate ipsius cerebri	8

LIBER TERTIVS.

123

De ueterno lethargo ue	9	De Tinaſmo	41
De catochō & uigilante comate		De dysſenteria	42
10		De colicis	43
De memoriæ & ratiocinationis		De ileo, gracilioris inteſtini mor	
iactura, & Caro, & Morofi	11	bo	44
De uertiginofiſ ſcotomaticis ue		De paſſionibus renum & ueſicæ	
12			45
De morbo comitiali	13	De hepatis paſſionibus	46
De melancholia, mania, & numi		De cachexia, id eſt, prauo corpo	
ne afflatis	14	ris habitu	47
De ephialte, ſiue incubo	15	De intercute	48
De Lycæone uel lycanthropo.	16	De lienis affectibus	49
De iis qui amore infantunt	17	De morbo regio	50
De apoplexia, & hemiplexia at		De prominente umbilico	51
que paralyſi	18	Vt quis diu maneat impubis &	
De conuulſionib. ſeu ſpasmis	19	imberbis. de conſeruatiōe pu	
De Tetano & differētiis eius.	20	dei dorum item depilatoriæ.	52
De tremoribus	21	De bubonocœle, enterocœle, &	
Remedia quæ oculis ſalubriter		hydrocœle	53
adhibentur	22	De teſticularū inflammatione,	
Quæ ad aures pertinent, & pri-		& ſcorti, aliisq; ipſorum paſſio	
mo de aurium dolore	23	nibus	54
De paſſionibus nariū atq; olfa-		De gonorrhœa & oncirogmo.	55
ctus	24	De ſatyriaſi	56
Aduerſus faciei uitia, & contra		De priapismo	57
rugas ipſius remedia	25	De infœcundis genitalibus	58
De paſſionibus oris	26	De huiſceribus pudendorum &	
De angina & differentiis eius, i-		ani	59
tē de iis q angina, aut alia qua-		De paſſionibus uulux, & men-	
uis ratione ſtrangulantur	27	ſtruorū primitus purgatiōe.	60
De grauedine, deſtillatione, rau-		De ſuppreſſis menſibus	61
cedine, & tuſſi	28	De nimia purgatione & fluxu	
De orthopnœa, difficultate ſpi-		ſanguinis per uuluam	62
randi, & dyſpnœa	29	De muliebri profluuiō	63
De morbo pulmonis	30	De inflammatione & declinatio	
De ſputo ſanguinis	31	ne locellorum	64
De ſuppuratiōe & phthiſi	32	De uteri abſceſſu	65
De morbo laterali	33	De huiſceratiōe uulux	66
De cordis affectionibus	34	De cancro	67
De mammarum affectionibus	35	De ſcirrho & durtia	68
De axillarū foetore ac ſudore.	36	De mola	69
De morbis qui infeſtant ſtoma-		De inflatione	70
chum, præcordia, & uentrē.	37	De uteri ſuffocatione	71
De uentris inflatione	38	De procidentia uteri	72
De cholera	39	De præcluſione uteri	73
De hienteria & cœliaca affectio-		Sterilitatis curatio	74
ne	40	De rhagadibus & condylomatibus	75

ac hæmorrhoidibus uteri	75	De hucerosi affectibus in plantis & calcaneis	79
De pariendi difficultate	76	Ad clauos callososq;	80
De coxendicis affectibus	77	De unguum uitis, & primū de	81
De podagra & morbo articula	78	reduitis	81

F I N I S.

PAVLI AEGINETAE

LIBER TERTIVS, ALBANO

Torino interprete,

Super eis quæ capillos intentant uitis, de Alopecia
Ophiasis, & glabritate. Cap. i.

Vemadmodum plantarum alie quidē humilitatis penuria inarescentes emoriuntur, nonnullæ uerò asciticijs, sibiq; contrarijs humoribus suffocantur: ita & in hominis cæsarie usu subinde uenire conspiciamus. defectione enim humoris glabretur: ex succis autem prauatis, Alopecia & Ophiasis, figura inter se duntaxat dissidentes, cōsurgunt. Hæc enim locum capitis affectum ad instar anguis glabrum describit. Alopecia uerò à uulpibus, quod eo frequentissimè id animantis malo confluetur, nomen est inditū. B. cutis igitur colore, redundantem humorem cōiectantes, euacuatione primitus, quæ medicamētis purgantibus fit, deinde quæ parti extrinsecus injiciuntur præsidijs utemur. Proinde ubi ad nigrorem admodum, aut candorē plurimum color uerxerit, cum hieræ antidoto, non tam pituitam quàm melancholicum quoq; humorem uacuare potente, expurgemus. Si uerò pallori propius accesserit, ei quæ ex aloë conficiuntur, globuli exhibendi sunt. Quorum uniuscuiusq; de scriptionem in compositorum medicamentorū uolumine comperies. Post uniuersi uerò corporis euacuationem, apophlegmatismo, nō semel modò, sed crebrius ex aceto, sinapi, melleq; composito, utendum. Conducibilius uerò multo, si in aceto origanum quoq;, aut pulegium, aut thymus, hyssopus uel maceretur.

tur. Quin & in cæteris quæ caput infestare solent affectibus, eadem methodo utendum: ante omnia superabundantem succum, uel purgandi facultate præditis medicaminib. uel sanguinis detractio, euacuantes, si modò sanguinis plenitas non desit. Sic deinceps ad localem medendi rationem procedendum.

De Alopecia.

Caput prius nitro confricatum, linteoque aspero, lanceo præsertim extersum, adque ruborem usque confricatum, uerbenaca in sole cum aceto contrita perunge: aut halcyonium asperrium crematum & læuigatum cum oleo ex lucerna obline: aut arundinis radicem, aut corticem amygdalæ amaræ cõbustam, oleo seu adipe ursino exceptam illinito. Mediocria quidem hæc sunt remedia: efficaciora uerò, quæ euphorbio, aut thapsia, aut adarce, oleo detrita laurino, aut liquida pice constituantur. Aliud: Testis erinaceorum marinorum combustis adipe ursina exceptis, locum antea nitro detersum perungito. Aliud: Piperis, stercoris ouilli aridi, irionis, seminis ericæ, singulorum drachmæ quatuor, ueratri candidi drachmæ tres, muscerdæ drachma, bile taurina, aut hircina, uel suina excipiantur.

Aliud aduersus Alopecia, experientia comprobatum:

Mandragoræ radicis, aristolochiæ, radicis ari, ceræ, picis liquidæ, cuiusque congij octo, axungie porci subrumis, rhododendri herbæ meditullij exiguum. axungiam & rhododendron, donec herba liquefiat, coquito, deinde glomeratam herbam abijcito, cæteræ axungie confundito, & elixato: postea ceram ac liquidam picem adijcito, mox audacter in sole utitor: cumque; hucera cicatricem contraxerint, caput uulpis combure, & alcyonium, anchusæque; nigre folia, omnia contusa unctiōni inspergito, quo caput pilis uestiatur. Aliud: Murini capitis cremati pars una, testarum marinarum tantundem cum axungia porcina: omnibus in fidelia decoctis, in usum inspergendo adhibebis. etiam ipsæ aridis utitor.

Medi-

Medicamentum e thapsia ad omnes diutinas affectiones.

Buphorby, thapsiæ, baccarum lauri, uniuscuiusq; uncia, sulphuris uiui uncia media, ueratri tantundē, ceræ uncia sex, olei laurini aut rhicinini, aut ueteris, quod satis est. In robustioribus adijciatur & nasturtij uncia, balcyony combusti uncia. Neque hoc medicamentū ad alopeciā tantūmodo, uerū ad quācūque etiā inueteratam perfrictionem confert. In uniuersum uerō in alopecijs prius frictione & abstersione ex nitro utendū, & rasione capitis continua: complures equidem noni, qui sola frictione & assidua rasura capillos plantabant.

Ad glabreta, & capillorum augmenta, ex commentariis Critonis.

Leporum uētriculos quinq; aridos, accuratē in uase testaceo torrefacito, quibus adijce tertiā partē uirgultorū myrti, acaciæ fructus, acaciæ cremoris, rubi canini, par pōdus: adiāti uncias tres. his omnib. in tenuē farinā contusis, attamina tenui cribro: deinde adijciens adipis ursinæ libras quatuor, & phocæ tantundē, denuō contunde, et excepta in pyxide plumbea reconde. sed ad usum, quocūq; uidetur bedysmate diluito.

Quibus conseruentur capilli.

Polytrichi partē unā, ladani partes duas, uino oleoq; myrtino excipe, & utere. Aliud: Anemones florē tritū cum oleo illinito. Sed hic quoq; nigrorē inducit. Aliud: Verbenacæ rectam cum radice exiccata & contusam, exilibus foraminibus incerniculo attamina, admixtaq; tāta olei quātitate, quantā ad sordium crassitudinem inducēdā satis est, in uas æreum reponito: & cum subacta tabuerit, pro oleo similiter utere.

Aqua capillos augens, & nigriores reddens.

Aquæ coelestis xestas sex, rhus Alexandrini xestas tres, polytrichi, herbæ sabine singulorum uncias quatuor, ladani unciam, myrti unciam, cucurbitæ aridæ tantundem, in uase uitreo per dies uiginti macerato, mouēs bis in die rude tedacea. Sequenti uerō tēpore pilis in aquā singulatim demersis, utere quotidie.

quotidie. Semen quoq; altheæ in balneo illitum, capillos non tam conseruat quàm augmentat. Pari modo & oleum illitum in quo ipsum semen altheæ elixum uel impositum sit.

Quæ comas extenuant.

Fici foliorum, uitis syluestris albæ corticis, pumicis, testarum buccinorum, cretæ cimoleæ, singulorum mina, omnibus fidelis nouæ ac crudæ impositis, & luto oblitis in fidelis uase, decoquito & cõterito, spumæ nitri adyiciens minâ dimidiam, gallas immaturas triginta: quib. liquefactis, eximito et utere.

Aliud: Spumæ nitri minis septē, pumicis tostis minis quatuor, aluminis scissilis, iridis aridæ, myrti syluestris nigræ, gūmi, bryoniæ radicis, uniuscuiusq; drac. quatuor, lupinorū crudo rū in pollinē redactorū cōgij parte quarta utere sine pingui.

Ad profluvium capillorum.

Aloē cum uino nigro, austero illinito, aut purpuræ operimenta cum oleo cocta, & myrrham & ladanum cum uino aut oleo myrteo, aut finum caprillum in testa combustū cum oleo dilue, capitiq; nouacula raso inunge.

Qui capillitium cirratum reddatur, & tincturæ eiusdem, ex Cleopatrz libris de crispitudine inducenda. Cap. 2.

Capite prius absterfo, radice uerticillaris herbæ capillos cum mero oblitito. Aliud: Raso deterfoq; capite, pineam nucem recentem, in cinerem usq; cõbustā, pilæ inditam cõterito, unguentoq; myrteo ad mellis usq; crassitudinē super infuso, sic caput oblitito. Aliud: Pili myrtorum & betæ pari modo cum oleo absterguntur. Aliud: Gallas uiginti, adianti uncias duas, aqua marina usq; ad mellis densitudinem coactas inunge: sed deterfo prius urina capillitio, aut lixiuio & calida aqua abluto, pilos hoc medicamine biduum perungito: ubi tãtis per cõtinuerit, tertio die ablue, exiccatosq; oleo myrteo perline. Hoc quippe delicatam, & crispam, & nigram reddit casariem. Crispior autem euadet, si prius capita nouacula raso, isthoc utare.

Quæ

Quæ canos arcent, & nigrorem inducunt.

Olei ex immaturis oliuis expressi sextarios treis, spica nardi denariū, conchulæ indicæ odoratæ, iunci odorati floris singulorum denarios quatuor in oleo coquito, atq; seponito, acaciæ cremoris uncia uino dissolue, & accuratè lauiato: quando uerò olei tertia pars fuerit relicta, hanc percolato, & confundens acaciæ sitella excipito, atq; inungēdo capiti utere quotidiē. Aliud: Nucum uiridium corticis, radicis ilicis, cuiusque quadrans, uini nigri sextarij tres, ad tertias decoquuntur, succusq; expressus cum olei myrtei sextario contunditur, utendum eo est quotidie.

Aqua capillos denigrans.

Gallæ sextarium, rhubarbari coriariæ, myrtorum nigrarum, foliorum cyperi, uniuscuiusq; sextarios duos, cinaræ quantū manu comprehendi potest, papaueris nigrorum in floribus capitulorum æqualem mensuram, aquæ putealis sextarios duodecim, pluribus antè diebus maceratas ad tertias coquito, deinde illinito. Detergis prius et exiccatis crinibus, cretæ cymoliæ quartam partem cotylæ, & calcis uiuæ æqualem mensuram illinito. Hæc succo betarum elixatarum dissoluta inungito, deinde betæ folia operculi causa superimponito: & ubi satis sic perennauerint, in lauacro expurgentur.

Quomodo rufi capilli tingantur & flauescant.

Myrrhæ partem unam, salis floris tantundem, accuratè friato, & inducto strigmentorum balneorum crasso lentore, absterfoq; prius capite, medicamento capillos inunge, atq; sic inhærere cum sua nocte diem finito, deinde ablui præcipito. Aliud: Lupini crudi cum aqua illiniuntur. Aliud: Ex spumæ argenti drachma, Creticæ terræ drachmis quatuor, calcis uiuæ drachma, aquam lentam sordium crassitudinis conficiēs, capillos perunge, & betæ folijs per biduum aut triduum iniecis, inde abluito.

Vt nigrum capillitium flauescat.

Eccem uini strigmento balnei excipito, & cerati crassitudine

tudine inducā, somnum inituro illinito, & mane capilli fului apparebunt. Aliud: Cyperi folijs in cremore struthij maceratis, eo diluto utere.

Tinctura auro similis.

Auri instar colorem faciunt, aluminis denarij sex, sandarachæ tātundē, croci denarij duo, thapsi qua tinctorum utuntur (quam Romani herbam rubiam nuncupant) denarij octo, lixiui pileariorum denarij quatuor. Coquito autem lixiuium & thapsum contusam, & dimidiata parte cōsumpta, exprime liquorem, in quo alumen, & sandarachā, & crocum dissolue, mox inijce uasi uitreo, & in necessitate, detergo prius capite, oblinito. Cum autem imbibitum fuerit, fœnogræci, & hordei, & cymini aqua tepida sufficiente ablue, inijciens & saponis quantum satis est. Aliud: Fece uini cōbusta, & oleo balanino simul confusis, capilli inungantur. Aliud: Sapone quoque Gallico absterge dā sunt singulis balineis comæ. Aliud impendit utile: Rhus rubentis sextarium, gallarū sesquilibram, celidrij uncias duas, herbæ aurescentis (quā rubiam ducunt) uncias duas, polytrichi fasciculos duos, absinthij fasciculū. Lupinorū delibratorū cyathos duos, aquæ sextarios septē, in uase uitreo excipe, finitoq; nouē integris diebus macerari, rudiscula mouēs bis quotidie. Vbi usus uenerit, tolle quod sufficit. In hoc spōgiā intingēs, capillos perfrica, humectosq; finito imbibere. Vbi uerō aruerint, sapone cadida aqua liquato, ablue.

Vt capilli candidi reddantur.

Verbasci albi florem crematum, aceto irriga, & confunde saponi. Aliud: Verbasci seminis, aluminis, raphanorum corticis, cuiuslibet denarium contunde, & taurini glutini quatuor drachmas commisceto.

De porrigne & affectibus capitis cutem deturpantibus. Cap. 3.

Porrigo (quam pytiriasim Græci dicunt) est tenuium furfuracearumq; squamularum ex capitis ac reliqui corporis

ris superficie, nulla relicta exulceratione, decidua resolutio. Prouenit uerò id uitij subeunte caput prauo corporis humore, falsæ pituita, aut bilioso & atribilario sanguine. Euacuato itaq; prius uniuerso, seu prodiū est, corpore, subscriptis remedijs utendum. Cretam cimoliā aqua maceratam betæ cremori cōfundito, atq; furfurationi illinito; & donec aruerit, illitum adbarere permittito. deinde loco infecto abluto, thure cū uino & oleo trito denuō perunge. Postera uerò die staphida syluestris, hoc est, herbam pedicularem, cum oleo illinito. Aliud: Nitri, fecis ustæ, glādiū unguentariarū, uniuscuiusq; libra, herbæ pedicularis libra una & dimidia, uino dilutis caput absterge. quodd si alia corporis pars prurigine infestetur, aridis. Humidiores uerò capitis furfurationes falsugine abluto, aut lupinorū decocto. Huius equidē summū experimentū habeo.

Psydracia & exanthemata capitis.

Psydracia exiles sunt capitis excrescentiæ, pustulis similes, quæ summā cutis superficiem exasperant. Exanthemata uerò summæ cutis pustulæ sunt, & exulcerationes subrubræ atq; salebrose. Vtriq; tamen uitio his quæ deinceps subordiantur, remedijs succurritur. Spumæ argenti, cerussæ, singulorum drachmis quatuor, aluminis duabus, foliorū rutæ uiridum totidē, aceto myrteoq; oleo cōtritīs, cuti illinito. Aliud: Rutam & alumen mellæ leuigata, derafo prius capiti illinito. Si uerò abscessibus capitis cuticula infestetur, oliuæ folia cum melle elixa cataplasmatīs modo impone. Aliud: Spumæ argenteæ, cerussæ, singulorum uncias duodecim, sulphuris ignem non experti drachmas octo, cerota myrtea excipito.

Ad huluscula capitis densa & rubea.

Sunt hæc perexiguīs admodum papillis similia, è quibus aquosi sanguinis humores eliquantur: derafo antè nouacula capite, & aqua nitroq; deterfo, sulphure uiuo cum lotio humano diluto, utendum. Vel atrametum metallicum cum aceto capiti illinendum.

De

LIBER TERTIVS.

De manantibus capite h ulceribus, quæ Græci
achoras dicunt, & fauīs.

131

Vna quædam in capitis cute affectio consurgit, quæ Græcis achor nuncupatur, Latinis manantia h ulcera, tenuissimis foraminibus cuius perforās, è quibus uiscida sanies excernitur. Haud sanè dispar huic figura et aspectu mali est, quod cerion, hoc est fauū dicitur, quoniam foraminibus amplioribus terebratum, quibus mellis instar humiditas perinde atq; in apū fauis continetur. Cæterum originē ad nitrosam, salsamq; pituitam referunt. Melioris igitur succi cibo uesci, acri salsoq; omnino abstinere conuenit, præsertim si inflammationē redolet affectio. Et post cōuenientē superuacanei euacuationē, derafo prius capillamēto, caput bis aut ter, aut multo sæpius aqua calida in qua elixata sit myrtus, aut rubus, aut lens, aut amari lupini, aut asparagi radix, foueto. Si multa uis saniei erūpat, folia salicis cū aqua aut lēticula inducito. Illinitiones autē cretæ cimolia, aut Cretica, aut rubrica Samia, aut pompholyx, aut spodiū, aut spuma argēti, aut cadmia, aut charta cōbusta, constituant, aut quæ ex charta cōcinnatur cōpositio arida, omnia cū aceto admixto. Smegmatis præterea usus probatur, quod sulphuris, herbe perdicij, saponis, æquali mēsurā cōstat. Composita medicamēta hæc sunt: Spumæ argēti drach. sedecim, foliorū rutæ octo, herbe pedicularis syluestris quatuor, atramēti sutorij duæ, cū aceto & myrteo redigantur in sordiū balnei crassitiem, & illinantur. Aliud: Sandicis drach. quatuor, myrrhæ tantundem, sulphuris uiui drachmas duas, mannæ quatuor, cum oleo ueteri inducito.

Ad achoras.

Qui foetidis id genus h ulcusculis infestantur, argenti recreamento, uel plumbagine cōtrita oblinuntur. Aliud ad achoras, & humidæ pforas: Rosarū rhododaphnes triens, sulphuris uiui tantundem, picis liquidæ, picis aridæ, singulorum quædrans, ceræ selibra, olei myrtini quantum satis est. In puerorum achoris, ea in lacte dissoluta illinantur.

I 2

De

Ficus autem nuncupantur germina hulcerosa, rotunda, subdura, subrufa. quæ comitatur etiam dolor. Oriuntur uerò hæc magna quidem ex parte in capite, sed & reliquo itidem corpore. Præstantissimū ad hoc remedium, alumē sciibile, & flos æris assatus, & glutinum quod ex taurorum tergoribus confit, æquali pondere: cum æris squamulæ duplo trita, cum aceto illinito. Optimum præstant auxilium, halecularū (quas mænidas Græci nuncupant) capita cremata, bulbi itidem elixi, & cinis denique cum aceto temperatus.

Contra capitis & menti ficosa exanthemata, Xiraphion.

Misyos drachma una et dimidia, chalcitidis drachmæ duæ & semis, squamulæ æris drachma, aluminis sciibilis tantundem, probè loto aridū superaccommodatur, & dimittitur. Postero uerò die cū denud lotum sponsia exterseris, idem imponito. Decidit enim ramentū densissimū: & si rursus diebus sequentibus idē fiat, absq; ullo cicatricis uestigio sanatur. Neq; uerò mediocriter hoc medicamentum adglutinatur, hæretq;.

Ad pediculationem capitis, quam phthirian Græci dicunt.

Qui pediculantur in capite, lupinorum aqua decoctorū diluto abstergantur. Aut uuam taminiā, aut sandaracham siue utrāq; leuigatā cum oleo ueteri acetoue illinito. Aut piperis perexiguum, ne exulcerationem inducat, cū oleo, aut hederæ cremore cum melle, aut minium synopicū cum aceto. Aut cedrinum liquorē, aut picē liquidā cum alumine, aut baccarum lauri succum expressum siue oleum deniq; raphaninū applicamus. Cæterū nos syluestrem herbā pedicularē aceto & oleo leuigatam induximus, & semper uoti compotes facti sumus.

De capitis dolore, quam cephalalgian Græci nominant. Cap. 4.

Dolor capitis, quam cephalalgian nuncupant quidam, ex difficillimis casibus existens, aliquando ex sola qualitate distemperata, quandoq; ex humorū nimietate, nōnunquam ex utriusq;

utriusq; culpa consurgit. Est quando ex primitiua causa, puta, qui foris accidit aestu, frigore, temulentia, idu. Grauißimi igitur capitis cruciatus, ex aëuiis qualitatibus proficißuntur: maximè uerò præcalida. At qui ariditatē sequuntur, non tãta uiolentia sæuiunt. Humida uerò qualitas omni planè sui ipsius respectu dolore uacat, nisi calori, aut frigori, aut humorū plenitati coniuncta sit. De eo capitis dolore qui febricitantes infestat, in superiore quidē uolumine, cui de Febribus est inscriptio, satis differuimus, in præsens de alijs uerba facienda sunt.

De capitis dolore, qui ex calore gignitur.

Qui ex aestu capitis dolore torquentur, eorū cutis tactu calidior, & primò statim manus iniectu aridior percipitur, oculiq; rubicundi fiunt: frigidis cōspersionibus, & inunctionibus delectantur, et earū beneficio dolore leuātur. Cæterū illis eadē curatio, quā caput ex febre dolentib. præscripsimus, quadrat. Perseuerante autem capitis dolore, subscriptis utendum cataplasmatis est. Conducit fronti & temporibus applicatus panis ex posca, & rosaceo, aliquando cum amygdalis, aut roseis uel aridis, uel tenellis, aut menta cum pulegio admixto, aut panis cum persici folijs. Valet etiam ocimum cum aceto & rosaceo tritū, aut hederæ corymbi in aceto elixi. Cōducit etiam subactam rosaceo, aut serpilli aquæ decocto triticeam farinam miscere. Cardamomū quoque in sartagine frictū, acetoq; & rosaceo tritum expedit. Aut fermentum cum rosaceo, aut iris arida cum aceto. Iugiter uerò unumquoduis horum mutato: nam uetustate efficaciam suam amittunt.

Pastilli aduersus cephalalgiam e calida intemperie.

Croci drachmæ quinque, chalcanti drachmæ decem, aluminis sedecim, myrrhæ septem, omphacij, chalcitidos, gūmi cuiusq; drach. tres, uini austeri quantū opus, utere cum posca. Quod si uigiliæ quoq; his accedat, tū somnificorū quippiā applicato.

De caput ex gelida intemperie dolentibus.

Qui ex frigore, capitis dolore impetuntur, diuersa his qui

l i

ex

ex aestu afficiuntur, indicia præferunt. Facies enim uero ipsorum non cõcidit, sed per pallida est. Frigidis neq; delectatur, neq; adiuuantur: uictus uerò ratio, & cætera concurrentia horum stabiliunt agnitionē. Inungatur itaq; oleū rutaceum, laurinum, aut irinum, aut nardinum, aut balsami succus, maximè si cum crassiora, tum uiscosiora fuerint retrimenta. Hūc frõte tenuis, & hoc liquore, & medicamentis quæ ex pipere & euphorbio cõcinnantur, oblini conuenit. Vinum tenuiū partium exhibendum. Motui quoque corporis indulgere, & lauacris nonnunquam calidis operam dare præcipito. Aliquando, quæ raphanis cietur, uomitione utendum. In quibus uerò qualitas absq; humorum plenitudine perseuerat, illo medicamento utitor: Piperis candidi drach. duæ, crocomagmatis drach. totidem, euphorbiæ recentis drach. octo s. stercoris colubini drach. una s. aceti accerrimi quantum satis est. affectam partē, confricatam prius oblinito.

De dolore capitis ex biliosis humoribus orto.

Signa horum consimilia habentur ijs, quæ eundē affectum ex insolatu natū portendunt. Accedit autē ipsis morsio maior, & pallor faciei, nonnunquā oris etiam amaritudo. Consuevit autem hæc affectio ætates potissimum in uigore consistentes, temperamenta calidiora, & uitā solitudinibus anxiam, & bilem coaceruantes flauā, inuadere. In horum propterea curatione, lauacris tēperatis, inunctionibus, aquosis potionibus, & uniuersa uictus ratione humidiorē, & boni succi utendū. Eucuarē præterea biliosum humorē absinthij diluto oportet, siue cum aloë, & ipsius picræ antidoto per se, aut cum momento scammony, uel confectis ex aloë globulis. Inungēda etiā frons uel croceo pastillo, uel trigono, uel alio quodam compari.

De capitis dolore per consensum.

Si uniuerso corpori caput cõpatiendi ratione condoleſcat, magna industria contra distemperamentum, contraq; exuperantem materiam certandum est. Si plenitudo urget, & præcipue

eipue in uenis, per incisionem uenæ sanguinem detrahemus. Sin modū qualitas magis transilierit, purgatorio utamur medicamento. Si consortij lege particula laboranti cōpatiatur, uerbi causa, iocinori, aut uētri, aut stomacho, hisce succurrēdū est. Si calida quidē subsit intēperies, panē ē uino aquoso suppe-
ditantes, aut ex chōdro, sorbitiones. Extrinsecus adspergines modicē infrigidantes, roburq; inducētes, ueluti antea demon-
stratū, superfundēdæ sunt, at si uiscidi ac crassi humores stoma-
cho impacti, dolorē capitis inuexerint, illos etiā, acetosum mul-
sum tū simplex, tū iulianū miscētes, amouebimus: ex hyssopo
insuper et origano remedijs, et his adhuc maiore calfaciendi
et incidēdi ui præditis. iam et quæ cū raphanis elicitur uomi-
tio, infusiones itē ex alto calidiores, et cataplasmata proficiūt.

De capitis dolore ex ebrietate.

Si uinum adhuc crudum in uentriculo fluctuat, aqua tepente potui data, uomere præcipito. At si post concoctionem quoq; caput doleat, refrigerantia & reprimētia profunt: cuiusmo-
di est rosaceum per se, uel cū aceto, aut succo hederæ, seu bras-
sicæ. Iam eius herba quoq; folia in aqua calida macerata, ca-
pitiq; imposita, fasciāq; circūligata, naturæ aptitudine ebie-
tati aduersantur. Quin et ipsa brassica elixa estur utiliter. Lēs
insuper sumpta, his opitulabitur, potissimē humido uētre præ-
ditis. Alicæ porrō, malorum puniceorum, malorum cotoneo-
rum, pisorumq; esus, & aquæ potus, salutares sunt.

De capitis dolore ex ictu.

Capitis dolore ex ictu laborantibus, nisi in summa modō cu-
tis superficie læsi uideātur, continuō uenā secabimus. Vincit,
caput largius subinde superfundere, oleoq; dulci irrigare, &
ipsum lanis cooperire. à uino & solidioribus cibis, præcipuē
si febris comitetur, ægri coërcendi sunt: et omnia breuiter tan-
quam ad inflammationem neruorum partium, & in primis
membranarum cerebri, commodē aptemus. Porrō ubi uulnus
illatum fuerit, & huic conuenientes suppetias dispiciemus.

I 4 Malagma

Malagma ad capitis dolorem.

Cerae drachmæ septē, olei amygdalini quadrans, terebinthinae drach. octo, eruginis rasa, cretæ cimoliæ, chalcitidis, singulorum drachmæ quatuor, pumicis drachmæ treis: aris adusti, squamæ stomomatidis, uniuscuiusq; drach. duæ. Verum ubi durius paulo esse uidebitur, amygdalino emolliendum est.

De cephalæa & hemicrania. Cap. 5.

VTerq; hic affectus ægrè cedens, ac continuus capitis dolor est, qui strepitu, clamoribus, luminis splendore, uini potu, & implentibus caput odoramentis cōcitatur & acuitur. Horum quidam totū caput percuti, alij uerò alteram modò capitis partē autumant, quos hemicraniacos nominant. Et quibus intra caluariam affectus cōsistit, is dolor usq; in oculorum radices penetrat. Quibus uerò extrā existit, hos circa caluā dolor impetit. Cū grauitate itaq; dolores, humorū multitudinem arguunt: cum morfu uerò, uel humorum, uel uaporum acredinem: cū pulsationibus autem infestantes, phlegmonen, sed cum extensione: siquidē sine grauitate percussuq; spiritus tenuis & uētosī copiā indicat. sin uerò cum pulsu, inflammationem membranosi corporis insinuat, si cum grauitate, plenitudinē intra membranas comprehēsam declarat. Cæterū si quādo putris etiam humor feruentior redditur, unā cum febre dolorē capitis patiuntur. Febricitant autē omnino, qui ob phlegmonen dolore afficiuntur. Corpore igitur uniuerso singulis ex æquo humoribus redūdāte, uenā aperire, & stimata languentis uirtute, et clysteribus acrioribus uti expedit. Si adhuc sanguis modū transilire uideatur, nariū uena etiā ad aperta, quantū satis esse uideatur, euacuabis. Mox hieram acutā exhibebis. ab hoc, est apophlegmatismis utendum: deinde & per nares exinanitiones probātur, per ea quidē quæ naribus infunduntur, errhina Græci uocant: cuiusmodi est elaterij succus cum lacte infusus, siue in farinam friatum elaterium, naribus inspiratum: & cyclamini porriq; succus. Composita sunt quæ sequuntur.

Errhinum

Errhinum ad diuturnam cephalæam, & ophthalmiam,
& comitali oppressos.

Nigellæ drachmæ octo, salis ammoniaci quatuor, elaterij
totidem, tritas oleo siccyonio, aut irino, aut cyprino excipe,
ita ut cerati consistentiam induat, & naribus indito.

Medicamentum pituitam extrahens naribus inspiratum.

Rapi, seu umbilici terræ aridi drachmæ octo, nitri rubicun
di drachmæ quatuor: sed si nitri loco elterium inijcias, multo
præstantius erit. pulvis eius naribus per arundinem insuffla-
tur. Vtere præterea epithematis circa caput, & unctionibus,
si uetustas morbum magis occuparit, sequentibus.

Epithema ad cephalæam.

Vngenti irini, peucedani, castorij, singulorum denarius,
baccarum lauri denarij duo, uirgultorū rutæ denarij quatuor,
cum cerato rosaceo excipiuntur, derafoq; capiti, uniuerso im-
ponitur. Mulier quædam in hemicranicis sequenti usa epithe-
mate, omnium ferè per ora claritate nominis uolitaui. Radi-
cem cucumeris syluestris uiridem in tenues portiones dissecas,
pariter et absinthium in hydrelæo, donec tabesceret, decoxit,
& hydrelæo quidem calido mediocriter partem affectam in-
spersit: radicem uerò cum absinthio in pollinè redactam, empla-
stri more imposuit: quo solò medicaminis præsidio, omnem he-
micraniā siue cum febre, siue absq; febre, curauit. Quod si ex-
acerbatio adeò magna superuenerit, ut nequeat tolerare dolo-
rem, utere his quæ lenire, & excrementa infestantia euocare
possunt. Cuius generis est quod proximè dicetur.

Vnguentum pro cephalæa.

Liquoris peucedani drachmæ sedecim, lachrymæ papaue-
ris, anisi, alterci, croci, myrrhæ, scāmonia singulorum drach-
mas duas aceto excipe, & in pastillos redige. Cum usus uene-
rit, cum aceto aut posca, his qui crassis humoribus aut flatulen-
tis spiritibus dolorē adscribunt, illinito. Et dropace cōsimiliter
unguento, & sinapismo utendum, quiq; è thapsia constituitur
I 5 orbiculo.

orbiculo. Pastillus præterea ex atramento scriptorio perad-
mirandum in hac causa habetur remedium: quo post hæc om-
nia, quemadmodum infra in opere de cõpositis dicitur, utẽdum
est. quin & illud admiratione dignum, in illis qui dimidia ca-
pitis parte propter crassum & uiscidum humorem dolitant:
Euphorbij partẽ unam, & castorij tantundem aqua excipito,
& in aurẽ affectæ partis indito: ad hæc balneum ingredi præ-
cipito: neq; longa in eo mora facta, ipsum assumant, & solito
more lauabunt, eo quippe modo probatũ experientia est. Neq;
alienum sit, oleo eadem subacta auribus instillare: et quod ad
ischiadicos inscribitur medicamentum, etiam diuturna cepha-
lalgia & hemicrania implicitos ex toto liberat.

Ad hemicraniam ueterem.

Allij drach. quatuor, ceræ duæ: axungie ueteris, cantha-
ridum, singulorum drach. duæ. Vesperis emplastri more impo-
situm, per noctem adhærere finito: mane uerò disrupta pustula,
parygro appellato medetor. Aliud: Baccarum lauri corti-
ce exutarũ drac. duas, foliorũ rutæ tantundem, sinapis drach-
mam, aqua maceratas cataplasmatis modo illinito. Hoc uerò
his qui ex frigida occasione confluantur, utilissimũ est, aded
ut semel modò illitũ sub balneum, cõfestim medeatur affectui,
ita quidem, ut à lauacro integræ sospitati restituat. Olei saba-
ni libra, ceræ uncias tres, euphorbij unciam, quo dimidiatam
frontis partem, secundum tempora uidelicet ubi musculi sunt,
illinito. In quibus uerò non multa frigiditas exuperat, gallæ
& crocomagmatis æquales partes uino leuigatas inunge. Sed
quibus calidi uapores humores'ue capitis dolorem inferunt,
his medicamenta ex euphorbio non offeras.

Apophlegmatismus contra cephalæam.

Succi sinapeos, aceto & melle triti uncias quartuordecim,
herbæ pedicularis drach. quatuor, pyrethri tantundẽ: cõtusa,
cribroq; excussa, mixtaq; in sole gargarizato. Quod si ex bi-
liosio humore aut intemperie quadã capitis dolor diutius pe-
rennaue-

rennauerit, ijs quæ mox de cephalalgia præscripsimus, utendum. Si dolor ne his quidem auxilijs elidatur, neq; cucurbitulis, neq; hirudinibus adplicatis, uisa per arterias facta fluxus distributione, non absurdum fuerit etiam post aures sectione arteriarum uti. Humidioribus uerò, balnea quoque naturalia magna utilitate adhibentur.

De agitatione mentis, siue phrenitide. Cap. 6.

Phrenitis, pāniculorum cerebri inflammatio, nunc quidem ipso cerebro pariter inflāmato, nunc uerò præter naturā caloris excessu in ipso existēte. Causa autem mali, uel sanguis exuperans, uel flauæ bilis humor existit: quādoq; flaua etiam bilis nimium torrefacta, iamq; in nigrorem tendens, unde grauiſſima phrenitis oritur. Nōnunquam cerebrū diaphragmati consortij lege condoleſcens, ex disseminatis in ipsum neruis afflictionem cōtrahit. Si uerò per summos urentiſſimarū febrium uigores, uel stomachi consortio, mentis alienatio accidit, non phrenitis, sed delirium modò hoc est. Comitatur autem peculiariter phreneticos magna quidē ex parte peruigiliū, nōnunquam turbulentus etiā somnus, ita ut exurgāt, exilient, & ceu furore perciti uociferentur. Cum risu quidē hi, qui ob sanguineū humorē præpollentem: cum temeritate uerò, qui propter flauam bilem insaniunt. Quemadmodū ij qui atra bile uitium contraxerūt, immaniter et incohibiliter efferuntur, obliuiscunturq; omnium eorum quæ dixerunt & fecerunt, oculos sanguinolentos præferunt, & subinde lancinant, nūc quidem squallescentes, nunc uerò illachrymantes, et lippitudine cæcuentes. Redditur lingua asperior, ex naribus sanguinis profluvia oriuntur, & floccos auellūt, & festucas colligunt, & per omnem morbi curriculum acutè febriunt, febre in profunditate malignius latente: pulsus paruos et obscuros habēt, cum quadam etiā duritie coniunctos: accedit respiratio magna & rara, cerebro primogenia affectione laborante. Si uerò per consensum diaphragmatis rationis error oriatur, respiratio erit

erit inæqualis, conuelluntur sursum præcordia, et calore multo æstuat. Veluti cum phrenitis cerebri uitio cõcitatur ardor, ruborq; subcruentus in facie cum uenarum extuberantia elucet. Quod si bili pituitosus humor contemperetur, ut causam mixtam id malum, sic et appellationem habet compositam: uigilem enim somnum (quod coma Græci dicunt) appellant. In uniuersum quidem, bilioso præpollente humore, uigil phrenitis fit: insaniunt enim eiusmodi uigilantes. Pituitoso contra superante, somno ueluti grauiori sopiuntur: ipsumq; hoc malum antiquiores Galeno medici, Catochon appellauerunt.

Curatio phrenitidis.

Si languentis uires permittunt, uenam in cubito confestim incidere, et copiosius detrabere expedit. Quod si delirans manum porrigere detrectet, aut licet hæc exerat, periculum sit, ne post euacuationem, iactata hinc inde præ furore manu, immodicam sanguinis effusionem incurrat, uenam in fronte secantes rectam, semel quod satis est, auferemus, clysteribusq; utemur ex oleo uel rosaceo cum cremore ptisanæ. Si uigilie superant, rosaceo aut oxyrhodino caput irrigato. Nonnunquam etiam capite prius aqua calida perfuso, medicamentum ex papauerum calycibus compositum propinabimus, nisi imbecilla uirtus prohibeat. Reliqua uero uigiliarum remedia, ex superioribus huc transferenda sunt. Decumbat autem languens in conclauis, tum luce tum temperie mediocriter disposito, et diuersis imaginum picturis uacuo, quoniam hæc detertere solent: in quod non nisi acceptissimi quidam necessary ingrediatur, qui laborantem non importunè interpellent, et nunc mansuetè consolentur, nunc austeriusculè corripiant. Principio aut alimentum mulsu esto: mox deinde cremor ptisanæ, et ex chondro sorbitiones, cum suauis aliquo potu: uerbi causa, apomelite uel hydorrhosato, aut aqua rosacea, aut rhodomelo, uel dulci hydromelo. Nam hydromelum, quod ex Cibra exiguis uasculis importatur uinosum, uitandum est, in huiusmodi plus uocamenti quam uinum excitans,

excitans, et maximè in capitis affectibus, et ante cōcoctionem. Lotum aqua panem exhibeamus. Intyba item, & lactucas elixas. Si immensus infestavit feruor, hæc cruda sunt exhibēda. Cucumeris item medulla, & peponis, & dorycnij, & consimilium. Aqua uerò gelida illis abstinendū, potissimè si septi trāsuerſi consortiū affectionis causam deprehendamus. Quòd si lotium, ut par est, ob dementiam retineatur, calentis hydrelæi rore pedinē atq; uesticā fouebimus. deinde & digitorū manus innixu loca prementes, proritabimus urinæ profluiū. Calido præterea oleo reliquam corporis molem ipsis decumbentibus perungemus. & ne sursum uersus agitentur, pro uirili cauendum: siquidē opulēti fuerint, ministrorum custodia obseruentur: sin autē inopes, uinculis constringantur. Inordinatus quippe motus uirtutem debilitat. Alia quoq; ratione iam antea fortē pedes uinculis excipiantur, et antispasmi causa contredentur. Si autem lōgior ac pertinax fuerit affectio, ab illis quæ soporem inducunt, coërcendi sunt. Admiscenda sunt autē quæ capiti adhibentur adspersginibus diaphoretica, succus uidelicet mentæ, aut serpylli, aut nepetæ, aut rutæ. Errhinis præterea tunc utendum, sed post septimanam. si uiscera inflammata fuerint, ex semine lini, & hordeacea farina, cum hydrelæo formato cataplasmate, mitigemus. Ad hæc cucurbitulas leues, aut concisa scalpello cute, tum ijs ipsis, tum ceruici ac spinæ imponamus. Si corpus squalidum et torridū uidetur, et adhuc febricitet, balineis quoq; ex aqua potabili et unctione largiori utendum. Vinum tenue nullarū fermè uiriū, uires recuperandi gratia propinandum: nullam ex ipso mentis alienationē, ut consentaneū est, oriturā sperantes. aut enim nō fit, quum adsit iam declinatio: aut iam facta facile desistit: aut remittēte morbo, gestationibus, & decenti uirium refectioe utendum. Cæterū mente capti ad se reuertentur, si ebrietatem, iram, ciborum corruptelam, atque præ alijs omnibus, æstus solis fugiant.

De

De inflammatione cerebri. Cap. 7.

Cerebrum inflammatione oppressum, in tumorem saepe ad-
 dedo attollitur, ut testæ commissuræ distendantur: dolor
 grauissimus & diuturnus, cibiq; uehemens fastidium siue an-
 gor comitatur, rubor multus in facie cum tumore laxo, oculi
 proterui, exerti, et caput turgidum euadunt. Vena sic affectis
 incidenda, uasa cubiti euacuanda, ex naribus & uasis sub lin-
 gua suis sanguis exhauriendus. Vtere porro ad capitis inflam-
 mationes, superfusionibus, cataplasmatibus item quæ tum hume-
 tandi, tum maturandi facultatem habent.

De erysipelate cerebri. Cap. 8.

Oritur etiam in cerebro erysipelas, cui obnoxius patitur eo-
 iusmodi: percipit cruciatum uniuerso capite, quasi in eo
 flamma exardescat, facies sub pallida frigescit, os inarescit.
 Ad hunc igitur modum habenti sanguinem detrahe, maxime
 de uenis linguae subditis, quoniam malum leuius reddit. Frigo-
 rificæ præterea facultatis remedia adhibe, quibus in alijs pa-
 riter ignitis cum inflammatione rubedinibus utimur.

De ueterno, qui lethargus Græcis dicitur. Cap. 9.

Lethargus, cum itidem rationalis uis quædam noxa sit, eun-
 dem quæ phrenitis locum, cerebrum inquæ, occupat: sed con-
 trariam habet materiâ, pituitam scilicet, humidiorē & frigi-
 diorem, cerebrum irrigantē. Comitatur autē ueternosos lenta
 quædā & ignaua febricula, non admodū mordax, cum dela-
 tionē in somnū profunda. Pulsus magni, rari, & undosi. Respi-
 ratio nimis rara & imbecillis, somniq; inuidium desiderium
 inaduosi, & marcore quodam languidi sunt, ægrè uocantibus
 respondent, obliuiosi, desipientes, oscitant crebrò, & ore ali-
 quandiu distento manent, quasi id claudere obliti. Deijciunt au-
 tem per aluū pleriq; humidiora, quibusdam uerò cōtrario mo-
 do uenter arefcit, lotiū iumentorū urinae similē reddunt. Non-
 nulli ex eis intremiscunt, & undiq; sudant. Cæterū Caros ex
 eadem lethargi materia proueniens, eo tantum ab illo disidet,
 quod

quoddam Carum febris uehementior præcedit, Lethargum sequitur: quodq; Carus alijs aliquod symptomatis superuenit, febrium puta exacerbationibus plerūq; & comitialibus, & contractionibus cerebri, nūc quidē fracta caluaria, nūc uerò membrana anteriorem cerebri uentriculū ambitu seruante oblata. Verū lethargus peculiarem quandam cōstitutionem habet.

Curatio lethargi.

Si uires ægri permittunt, etiam hic uena incidenda est: si non concedūt, acribus clysterijs utemur. Decumbat æger in ædibus amplis, et mediocrē lucis splendorem obtinentibus: caput olei imbre fouendū, cui adiectum sit castoreū. Neq; desunt, qui olei loco oxyrhodinū cū castorio usurpant, robur inde pariter & calorem capiti indentes. Reliquam uerò corporis molem, & præsertim extrema, oleo ueteri oblinentes, cum nitro tosto, aut pyrethro, aut pipere, aut grano Gnidio detergūt. Potest uerò quis & cerato ex his unā cum castorio cōfecto uti. Odoramenta præterea offeremus, thymum, aut origanum, aut pulegium aceto leuigatum. Os porro, & palati cælum, sinapi trito cum exiguo mellis, illinito: adhærentē glomeratamq; digitis pituitam eijcito. Quod si admiserint, & apophlegmatismo utitor ex oxymelite cū hyssopo, pulegio, aut origano, aut ipso etiam sinapi. Propinabis aliquid eorū quæ ocysimè transeunt, præsertim diospolitici quantū capit cochleariū unum cum posca. In diuturnis autē tremoribus exhibendū est castoreum scrupulorum duorū aut trium pondere. Vbi uerò humorum extiterit nimietas, neq; quicquā aliud prohibet, scammoniā unius scrupuli pōdere castoreo admiscebimus. Perseuerante uerò etiam dum affeetione, dera sum nouacula caput, salibus, milio, et consimilibus, lineo sacculo inditis, fouere expedit. Ad hæc sinapismis secundum caput, & his quæ sternutamentū proliciunt utendū: deinde cucurbitulæ occipitio sunt admouendæ, partim leues cum multa flāma, partim uerò incisa scalpello cute. Naturalium interim excretionum nunquam obliuisci conuenit.

tuna

tum iniectionibus, tum ijs quæ cient lotium. Irrigabis autē pedinē oleo rutaceo, aut Sicyonio, cū momento castorei. Crebrius uerò ut deglutiant admonendi sunt, calidæ aquæ dulcē aliquā potionē, præcipuē ex melle ori instillātes bombylio, angustii oris calyce. Et sicubi mediā quoq; regionē occupauerit aliqua inflāmatio, huic itidē adspersionibus et cataplasmatibus mesdendum. Naribus sinapi aceto leuigatū, aut castoreum combustum, admovento. Ptisanæ uescātur cremore, aut auenæ, aut aslicæ, cum aceto mulso, aut sale, aut pulegio, nunc quidē quotiē die, nunc uerò alternis diebus: post cibum uinculis stringātur, partes extremæ quamplurimū percellantur, cruraq; pungentur, pili nonnunquā uolentius excitentur euellendi. Iam femora & crura rubicunda medicamentis exulcerantibus facta, sepiusculē iuuant. Declinante uerò iam affectione, alterna subleuatione, reclinacioneq; gestationem uocant, utendū: atq; in balneū ducendi: refectrix deniq; educatio cōuenienter adhibenda.

De catotocho, aut peruigili comate. Cap. 10.

Iam in sermone de phrenitide habito, huius morbi rationem perstrinximus. Notas in uniuersum habet cum phrenitide ac lethargo aliquo modo cōmunes, sed pro exuperante materia uariantes. Priuatim uerò has obtinet: Opprimitur ac decumbit laborans supinus, protensus, facie interdū subtumescēte & mediocriter pallida, lethargicis persimili: quādoq; uerò & rubor in ipsorū uultu efflorescit, & sursum uersus palpebra superior conuelli uidetur, & ita extare, ut nequeant conuiuere: nulla apparet respiratio, sed æger tanquā extinctus iacet, paruum atq; obscurū retinet arteriarum pulsus, & uehementer crebrum: urinae & alui cohibentur, uel exiguē redduntur. Qui meliusculē habet, liquorē per fauces infusum deglutit: qui uerò malo succumbunt, regurgitando per nares reijciunt. Quum igitur pituita bilē superat, à lethargicis eo seeparatur, quod neq; tumet facies, neq; liuida cernitur, quemadmodum lethargici, nisi quod paulatim leuiq; sudore diffluunt.

Grauiore

Grauiore in periculo sunt, qui uigilijs continenter defatigantur, si lotia non procedunt, & suspiriū interruptū intenditur, sudor erumpit, haustuq; ipso potus in nares ebullit & regurgitat. Quod si mulier hoc malo cōflictabitur, ab ea quæ uterina suffocationi obnoxia est, hac nota discernetur, quod secundum naturā uideatur iacere, & ea quæ dicuntur percipere, et nunc exurgere, nunc denuo graui somno recumbere. Est ubi diuersum à uigili comate catochon tradunt, non compositā, sed simplicem quandam causam habentem: frigidiorē quippe et aridiorē materiā, quæ posteriore cerebri sinu obturato, affectionem hanc effecerit, qua subito deprehensus, in eodē habitu in quo correptus est, permanet: uerbi causa, stans, aut sedens, clausis oculis, aut respiciens. quapropter uetustiores Græci catochos, catechomenos (id est, occupatos & deprehensos) in eo malo constitutos nuncupauerunt. Recentiores uerò catochin & catalipsin, quasi detentionē et deprehensionē dicat aliquis, nominauerunt. Curatio persimilis quidem prædictis est, symptomatum uerò discrimina diuersis auxilijs indigent.

Curatio catochi.

In hoc quoq; somni marcore sanguinē detrabere expedit, potissimum in quibus facies rubicundior existit, uirtute corporis permittente: aut clysteribus utendū, nunc quidem pituitanum modum naturæ excedentē elicientibus, nunc uerò bilem redundantē placantibus. Pari modo aliorum quoq; præsidiorum ratione utendū, eodemq; modo ægrum nutrire, nunc diebus quidem singulis, nunc uerò alternis, conuenit. Affectus uerò ualde periculosus est, si ex aliquo cibi aut potus errore contingit. qui ut uomant, protinus cogēdi sunt, & cōtradiori uicinus ratione compescendi, alius irritetur, uiscera superfusionibus ex cymino aut ruta irrigentur. Cæterū qui ex temulentia id mali contraxerunt, ijs ebrietate discussa, humidiori alimēto succurrendum, cuius generis ptisanæ cremor cēsetur. caput ad hæc conuenientibus illinitionibus humectandū: æstate quidē, frigidis

K

hyeme

hyeme uerò tepidis. Si crapula non soluatur, neq; ad sobrietatem reuertantur, deplorata uoletudinis ægro manus admo- uenda non est.

De memoriæ iactura, & ratiocinationis labe, Caro
& Morosi. Cap. II.

N Ascitur quādoq; memoriæ abolitio priuatim, quandoq; fa- cultate rationali simul uiolata: quemadmodū et mentis seu ratiocinatricis animæ offēsa primò per se cōtingit, deinde for- titur memoriæ iacturā comitē. Verūm utraq; mētis scilicet & memoriæ, parte malè affecta, morosis, id est, fatuitas creatur. Obtinēt uerò cōmunem ex malo tēperamento illic existente, causam. Quod ubi uerū modò fuerit, memoriæ et ratiocinatio- nis noxam, torporesq; & grauiores somni impetus (quas cata- phoras appellitāt) et altos deniq; prolixosq; somnos inducit. At si humori frigus quoq; accesserit, nō tam caros, id est, sopor- es, quā lethargū inuebit. Non dissimili etiā modo cum sola affuerit ariditas, uigilias tantū: si uerò ariditati accesserit fer- uor, deliria & phrenitides cōciliat. Cæterū mala hæc tēpera- menta nūc quidē in humoribus, nūc uerò in cerebri cauernis, aut ipsius uasis, aut in humiditate inspersa, aut in ipsomet cere- bri corpore, aut temporū musculis huiusmodi quid patientibus oboriūtur. Si quādo uerò humores cū ipsis cōmiscentur, parē quoq; affectū asserūt. sed simplex ne an cōmixtum efficiēs tē- peramentū sit, ex recrementorū specie facile deprehēdes. Cæ- terū memoriæ & ratiocinationis iacturā frigoris esse pro- lem nō ignoramus: an uerò cum humiditate uel ariditate iūcta cōtigerit, id quidē ex egestionib. laborātis habitu, tēperamen- to, uicinis ratione, tempore anni, ac regione datur cognoscere.

Curatio

Si frigida fuerit intēperies, calfacienda est contrarijs: si hu- miditas accesserit, etiā siccanda: si cōtrā ariditas cōiuncta sit, humectare pariter & calfacere conuenit. Eodē etiā modo ubi calida distemperatura, refrigerandū: si ariditas accesserit, hu- medandum: si humiditas, tam refrigerare, quā arefacere
condu-

conducit. In quibus uerò sanguinem plus iusto abundare comperies, uenam incidere, uel clysteribus acerbis uti, deinde hieram propinare, tum apophlegmatismos usurpare oportet. Circumlinitiones porrò capitis ax oleo, frigorificis & exiccantibus rebus adiectis, rosas inquam, myrto, lentisco, & huius farinæ cæteris conferunt. Vniuerso etiam corpori cōsulendum. Quod si ex feruore et lassitudine scaturit, caput aceto rosaceo perfundatur. Et reliqua curandi ratio, in alijs cum esculentis, tum poculentis, infrigidandi humectandiq; naturā habeat. Si Carus Morosi, aut obliuioni superuenerit, huic quoq; prospiciendum, quemadmodum antè de lethargicis tradidimus, ubi eorum etiam discrimen ob oculos expositum est.

De uertiginosis. Cap. 12.

Accidit affectio uertiginosa, cum cerebrum gelidus glutinosusq; humor occupat: unde ea correpti, etiā leui de causa facile cōcidunt. ut si quando extrinsecus circumagi aliqua, uerbè gratia rotas, uortices, turbines uel cōspexerint, uel si ipsi quoq; in gyrū uertantur: interdū uerò cum capite incalescunt, cōmotis in eo humoribus, aut etiā spiritu. Nōnunquā uerò coarctatis in angustū anterioribus cerebri cauernis, perforatu cranij ruptis, ex quibus sanè uehemētissimi cruciatus oriuntur. Præcedit autem primigeniā affectionem, capitis dolor uiolentus, caros, sonores & sibila aurium. Læduntur nonnulli quidem odoratu, aliqui uerò gustu: quibus uerò per consensum oris uentriculū uertigo accidit, cardiognus hos & nausæ consequuntur.

Curatio.

Vertiginosi in accessione quidē concinnis odoramentis, frictionibus, ac alijs cōsimilib. excitādi sunt. In relaxatione uerò discutiedæ affectionis gratia, sanguis ante omnia detrahendus, deinde hiera purgandū. Interposito tēporis spacio, clystere acriori utendum, ex cētaurij aut colocynthidos decocto. Post huiusmodi inanitiones caput cucurbitulis occipitio adglutinatīs, incisa cute salpello laniabitur: post hæc apophlegmatismis &

sternutamentis utendum. Quos uerò calor capitis & aurium tinnitus molestat, ueluti cum uapores calidi per arterias ascendant, etiam arteriarum post aures incisio adhibenda est, ut de Chirurgicis exequemur.

De morbo comitiali. Cap. 13.

Comitialis morbus, cum totius corporis conuulsio sit, non sine principum animæ functionū offensa, partim in ipsa quidem cerebri substantia, partim uerò in ipsius uentriculis omnibus cōsistentem habet causam, nunc quidē pituitosum, nunc uerò melancholicum humorem. Quin & ex ostio uentriculi affecto per consensum nascitur, quemadmodū in Colicis, ceu in sermone qui de illis habetur, explicabimus. Vel certē ex aliarum etiā partium cōmunicatione, cum aura quædam frigida ad cerebrū effertur: interim à cruribus, interim à manus digitis oboritur. Visus est nonnunquā & à locellis in quadam muliercula, tēpore quo uterum gerebat, prouenisse: post partum uerò cessauit. Accidit affectus iste potissimū pueris, eisq; recēter in lucem editis: post hos adolescentibus & adultis, minimē uerò senibus & decrepitis. Præcedit igitur epilepticos, corporis et animæ status quidā inuolūtarius, mcestitia, familiarium, aut eorum quæ auscultauerunt, obliuio, insomniorū imagines turbulētæ, dolor capitis, & continuata eiusdē repletio, ex iracundia maximē, pallor itē faciei, & inordinatus linguæ motus: nec desunt qui eam cōmordent. Qui stomachi uitio comitiali cōfluantur, hos tremor ipsius præcedit, fluctuatioq; et erosio: ieiunijsq; seu tarda cibi assumptione exacerbantur: imminente uerò symptomate, subitō concidunt, cōuelluntur, & obscure interdū & indiscretē uociferantur. Præcipuum uerò illorum indicium est, oris spuma, cum cætera cōmuniter quodammodo & alyis morbis eueniant. Quibusdam uerò præter uoluntatem cum lotium, tum oletulū excernitur. Nec desunt, quibus & genitale semen. In quibus itaq; morbus acutissimus est, protinus interficit continuitate exacerbationum, & eorum quæ
super

superueniunt uehementia. Cæterum magna ex parte longus est: ideoq; si nō in pubertate, aut mulierū expurgationum, aut conceptus tēpore cessauerit, aut si post hoc tempus inuasit, plerunq; ad mortis usq; diem comitatur, nisi per accommoda remedia fuerit natus. Arguit autē comitali correptos, ex bitumine, aut gagate lapide, aut cornu caprino suffitus: comestum item tetur hircinum, aut iocinoris assi nidor.

Curatio morbi comitalis.

Si comitali implicitus infans adhuc fuerit, nihil satagere conuenit: ætate namq; usq; in statum biliosiorē & aridiorem uergente, uictusq; frugalioris usu, sua sponte plerunq; affectio cessat. Oportet autē infantulorum & lactescentiū uictus duntaxat rationē obseruare. Qui post primam pueritiæ ætatem incidunt in epilepsiā, eorum conuulsas & distortas corporis partes pingui irrigare, constringere, & in rectū redigere, deinde ori diducto, digitū aut pinnā oleo irino imbutā inserere ad detrahendā pituitam, consilium est. Sensus odoramenti ad hęc excitandus est: uerbi causa, peucedano, cyrenēsi succo, bitumine, & pice cedrica. Post acceßiones uerō (nisi quid prohibeat) sanguis è cubito mittendus est. Acceßione uerō nihil remittente, extremas corporis partes sinapismo obline, cucurbitulamq; præcordijs applica. Quod si hæc nulla comitetur intermissio, minima salutis spes est. Confidenter tamen medicus castorium ori uim faciens infundat, & liquorem cyrenaicum, cum melle & aceto: per sedē decoctum centaury uel colocynthidos immittet. Exurgentes uerō à comitali paroxysmo, refeito uirium robore, purgatione hieræ euacuari debent. Hęc utiq; recētis & acuti comitalis medela est: deinceps uerō quæ ad arcendum inueteratum morbū faciunt, trademus. Affecti igitur potu aquæ quàm diutissimè continendi sunt. Exorsi curationē à sectione uenarū, si nihil debortetur: interpositis quatuor aut quinque diebus, corpusculū reficiemus, ac tum medicamento purgante euacuemus, maximè ueratro nigro, aut colo-

K 3 cynthide,

cynthide, uel certè scammonia. Oportet autē ueratrum absq;
 medulla cōtūsum, & per subcerniculū traiectū mulsæ cyathis
 quinīs aut senīs inspargere, uel melle discocto cū exiguo pipe
 re excipere. Colocynthida uerò, semine abiecto, interiore fara
 cu seruato, passo implere, & solidā noctē macerari: matutina
 uerò diluculo appetēte, passum à colocynthide tollere, & pro
 pinare. Aut ex cādido ueratro medicamentū purgās usurpan
 dum. Est autē id eiusmodi: Baccarū lauri decorticatarū, pipe
 ris albi, alypiadis, euphorbij, ueratri albi, uniuscuiusq; drach.
 octo, hæc quidē exhibebis una dosi cū passo, quod in colocyn
 thide pnoctauit, pulchrè quidē euacuat per uomitū. Satis uerò
 purgati, lauādi sunt: tertio uerò die cucurbitulæ præcordijs
 & scapulis, concisa scalpello cute, sunt imponendæ. Post hæc
 plusculis aliquot diebus interiectis, corpusculo rursus recreato
 hiera ex cucurbita syluestri alius sollicitanda est. Quibus per
 actis, cucurbitulæ capiti & occipitio defigētur. Sequēti uerò
 die, laboranti panis mulsæ decoctus & cōtritū cū amygdalis
 amarīs, aut serpillō, aut mēta, aut nepeta, ruthāue, catapla
 smatis instar applicādus: id per tridū cōtinuè agendum. Post
 hæc tōdi caput, et peucedani succo cū aceto diluto, in quo spon
 dylum sit elixū, perungi debet. Rursus spacio interposito, et
 corpore refecto, antidoti è colocynthide obolos nouē in aqua
 mulsæ corrigito: & interpositis iterū diebus, exhibe antidoti
 obolos tres, mox inde pharmacis quæ sternutamenta ciēt, ute
 re. Post quinq; aut decē dies, castoreū in mulso propina. Quie
 te denuō intercalata, alius clystere ex cētaurij & colocynthi
 dis decocto eluēda est: rursus deinde hierā suppedita, & apo
 phlegmatismis deinceps, & purgātibus per nares, ad hæc si
 napismo qui capiti inducatur, cibis item acrioribus tēpestiuè
 utendū. Cōfert his quoq; oxymel scylliticū quotidie epotū: atq;
 mel in quo scylla sit liquefacta, mēsurā cochlearij. Viā por
 rō ratio illis expedit, quæ incidēdi extenuandiq; facultatē ha
 bet. Proinde & capparis assiduè cōmansus, & salsamentum
 conducunt.

LIBER TERTIVS.

151

cōducunt. Abstīnēdū uerò à carnib. legumīnib. et uīno immodi-
co, à uenere itē immoderata, balneisq; et sinapi, potuq; cōfestim
à balneo, potissimū meri. Vtēdū uerò exercitijs et fricationib.
quæ post omnes corporis partes, capiti quoq; abibendæ sunt.

De iis qui stomachi consensu comitialiter concidunt.

Quòd si primarius stomachi affectus comitalem inuexerit,
ut probè cōcoquat, ægrotātī sollicitius prospiciendū est. Ad ho-
rā igitur tertiā panis accuratè præparatus, ex uīno assumen-
dus diluto, modicè adstringēte, et albo. Exhibebimus itē medi-
camentū ex aloë, bis aut ter quolibet anno. Noui quādoq; pue-
rum (inquit Galenus) nunquam sanè postea comitali morbo
conflictatū, quādiu radicē glycydis (quā pæoniā nuncupat)
magnā et recentē collo suspēsam gestauerat. Præterea et aga-
ricum eo morbo oppressis subuenit, seseliq; ac spodylij itū semē,
tum etiā radix. Necnō et aristolochia rotūda cū aqua sumpta.
Opitulatur autē magnificè crurū scarificationū giter adhibita.

De iis qui alicuius membri uitio comitali uexantur.

Ingruēte iam symptōmate, cū sentiunt ab aliqua particula
siue pes uel manus sit, excitari, oportet laqueo brachiū aut ti-
biā fortiter ligare. Inclīnāte autē morbo, à lassitudine uindi-
care, adurens aliquod medicamētū affectæ parti inducētes: cu-
ius farine lepidiū est, aut quod ex cātharidibus cōsarcinatur,
et id genus. Iulianiū porro oxymel in ea affectione cōstitutis
præsentissimā opem adfert, particulatim emolliēs materiam.
Post omnia autē quæ recensuimus, theriaca quoq; et sponte
emergētia lauacra locū habent. Per uniuersum uerò uitæ spa-
cium à cruditate cauendū est sum mōpere, et ne cibus ante con-
coctionem alius superingeratur, crassi item succi edulia. Vitēt
tardū cibationē, cōmotionem corporis turbulentā, crapulā, et
potu (ut diximis) cōfestim à balneo, præcipuè meracū, uinum
ualde uctulū et crassæ substantiæ: acrida, et uebementer odora-
ta, quæ caput infarciunt, fixis oculis ex alto dispicere, diutis-
simam in balneo moram, et capitis ob insolatum exustionem.

K 4 De

Melancholia, alienatio quædam mentis est sine febre, quæ ex melancholico humore intellectus sedē occupante, magna ex parte prouenit, nunc ipsomet cerebro per se affecto, nunc uniuersi corporis lege cōsortij cōmutato. Et tertia quædam melancholiæ species est, quæ flatuosa hypochondriacâ; à præcordijs nuncupatur, ex inflammatione præcordiorū circa stomachū oboriens, quæ nunc quidem auras quaspiā uitiosas, nūc uerò essentiæ humoris partem ad caput sursum transmittunt. Communes omnium notæ sunt, terror, animi mœror, hominum odiū. Sunt qui sese animalia quædā bruta autumēt, & emulantur uoces eorū: alij uerò uasa testacea, & ne frangantur, expauescunt. Alij mortis desiderio tenentur: quidam mortis formidine torquentur. Aliqui perpetuò ridet: aliqui cum fletu lugent. Nōnulli incitari se maiore quodam numine uidentur, uaticinanturq; futura, haud aliter quàm diuinaculi & numine afflati, quos entheasticos Græci priuatim appellitant. Peculiares autem notæ sunt, eorum qui per consensum totius corporis melancholia cōfliâtur: Gracilitas corporis, nigredo, hirtitudo, & nihil aliud esse quàm melancholicū, siue natura, siue ex aduētitiō fuerit, puta per quasdā solitudines, uel uigilias, uel uitiosi succi eduliorū assumptionē, uel hæmorrhoidum uel muliebrium mēstrum retentionem. Sed qui in eam affectionem præcordiorū uitio incidunt, eos cruditates, acidæ ruetationes, feruor, & ipsorum grauitas, arguunt, et quod hypochondrium sursum conuellitur, & nonnunquā phlegmone ætatur: quodq; circa exordium, deinde uerò his aduētis, atræ bilis comitâur symptomata, quæ utiq; cōcoctionibus, aut excretionibus, aut flatibus multis, aut uomitionibus, aut ruetibus leuâur. Nullo uerò horum, aut paucissimis ex illis apparentibus, melancholica quæ apparent signa, cerebrum per se atræ bilis humore affici testantur. Si quando uerò flauæ bilis plus æquo assatæ, in atram facta fuerit permutatio, mania, id est,

id est, furiosam dementia[m] inferet, in qua ferocius ferarum more scēiunt, ut eos qui incauti[us] circa ipsos accesserint, uio- lenta manu uapulēt, aut interficiant.

Curatio melancholiæ.

Primigenio igitur cerebri affectu melancholicis, lauacris frequentibus, uictu boni succi & humedante, cum opportuna animi uoluptate, citra alterius præsidiij opem medetur, quādo humor infestans temporis diuturnitate nondū euacuationi resistit: tunc enim potentiora, magisq[ue] uaria adhibere oportet remedium auxilia. Purgandi itaq[ue] sunt principio epithymo, aut aloë. Horum quippe uel momentū unaquaq[ue] die sumptum, plurimum opitulatur, clemēterq[ue] aliu[m] subducit. Postquā purgatus fuerit, sicut cōprehensum est, absinthium præbeto, nunc herbam in aquæ duorum cyathorum mensura maceratam et elixatā, nunc uerò eius succi drachmā mediam cum aqua assidue liquefactā. Aceti quā acerrimi momentū sorbitioni sub somnum porrigitur, ex quo multa obsonia madefacta manducant. Satius uerò fuerit, aceto scyllā permiscere, & polium, et tenuem aristolochiā. Quum uerò inchoante morbo ad curationem accesseris, qui ex lege consortij totius, ut dictū est, corporis sit, constante uiriū robore, omnino à sanguinis detractio[n]e auspicandū est. A' uenæ incisione, recreatū per inferna medicamento, ex colocynthide aut helleboro nigro purgare conuenit. Oraq[ue] hæmorrhoidū aperire, & muliebres purgationes ciere, si propter harum suppressionem affectio cōflata fuerit. Probantur etiā remedia cum quæ urinam proritant, tum quæ per sudores purgāt. At si è præcordiorū uitio hæc passio cōstiterit, etiam horū curam habere conuenit, fouendaq[ue] eadem decocto rutæ, anethi, absinthij, pulegij, seminis uiticis, & baccharum lauri superfuso: nam hæc dolores mitigant, & flatu communiunt. Coquātur autē in oleo, & cataplasmat[is] modo imponantur: sed horum cataplasmata, etiā ea quæ flatu dissipant, apium, aut anisum, aut cyminum habeant: neq[ue] malū, si

cyperus, iris, & libanotis, cataplasmatibus injiciantur. Haec autem diutius interdum etiam siue comederit, siue ieiunus sit, permaneant: quumque ea detraxeris, uelamentum aliud latum ex lana super applicato. Cucurbitulis porro oportet, ad discutiedos spiritus, leuibus uti: aduersus uero dolores & inflammationes, cum scarificatione. Si cum medicina diligentiam coniunctam uis, noli sinapis obliuisci. Vtere ad haec acribus, exterendi facultate praeditis, & dropacibus dorso tenus, & super uentrem. Si uitium in uetustate incidit, praesentissimum est praesidium, quae cum ueratro per uomitiones fit purgatio. Viduus insuper cunctis boni succi, & modice humectans conuenit. Vitare debent carnes bubulas, atque ceruinis, lentes, & brassicas, cochleas, uina crassa et nigra, et quaecumque, uno uerbo, atram bilem pariunt.

Curatio maniae, siue furiosae dementiae.

Mania laborantibus perinde atque melancholicis succurritur. Priuatim uero horum capiti rosaceum, & acetum rosarium adhibeantur: et picra antidoto, incisa prius uena, purgetur. Admouenda sunt etiam capiti hirudines. Potissimum autem auxiliatur ipsis erratici faeniculi radix, semenque ipsius ex aqua epotum, et bryoniae radice drach. cum aqua quotidie sumpta. Si uero ad potionem pharmacorum purgantium induci nequeant mentis inopes, admiscenda sunt ea clanculum, partim sane ferculis ipsorum, uerbi causa, buccellis, aut caricis, aut palmulis: partim etiam poculis adijcienda. Ante omnia uero uel in culcitra uinciendi sunt maniaci, ne male uel semetipsos, aut familiares quibus incidunt, afficiant: uel gestandi in lecticulo intra gygartum, hoc est cubile quoddam mente capitis consecratum, ex alto pensili.

De Phaunorum, incuborumque ludibriis, Graeci ephialten & epibolen nuncupant. Cap. 15.

Ephialten, quem nostri incubonem dicunt, alij a uiro nomen duxisse autumant, aut a phantasia, qua patientes aggredi se se ab aliquo imaginantur (ἐφ' ἄλλοθεν enim insilire alteri est, et inuadere.) Themison uero decimo Epistolarum uolumine, a suffocando nimirum pnigaliona, quod agrotantes praefocet, appellauit.

pellauit. Id mali potissimè crapulosus, et iugiter stomacho crudis euenit. Comitatur ista affectione possessos, difficilis motus, atq; torpidus per somniū sensus, ac praefocationis in mēte obuersatio, & ueluti ingruētis opprimētisq; alicuius occupatio. ita ut uociferatio supprimatur, aut uox obscura indiscretaq; edatur. Quidā inani phantasia ducti, etiā audire saepe eum qui se oppresserit, ac uenerē exigere credunt: sed eos digitis pectinatum coniundis, siue contractis, in pedes sese conyćere. Occurrendū itaq; malo accuratè statim inter primordia. Nā si multo procrastinatur tēpore, iugiter noctu inuadens, grauius aliquod malū denunciat: morbū attonitum, furiosam insanid, & morbū comitalē, quamprimū in caput uitij huius materia irrepserit. Quicunq; enim epileptici interdū, eadem noctu per quietē ephialtici patiuntur. Expedit igitur, secta prius uena, purgationibus uniuersum laborātis corpus euacuare. Egregiè autē præter cætera hoc malo detentis, ater belleborus drach. unius pōdere subuenit. Scāmonia admixtis obolis tribus, atq; bene fragratiū odoramētōrū aliquod, anisonēpe, dauco, petroselino. Quæ ex sicyonia cōficitur hiera, efficacius succurrit. Refertur autē hoc medicamētū ad Ruphū. Vidus tenuis esto, et flatu penitus carēs. Præsīdio erit ipsi patiēti pœonia semē. Quindecim autē grana eius nigra cū aqua idētidē propināda.

De Lycaone, aut Lycano. Lycanthropó ue. Cap. 16.

Qui lycanthropia correpti sunt, per noctē domo exilientes lupos per omnia imitātur, & quoad dilucescat, circa defunctorū monimēta plerūq; diuersantur. Notis uerò sequētib. eo morbo oppressū deprehēdes: perpallidi sunt, cernūt imbecilliter et obtuse, oculis aridis & lingua aridissima, nullā saluā expuūt, siti excruciantur. Tibiæ, quoniā frequēter impingūt, ita exulcerātur, ut curationē nō recipiāt. Hætenus indicia. Cognoscendū q. lycāthropia melācholiæ species est, cui circa tēpus accessionis morbi succurrēdū sanguinis usq; ad animi deliquiū detractione, educatione laborātis cū boni succi alimētis:

Lauacris

Lauacris dulcibus, deinde feri lactis per triduum usu, & purgatione hieræ & colocynthide bis aut ter repetita. A purgationibus uerò, ea quæ ex uiperis constituitur iberiaca, & cæteris quæ de melancholia memorauimus. Accedente iam morbo, solennibus soporiferis caput irrigandum, opioq; in somnum uersis, nares inungendæ.

De iis qui amore insaniunt. Cap. 17.

Cum amores solitudinibus curisq; constent, neutiquam absurdum fuerit, eos cerebri affectibus adnectere. Cura uerò animæ quoddam est affectio, in motu laborioso ratiocinatione occupata. Comites autem uesaniæ huius notæ habentur, oculi concaui, lachrymas nullas effundunt, sed uoluptate quasi perpetua perfusi apparent; palpebræ crebrò mouentur. Cæterisq; corporis partibus non collabantibus, soli illi amatoribus concidunt. Pulsus proprius amantium nullus est, quemadmodum autumauerunt quidam, sed qualis eorum qui solitudinibus multis sunt impliciti. Cæterum cum recordatio rei amata, uisu uel auditu, præcipue ex improviso subierit, tum protinus perculsa mente pulsus pariter commutatur, neq; naturalē & quabilitatem neq; ordinē seruat. Hos igitur mæstos & perui Giles, cum quidam dispositionem non satis pernoissent, uinculis, solitudine, tenuiq; uictus ratione cōsumpserunt. Ex quibus cordatiores, deprehensio amante, in lauacra, & comessatū, & gestationes, et spectacula, fabulasq; animū abducunt. Quibusdam terrorem incutere cōuenit. Qui amoris perpetuū uacant, malū indelebile efficiunt. Oportet igitur illis cōtentiones proponere quasdam eius generis, quod persecutus est antea quisque, prorsusq; ad alias solitudines mentem & cogitationem transferre.

De morbo attonito, quam apoplexiam Græci: & diminuta apoplexia, quam hemiplexiam, aut resolutione, quam paralyfin appellant. Cap. 18.

Quando communis neruorū origo afficitur, atq; inde unius Quersæ corporis partes sensu simul & motu spoliantur, morbus

morbus attonitus Romanis, Græcis apoplexia nominatur, principalibus animæ functionibus oblaſis. Si in alterutra capitis parte obſtrudtio fiat, hemiplagia atq; paralyſis nuncupatur. Si in alterius partis aliquā particulā incubuerit oblaſio, eius tantūmodo partis affectio dicetur. Crus itaq; inquit Hippocrates, ipſi apopleſion euaserat, pro eo quod erat reſolutum. Quocirca ſeruatur in attonitis exigua quādam reſpiratio: quæ ſi plurimū à naturali operatione reſceſſerit, ſummam eſſe affectionem arbitrare: ſi paululū, exiguā. Peſſima uerò eſt, quum intermittitur, uel magna etiā cum uiolētia trahitur. Fit autem affectio, gelida pituita ſemel & cōfertim principaliffimos cerebri ſinus infarciēte. Si quādo uniuerſum ſpinæ principium dicto modo conflidatur, omnes quæ ſub facie conſtitutæ ſunt partes, ipſa manente incolumi, reſoluūtur: eo quod partes quæ inibi habētur, cū ſenſationis, tum motionis uires cerebro acceptum referant. Si uerò ex medietate affligitur, illarum partium reſolutio conſtituitur. Vbi uerò odorādi facultas interit, uel anteriorum cerebri uentriculorū intemperie afflictorū, uel meatuum qui eiūsmodes à colando dicuntur, obturatorū, affectio eſt. Attoniti igitur procumbunt ſine uoce, ſine motu, citra ſenſum, & abſq; febre. Præcedit eam affectionē, capitis reſertinus et acutus dolor, puluini uenarū circa guttur (ſphagitides Græci appellant) turgentes, uertigines, tenebricoſa lucis obſcuritate oculis obuſante: oculorū incerti et diſcurrentes lucis ſplendores, frigus extremitatum abſq; cauſa, totius corporis tremor, difficilis motio, dentium in ſomno ſtridores, lotium quaſi rubiginofum, atrum, paucum, cum corpulentiore farine ſimili hypoftaſi. Bo morbo facilius tentantur circa ſenium, maxime pituitoſioris temperaturæ homines, & eiufdem naturæ uictus ratione utentes. Si quem in iuuentute atq; aſtuo tempore oppreſſerit, ſummam neceſſitatem arguit.

Apoplexiæ, & hemiplexiæ, paralyſis ue curatio:

Morbus apoplexiæ uel nullam, uel difficile admitit curationem,

tionem, mortē quippe minatur subitam. Si quo etiam medio elz-
ditur, cum paralyſi plerūq; partis alicuius corporis diſcedit.
In quibus itaq; ulla ſalutis ſpes eſt, iſ uena quāprimum incident-
da eſt: et ſi remiſſionē quandā adipiſcantur, eodem die, ſiue ſe-
quente ſanguen auferendū eſt. Alius quoq; acri clyſtere mu-
ria & melle mixtis ſubducēda. Deinde oleo copioſiore ſulphu-
rato uniuerſum corpus inungendū. Caput chamæmelino, uel
anethino oleo, in quo ſcilicet ſpōdylū aut nepeta fuerit elixa,
irrigandū. Muſſam præterea inſtillato, et quæ ingentē odoris
fluxū emittūt, naribus admoueto: Opoponaca ſcilicet, aut ſa-
gapenū, galbanū item, uel caſtorium. Oportet autē ori quoq;
uiolēter aperto, digitū aut pennā oleo madidum, ut ea quæ mo-
leſta ſunt, eiciantur, intus mittere: ſedē quoq; iſ quæ ſtatus ſub-
ducunt et diſcutiūt, oblinire. Potui aquā muſſam, ſiue oxymel
exhibere cōuenit. Vtemur etiā apophlegmatiſmi, è thymo uel
origano in aceto elixis. Vbi uerō malū remiſerit, mollē & fa-
cilis digeſtionis, ſucculentūq; cibū aſſumamus. Mutitate uerō
permanente, ſi per uirtutē integrū fuerit, cucurbitulā cum ſca-
rificatione ceruici applicemus. Si liceat, etiā præcordijs: dein-
de geſtentur biga, aut uehiculo, aut penſili culcitra. Vſurpāda
ſunt et ea quæ ſternutamentum proliciunt crebrius, neq; his e-
tiam minus apophlegmatiſmi. Poſt decimū uerō ac quartum
diē, ad reliquas geſtationes perducemus. Sermocinationis præ-
terea curā habere oportet: et peruetuſtum apomeli miniſtrabē-
mus cū micis uel alica: poſt hæc exhibēda eſt hiera quā min-
imū, à uiceſimo primo die in balneū ducētur: uinū tenerū calēti
aqua dilutū potioni datur. Vires inde balineis atq; illinitionib;
reſtituendæ ſunt. Perducātur, ſi fieri poteſt, in loca maritima.

Reſolutionis, quam pareſin nuncupant, curatio:

Quod ſi principalibus animæ functionibus illæſis, omnes
uel quædā corporis partes reſoluātur, etiā hic qui infeſtat hu-
mor, qualiſcūq; fuerit, euacuādus eſt. Mox hiera, quæ caſtorij
partem admixtā habeat, porrigito: à dimidio quidē drachmæ
auſpicans

LIBER TERTIVS.

159

aſſpicans, cum momento mellis & calida aqua dilutam, uel
 per ſe, et piperis dimidiato ſcrupulo adieſto: poſt hæc quatuor
 diebus interpoſitis, integrâ drach. exhibebimus: ab hoc ſeſqui
 drach. poſtremè duas ac tres, atq; tum rurſum totidem diebus
 intercalatis quatuor drachmæ ſunt offerendæ (ſi modò per lan-
 guentē liceat) addito mellis cochleario. Mēbris uerò medica-
 menta quæ diſcutiendi facultatē habeant, quæq; exaſperando
 cruentū ruborē cutis excitare poſſint, applicāda: quibus cum
 caſtoriū, aut piper, aut pyrethrū, aut ſemē roris marini, aut eu-
 phorbiū cōmiſceamus. Super hæc uerò embrochæ etiā pro-
 ſunt, quæ oleo rutaceo, aut ſicyonio, aut alioqui peruetuſto con-
 ſtant. Eſculēta cōueniunt frumētacea, & quæ ſorberi cōmodè
 poſſunt, aut aliàs nō difficilis cōcoſtionis, et ſuperuacaneis rea-
 trimētis exortia. Cucurbitulæ partibus reſolutis, ſi plures fue-
 rint, diuiſim: ſi pauca, uni adglutinētur. Poſt cucurbitulariū
 uſum, cataplaſmata ex pice, aut reſina, aut māna, illinito. Ex
 re autē & uſu fuerit, artemiſia elixa cum nepeta, conyla et ni-
 tro, aquæ tūtillo quæ elixādo cōſumetur, admixto. Alius deo
 nudū ſubducatur, uel cum aloë, uel polypodio, uel ſcāmonia, uel
 pulve ex colocynthide. Vnguēta itē proſunt ex oleo ueteri illia-
 ta, in quo ſcilla macerata dies quadraginta ſub ſole fuerit. Si
 huius copia non ſit, ſcillæ uncias duas in oleo coquito, atq; cir-
 cunlinito: aut ſemē roris marini cōſimiliter præparatū. admē-
 ſcēda uerò ceræ eſt uncia, ne diffluāt. Quòd ſi galbani quoq; et
 caſtorij, euphorbij, adarces, atq; nitri, ſingulorū ſemiunciam
 aſſūperit, multo efficacius in medēdo fuerit. Amuſſatim por-
 rō quadrabit et ranūculus herba oleo elixa, et inſolata. Cōdu-
 cūt potiones caſtorij drach. unius pōdere, et opopanacis fabæ
 inſtar deuoratum. Mirum quantum opis adferat etiam ſagape-
 num erui magnitudine in mulſa: caſtoriū pariter cum opopa-
 nace, ſuccoq; Cyrenaico, milij quantitate. Confert etiam quæ è
 tribus piperum generibus conſtat antidotus. Quin & caloria-
 ficis acopis apophlegmatismis q; poſt decimum & quartum
 diem,

diem, plenioribus cibis utemur. Pluſculo iam auxilij cōcilia-
to, balneo credemus. Poſt triceſimū diem dropace quoq; uten-
dum, atq; lauandū, deinde ſinapi emplaſtri modo inducēdum,
in his in quibus motus atq; ſenſus perijt. Aduertentes tamen, ne
(quoniā uſtionē non ſentiūt) pluſ ſatis perurantur. Hiſ uerō
qui ſenſu minimē deſtituūtur, cuiē cruciatare dūtaxat cōuenit
poſt tumorē inducū, in balneū deducere, et cerotiſ molli-
bus deri. A cœna uomitione, uel radícula citata utātur. Geſtatio-
nibus itē ſellæ, uel plaſtri manualiſ, aut rhedæ. Reliquo uerō
tēpore in naturalia lauacra deducātur. Magna poſtremo cum
utilitate uicūſ ſiccior, potioniſ frugalitas, atq; fricatio adhi-
betur. Epuliſ itaq; ſiccis uſcātur, ſitiſ pro uirib; tolerantēſ.

De iis qui laxatione aut extensione reſoluti ſunt.

Quoniam autē artuſ reſolutionē experti uel conuelluntur,
uel relaxantur, idq; interdū plenitate, interdū uerō uacuitate,
ruſſum attendendū eſt, partim ſanguinem eſſe detrahendum,
partim uerō minimē. Deinde in partib; quidē relaxatiſ, reme-
diſ laxantib; ea quæ aſtringunt miſceto. In contrariſ, rela-
xantib; ſolummodo utendū, cum perfrictione molli. Comple-
ctatur autē oleum, quod relaxatiſ adhibetur, nitri contriti, ſe-
ciſq; uini crematæ paululū. Fotuſ erunt ex aqua admodum ca-
lida, præcipuē marina: in qua elixentur lauri, uel agni germi-
na, aut ſamproſychum, uel aliud quiddā eiufmodi. Aeſtuo uerō
tēpore in mari natationeſ, et ſummæ cutiſ exaſperationeſ, uel
in primis conferunt. Vapulent itaq; parteſ afflicte feruliſ,
aut ramuliſ urticæ. ſi reſolutio perſeueret, oportet flacceſcen-
tem ac reſolutā inter articuloſ carneſ attractam comburere,
transfigenteſ candentibuſ ferriſ exilib; et tenuib;: ſed con-
tractiſ partib; dropacem continuō ſuperaccommodare.

De ea quæ in unoquoq; membro conſiſtit reſolutione.

Quæ diſſectiſ neruiſ accidit pareſiſ, nullo medicamine uin-
citur. Sed quam intemperantia, aut humor aliquiſ cōciliauit,
huic in genere quidē facultatib; prædictiſ ſuccurritur. Sunt
uerō

uerò peculiares quædam singulis ipsorum, quas subnectemus, medelæ. In his igitur qui canina cōuulsione raptu'ue impetuntur, per phorceā instrumentum quod uocāt, ex æquo in diuersum deduces. Sanguinē q̄; ex subiectis linguæ uasis detractio competit. Cucurbitulæ item circa priorem dorſi uertebra adæ glutinatæ, atq; apophlegmatismi. & per nariū infundibulum faciæ purgationes cōferunt. Sciendum igitur est, nō eam quæ diuicasse uidetur mandibulam, resolutionē expertam, sed oppositam. In gluuie uerò uulsa paresi, cucurbitulæ mēto sunt designandæ. Utendum præterea, quæ castoreo, sagapeno, et succo Parthico cōstant, illit ionibus. Confert etiam gargarismus ex rebus acribus. Lingua porrò paresi infestata, uenæ ipsius secādæ sunt cucurbitulæ mento apponendæ, utendum apophlegmatismis ex sinapi, & exercitationibus linguæ. Vocalibus uerò instrumentis resolutionem expertis, thoraci afferenda sunt præsidia, spirationis suppressione, exclamatione q̄; utendum. In superciliorum uerò paralyſi, palpebrarum inundationes pariter cōducunt: prodest etiam cōsutio. Vesica autem resoluta, siue lotium cohibeatur, siue citra uoluntatem excludatur, pedini est tauro medicamento adhibenda sunt. Sedi uerò oleum rutaceum, aut sicyonium, adiecto butyro et castorio, aut galbano, aut opopanace, aut lasere infundendum: quæ quidem per colem uesicæ immissa, plurimum opis contulerunt, aut sola etiam suffecerunt. E' centaurio præterea et colocynthide clysteres cum sicyonio intestinis non inutiles sunt. Profunt item pharmaca quæ lotiū proritandi facultatem obtinent. epota et castorium consimiliter: sed ante omnia, ijs qui nihil lotij emittunt, id per siphonculos uesicarios (quos catheteras Græci uocant) elicendum est. Balneis porrò relaxantibus insidendū, et cataplasmatibus inde confectis utendū. Si uerò præter uoluntatem lotium excernitur, cum roborantibus præsijs adstringendū, alimenta arida, et potus gelidos usurpandum. Quum instaurantur, rubores in summa cute cōcitare, & naturalibus balneis frigidis

L

utē

uti conuenit. Resolutio uerò spinæ ob uulnus, aut casum, aut luxationem uertebrae, lethalibus symptomatis confluentibus nullo remedio eliditur. Quòd si penis resolutus est, iisdem quæ ad uescicam pertinent, utendū. In iisdem partibus atq; lūbis, etiā ijs quæ intendendi uim obtinēt, utemur. Improbatur lac, caseus, & reliqua bellaria, lactucæ cū cæteris oleribus. Recto aut̃ intestino resoluta, quandoq; ab inuitis oletulū excernitur, quandoq; retinetur, iisdem utendū est remedijs, aliàs quidē eadē p̃ clysterē immittēdo, aliàs uerò astringentia: uerbi causa, decoctū cupressi, lētisci, rubi: aliàs remittētia, cuiusmodi sunt adeps suillus, aut anserinus, et oleū maluaceū: nonnunq̃ et mordētia, ueluti salsugo, aut colocynthidos, aut similiū decoctū. perinde enim motiones, atq; ipsa agitatio promouet. Si autē frigus apprehēderit, acopū ex euphorbio cū oleo dilutū immittito. Membra postremo resoluta, cōmuni cura flectito, perfricato, et quæadmodum prædiximus, distendito: summa nanq; spes in frictione sita est.

De paralyti ex colico morbo contracta.

Colica quædam affectio nostra ætate incruduit, quam (et præcipuè eos qui euasuri erāt) motionis exacta quædam membrorum orbitas comitabatur, sensu tactus incolumi, ut uidetur, cōseruato, tanquā iudicatorio aliquo trāsitu ex corporis profunditate in extremas particulas facta. Proinde citra medicamentorum subsidii ultro plerisq; motus postliminio reuersus est: alios uerò qui difficilioris curationis fuere, etiam simpliciora ex prædictis unguenta persanauere. Præcipua uerò his inuenta sunt, tum id quod è populo nigra, tū quod ex abiete cinnatur acopon. Plures uerò medicamenta quæ robur inferrunt, & mediocriter refrigerant, magnificè iuuerunt.

De conuulsionibus. Cap. 19.

Habito de Paralyti sermone, consequens est, ut de Conuulsionibus agatur: quoniā utraq; neruorum est affectio. Cuius rei quoq; gratia de tremoribus deinceps subnectemus. Quando igitur circa morbi statim exordium, uel haud longè ab initio conuulsionēs orsc̃ diutius perennant, à plenitate trahunt originem.

ginem. Cū uerò copiosos sudores, aut uomitiones, aut excrementorum deiectiones, aut sanguinis profluuiū, aut uigilias, aut famem, aut permultas & uehementes cōmotiones sequuntur, à uacuitate oriuntur. Vbi uerò aliquis sospitū subitò cōuellitur, à plenitudine fieri necessum est. Verū si ex febribus adurentibus totius corporis moles et nerui inanuerint, illaq; ariditate conuulsio oriatur, exitiosissimū, & tantū nō immedicabile malum est. Primum igitur membra quæ cōtrahuntur, ualidè continenda sunt, inordinatisq; motibus occurrēdū. Cōfricentur oleo rutaceo, aut sicyonio, aut ueteri, aut huius farine quopiam alio. Propinanda etiā mulsā est. Cæterū qui ex inanitione, conuulsione cōsticiantur, oleo, aut hydrelæo calēte fouēdī sunt. In lauacrū quoq; nisi quid prohibeat, ducēdī: tēperatoq; solio cū oleo ac frīctione lenissimā utendū. Nutriemus autem sic affectos, quæ ex chōdro et alica fiunt sorbitionibus, et uino tenui, facilisq; digestionis, aquoso, nisi infestet febris: tum enim ptisanæ cremore utendū, somnoq; uacandū. Sed quæ ex plenitudine aut phlegmone cōuulsiones cōtrahuntur, plenitudinis euacuatione curātur, phlegmonē peculiaribus suis præsidijs mēdando. Fiunt præterea cōuulsa nonnunquā, cum uomentes lancinantur uehementius. Succurrit ipsis et acantiū radix, et spinæ albæ semē in potu sumptū. Aegyptiæ quoq; acāthæ: nonnullē centaurij tenuis succū potui præbent, cū uidelicet ex plenitudine cōtrahitur cōuulsio. Neq; ad bibēdū modò porrigito, sed et foris quoq; cuti, castoriū unā cū sicyonio illimito. Quid si his per petratīs nō cessauerit cōuulsio, cucurbitulas, cute scalpello circuncisa, imposito: cruribus quidē cōtractis, coxendicibus et extremæ uertebrae: manibus uerò cōuulsis, dorso et primæ ipsius uertebrae, partiq; humero superiacenti. Vno uerbo, si toto corpore ab affectione libero, labiū, aut palpebra, siue lingua contrahatur, dirū symptoma putandū est, magnos secū terrores adferens, licet exiles corporis partes affectæ uideantur. In his itaq; ab occipitio et primis uertebis fiat sanguinis detractio:

Rigor, qui tetanus dicitur, cum & ipse conuulsio quædam existat, euenit ceu gelu concretis, corporis, præsertim spi-
 nae musculis, frigido humore foris & intus adstringente: unde
 in ea affectione constituti, seipsos flectere non possunt. Vbi igitur
 corporis membra antè tenduntur, appellauerunt Græci
 emprosthotonū, nos rigorem in pedibus. Quando retrorsum, Græ-
 cis opisthotonus, Romanis rigor in scapulas uocatur. Quando
 autem ceruix æquabiliter in utraq; partem recta intenditur,
 tetanus ab illa, rigor simpliciter ab hac gente appellatur. Ve-
 rum Pelops affectiones has musculorum neruorumq; ceruicis,
 quorum beneficio in anteriore, posteriorem partem. & quoquo
 uersum ceruix flectitur, tensionem & contensionem nominat.
 At qui si in posteriores musculos colli rigeat, opisthotonus ex-
 accidere: si uero in anteriores partes, emprosthotonus: si re-
 cta in utraq; tetanus nuncupatur. Causam huius mali asserit,
 musculis repletis spiritu et aëre crasso ac nebuloso. Affirmat
 eundem supra modum frigidum & concretum esse, ac ideo difficul-
 ter mobile: unde fit, ut sic affectis fomenta sicca magis conue-
 niant quam humida. Et hæc quidem tetani sunt differentie: sed
 omnes communi, non diuersa ratione curantur. Præsentissimum
 igitur est præsidium febris superueniens, quæ non fuerit à prin-
 cipio. Arguit uero has angustæ respiratio, pulsus rarus et par-
 uus, nonnunquam risus etiã Sardonicus eos inuadit, & rubor
 faciei, oculi intumescere magis uidentur, & uel nihil omnino
 moriuntur, uel instar aquæ lotium, uel cruentum, cum quibusdam
 ampullis reddunt, alius exiccatur, uigilijs magis infestantur:
 & sæpenumerò conuulsionibus ita conflantur, ut periculum
 sit, ne de cubili decidant: quandoq; singultire incipiunt, & è do-
 lore laborant: alij quidem capite, alij uero utrisq; clauiculis,
 humeris & lumbis, nonnulli uero ipsorum subtremuli quoq; red-
 duntur. Facit autem affectionem hæc etsi rarius, lassitudo, humi-
 dormitio, potius eleuatio, casus, uulnus, æstus, plaga, & alia
 que

quæ eiusmodi nervis noxiam inferre possunt. Medendum autem his quemadmodum illis qui ex inanitione conuellantur.

Tetanicæ curatio.

Rigore nervorum ceruice in rectū intenta, sanguis statim inter initia mittendus est, partes eorum lanis oleo sicyonio aut castorio cum ueteri oleo imbutis cooperiendæ, aut uesica quoque latior calente oleo referta, tendinibus est imponenda. Concisa deinde scalpello cute, cucurbitulæ agglutinentur, leues enim etiā lædunt. Applicentur autem interdum ceruici et ab utraque scapularum parte, & lacertosioribus pectoris locis atque præcordijs, nonnunquam uerò regioni uesicæ atque renū. Nihil uerò detractioni parcendum, modò non confertim, sed sensim pluribusque uicibus auferatur. Sudores porro lanis oleo madefactis detergendi sunt, ne refrigerati euanescent. Quod si tetanos inuenerit, in oleum bis in die descendere iubeas, & haud diu in ipso morâ trahere: nihil enim uirtutē perinde atque olei inessus deijcit. Bibendū est hydromeli crassum ad dimidias usque decoctum. Ad hæc panacis succi drachmam robusti hauriant, imbecilliores autem hemidrachmiū, uel ad minimum, obolum. Videri autem possit cuiuspiam hoc officere stomacho. Exhibendum etiā ammoniacū: aut succi cyrenensis quantitas orobi, excocto melle oblita deglutiat: laserpitijque radicis cochlearia duo, mulsæ cyathis tribus indita, aut elixatio eius, potui exhibeatur, uel myrrhæ drachmā ex aqua mulsæ, hyssopi que decoctū. Omnium uerò inculpatissimum expeditissimumque erit, castorij exhibere cochlearia duo aut tria, distributa tamen hac quantitate. Nihil enim officiet, etiam si post cibum ex ipso dederis. Præter reliqua uerò ipse quoque potus aliquandiu uacationem habeat, minutatimque sumatur: a grè enim potantibus in nares potus rebullit, unde uehementer lacinati ad conuulsionem iritantur. Illinienda uerò sedes est oleo rutaceo, cum opopanace, immittaturque ipsis per inferna. frigida porro superfusionem, cum sit (quemadmodū Hippocrates asserit) maximè temera-

ria, & ob hoc à recentioribus (ut arbitror) reprehensa, etiam nos ipsi deuítamus. Vnguentum probatur, quod accipit nardi sextarium, ceræ sexantem: folij, amomi, styracis, mastiches, castorij, adarce, euphorbij, piperis, spicæ nardi, cremoris balsami, singulorum unciam.

Opisthotonicis potio.

Panacis radicis, piperis albi, costi, myrrhæ, succi papaueris, paria cuiuslibet pōdera, sub somnum instar cicerculæ exhibebis. Conducit etiam orithopnoicis. Esto præterea in hac affectione constitutis uictus extenuans, expeditæ digestionis, & minime recrementosus.

De tremoribus. Cap. 20.

Tremor uniuersim ex imbecillitate neruorum originē trahit, cuius rei testis senectus est. Priuatim uerò plures et diuersæ causæ tremorē efficiunt, frigidus uidelicet naturæ temperamentum, importunus frigidæ potus, præsertim in febribus, gelidi & glutinosi humoris abundantia, & immodicus uini usus. Qui igitur ex delictis admissis aperte tremunt, à nocuius abstineant. Perseuerantibus uerò diutiusculè, factis in febri tremoribus, principid quidem uniuersum corpus oleo Sabino, sed in relaxationibus accessionum, peruetusto, aut sicyonio, irrigato: extimas uerò corporis partes illitas mollibus lanis cooperito. Deinde cucurbitulæ à prima spinæ uertebra usq; ad scapulas & lumbos defigendæ, membris antea atq; præcordijs cataplasmate ex hordeacea polenta illitis. Iam eadē hæc membra lanis oleo ueteri aut Sicyonio infectis contegantur. Quod si febres in uetustatē inciderint, alternis diebus in oleum uel hydreleum descendendum. Frictionibus ad hæc mollibus utendum. Si uerò diutius durauerit affectio (frigiditate iam suspecta) propinanda mulsa & castorium sunt. Calidis pariter locis gestationem fieri conuenit. Cibum promptæ digestionis exhibebimus: primo quidem loco sorbilem, deinde uolucrum, atq; piscium mollem carnem habentium. Finitis autem febribus

bis,

bus, lauandum, sed à gelido lauacro & uini potione abstinendum. Quod si multitudo crassorum & glutinosorum humorum fuerit, incidentibus, & extenuantibus utendum. cuius generis est: Accipe ramusculi rutæ, spondyli, quantum tribus digitis capi potest, castorei, nitri, uniuscuiusque obolos duos, dato quotidie cochlearium cum oxymelite, per uniuersum triduum ieiuno. Aut panacis et piperis grana quinq; propinato in mulsæ cyatho. Simplicia ante potata trementibus succurrunt: uerbi causa, castorium, leporis in cibo cerebrum, alibæ radice elixatio, damasonii foliorum drachmæ quatuor in mulsæ, eupatorium cum aqua. Frigore autem modum excedente, & Zodymi unguento, ac ijs quæ contra paresim scripta sunt, acopis et unguentis, & summe cutis rubrificationibus utantur, et excitationibus, perfricationibusque. Cæterum ob temulentiam tremuli, à uino, donec exactè malo liberentur, coercendi sunt.

Ocularia, & primo de dolore, ex decretis Galeni. Cap. 22.

Quando oculos acerbissimi dolores infestant, considerato quo nunc ex affectu corporis idem in inflammationibus proueniant. Aut enim propter rosionem uehementem ex dira in oculos decumbentium humorum acrimonia, uel ob tensionem faratarum tunicarum, aut propter intensiorem aliquam crassorum humorum, aut spirituum flatulentorum, grauissimi in ipsis cruciatus emergunt. Rosionibus itaque purgantibus præsidys quæ mordaces humores educunt, opitulabimur, & oui albore oculis infuso. Vbi uero maturitatem acquisierit inflammatio, & corpus excrementis uacaret, balneis nullum inuenias commodius auxilium. Sed ijs quæ rudimenta ad plenitatem referunt, inflammationibus, euacuatione sanguinis, subductione uetris, & infernarum partium frictionibus, mederi competit. Intensionibus uero, euacuato prius toto corpore, & humoribus qui sursum impetuose uergebant, ad ima reuulsis: deinde remedijs topicis, quæ discutiendi uim habent, succurrendum. Fotus igitur ipsis applicandi sunt, & fenogræci decoctum infundendum.

Vbi uerò crassi sanguinis humor oculorum uenulas intendit, siue reliqui corporis succorum redundantia intendit, potio uini, quod leniter calfaciendi, euacuandi, atque aperiendi, uim habeat, non inutilis est.

De lucis oculorum perturbatione, & priuatim de Ophthalmia, id est lippitudine.

Perturbatio humiditas oculi est, simulq; cum rubore præter naturam calor, non ex corpore, sed foris aliqua occasione adueniente: uerbi causa, sole, fumo, puluere, oleoq; suscitatus: proinde discreta ipsius causa facillime discutitur. In genere perturbationis huius ophthalmia censetur: non modò forinsecus, uerum citra euidentem quoq; causam ingruens, & ad tertium, quartum, aut quintum diem plerunq; permanens. Medetur ei citra negotium, præcautione eorum quæ irritando foris efficiunt, nutritu exiguo, aquæ potu, aut deambulatione, aluiq; cita deiectione.

De inflammatione.

Quum oculi inflammatione tentantur, post totius corporis purgationem, ungentis utendū, quæ humoris pituitosi fluxum reprimere, & irritationem placare possint: uerbi causa, Nilei diarodon, aut Mediacum et Nardinum. Tunica uerò adnata, inflammatione correpta, collyrijs quæ ab affectus celeritate monemera dicuntur, cum oui albore infusis utemur: postridie uerò, nisi phlegmone intendatur, oleum nardinum illinendū est. Fomentis autē ex decocto meliloti & fœnogræci, uti cōsiliū est. Quod si ex crasso humore lippitudo proueniat, medicamenta quæ neq; obstruendi, neq; humoris incrassandi, sed quæ diffundendi, humectandi, & excernendi facultatem habent, utilia sunt: cuius generis est Chiacñ. Quod si humores capiti fuerint impaeti, cucurbitulā occipitio impone, uel sacrificato, uel hirudines fronti iuxta affectum oculum admoeto, aut cataplasma ex pane syncero aqua macerato, cum exiguo rosaceo: aut polentis in capitū papaueris decocto elixatis, super accom-

modato.

modato. Efficacior etiam utendum est cataplasmate de croco, meliloto, & palmularum carnibus, & tenerioribus coriandri folijs, vitellisq; ouorum assis, & micis panis in defruto maceratis, & exiguo rosaceo, capitumq; papaueris læuigatorum decocto. Semen quoq; papauerum quandoq; mitigandi doloris gratia miscetur. Quod si doloris uehemens fuerit necessitas, momentum opij adijcitur. Sine intenso dolore, deuitanda sunt narcotica. Si mediocris phlegmone urgeat, aloë per se, aut aqua aut oui albore dilutā illinito. Sed quo præsentius fiat auxilium, croci drach. sex, aloës sedecim, gummi nouem simul, aqua cœlesti excipe, collyriaq; concinna: sed & diaroica nuncupata remedia, ab ophthalmiæ principio peraccommodata habentur. Quos uerò prementi digito cedens, turgidiusculus et percandidus circa palpebras, adnatamq; oculi tunicam tumor, absq; tunicarum offensa infestat, his quamplurimum oculis afferent liquida collyria, hygrocolluria Græcè appellata, tum de croco, tum atramento sutorio, melleq; confecta. Illud uerò saluberrimum censetur:

Liquidum collyrium indolorium.

Metallici atramenti sutorij, mellis Attici, cremoris fœnogræci, pares singulorum portiones, ad mellis usq; consistentiam elixabis, deinde nucleo specilli utrumq; hircum attingito.

Ad Epiphoram defluxionum.

Auersus defluxionum impetus (quas epiphoras Græci dicunt) in principio statim congruit inedia, aquæ potus, & omnium maximè concubitus abstinencia. Adhæc aluus subducatur, posca aquosa madesiat facies, præcipuè si feruens fuerit defluxio: sin minus, atramento sutorio cū melle frontē atq; palpebras oblinito. Nonnulli uerò atramentum sutorium aqua maceratum, ad collutionē exhibent. Sed qui citra inflammationem huiusmodi destillatione afficiuntur: aut etiam cum inflammatione quidē, sed ita, ut supra os caluariæ consistat opifex materia, adglutinamentis in fronte utendum: uerbi gratia, ex sim-

L 5 plicibus

plicibus quidem, uirentibus uitis folijs, aut rubi cremore, aut portulacæ, aut cotoneorum cum tenui polenta, aut galla trita cum uino, et tenuissimo farinæ polline, aut cicuta, aut pulicari herba cum aqua, aut solano, aut cochleis cū testis in liuorē contritis, instar cataplasmatidis à tēpore ad alterū tempus illitis: et ut summatim perstringā, adstringentibus atq; frigidificis. Ex cōpositis uerò pollen frumētaceum, aut myrrha, aut ibus, cum oui albore illinatur: aut Samia terra, cū myrrha et māna, similiter cū candido oui liquore. In frigidioribus porrò fluxionibus, sulphuris uiui, bituminis, picis, colophonice, uniuscuiusq; drach. duæ, pariter etiā musa trochiscus, et Aster, et cōsimilia, optimè fluxū reprimūt. Theriaca item uino adstringente subacta, fronti q; illita, frigidus humorū fluxus cōpescit. Hæc ipsa in potu quidē sumpta, magnificè succurrit, ipsi uerò oculo cum lanā, tum panniculū tenuem, albore oui infecta, imposito. Causæ ad hæc recēs pari modo oculo applicatus, acutis maximè fluxiones cohibet. Collyria item cognomēto, quia reprimunt, staltica, cū illita, tum instillata aqueo oui idem præstant. Si uerò in profundo et sub calua, humor cōtensus lōgo tēporis spacio perennauerit, post uniuersales corporis euacuationes medicamētis quæ per nares repurgāt, et apoplegmatis utendum. Capitis tonsura, et quæ cutē eius rubicundā reddūt, probantur. Cæterū in his curationem etiā manū in capite accersunt: uerbi causa, angiologiā, et arteriarū sectionē, tum hypospassthismū, tum periscyphismum, atq; circa uerticē usq; ad os combustionē. Cucurbitulæ autem occipitio cum scarificatu impositæ, fluxionis impetū reuellere possunt. Signa porrò fluxionis extra caluariā, ex uenarum cōceptaculis deprehenduntur: quoniā ea circa frontē atq; tēpora supra modū tument, et caput ueluti reuindum cernitur, et quæ siccandi uim habent adglutinamenta auxilio sunt. Quod si horum nihil adsit, humorum impetu durante, et sternutamentis interim plurimum molestantibus, sub caluaria humorem hæere iudicandum est.

De

Cum ex uehementiore oculi inflammatione utraq; palpebra ita peruertuntur, ut ægerrimè ſubiacentes oculos uelent, albumq; ipſius ſublimius nigro ſupereminet, ac rubrum etiam magnam nigri partem occupat: ſubuenit huic ſanguinis detractionio, Catharticum, & diarhodum collyrium candidum, et ſpodiacum, cum lacte, aut oui albore: quibus illinendæ ſunt palpebra, tempora atq; frons. Fomentis præterea & cataplaſmatibus, quæ leniendi facultatem obtinent, utendum. Decreſcete autem inflammatione, acrioribus ſubungendum cenſeo: quale habetur diarhodum uiride.

De hypophagmatis & Emphyſematis.

Hypophagma, ruptio quædam uenarum agnatæ tunica prohibetur, ex icſu ut plurimum contingens. Sanguinè igitur ipſis palumbi, aut columbæ, aut calidum lac muliebre, in quo momentū thuris diluatur: uel muriâ, maximè uerò ſalis Capadocy inſtillato. Vtilis item fotus ex hyſſopi decocto adhibitus. Conducit uerò laxis tumoribus, qui oculis ex plaga proueniunt, fotus è poſca continuus. Spongia itidem ex poſca applicata. Spheclariū ſpeculariumiue combuſtum, & ſtercus columbinum, pari pondere, uino aut aceto diluta inungito. Cataplaſmatis inſtar caſeum recentem, aut radicula corticem, aut uuam paſſam exacinatam, ſingulatim in poſca aut aqua muſſa applicato. Hæc quoq; contra Emphyſemata faciunt.

Ad Emphyſemata pruriginofa, & Pſorophthalmias.

Emphyſema palpebræ excreſcentia eſt, laxo tumori ſimilis. Pſorophthalmia uerò, pruriginofa palpebrarum ſcabies eſt, ex ſaſſo nitroſoq; humore ducens originem. Expedit ipſis ex poſca, lenticulæ decocto, et roſarū fomētatio: tū illud hygro collyrium, æris drach. ſex, miſyos combuſti, myrrhæ, uniuscuiusq; drach. tres, croci unâ et ſemiſſem, pip eris drach. uini Chij, & paſſi Cretici, ſingulorū ſeſquicyathū: coquito ad mel liſ uſq; ſpiſitudinē. Hoc eſt medicamē Braſiſtrati, pächryſon appellatum.

appellatum. Valet etiam ad anginam, oris hulcera, uerendorumq; & aurium dolores. Illinantur autem & oleo genæ, sub somnum. Vitentur uerò acida, salsa, & acria,

De Sclerophthalmia & Xerophthalmia.

Sclerophthalmia, durities, & difficilis est cōmotio, cum dolore ac rubedine, absq; humore. Quocirca spongys aqua calida imbutis oculos identidem fouere, & palpebris, somnū iniaturo, ouū cum rosacco, aut adipem anserinū imponere conuenit, fugientes frigida, quæq; duritiem cōciliant. Caput uelari, & pinguedine oblini, aliudq; subduci debet. Xerophthalmia uerò, pruritui similis oculorū est, sine fluxione dispositio. Mendendum huic lauacris, inunctionibus, & boni succi nutritu. Vtriusq; præsidio cōmuniter fuerint medicamēta tam acria ut lachrymas eliciāt, per quæ durities remittetur, et ariditas humescet. Huiusmodi existit et Brasistrati panchrysos, & quod appellatur dicenthetō, & id cui cognomentum est stratiotico.

De Ectropiis.

Inuersio palpebrarum hæc est affectio, uel ad cicatricem, uel ad carnis superexcrecentiam referens originē. In quibus ergo subexcrecentia in uetustatem incidit, rasilis ærugo torrefacta teritur & admouetur: aut plumbo cremato cum sulphure ignem non experto, & loto: aut ambobus æquis partibus, tum æris flore, tum plumbo utitor. nam quod ex cicatrice nascitur Ectropion, ad curationem sui consummatam, manuum operam desiderat.

De Ægilope & Anchilope.

Ægilops abscessus est, qui inter maiorem oculi hircum & nares fit: qui ruptus si negligatur, usq; ad os fistulam aperit. Idem priusquā in hircus erūpat, Anchilops appellatur. Magnificè igitur cōducit glauciū, & crocus, unā cum succo perdicij applicata: identidem uerò permutari debent, & neq; patidum mutantur ipsa. Aliud: Halica in aceto elixa, & sciētē friata: non modò incipientibus, sed et in suppurationem iam conuersis

cōuersis succurrit, aperitq; & ad os usq; descēdit. Hoc si quis utatur, non Aegilopas solum, uerū Anchilopas etiam medebitur. Aliud: Ruta satiuā cum cinere lixiuio quod primò destillauit, trita, decocta, & imposita, aegilopas præclarè instaurat, & usq; ad os penetrat: intra initia mordens, sed postea nō ita. Atq; suspiciendum interim, quòd nullam post se turpē cicatricem relinquat. Aliud: Cochleas cum testis tritas imposito. Aloë quandoq; & myrrha admixta, priusquā aegilops in sanem sit cōuersa, quod remediū etiā post apertionem desiccet.

De Trachomate, id est scabritate.

Trachoma genarum interiorum scabrities est. Harum exarsio rigida, quæ eò peruadit, ut ueluti in fissuras exasperetur, Sycosis uocatur: quod si inueterauerit & occaluerit, Tylosis appellabitur. Collyrijs igitur utendum, tum illo quod è uino, tum eo quod è duobus lapidib. constituitur. Et ipso hæmatite lapillo aqua eloto, subiectis palpebris abstergēda est. Atq; Hermation cum exiguo cygnario, aut diacrocū, non tam ad hæc, quàm ad psorophthalmiā sine exulceratione cōgruit, inuersæ genæ illitum. At si callus durior, his non uincatur præsidys, genam inuersam pumice, uel testa sepiæ, uel folijs ficulneis, aut instrumēto quod à palpebrarum rasura Blepharoxyston uocant, abradimus.

Da Chalaziis.

Chalazium est ociosi humoris in palpebra collectio, cui medendo ammoniacum aceto liquatum cū galbano illinito. Opitulatur etiam unā cum ceroto excepta terebinthina.

De Crithe, seu hordeolo.

Hordeolum, quod critthen Græci nominant, tuberculum est quoddā exiguum in palpebra cilio longiusculum oriens. Quod oportet cera candida fouere: aut muscæ capite amputato, reo liquo corpore perfricare, aut hordeorum diluto perfundere.

De pediculatione palpebrarum.

Expurgatis antea pedunculis, aqua marina tepida ablucere palpebras

palpebras expedit: mox medicamentum quod subscribitur, et
lio applicare. Accipe aluminis scissilis portiones duas, staphi-
lidis syluestris portionem unam, quibus tritis utere.

De Madarosi, siue Milphosi.

Hoc pathema casus pilorum palpebrae est. Post uniuersi igitur
corporis accuratam curationem, smegmatis quae cognomen
to calliblephara (quonia uenustatis palpebrarum gratiam leno-
ciniumque inducunt) nuncupatur, utamur. Terrae Ampelitidis,
croci Celtici, ladani, et quales singulorum partes, tritas adhibe.
Aliud: Stimmeos usti et eloti drachmam, plumbi cremati et
abluti drach. quatuor, croci tantundem, nardi Indicae drach.
treis, unam contere atque utere. Aliud: Palmularum ossium cre-
matorum drach. tribus, nardi Gallicae duabus contritis, utere.
Hoc scabiosis quoque oculis subuenit.

Neapolitae ad palpebrarum defluuia, et diuturnos
ciliorum affectus.

Stimmeos, cadmia, chalcitidis, misyos xenici, et quas singu-
lorum partes obiter contunde, melleque subacta torrefacito, lae-
uigatisque utitor.

De Ptillosi.

Ptillosis, palpebrarum est in callum indurata crassities, ru-
bes: quam magna ex parte capillorum defluuium comitatur.
Praeter memorata igitur, muscerda etiam deusta, melle laui-
gata et illita, summe proficit.

Ad superciliorum Madarosim, uel glabreta.

Digitis oleo, seu oleo anserino infectis, plumbum contere, coque
oblinito. Aliud: Hoc nonnihil nigroris quoque inducit: Nu-
ces ponticas crematas, cum adipe caprino, uel ursino contere.
Aliud, quod ad menti etiam alopecias confert: Herbae Apolli-
naris drach. duabus, muscerdarum drachmam, polytrichi tan-
tundem, unguenti irini cochlearijs quatuor, laeuigatis perac-
curate, unguentum admisceto, fotoque prius loco illinito. Qui si
nouacula ante rasus fuerit, efficacius erit.

Ad

LIBER TERTIVS.

174

Ad Trichiasim palpebrarum.

Pilis qui oculum pungunt prius euulsis, locū confestim sanguine ranae priuatim inungito, uel cum cinere chamaeleōtis albi, aut sanguine cimicum, aut fumarie inter hordeū prognatae succus cum gummi, aut tellinarū salsarum cinis cum cedrino liquore, aut loti cinis, aut alumen liquidum, phorimon appellatum, aut muscae caninae sanguis admodum ad hoc confert.

Trichocolia, id est glutinamentum capillorum:

Conglutinant infractos pilos: Bitumen, mastiche, colophonia, gummi, cochlearum uiscosa portio.

De Encanthidibus & Rhyadibus.

Encanthis est, cum maioris hirci naturalis caruncula excreuit, & protuberat. Rhyas contra, eiusdem est imminutio. Encanthidas igitur iisdem medicaminibus, quae de B. Aropio memorauimus, similibusque rebus adurentibus, uel erodentibus comminues: non totis, ne Rhyas in uicem eius inducatur: sed ad naturalem usque magnitudinem. Rhyades, magni quidem anguli carne siue rudis chirurgici manu, siue pharmacorum carnem corrodentium culpa absumpta, nullo medicamento uinci possunt. minuta uero ipsorum parte, iis quae modice adstringunt & carnem inducunt, restituas: cuiusmodi sunt, quae ex croco & glaucio & aloë componuntur, & diacrocu appellata collyria. Altercum item in uino decoctum, & impositum, & momentum aluminis cum uino.

De oculerum h ulceribus.

Hulcerum quae oculos infestare consueuerunt, genus quidem unum est, sed particulares differentiae plures. Nam quod in cornea tunica caui angulū, mundūque bulcus fit, Bothriū nuncupatur. Quod uero latius quam hoc, et minus profundū, Caeloma appellatur. Argemon autem in circulo iridis natū, ambientia comprehendit, ita ut extra iridem subrufum, intra uero albuma appareat.

appareat. Epicauma uerò hūlcus est sordidum, impurum, & crustosum: quod cum expurgatur, sæpius humida quæ sunt in oculo effluunt. Et alia innumera ferme hūlcera sunt discrimina, de quibus cōmunius uerba faciemus. Proinde si hūlcus cum phlegmone ortum habuerit, curatio illis quæ phlegmones leniendæ et maturandæ potestatem habent, peragatur adhibita peculiari hūlceris medela: cuiusmodi quidem sunt collyria, Libanium, cygnus, et quæ pelaria appellantur: item aster, et similia: præterea quæcunq; ex amylo, terra astere, cerussaq; cōstant. Scimus autem omnium præstantissimum anodynum esse Ilamonem: cæterum in eius usu perseverandū nō est, quoniam uehementissimè stuporem inducit. Utilissimum autem diazematōn, nihil stuporis inferens. Quod si cum fluxu hūlcus fuerit, ex collyrijs aliquod illi admiscebimus: quale est diaphyras & chiacum, & fuluus cygnus, et breuiter quæ reprimendi sine rosione facultatem obtinent. Aduersus autem sordida ocululorū hūlcera, mulsæ modicè aquosæ ac fœnogræci decocto utamur per se, et adiectionis etiam quæ ad eam rem facta sunt collyrijs. Acutiora quidem si fuerint hūlcera, albis, Seberiano, & quod ex fœnogræci diluto cōtextitur. Vbi uerò acria non sunt, collyrijs quæ myrrhā habent, et nardinis utendum. Cæterum hūlceribus expurgatis, Cleon medicamentum pulchrè potest cicatricem inducere, & eidem similem colorem induere.

De proptosi hoc est, procidentia oculi.

Proptosis casus est uueæ tunicæ, ab erosione siue disruptione corneæ proueniēs, quæ exigua adhuc, ita ut muscæ caput resferat, Myocephalon nuncupatur: aucta uerò amplius instar uueæ acini, Staphyloma dicitur. Vbi uerò plurimum succreuerit, adeoq; egreditur, ut palpebras transfiliat, Melon: cum deniq; obcalluerit, Clauus Græcè Elos appellatur. Quocirca si mediocriter tantū oculus, ueluti ad muscæ capitis instar à suo iusto modo procidit, medicamentis quæ reprimendi, astringendiq; potetiam obtinēt, utendum: uerbi causa, Chio, Phæo, Nardino,

dino, & Theodotio. Et eo quod e summo oleæ coliculo, & ex cornu conficitur. Spongia, posca, aut uino adstringente, aut rosarum decocto imbuta, oculis leniter alligetur, aut splenium. Præcipuum uerò bonitatis honorē aduersus procidentias & omnia hulcera habet Olympiacum, aut Olympus appellatum, cum cremore oleæ, aut polygonij, aut polij. Eadē & hulceri Clauo cōgruentia sunt, & Staphylomatis priusquam albescant. Nam quæ maculas candidas contraxerunt, & calli instar obduruerunt, insanabilia censentur.

De oculi fugillationibus, suppurationibus ue.

Hypopyon in cornea oculi membrana quandoq; nascitur, nunc quidē in imo, nūc uerò in summo, ungui humano forma non dissimilis suppuratio: quæ causa est, ut unguis oculi etiam hoc malū appelletur. Scopus itaq; curationis huius est, ut pus quod in tunica coit, per ea quæ non uolēter discutiunt, dissipetur: cuius farine sunt aqua mulsa, & fœnograci cremor, et quæ ex eodē cōtexuntur collyria, atq; libanū, & quicquid ē thure cōcinnatur. Aut cōfringatur uomica, & cum ualētioribus expurgetur: ē quorū albo sunt diasmyrnes, & hygidū. Atqui hypopyis absq; exulceratione medendis, etiā illo utendum est liquido collyrio, cōposito ex atramenti sutorij, croci, singulorum drach. octo, myrrhæ quatuor, mellis libra. Cæterum phlyæna cum corneæ membranæ extuberantia sit, ex humore compagem ipsius excoriente, curationi subijcitur sigillatorū. Medicamē humidū ad hypopya: Bassi, croci, aloes, myrrhæ, uniuscuiusq; uncia, uini quadrans, mellis optimi uncia sex, diluatur crocus cū uino exiguo, deinde aloē cum myrrhæ, & simulatq; crassitudinē prætulerint, inijcitur mel. Vniūta uasē uitreo reponuntur: bis quolibet die, ter 'ue, si necessitas urgeat, illinito. Vna quippe opera oculum purgat, carnē reficit, & cicatricem inducit.

De cicatricibus & leucomatis.

Cicatrices quæ in superficie oculi innascuntur, à quibusdam
M generali

generali nomine cicatrices, à nonnullis uerò nebulæ: quæ al-
tius delitefcunt, leucomata, id est albugines dicuntur. Quibus
medicamenta abstergendi purgandiq; facultate prædita sub-
ueniunt. Leniores uerò maculas, nebulas inquã, anemones suc-
cus exterit, atq; minoris cētaurij succus cum melle. Bas autem
quæ longiore temporis spacio perseuerauerunt, cedriæ liquor
extenuat. Aes itē per se aqua instar collyrij tritum: & deter-
gentia collyria, cuius generis est, quod è cornu ceruino fit, &
rhinarion, hecatombeq; & similia. Sed leucomata, nitrū oleo
peruetusto accuratè maceratū, scitè illitum, discutit. Idē sepiæ
testa cremata, cum melle trita præstat. Inter collyria autem,
hoc quidem haud inscitè & clemēter extergit. Mamiæ, gut-
tæ ammoniacæ, myrrhæ, troglodytidis, oletuli crocodiloriū,
æquis partibus, in collyriū redactis utere: aut cōfectis ex aqua
dissoluto crocodili terrestri stercore collyrijs, maculas obli-
nito. Haud improbè ex Cappadociis salib. aqua dilutis colly-
ria, natura cōtra albugines cōparata, guttatim instillaueris.

Cicatricum tinctura.

Gallæ, acaciæ, singulorum semiuncia, atramenti sutoriij
drach. binæ. Collyrium præterea illud proficit: Mali Punici
floris, cytinorum, atramenti sutoriij, acaciæ, gummi, uniuscus-
iusq; uncia dimidia, stimmeos, gallæ, singulorum drach. duæ,
aqua soluuntur. Cum autem mali Punici flos ad manum non
fuerit, tum quæ instar mēbranæ acinos intercedūt, admisceto.

De Pterygiis, hoc est unguibus oculorum.

Vnguis siue Pterygion, nervosa quædā adnatæ membrae
nula excrescētia est, ab angulo quidē oriens, sed ad oculi usq;
pupillam procedēs: quæ supra modū adaucta, pupillā operit.
Magna igitur & inueterata pterygia, sola manu chirurgica
exciduntur. Recētiore uerò, & mediocris magnitudinis, ab-
stergentibus præsidys expugnantur: cuius generis sunt, quæ
palpebrarum asperitatem, & albugines propriè consumunt.
Ex incompōsitis quidem æs crematum, aut atramentum suto-
rium,

ritum, cum felle suillo optimè cōducit. Sed lōgè efficacius hoc, cum atramenti sutorij partem, gummi partem semissem uino macerata inungimus, uel collyria conformamus. Nonnulli uerò fel caprinum melli confusum illiniunt.

Ad Ptergia, Hypopyos & Amblyopias: Oribasii.

Lapidis magnetis, eruginis rasilis, sinopidis, guttæ ammoniaci thymiamatis, singulorū drach. quatuor, croci drach. duæ, mellis Attici cochleariū. Hoc etiā medēdis albuginib. cōfert.

De Antrachosi & carcinomatis:

Carcinoma, id est cancer, in cornea oculi mēbranula abscissus est, magni doloris, tunicarū ruborem & dilatationem præferens, cruciatus pungens usq; ad tēpora protenditur, potissimum si concutiantur: appetitū carent, & acribus exacerbantur: hoc malū remedijs nō uincitur. Dolor tamē lactis potu leniendus est: frumentacearū item & probi succi epularū porrectione, absq; ulla acrimonia. Collyria dolorē sedantia infundantur: uerbi causa, Spodiaciū, Seberianū, atq; id genus alia. Consulendum præterea bono totius corporis temperamento. Atqui Carbunculus quoq; ipse hūlcus est maleficum, difficile, crustosumq; quod nunc quidem bulbo, nunc uerò palpebræ, quemadmodū & alijs quibuscunq; corporis partibus contingit. In eius qui in bulbo oboritur, curatione, statim ab initio fieri debet cum clystere euacuatio: deinde lacte coctionē probam experto, moderata expurgatio: mox spongia foto, farinam orobinam aut triticeam in mulso elixā, adglutinare expedit. Nonnunquā & iridem tenuem emplastri modo superapplicare, lacteq; oculū eluere. Si ulcera edendo repant, lenticulam cum melle, aut malis cydonijs decoctis accommodare. Si latius depascendo diffunditur hūlcus, folijs oliuæ elixis, malicorijs in uino concoctis cum melle contritis. Noma autem consistens est, & crusta impositu medicamenti quod dicturus sum, decedete, cum hūlcera fuerint pura, luteis ouorū asis tritis cū croco et melle, donec cicatrix inducatur, oblinito. Medicamētū

M a autem

autē est illud: Spodij drach. quatuor, myrrhæ non admodum torrefactæ drach. treis, & obolos totidē, in Amineo uino usq; dum exiccetur macerans, passo Cretico ueteri cōmisceto: ubi simul eliquata fuerint, liquidum in pyxide fidili excipito, atq; sublinito. Sed ad carbunculos palpebrarū, malum punicū acidum totum & contusum concisum in aceto coquito. Vbi subactum frustulatum, probeq; leuigatū fuerit, linteam oppleto, et utitor; interdiu quidē bis ter' ue cōmutans, noctu uerò semel.

De Mydriasi.

Mydriasis uitium est, quo colore nihil quidē cōmutato, pupilla multo naturali habitu latior apparet, & nonnunquā uis soriā facultatem ex toto impedit, interdum uerò magna ex parte species hebescit, ut obiecta lumini longē minora esse uideantur quā sint, cuius causa est excrementitius quidā humor. Succurrēdū est itaq; sanguinis incisa uena cubiti detractio ne, uel expurgatione; si uerò non, uenas in hircis diuidito, de inde cucurbitulā occipiti imposito. Faciē itē atq; oculos aqua marina perfundito. Quod si marinæ copia non sit, muria aut posca. Medicamentis deniq; iisdem utendū, quæ & in medendis phlyctanis expediunt.

De Phthisi & Atrophia.

Phthisis affectus est, quo pupilla angustior, obtusior, hebetior, corrugatioq; redditur: quæ cernuntur, maiora esse apparent quā sint. Oritur uerò ex ariditate condensante. Dirimitur autē phthisis ab atrophia hoc discrimine: Phthisis angustio rem facit pupillā, atrophia uerò totum oculum exiliorem & humilio re reddit. Medebimur autē huic exercitationibus, et quā accurata capitis, uultus, & oculorū fricatione: facies ad hæc aqua fouēda, caput ungeto aliquo calorifico circumliniendum. Oculi rarefacienti medicamento aliquo ungendi, quale est quod sequitur: Gutta ammoniacæ drachmam, crocomagmatis drachmas quatuor, croci duas, floris æris drachmam, aqua excepta in usum adhibeto.

De

LIBER TERTIVS.

181

De Nyctalope, id est acie uespertina.

Nuscitio, quæ Græci nyctalopa appellant, uulgò dici consuevit, quoties acciderit, ut interdiu quidem iusta acie uideat quis: occidete uerò sole, obtusus: noctu planè nihil. Medebitur huic, sanguinis è cubito detractio, hirquorū expurgatione, aut per clysterè inanitione: mox apophlegmatismis pituitam detrabere, aut sternutationes ciere præcipientur. Potui byssopum, aut rutā ante cibum offeremus. Quod si his peractis, non ex animi sententia succedat, rursus medicamentū expurgandæ facultate præditum, ex scammonia & castoreo exhibeatur. Oculi melle despumato inungantur, conuiuentibusq; ipsis ac cōpressis humida intus contineantur. Aluminis cōbusti partes duas, salis fossilis unā, cōtere cū melle, atq; sublinito. Aliud: Iecur hircinū assatur, & aquosus inter assandū inde emanās humor collectus inungitur, ipsumq; hepar edendū exhibetur: de coeli quoq; iocinoris uapor oculis apertis accipi præcipitur.

De glaucomate & hypochymate, ex Rufo.

Glaucoma & hypochyma, unū idemq; mali genus esse antiqui putauere. Posteriores uerò glaucomata quidē crystallini humoris uitia, quæ ex humiditate in glaucū colorē transeunt, existimauerunt. Hypochymata uerò, suffusione humorum, inter corneā & crystallinā tunicā concretorum. Sunt autē omnia glaucomata ex ijs quæ nullo prorsus eliduntur remedio. Hypochymata uerò sanantur, sed non omnia. Verū illis qui suffusione tentātur, antequā morbus consistat, sanguinis è cubito detractio, expurgatione, enematisq; acrioribus succurritur: uerbi causa, ex centaurij, aut cucumeris amara decocto, & alui crebriori solutione, cucurbitulisq; in occipite cum scarificatione adglutinat. Per uniuersam uidetur rationem, a quam potare, & alimentis extenuatibus uti congruit. Conferent autem temporis progressu, et apophlegmatismi per dies aliquot. Qui uerò perperam intuentur, tanquā si culices appareant, è prauo aliquo humore, aut biliosioribus uaporibus sursum

M 3 sum

sum balantibus, his medicamentum ex aloë amarum exhibebimus continuò, aut cum illo quoq; purgabimus. In oculis itidem medicamentis utendū, primum quidem simplicibus, ueluti melle & oleo cum fœniculi succo. Mox etiā cōpositis, cuiusmodi fuerit illud: Sagapeni didrachmiū, succi Cyrenēsis, uera tri candidi, singulorū drach. sex. Alij in mellis acetabulis oīto excipiunt: nos autē, Oribasius inquit, subscripto utimur: Caue calidis liquoris, chamædryos, sanguinariæ, uniuscuiusq; æquales partes conteruntur. Faciunt uerò bene etiam collyria, & quod ex succo fœniculi cōfit. Proteus præterea, & Thalassius, & è succo balsami confectū, & ex his contexta collyria, opitulari possunt. Ad hæc fœniculi decoctum in principijs superfusum auxiliatur, medicamētumq; ex succis opobalsami, oleo ueteri, & id genus confectis.

De Amaurosi & Amblyopya:

Caligatio, quā amaurosim Græcè nominant, est totius plerunq; cernendi usus absq; manifesto oculorū uitio impedimentum. Obtusio uerò, quā amblyopiam Græci uocant, hebetudo uidendi est, ex clandestina quadā causa proueniēs. Curatio ei in uniuersum eadē quadrat, quam antea in suffusionibus oculorū explicauimus. Speciatim uerò ex oculorū hirsutis sanguinis euacuatio, hirudinū circa tempora adiectio, et infernarum partium frigidio. Progressu uerò tēporis, sternutationem cientibus utendū, & ante cibū uomitionibus, & inunctionibus primò quidē ex mellis & olei æquis partibus, deinde ex his quæ sequuntur cōcinnato: Croci oboli bini, fellis hyenæ drach. pipæris cōmunis grana octogintaquinq;, cremoris fœniculi drach. sedecim, guttæ ammoniacæ thymiamatis drach. una, dissolutis pulueribus cū succo cōponuntur, mellis cochlearia quatuor adijciuntur, præparata & ærea pyxide excepta utere. Antè inunctionē autē oculi in calidā aquā marinā immersi fouētur.

De Strabismo.

Infantes à generatione strabismū patientes, curantur, per
sana

sona siue larua ita faciei, ut in rectum necessariò intueantur, imposita. Strabismus enim conuulsua musculorum qui bolbū mouent, est affectio: & lucerna è regione posita, non ex obliquo apparente, emendatur. Sed quādo nares uersum oculi detorquentur, floccos rubro colore suffusos, oculorum hircus, qui circa tempora sunt, adglutinato, ut ad hos fixis luminibus directè intuentes, corrigant oculos.

De Ectropio.

Ita exprimuntur et eliduntur quādoq; oculi, ut exerti per seuerēt. Quibus ex strangulatu uitiū oritur, incisio uenæ cubitus præsidio est. Si ex alia quapiā occasione ueniat, uera è tro nigro, aut scammonio alius ducenda est. Expressiones uero oculorū, quæ ex dolorib. proueniūt, sæpius enim ex nisu laborantium è dolore partus contingunt, purgationibus soluntur: proinde has moliri atq; iuuare competit. Iris autē post sanguinis detractionē, si non quieuerit malum, occipitio cucurbitulā adhibeto, lanamq; melle illitam imposito, aut floccos cum aqua, superq; linteum duplicatū, suspensa manu adalligabis. Expedit præterea, aqua marina gelida uultui superfusa, Cichorij itē, & seminalis herbæ succus cum lachryma papaueris illitus: & alia cōtrahēdi et astringēdi potestate prædita.

De oculi suffusione, quam synchysis uocant.

Confusiones ex idu, sanguinis à cubitu detractio, sanguinem item potissimè nuper perempti turturis curat. Sin minus, uersum oculū sanguine columbino oppletū: deinde lanas molles in ouum contusum cum uino, & rosaceo maceratum imponitur & alligatur: sequenti die idē faciendum: tertio fouendum, lac instillandum, & ex rebus idoneis cataplasma adglutinandum. postremò collyrijs, quæ ad ueteres affectiones faciunt, perungantur: uerbi causa, Chiacco.

De Myopia.

Lusciosi, quos myopas Græci uocāt, dicuntur, qui statim ab ortu quidē ipso, oculis propius admota cernūt, sed procul dista spectare nequeūt. Insanabilis sanè istiusmodi affectus est, ob

spiritus uisui, unde nascitur, debilitatē. His contraria patiuntur decrepiti. nam quæ longius distāt, exactius quā quæ admotā sunt oculis, conspiciunt.

Auricularia, & de aurium dolore. Cap. 23.

Postquam aurium dolorem algore contractū ex anni tempore, antea dā uisus ratione, uel laborantis interrogatione, utrum ex euidente causa prouenerit, cognouerimus, & ex eo quod dolor in ima aure sine grauitate, uel distensione, uel ardore fixus sit, calorificis curabitur præsidys, auditili meatui oleum rutaceum calidū, aut nardinū, aut laurinum calidum, aut amaracinū, aut phulliatum, aut spicātū, aut cōmune, cum euphorbio, aut pipere, aut castorio, aut commagenū quod uocant ungentū, aut succum balsami instillādo. Et oleum in quo feruefactum sit alliū, uel cepa, auribus instillatum, auxilio est. Ex calida uerō intemperie contracto dolori, in quo feruorem quendam citra grauitatē aut distensionem sentiunt, contrarijs occurrendū, cādido oui liquore colliquato auri infuso, perinde atq; in oculo, & lacte muliebri, cum aliquo ex anodynīs collyrys, aut succo perdicū, cum exiguo rosaceo, eodemq; ipso, aut oxyrhodino, aut succo solani, aut coriādri, aut albuci, aut oleo in quo lumbrici, aut multipedes aselli, qui in locis uliginosis, sub situlis ue reperiūtur, decocti sint: aut oleo amygdalino perse: uel uiuentia buccina tria in eo elixa, à natura faciunt. Cæterum ex uiscidis & crassis conceptū humoribus dolorē, è capitis, ipsarumq; aurium grauitate, & præcedēte uisus ratione cognosces. Sola absq; grauitate aurium distentio, spiritū flatulentū inclusum colluctari intus testatur. Utēdū itaq; in utrisq; aperientibus & incidentibus medicamentis: cuius generis est, aphronitrū cum aceto et melle, atq; bilis ouina cum oleo communi, siue amygdalino: necnon & porri atq; cepæ succus tepens cū melle, aut origanum cum melle, lacteq; muliebri contritum, stillatim infusum. Aduersus autē uehementiores frigiditates, fel caprinum cum porri succo instilletur. Quibus uerō dolor

dolor ingens est ac diuturnus, & grauitas auditus, etiam hisce utendum: cuiusmodi sunt, dracunculi succus, ari, bryonia, & huius farine cætera. Priuatim uerò eis qui auris cruciatu propter flatulentū spiritum torquentur, cucurbitula aqua calēte prius calefacta, circa aurē agglutinata, magnificè succurrit. Quòd si grauitas, distētio, pariterq; calor, & dolor pulsatilis, aut febris etiā tentet, inflammationē subesse censeto. atq; ante omnia quidē incisione uenarum utendum: deinde cum auriculario specillo lana inuoluta, oleo dulci calido frequēter fouere expedit. Adeps ad hæc anserinus meatui instillandus est, aut uulpinus, aut Basilicū medicamētū cum rosaceo, aut cyprino, aut irino. Foris porrò cataplasmatibus modo illinēda sunt, quæ leniendi dolorem pariter & concoquendi potestatem habent. Sed dolore uiolentiùs sæuiente, ijs quæ mediocriter sensum stupefaciūt, utemur: haud enim leue inde periculū cerebro, quod auditorio neruo inflammato uicinū est, incumbit. Pulchrè igitur dolorē placat, quod habet opij partem unam, castorij partes duas cum lacte muliebri, aut candido oui, aut uino dulci, si tepidū auribus instillatur. Crocodes quoq; pastillus, & Aster, & Philonis antidotus, ita afflictos sæpenuerò adiuuit. Iam uerò aurē assiduè uel oleo communi, uel aliquo calido fotu fouere ex usu est. Lanam eo ipso intinctā in aurē demittere, ita quidem ut minimè, quantum fieri potest, particule ab inflammatione infestatæ attingantur. Vbi autē dolor inueterarit, & iam in suppurationē conuerti cœperit, medicamento è succo seminis lini utitor: instillās id ipsum cum rosaceo, aut chamæmelino solutū. Vbi uerò aqua medicamentosa auditorio meatui inherens offenderit, siquidē plurima fuerit, oris suauis, aut calamo in aurē demisso, ipsam extrahito. Sin pauca, lana auriculari specillo inuoluta, extergens hanc, oleum aliquod tenuium partiū, aut rosaceum, aut oui album, aut muliebre lac, instillato. Cuncta autem moderatè calida esse oportet, quæ auribus adhibentur.

Ad hulcera cum inflammatione infestantia.

Lyciū & meconiū, pari quantitate cū melle trita indātur.

Ad maximos dolores, pus, & grauem auditum.

Amygdalarū delibratarum, spumæ nitri, opij, thuris, singulorum drach. treis, croci quatuor, galbani duas, myrrhæ unā, aceto læuigata, instillato, dolore quidē infestante rosaceo diluta: si purulentia adsit, mulso aut oxymelite: si difficultas auditus, aceto. Hulcera porrò recētia, glaucium aceto subactum, medetur, & quæ ex eo cōficiuntur collyria. Faciūt idem diacrhodon, diacrocū, et diasmyrnes. Quemadmodū rursus suppurantia citra dolorē, spurcitia ferri cū aceto diutius læuigata.

Ad sordes aurium induratas.

Nitro aceto soluto cum aqua aurem colluito, & absterfis sordibus, nitrum aceto dilutum cum rosaceo instillabis. Aliud ad sordes: Cardamomi & nitri momentū cum caricis exacinnatis exceptum, in collyria digestum, auribus inijcitur, & per triduum gestata, educūt sordis plurimū, & haud mediocriter leuant. Conducit autē insuper excrescentys carniū, diutinis doloribus et exulcerationibus, quod habet, aloes, thuris, myrrhæ, singulorum drachmā, misyos quatuor, quibus cum aceto in pastillos coactis, ubi utendū fuerit, aceto & rosaceo soluta, infundito: pastillumq; Andronis, Heræ, & Musæ.

Ad inueterata hulcera.

Cedrinum liquorē melli confusum, illinito. Aliud: Misy combustū, & in farinā tritū, inspiratur. Aures cum oriculario clystere, posca, aut oxymelite, aut mulso, aut iure alicuius repellendi uim habētis, ueluti lenticulæ, aut rosarū, eluuntur.

Ad aures cruorem exudantes.

Blue auriculam rotundi odorati iunci decocto, polygonij uerò succum cum momento aceti instillato, aut lycium, aut amurcam, aut acaciam, aut porri liquorem.

Ad carniū excrescentias.

Auris nitro ex aqua calida, unā cum squamæ æris, & sandarachis,

Maraches, æquis partibus illuitur: crusta uerò obducta, melle repurgatur.

Ad aures uerminosas.

Absinthij, aut centaurij, aut porri decocto colluatur. In stilibis item capparis foliorum recetium, aut fructus eiusdem succum, aut liquor cedrinum, aut humanum lotium peruetustum, aut ueratrum album cum melle, aut nepetæ succum, aut scamoniâ cum aceto, aut succum absinthij. Oleum quoque meatui instillatum usque ad summum, ipsos euocat. Præstat autem oleum aceto temperatum. Et aduersus animalcula quæ auribus incidunt, ipsædem utitur.

De calculis, & consimilibus quæ auribus inciderunt, extrahendis.

Auricularium specillum lana inuolutum, terebinthina, aut gummi, aut alio quopiam glutinoso madefactum in aurem demitte, atque ita ipsum extrahes. Quod si per id parum profeceris, oleum calidum meatui assidue instillato. Si ne tum quidem eijciatur, aut comprehendatur, alia aggrediunda est ratio, ueluti in volumine de Chirurgia prosequemur.

De sonoribus ac sibilis aurium.

Si aurium tinnitus in febribus, aut earundem decretorijs prouenerint, noli quid negotij facessere. propediè namque cum plurimum, spontè hæc murmura cessant. At si post ægrotationem perdurauerint, absinthij decocto auribus fotis, acetum atque rosaceum infunde, aut radiculae succum cum rosaceo, aut helilebori nigri cum aceto. Contra ueteres aurium sonos ex crassis & uiscidis humoribus obortos (deprehendes autem id, quod non uniuersim, sed particulatim obueniunt, consistantque) aceto et nitro et melle aures eluito. Aliud: Veratri candidi drachmas duas, castorij tantundem, croci tres, nitri sedecim, in aceto dilutas dirige in rotulas, & utitor.

Ad diurnos aurium tinnitus & sibilos.

Euphorbium oleo cyprino dilutum calfactumque inijcitur, quibus

quibus ex nimio sensus acumine caput euaporationibus et flatulentis spiritibus tentatur, his castorium, et semen cicutæ in aceto laeuigatum instillato.

De grauitate auditus, & surditate.

Surditates quæ e primo statim ortu, aut post partu quidem, sed diuturnæ, et absolutæ constituuntur, curatione non recipiunt. Quæ autem absolutæ non sunt, sed inueteratæ tamen, et ipsæ insanabiles sunt, aut ægerrimè curantur. Quæ ex bilioso humore sursum uergente conflantur, non admodum difficulter euacuationibus, quæ medicamentis bilem deducentibus fiunt, discutiuntur. Nonnullæ etiã nulla medela adhibita, bile per inferna deiecta abolentur. Surditates uerò, uel audiendi grauitatem, e crudis et crassis humoribus prognatas, sectione uenæ, aut omnino purgatione cum hiera curato: apophlegmatismis item et errhinis utens, naturalibusq; aut ex marina lauacris. In auditorium autem meatum instillare quæ ad aurium tinnitum præscripta sunt, cõuenit. peculiariter autem hæc: lotium et fel caprinum, aut solummodo fel, aut rutæ succus cum melle, aut castoreum cum oleo anethino, aut æsopi medicamentum cum unguine nardino, aut fel caprillum cum galbano. Aut quod habet castorei drach. duas: nitri, ueratri cãdidi, singulorum drach.

Ad contusionem aurium, quam thlasin nominant.

Hippocrates quidem nihil ipsis admouendū asserit. Quoniam autem a laborantibus sæpenuerò impellimur, utendum utiq; his: Myrrhæ, aloës, thuris, acaciæ, æquas partes, cū aceto, aut oui cãdido oblinito. Aut panis calidi medullâ cū melle in mortario cõtusam, cataplasmatismodo inducito. Vel quod recipit, Bituminis, thuris, aloës, cochlearii carnis, bulborum Aphricanorum, pares singulorum portiones aceto contritas imponito. Si phlegmone accedat, sesamo soluta illinito, aut chondro cum aceto elixo. Atqui cataplasmata in hac affectione laxiora sunt, absq; deligatura: uel leuiter modò uinciantur, laxamq; oleo infusam sinuoso auris specui imponito,

De

LIBER TERTIVS.

De Parotidibus.

169

Parotis, glandularū iuxta aures est affectio, quæ eructant inibi materia, nunc ex capite humoribus in eo impactis, nunc ex reliquo corpore in febribus decretoriū facientibus, exoritur. Quocirca si etiamdū in profundo delitescens, parotis non assurgit in tumore, extrahentia præsidia exhibentes, aut cucurbitulam affigentes, aut fomentationib. crebris utentes, ne si in altū remeet materia, periculum afflicti non effugiant. Si uerò in tumore fastigiatum cum inflammatione attollatur, contrarijs omnino cataplasmatibus, leniendi & maturandi uiribus præditis, utemur: uerbi causa, ex farina hordeacea, aut triticea, aut seminis lini farina cum mulsâ, aut fœnogræci, aut altheæ, aut chamæmeli iure decocto: et quod ex rumice & axungia sine sale constat. Si sanguis modū excedere uideatur, euacuandus est ante omnia ipsius incisione uenarū, siquidē per uirtutē laborantis integrū sit. Sed si tumor nō discutitur, medicamentis quæ suppurationē inducunt, utendum: cuius generis est farina triticea, cum caricarum decocto & oleo: atq; id quod ē polline, itē id quod ē fermento cōponitur medicamentū. Commeante uerò iam ad suppurationē abscessu, uel dissectionē purulētia excernetur, uel acri medicamine cōfringetur. B. quorum albo censetur, nuncupatū smilium, & quod ex allijs constituitur. Parotides autem leuiore fotu ē muria discutuntur: item diaperanu medicamēto. Hoc quidem non pus modō iam maturatum dissipat, sed indoloriū etiā præ omnibus cæteris est efficacissimum. Ad inueteratas parotidas, buccinorum aut purpurarum crematarū cinerem cum melle aut axungia imponamus, aut ficus marinas coctas, aut marrubiū cū sale. Iam obduratas emollit, tum Mnasæi, tum Ariobarzanos cōfectio. Præsentissima uerò est, quæ ex lentitia seminis lini textitur. Ante uerò hæc illinito ammoniacum, mixta cum cataplasmatibus pice liquida, aut adipe taurino, aut bdellio, aut styrace, aut medulla ceruina.

De

I olfaciendi potestate læsa, uox incolumis seruetur, antea
 Sriorum cerebri uentriculorū affectionis suspicio est, qui uel
 simplicis intemperiei culpa noxā conceperunt, uel prauorū
 humorum exuperantia. Si uox autē simul læsa fuerit, ac labo-
 riosior quodāmodo, propter obstructionem meatuum, qui ethi-
 moides à colando uocantur, euaserit, malum rursus ex uitiosis
 humoribus conceptū putato. Proinde cerebri intemperatura
 ex notis sæpius enumeratis cognita, cōtrarijs utitor remedio-
 rum adminiculis, caputq; calida marina perfundito: humores
 apophlegmatismis euacuato, maximè uerò quæ ualidè per na-
 res educunt errhinis. Odoramentaq; subtiliū partium, quem-
 admodū in distillationibus exhibeto. Si humorū copia in uni-
 uerso corpore uersetur, hanc prius uel detractione sanguinis,
 uel purgatione cū hiera euacuato. Sic et in polypo, & oza-
 na agendum censeo: deinde loco forinsecus injiciēda sunt auxilia.
 Theriaca quoq; potassa piissimè opem præsentissimam attulit.
 Est autem polypus, tuberculū præter naturam in naribus ob-
 ortum, substātia polypodis marini carnem referens. Eiusdem
 uerò naturæ est et sarcoma, hoc est, caruncula in naribus præ-
 ter naturam incrementum. Ozaena uerò hulus est cariosum,
 ac putridum, ex acrium humorum illuue prognatum.

Ad Polypodas & Sarcomata.

Squamula aris unciam, atramenti sutorij drach. sex, san-
 darachæ quatuor, ueratri nigri duas, naribus flatu impellito:
 & utere perinde atq; præstantissimo: nam in tredecim diebus
 opem præbet notatu dignam. Conducit & atramentum suto-
 rium, cum aceto. Aliud: Corticū mali granati sesquiunciam,
 atramenti sutorij drach. decem, chalciteos octo, bilis taurinæ,
 amomi, myrrhæ, nepetæ, marrubij, singulorū drach. quatuor,
 croci duas, ueratri candidi quatuor: arido utere. Aliud: Di-
 phryge læuigato nares attingito, & peniculo ex linamento
 funiculari prius patentes facito.

Ad

LIBER TERTIVS.

Ad Ozænas.

191

Misſyos, chalcitidis, myrrhæ, uniuſcuiuſq; drach. ſeptem, atramenti ſutorij ſex, aluminis fiſſilis, gallæ, ſquamulæ æris, ſingulorum drach. quatuor, aluminis rotūdi duæ, thuris una, aceti ſextarius, totum in uaſe æreo ad mellis uſq; cōſiſtentiam elixatur, ex carptis q; linamentiſ penicillo adhibetur.

Aliud: Aeruginis & æris ſquamæ paria pōdera in puluerem redacta, conferunt.

Aduerſus fœditatem odoris narium.

Myrrhæ, acaciæ, amomi, ſingulorum drachmā, melle deſpumato exceptā, ſummo nariū interſepto adglutinare mandato. Aliud: Amomi, myrrhæ, roſarum ſiccarum, æ quali pondere, unguento nardino exceptum, illinito. Cōducit etiam graueolentiæ narium, malagma Hedychroi cum uino.

Ad hulcera quæ naribus inſident.

Ceruſſæ libram, ſpumæ argenti uncias treſ, ſcoriæ plumbi tantundem, uel plumbi cremati: ſingula probè lota, uino oleoq; myrteo excipe.

Ad ea quæ Glycea dicuntur hulcera.

Spumæ argenti, rutæ recentis, ſingulorum drach. quatuor, aluminis ſciſſilis duæ, oleo myrteo atq; aceto ſubiguntur.

Sternutationes prolicientia.

Sternutamentum citat helleborus albus, aut caſtoreū, aut piper, aut ſtruthion, aut uno faſce omnia: neq; tamē inſpirare, ſed pinna aut digitulo ad intimam naſi partem inſerere conuenit. Sternutamentū autem plus æ quò citatū, medicamine conſpiciendum eſt: nardinum igitur, aut roſaceū, aut glycelæum, inſunduntur. Quin & odoramēta ſternutamenta ſiſtunt, aniſum, ocimi ſtipulæ contuſæ. Sed inter hæc omnia caput ſmegmatis ex nitro & pumice factis exiccandum eſt, aut eo quod Aſclepium cognomentum habet, & Conſtantini ſapone, & Cappadocico ſale, & alijs id genus utendum.

De ſanguinis profluuiio e naribus.

Super ſanguinis ex naribus eruptione, quæ febricitantes infeſtat, libro ſecundo inter febres recensuimus. De quacunq;

uerō

uerò alia, quæ ægrè compesci potest, in præsentia agemus. Chalcitidis pollinem ellychnio siue funiculo lucernario concocto, aut priapisco excipe, & foraminibus nasi indito: aut oui calycis cinerè admisceto, & gallæ dimidium: lyciòue indico attinge, aut stercoris asinarij cremati cinerè inspirato, aut succum eius elicitū instillato, aut molaris lapidis extincti acetō uaporem naribus hauriendum præbeto. aut obstruenti hoc unguine uitior: Mannæ thuris partē, aloës semissem, oui candido excipe, & utere, per linteolum ex ellychnijs intortum, forinsecus leporinis pilis unctulo adiectis: aut lucernarij funiculus in nares conijcitur. Aut cucurbitulā leuem directā hypocondrio naris, unde sanguinis eruptio fit, bene magnā et constanter applicato: uel aures ualentius obturentur, frontē spongijs gelida aqua imbutis foueto, uel syciā cum sanguinis detractione occipiti adglutinato. Quandoq; uenam secare, nisi quid interdicat, & extremas partes deligare expedit: præcipuè brachia atq; crura, quemadmodum in uenæ sectione solitum est. Ad hæc agitari cōcutiq; easdem particulas imperato, manus quidem perfricando, pedes uerò obambulando. nam uenis indidem sanguine fartis, narium uasa inaniuntur. Spongia gelida posca madens, forisq; manantibus sanguine naribus stricim applicata, quod desideratur, identidē absoluit. Satius autem, si antè naribus cuneoli instar penicillus prælongus ex linamentis carptis contortus inferatur.

Aduersus faciei uitia, & antidotum quo facies a rugis conseruetur. Cap. 25.

Thuris drach. quatuor, fuci tres, spumæ argenti, piperis, uniuscuiusq; octo, omnibus ex ichthyocollæ tunscæ diluto solutis, & in rotulas conformatis, utendum. Aliud: Ramenti eburnei drach. octo, thuris masculi, ichthyocollæ, paria pondera: utere, quemadmodum dictum est.

Ad faciei nigredines.

Ireos, aut ptisanæ lomenti, singulorum sextarius unus & semis,

semis, salis ammoniaci, cornu ceruini cremati, ammoniaci thymiamatis, uniuscuiusq; sextans, aqua dissoluta in pastillos diriguntur, rursusq; aqua diluta ante balneum illinuntur. Aliud: Pissanae, erui, thuris, illyridis, spuma nitri, singulorum chœnices quatuor, costi, amygdalarum amararum, uniuscuiusq; drach. viginti, ouorum candido liquore, et lacte asinino excipito, atq; eo quo diximus modo utere. Vincit etiam pastillus Peponatos.

Ad asperam & discolorem ceu a sole cutem, & lentigines.

Cretæ cimoliæ torrefactæ cōgins semis, spuma nitri assati uncia, siliquæ eruacæ uncia media, fellis taurini, scobis eburnei, utrobique uncia, contritis facie defricato. Aliud: Fecis uini, erui farinæ, lomēti, singulorum drach. decē: ueratri candidi quinque, spuma nitri decē, halcyonij tātundē læuigata infricatur.

Ad sugillata, quæ Græci hypopya appellant.

Oculis inter initia quidē, decocto scenogræci, deinde uerō & meliloti fotis, Nili collyrium diarhodon aqua dilutum circumlinito, post hæc diasmyrnes. Quod si nihil profeceris, cōpositum ex sandyce crematū inunge, aut hyssopum cum aqua impone, uel in panniculū uincto hyssopo, & calida aqua mādete, liuores foueto, aut muria acri cōsimiliter. Præterea corticē radiculae cum melle tritū applicato, & hoc inueteratos liuores exterit. Cæterū ad expungenda quæ uetustas occupauit faciei sugillata, et uibices ipsius liuidas, tordyli partes duas, rubricæ Samiæ partē, cū melle imposito: cauēs interim, ne exulcerationē inducat. Aliud deterforiū: Hyssopi, thapsiæ, castiæ, ceræ, singulorum drach. duas, terebinthinæ unam, adglutinato: cura adhibita, ne locus exulceretur, & ob id quidem identidem tollendum.

Ad uaros:

Sunt autē uari, exiles, duriq; in facie tumores, quibus oxy-meli infricando circumlinito: aut spumā argenti cum terebinthina, & pusillo olei albi tritā inunge, similiter infricans: aut fissile alumen cū terebinthina, aut amygdala amara aceto eli-

N quata

quata infricantur. Sed in callū duratos uaros. saponis Gallici uncia dimidia, thuris, guttæ ammoniacæ, u. ius cuiusq; drachma, aqua dilutis illinito, & hora transacta abluito.

Ad uaros, pilos, & aspredines faciei.

Ceræ drach. decem, terebinthinæ unam uisci duar, colliquesfacito, superq; oleū infundito, atq; eo medicamine uultum tergito: tollit enim radicitus. Aliud: Papauer læu gatum, aut pulegiū cum sale atq; aceto, cataplasmatibus modo illinito.

Cerorum Thaidis, ad rubicundum uultum faciendum.

Croci, rubiæ radicis, fuci, thuris, myrrhæ, singulorum drachmas duas adipe uitulino, & oleo mastichino excipe, deinde illinito, interualloq; temporis imposito, sponsia calida imbuta abstergito. Cæterum faciei medicamēta uniuerso quoque corpori congruunt.

De affectibus oris, & primo de dentium cruciatu. Cap. 26.

Dentium absq; gingiuarum phlegmone cruciatus, interdum quidem in suo corpore, nonnunquā uerò in neruo quī ad dentes pertinet, fieri consuevit. Validissimis igitur opus habet remedijs, quocirca pleraq; ipsorum aceto quā acerrimo componuntur. Cum uerò gingiue propter phlegmonē dolore infestantur, omnium præstantissimū medicamētum est oleum lentiscinum, bene temperatū, ore retētum. Esto id autē recens, quoniā uetus tantū bonitate recenti cedit, quantiū uetustate superat. Cōmunis autē etiā in præsentiarū obseruetur medēdi ratio, ut prius qui toto corpore modū excedit humor, euacuetur.

Ad inflammationem dentium.

Colluantur aceto, in quo elixa sit galla, aut haliacabiræ radix, aut herbe apollinaris semē, aut eius folia, aut pulegium, aut solani succus, aut capparis radix, aut myrti folia, aut populium, aut cucumeris syluestris radix, aut folia rutæ cum oxymelite, aut cornu ceruinū, aut acetum scilliticū, aut pyrethrum cum hyssopo. In exesam uerò dentis concauitatē styrax cum opio inditur, aut galbanū, aut sulphur ignē non expertū cum lycio

lycio, uel alterci seminis uapor per infundibulum recipiatur. Philonis præterea antidotus denti illita, indolentiâ conciliat. Vbi uerò ex fluxu dentes dolore conflantur, myrti & len-
tisci, & gallæ decocto, aut rhu Syriaci, aut florū agrestis pu-
nicæ, aut maliciorum iure colluito. Applicatis salis portio-
nibus duabus, aluminis tosti, et aceto extincti læuigatiq; parte
una, postea uino colluantur. Gingiuis cruentis, tenue alumen
inspergitur, aut aloë et uino colluuntur, aut rubi radice uino eli-
xata, aut rhu Syriaco. Gingiuas uerò cruentas & defluxione
pressas, salsamēti crudi in olla ad carbones usq; deusti, cinere
attingit. Aloë porro dentes concussos, si inspergatur, firmat.
Rhus itē Syriacus, aut fissile alumen, aut galla, aut rubi radix
per se, uel in uino elixa. Aliud: Nucis uiridis corticē læuis-
gato, atq; ius ipsorum si habes, myrrhā ueram, alumenq; scis-
sile in ipsum cōj cito. ubi unita fuerint, in usum infundito, atq;
gingiuis qua dens afficitur, imposito, præsentī erit remedio.
Aliud: Allium, & piper, & syluestre staphida, trita, si funicu-
lo laneo in cuneolos exiles redegeris, atq; identidem ore uer-
saueris, aut permutaueris, humiditatem capitis purgabis, den-
tesq; sanabis.

Ad quassatos dentes, & gingiuas fluxibus tentatas, & unum-
quodq; depascendo serpens in ore hulus.

Chalcitidos ass. & drach. duodecim, cadmiæ octo, utere hoc
pulvere, adiecto aceto: sine dolore dentes tollit. Farina cum li-
quore tithymalli inditur, et super bedera folium accommoda-
tur, & horam permittitur: sponte enim dens conteretur.

Dentium smegma, & ad parulidas.

Aluminis latercularij, salis ammoniaci, singulorum triens:
myrrhæ, costi, pyrethri, uniuscuiusq; drachmæ quatuor, piperis
grana octoginta.

Ad parulidas.

Sulphuris ignē non experti, piperis, aluminis fissilis, æqua-
les partes. Et parulis inflammatio quidem est, in aliqua gingi-
uarum

uarum parte orta: quæ nisi dissoluatur, suppurat: cum uerò suppurauerit, scalpello dissecta, linamētis insertis distēdetur. Epulis uerò, carnis quædam excrescentia est, quæ ab inflammatione exurgens, ad intimum molarem pertinet, cui febris interdum dolorq; iungitur. Opus itaq; cum habeat reprimētib; rasili ferrugine per se, aut cum eiusdem ponderis galla, utendum. Aut fori tosto, aut alumine quocunq; combusto, aut galla priuatim, aut squama æris cum aceto cum plurimis diebus emollita & arefacta.

Dentium smegma.

Aristolochiæ radix cremata, cornu cerui tostum cum paulo xillo mastiches, sal album melle conspersum, folijsq; ficulneis circumuolutum, combustumq;, donec in carbones uertatur. Aliud: Buccina sale respersa & adusta, cochleæ itē terrestres cum melle exusta, lana succida cū exiguo sale exusta: singulis aut horū fragrantia causa admisceatur flos rotūdi iūci odorati, aut spicæ nardi, aut foliū malabathri, aut cypirus, aut iris.

Dentes dealbans, gingiuas restringens, & iucundum oris odorem præstans.

Pumicis, salis assi, iridis, singulorū drach. quatuor, cyperi quinq;, spicæ nardi una, piperis sex, leuigatis utere.

Ad dentium stuporem.

Dentiū torpori portulaca manducata succurrit, aut oleum ex nondum maturis oliuis expressum, infricatum. Idem facit amurca, oleo in æneo uase, usq; ad mellis constitutionem decocta, si inueterata illiniatur.

Aduersus dentes attritos.

Dentibus attritis bacca lauri, alumen fissile, aristolochia sarmentaria pari pondere subueniunt.

Contra gingiuas exefas.

Florum rosarum drach. octo, gallarum quatuor, myrrhæ duæ, gingiuas corrosas & humore flaccidas collutas sanant. Item lac asininū, oliuæ foliorum decoctū, acetum scilliticum.

Aride

Arida uerò adhibita ærugo ferri, cytiniq;. Cæterum ad tumores & carnis excrescentias facit portulacæ succus in ore contentus. Muria quoq; conditarū oliuarum, oleum calidū ex oliuis nondū maturis expressum, aut lentiscinum, aut melinum, aut amurca. Ex aridis uerò ærugo ferri, aut æris, radix aristolochiæ, plantaginis semen, diphyrges, atramentum sutorum torrefactum, atq; cytini.

Ad labiorum fissuras.

Amurcam elixam, aut adipem anserinum cum melle terebinthinaq; pari pondere, floris rosarum, hyssopi, rosacei, singulorum perexiguum illinito.

Aduersus tumorem linguæ, quem Batrachum appellant:

Ranunculus tumor est cum inflammatione sub lingua erumpens, in pueris maximè. Locum itaq; misyos, æruginis rasilis, æ quis portionibus siccis perfricato. Mento autem applicabis antheram, aut sphaerium, aut parygrū ex ouis concinnatum. Venam in perfecta ætate sub lingua secare expedit. Aliud, quod ad aphthas quoq; facit: habet ferruginis rasilis, gallæ, chalcitidis, pares partes: cum passo uerò etiam os eluitur.

Aliud: Bruina farina cum melle ranunculū prius abstersum, galla item læuigata cum melle illinito, aut rosarum floribus similiter, uel iure foliorum oliuæ colluito.

Ad tonsillarum inflammationem.

Si in febricula tonsillæ & columella inflammantur, gargarisationes cum furfurū, aut rosarum, aut palmularū, aut myxarum, aut lentiū decocto competunt. Sed inflammatione remittente, aut in summo eius uigore, mel quoq; dictis cōmiscendum est, quod ab initio facere nequaquā conueniebat, neq; in augmento, ne quem acredine defluxum cieat. At si ad suppurationem iam perducta distrūpatur, mulsagargarissandum est, aut cum lenticulæ aut rosarum decocto: cuiusq; ad exactā solutionē insistendū, aut stomaticā collutionē gargarissandam porriges. Vbi uerò hucera pestilentia tonsillas occuparint,

N 3 utendum

utendum quidem præscriptis : priuatim uerò offerēda est di-
moron confectio, aqua calida, uel aqua mulsa cum flore rosa-
rum traiectarū, aut costū, aut rhus arida, uel elixa, uel glauci
foliorum aridorū decoctum. Est illud peramarum quidem, sed
optimè conducit, si succū, ut in collyrijs solemus, mulsa soluas:
ipsius uerò fruticis aridi flatu impulsī commodissimus est usus,
aut digito accommodati. Danda autē est opera, ne omnino mani-
bus attingatur, aut suspensa saltē manu primoribusq; digitis.
Auxilio etiā fuit Andronius pastillus. Post istas irritationes,
gargarismata cum iure glycyrrhizæ facito, aut eo quod scy-
belite, croco, terra chia, & myrrha constat: postremò uerò æ-
mylo & tragacantha. Quod si hylcus serpens perseueret, me-
dicamento ex lacte, & Samia creta gargarissandū. Aliud
ad tonsillas & antiadas: Succus mali punici dulcis cum cor-
ticibus contusi partes sex, cum mellis una confusæ, ad mellis
usq; crassitudinē decoquantur, & inungantur. Aliud: Con-
stat ex gallæ immaturæ uncijis quibus, aluminis fissilis uncia,
salis ammoniaci torrefacti uncia. hoc puluere leniter attinge.

Aliud: Gallæ drach. octo, misyos duæ, salis assi quinq; ari-
do utere. Est autem Antias, tonsillarum tumor durior.

De oris columella.

Quando gurgulio, quam uuam nuncupāt, inflammatione
tentatur, gargarismatis, quorum usus in tonsillarum inflā-
tione probatur, mediocriterq; astringentibus utendū: cuiusmo-
di est, succus mali Punici, cochleario aut instrumēto quod Sta-
phylepartū nominant, subditus, tum priuatim, tum cum melle
quantum satis est decocto, aut dulcis radix mali Punici liquori
permixta. Benefacit etiam dulcis radicis succus cum melle in-
ditus. Reprimit uuā hæmatites lapis, & Phrygius crematus,
& ueluti non senescens, ageratus dictus, & confectio ex Phry-
gio lapide, pudēdis dicata, & terra Samia, & eretrias, & ru-
brica sinopis, & Lemnia, & omphaciū per se, et cum horum
aliquo, spinæ item Aegyptiæ fructus, & alumen scissile. Rosæ
ucrò

uerò cum semen, tum folia, mitiorem exerunt efficaciam. Adbuc etiam lenius operantur, gummi, tragacantha, sarcocolla, amy-
lum: quibus utiq; potissimè utendū, si uua magis torqueatur, ab
astringentibus cōstricta. Si æqualiter crassa fuerit ipsa, quod
malum columellā appellāt, gargarismatis fidendum quæ ex
myrrha, croco, & cypero constant. Cæterū contusiones solia
citius obseruandæ sunt, & ob id quid? penna potius circumlis-
nienda: permixtum uerò medicamentū proficit, rhus Syriaci
drach. octo, croci quatuor, costi octo, seminis rosarū quatuor.
Ad hæc gingiuis cōducit linamentū è purpura marina, quod
uiperæ collo circumdatū ipsam strāgulauerit: deinde tonsillis
circumapplicatum. Mirum quantum hoc opis cum ad tonsile
Lu, tum ad quæcunq; faucium uitia conferat, teste Galeno.

Ad sanguinis eruptiones ex ore.

Porri folia contusa imposito, aut spongiam nouam pici
crudæ immersam concremato, læuigatamq; in usum adhibe.
utilissima est. Oris item collutiones, ex rosis aridis seu uiridi-
bus; decoctum itidem frigidum, aut capreolorum uitis, aut len-
tisci foliorum, aut rubi, aut malorum cotoniorum, aut rosas-
rum, aut acinorum uuæ, aut lenticularum.

De angina, eiusq; differentiis, inibiq; de strangulatis, aut alias
quodammodo suffocatis agitur. Cap. 27.

Inflammati faucium interioribus musculis, angina, quæ
Græcis synanche dicitur, accidit: exterioribus autē, parasy-
nanche. Pari modo & gutturis interiores musculi, si inflam-
mationem experiuntur, cynanchen: si exteriores, paracynan-
chen excitant. Omnium eadē euenta sunt. Recta ceruice spira-
tio, & dolor cū difficili spiritu. Nonnullis etiā febris, ruborq;
uultus, colliq; & tumor in quibusdā accidit: os ipsorum hiat,
& deglutire nequeunt. Cynanchen nonnunquā suffocatio co-
mitata est. Hoc affectu pueri rarenter confluantur, cum uerò
tebra ceruicis affecta loco suo excidunt. Cæterū his tanquam
deploratis, manus admoūda non est. Reliquis euestigio uena

N 4 cubiti

subiti aperienda. Sed non semel confertim euacuandū, uerū
 in plures euacuationes humorum multitudinē separātes. nam
 cum ex cumulata et semel facta inanitione in animi deliquium
 incidunt, suffocationis periculū superuenit, prorumpēte uni-
 uersim in affectā partem materia. Si his malū non cedit, uen-
 quoq; sub lingua secandæ sunt: aut lingua etiam ipsa, si exerta
 tumentiorq; uideatur, scalpello cōcidenda est. Aliumq; acriore
 clystere ducēda, pedes ad hāc aqua calida fouēdi, extremāq;
 corporis partes ualidē deligādæ. Lanis collū succidis, uel oleo
 imbutis uelari, et ex hordeacea polenta cruda, cataplasmate
 adiuuari debet. Ab initio porrō usdē quæ de phlegmone tonsil-
 larū memorata sunt, gargarizandū: aut simplici diamoron,
 cū elixatione rhois. Nobilius autem fuerit, quod ex syluestrib.
 moris institutū est, diamoron. Post hāc uerō et cōposito dia-
 moro, aut diataryon utendū. Morbo uerō in summo incremen-
 to uigēte, nitri quoq; pauxillum admiscendū est, aut sulphuris
 etiam ignē non experti, nisi acredo aliqua prohibeat. Oletum
 præterea caninū aridum contritum, cumq; melle illitū, præ-
 sentissimū est remediū, atq; ex hoc colore candidū præcipue:
 et syluestrium hirundinū cinis similiter prodest. Moram diu-
 tius trahente malo, illitione ex semine rutæ, quod besasa appel-
 lant, utendum. Interdum quidē eius potentiā aliorum medica-
 minum mixtione remittentes, nonnunquā denuō intendentes.
 Probatū etiā cucurbitularum et hirudinum sub mento, cir-
 caq; ceruicē applicatio. Ad hāc gargarismatis ex iride, bysso
 po, melanthio, abrotono, glycyrrhiza, ficis in aqua mulsa de-
 coctis, aut rutæ succo cum lacte, aut sinapi cū oxymelite uten-
 dum. Si qua uerō asperitas inde acrior percipiatur, oleū quā-
 præstantissimū calidū, aut rosaceum per se, aut cum cremore
 ptisanæ, aut fœnograci gargarizandum exhibetur. Alimen-
 tum aqua mulsa per triduum esto, à quo cremor ptisanæ cum
 potione aliqua suauis propinādus est, deinde et ouorum uitelli
 per liquidi. Bmēdata iam ingluuie (ita ut deglutiant) sorbitio
 nibus

nibus ex chondro, & cibus languentiū uirtuti conuenientibus, utendum. Malo autē remittente, ægrum cū ad inambulationes, tum in lauacrum perducemus. Locum affectum cerato ex oleo rutaceo contegamus, & reliqua educatione, ut decet, uirium refocillatrice utamur. Nemini strāgulatorū, quibus spuma circa os extiterit, manus admoliri debet, suadente Hippocrate. Alij uerò uitæ restituantur aceti infusione, & piperis, aut urticæ seminis in aceto acerrimo cōtriti: sed quoniā ægrē admodum suscipiunt, cogendi sunt. Dissolutis uerò colli ruboribus, statim suspiciunt, & ad se redeunt. Consimiliter & in naufragis, & uno uerbo, in omnibus qui præfocantur. Excitatur enim his, recreaturq; caliditas.

De Coryza, catarrho, arteriacis, ac tussi. Cap. 28.

Communis est affectibus illis, excrementitij humoris à capite in subiectas partes delatio: qui si in nares defluit, malo coryza græcè, mucus & grauedo latinè nomen est. Si in fauces & palatum, Catharrus simpliciter Græcis, destillatio nobis appellatur. Sin autē in guttur & asperā arteriam deferatur, ita ut interiorē membranā ambientem exulcerarit, et salebrosam reddiderit, uox raucosa comitatur, appellantq; affectionem Branchum, siue arteriacum, latinè raucedinem: in quibus non è capite modò, sed ex uehementiore uociferationis conatu, et è gelidi aeris inspiratu asperitas prouenit cū inflammatione. Si prorogatur diutius malū, fluxusq; in pectus, pulmonesq; decūbit, maleficæ ac pertinaciores generātur tusses. Quin & ex intemperie sæpius tussis excitatur, quandoq; calidior ceu in febribus, nonnunquā frigidior, quemadmodū in tempestatibus Aquilonijs, quæ aridior est. Iam uerò aliorū sæpenumero morborū symptoma tussis existit: uerbi causa, morbi lateralis, iocinatoriorū, phthisicorum, affectuūq; pulmonis. Proinde Galenus in diuturnis tussibus, grandines quasdam à thorace reijci prodidit. Alexander uerò calculū quendam ponderosum, ueluti in urinarjs meatibus nascitur, in uetere tussē

N 5 reddi tura.

redditum perhibet, indeq; cessasse tussim asserit. Nos autē inter sanguinis reiectionē, lapidum excretionem uidimus, quem admodum ubi illuc peruentum erit, pressius commemorabimus. Qui igitur ex aestu, coryza, ut catarrho conflatur, circa partes affectas caloris sensum percipiūt: fluxio quaedam acrium humorū ac tenuium cū per nares, tum per os defluit, rubor partes faciei nariumq; inficit. Qui uerō ex frigore, his circa caput & frontem oritur distētio, meatusq; obsum quae à percolandi adminiculo ethmoide uocatur, obturatio, ita ut resonare uox deorsum per nares nequeat: quibus longiore tempore protenditur, & tusses accidunt, pituitaq; excretio, nunc quidem crudae, nunc uerō liquidae, interdum autem uiridis. Nonnullis uerō febris superuenit, eos qui ex aestu impetuntur, nihil adiutans: sed ipsi qui ex algore infestantur, concoctionis functionem promouens.

Curatio catarrhi atq; coryzae.

Quum igitur calida intemperies modum exuperat, eadem remediorum praesidia quae ex tali causa caput dolentibus competunt, adhibenda sunt. Lauacris utendum, caput permulta calida cōspargendum. Alimenta his cōueniunt, quae sorberi commodissimè queunt, oua sorbilia, amyllum, placētā quae itria uocantur, & sesama, & amygdala, & pini fructus, et quaecunq; ex lacte concinnantur bellaria. Ex uinis uerō, dulcia, non antiqua, eiq; papauerum capitibus linctus, & quae ad haec cōposita sunt praesidia. Si gelida intemperies affligit, et morbus difficulter uincitur, per modico uti oportet nutritu, & capitis ē calidis & subtilium partium rebus, nardino, rutaceoq; cōstituta inunctione. Irinum uerō nō illinendum solum, sed & naribus instillandum. Intus eadē thure, & myrrha cum oleo, maxime si ex frigida causa grauedo orta sit, perungantur. Nonnullis odoramenta ex reycula cōbusta, uel ex melanthio aut cymino crematis, detrictoq; panniculo illigatis, fuerunt auxilio: Cyphi Selniacum, id est lunare, naribus admouetur, & frōti salubriter

ter circumlinitur. cui simul unum ex emplastris inflammatio-
nem profligantibus adglutinato: è quorū numero est Icesium,
aut Oxera, aut Barbarus, aut Athena. Ad catarrhum uerò fri-
gidum, Cyphi quoq; potare expedit. Thorace balsami succus
per lanam succidam illinendus est: fouendum idem ab omni
parte cum styrace, irino, & anethino. Cibarijs calidioribus, et
concoctioni nihil renitentibus utendum. Materia uerò conco-
cta, apophlegmatismus qui commanducatu pituitam cit, con-
ueniet, & smegmaia capitis: uerbi causa, sapo Constantini, et
his similia.

Raucedinis curatio:

Arterijs branchijsq; appellatis, eadem sanè quæ superius
cōmemorata, conueniunt: priuatim uerò si arteriā laryngaq;
occupauerit inflāmatio, inter initia statim, quæ tectorij modo
illinūtur, remedijs meatus obstruētibus, tantisper dum inflam-
matio moderatior reddatur, utendū est: cuius generis sunt, con-
fectio passi Cretici, tragacanthæ, gummi, & amyli. Pinguium
item palmularum decoctū, et dulcis radicis cum sapa, ad mel-
lis crassitudinem: usq; hypoglottidum, sic quòd sub lingua
teneantur, appellatarū. Sed tunc ante omnia uino abstinēdum
est: dulce autē uinum, si inflammatio remissior euaserit, potui
detur. Et bellaria ex melle, & lacte cum amylo, aut pane sili-
gineo, sorbitionesq; ex amygdalis, atq; butyrum assumantur.
Cum uerò humiditas aliqua artus occupat, uehementius abster-
gentia aggrediunda sunt: qualia sunt, fabaceum lomentū, &
ex melle confecta: brassicæ item, & porrum probè decoctum.
Pharmaca porrò magis calorifica, & quæ ad tuſim faciunt,
accommodata sunt. Et quæ sapa ex ficis pinguibus, thure, iri-
de, terebinthina, styrace, galbano, pipere, cinamomo, cassia, et
his non dissimilibus confiunt.

De Tuſi.

Tuſibus quoq; eadem methòdo medendum. illud duntaxat
absq; perperſione non pratercundum, per consensum ne ca-
terarum

terarum partiū quis tuſſiat, uerbi cauſa, gurgulionis deſtillantis, aut capitis, et an alijs morbis ſuperueniat. His quoad eius fieri poteſt, ſecundū quē prædiximus, & mox dicemus modū, proſpiciendū eſt. Cōpoſita uerō præſidia deinceps exponam.

Catapotia, medendo catarrho ac tuſſi.

Styracis, myrrhæ, opij, galbani, pares uniuſcuiuſq; portiones, paſſo exceptæ, aut ſingulatim in mortario cōtuſæ, ad erui inſtar digeruntur, noſtūq; lectum petenti trina aut quaterna, quina' ue propinantur, paſſumq; inſuper ſorbetur. Hæc quippe ad acrem & ſubtilem faciunt deſtillationem. Aliud: Herba apollinaris ſeminis drach. duodecim, pinearū nucum ſex, croci duas, deſruto aut paſſo excipe, & utere.

Ecligma, ſeu linctus.

Mellis uncia, butyri ſemuncia, ſimul coquantur, & exhibeantur. Hyſſopi præterea & ficum, & nucleorum pineorum, & iridis decoctum hauriatur.

Catapotia ad diuturniorem tuſſim.

Styracis drach. ſex, myrrhæ duas et ſemiſſem, terebinthina, galbani, opopanacis, ireos, ſingulorum drach. duas, piperis albi, nitri, ſeminis alterci, ſucci papaueris, uniuſcuiuſque drachmam, abſq; ullo liquore in pila contuſa, in catapotia digerito, atq; eo quo docuimus modo utitor.

Arcendis ſalebris gutturis, tuſſi, cruentisq; ſputis.

Amygdalas amaras decorticas uiginti quinque, ſeminis lini torrefacti drach. quatuor, tragacanthæ duas, nuclei pinei grana triginta, oui in adipe toſti croceū ipſa tragacanthæ in aqua liquatur, totum uerō paſſo excipitur. Quod ſi fractæ quoque uocis ſonus edatur, paſſi loco mellis aliquid confundito, præſertim in quibus nonnihil ſurſum ferri ac eijci expedit.

Arteriace hypogloſſis, his qui uocem amiſerunt, raucis & anaphoricis accommodata.

Tragacanthæ, gummi, ſingulorum drach. ſex, myrrhæ eam, thuris unam & ſemis, piperis candidi grana uiginti, croci

croci drach. succi glycyrrhizæ sex, trium palmularum carnem, passi Cretici quantū satis est. Et ipse solus tragacanthæ succus in uicē succi glycyrrhizæ linguae suppositus, decoctūq; ipsius ad crassitudinē usq; elixum, quadrupla mēsurā inditur.

Ad amissum uocis sonum, & his qui uocem exercent efficac arteriace.

Porra sex ad tertias usq; decoquito, & ipsa quidem porri cito: liquorē uerò alicæ cum melle iuri ipsorum commisceto, & ouorum antea elixatorum lutea terna unā decoquito, anæthi rudicula subinde commouens.

Bechicum tussientibus utile.

Pulegij uncias duas, nucleorum pineæ, seminis cnici, seminis lini, uniuscuiusq; uncia, piperis cocti uncias quatuor, mellis elixato miscebis. Aliud: Hyssopi, pulegij, piperis, singulorum uncia, petroselini uncia semis, mellis hemina excipiuntur.

Maturatiuum indeteratæ tussis:

Vbi mellis drach. sedecim, terebinthinæ duæ, galbani quatuordecim unā coxerint, in rotellas digerito, quæ fabæ magnitudinem æquent, & instar nucis ponticæ, & ex his delin-gatur. Aliud: Tussi aridæ arteriaca medentur, & feruentis aquæ interdū sorbillatio. sputū enim propter crassitudinem pituitæ nō reijcientes, liquidis aliquantulū adiuuabuntur. Cōfert præterea ipsis, hyssopi, iridos, & nucis pineæ decoctum.

Trochiscus Capnistos ad tussim continuam.

Styracis, piperis, mastiches, petroselini, singulorū unciam, sandarachæ diobolos sex, baccas lauri duas, melle excepta in pastillos dirige, qui carbonibus iniecti, fumo suo nidore exhibent utilē, si per infundibulum in fauces tussientis admittatur. Prodest etiam quocunq; modo perfrigeratis.

De Orthopnoæa, Asthmate, & Dyspnoæa. Cap. 29.

*Q*ui sine febre crebra respiratione, tanquā à citatiore cursu agitati, conflitantur, ab eo quod comitatur accidente, asthmatici, hoc est anhelosi nuncupantur. Eadem quod strangu-lari

lari formidantes, ad respirationē recto pectore toto nituntur, orthopnoici dicuntur. Oritur autē affectio, crassīs & glutinosīs humoribus, fistulosis pulmonum cartilaginibus, cavitatibus infarctis. Dyspnœa uerò, hoc est spiritus et animæ difficultas, commune est accidens, cū hæc, tum alia plurima mala comitans. Anhelosorum medendi scopus est, uiscidos crassosq; humores, medicamentis attenuantibus & abstergētibus consumere. Proinde acetum scilliticum hoc malo oppressis at commodatissimū est: & inde confectum oxymel in potu sumptum, ipsaq; scylla tosta, cum melle trita. Ex antidotis hiera, et alia medicamenta ualidissima, quæ aluū continenter deiectionibus sollicitant, & cum raphanis citati uomitus, aristolochia rotunda bibita, centaurij maioris radix, spondyli semen & radix, nepetæ fructus, hyssopū, iris, melanthium. asellorū qui uligi nosis & aquaticis degunt, sextariū uasi inijciens fideli, super carbonibus torrefacito: ubi uerò candorem induere cœperint, conterito, melleq; despumato excipiens, mystrum cū ante, tum post cibum porrigito. Quod si necessitas urgeat, ante hæc omnia uenam aperito, & secundum laborantis uires euacuato: aluus item clysteribus irritanda. foris thoraci ficus, lolij farinā, & hordeaceam cataplasmatibus modo imposito, resina interim ceraq; et melle adiecta. Inspergatur etiā illi iris, mannaq;. Non alienū fuerit, farinā hordeaceam cum resina, cera, iride, mannaq; emplastri more adglutinare. Ungentis uerò utendū admodū calorificis, irino, anethino, & rutaceo. Peculiaris multo est, pumicis partē, sphecles (quæ est sex uini) crematæ partes quatuor, spumæ nitri ceratū, confusa & cribrata ungentis excipiuntur, & throaci infricantur. Mala gmatum usus est, quæ sanies & serosos sanguinis humores ex trahendi potestatem obtinent.

Pro suspiriosis potio.

Anhelatoribus polij, abrotoni, castorij, chamæpityos, gutta ammoniaci thymiamatis, singulorū partes æquales melle subactas

fabam exhibeto. Aliter: Sunt nonnulli qui *spumæ nitri* cochlearium, tribus *mulsa* cyathis mixtum propinant.

Aliud: *Spumæ nitri* dodrās, *piperis* drach. *laserpiti* drach. semis, cochlearium ex aqua propinatur. Aliud: *Castorij*, gutta *ammoniaci thymiamatis*, singulorum drachmæ sex, *piperis* grana quadraginta, passo excipiuntur. *fabæ* magnitudo cum *mulsa* exhibetur. Aliud: *Sinapis* drachmam. *spumæ nitri* ternos obolos, *elaterij* semiobolum, totum hoc in orbiculo o^octo cōformato, per biduum binos exhibeto: purgant namque per superna, citra molestiam. His qui uelut qui obtorto collo tantum non suffocantur, dato *spumæ nitri* drach. treis, cum *hydromelitis* cyathis ternis, atq; cum *cardamomo* nonnunquam, confestim opitulatur. Plurimum quoq; coxen dice laborantibus confert.

De peripneumonia. Cap. 30.

Peripneumonia, pulmonis inflammatio est, quæ plurimum ex ualentiore in eam partem destillatione, aut angina, aut suspirio, aut dolore laterali, aut alijs ex morbis provenit: nonnunquam affectus à sola inflammatione auspiciatur. Comitatur spiritus angustia, febris acuta & comburens, grauitas, distentioq; pectoris, tumor, & ingēs in facie repletio, materia ad superiora impetum instar ignis faciente. Males rubentes sunt, oculi turgescent, nutant supercilia deorsum, & cornea oculi tunica subpinguiuscula apparēt. Quū hæc indicia ad æstus feruentiorem declinant, ignita rubedo cum inflammatione pulmonis coniectanda est. In his igitur qui ex morbis alijs in hunc deciderunt, uenæ incisio recusanda est: maximè si diutius perseuerauerit malum, aut ab initio sanguinem detraxerint. Alius durior, in morbi inclinatione clysteribus ducenda est. Aut cucurbitula peringentes complures que, circumcisa scalpello cute, pectori & lateribus, si nihil obstet, adglutinanda sunt. Quod si peripneumonia confestim ab initio inuaserit affectio, consentientibus qui ad hoc desiderantur calculis,

uena

uena secanda est: sin minus, cucurbitulae sunt imponendae sanguis pro agri uiribus demendus. Sorbitiones ad haec cremoris ptisanae, chondri, cum melle assumantur, aut ex amygdalis amarum cum simila, aut chondro, ammixtis pariter potionibus aliquot dulcibus, hydromalo, aut apomelite, aut hydrososato. Salubre etiam recens butyrum, quantum capiunt cochlearia tria. Propinandum autem ipsis ficuum cum hyssopo decoctum, uel iridis malsa percoctae, uel pulueris eius mensura duum cochleariorum, melicrato inspersorum: hoc etiam per inferna expurgat. Quod uero ad uirium tutelam attinet, crebrius illis melicrati portio seorsim, et cum nucleis pineis repetenda est. Cucurbitulae uniuerso thoraci, lateribusque adglutinandae sunt. Cerotum cyprinum, quod iridem admixtam habeat: aut cerotum ex oleo rutaceo, et iride arida confectum, accommodetur. Vel quod est cera, resina, medulla ceruina, butyro, aescyppo, iride sicca, et unguine nardino constat epithema.

De sanguinis sputatione. Cap: 31.

Si cruentum sputum ex ruptis uenarum uasculis originem trahit, largior sanguinis effusio comitatur, et ex euidenti quidem interdum causa, nempe lapsu ex alto, clamore, et id genus: interdum uero ex abdita, puta plenitate, aut frigiditate, nimium naturae modum transgrediunt: frigus namque uenas rum pere, testatur Hippocrates. Si uero cruenta reiectio ad uenarum erosionem referatur, sanguis non confertim, sed per intervalla sigillatim excreatur: quum acris quaedam et praua edulia, aut cibi abstinentia, aut acris destillatio à capite in pectus praecesserunt. Si ex uasorum pulmonis ad apertione, nihil quidem ex enumeratis, excepta interdum plenitudine, praecessit, sed uictus humidior atque calidior, lauacrorumque immoderatum usus: et nimium calidis locis domicilium, mali causam excitare uidebitur. Et neque per inflammationes, neque per febres, neque in doloribus euenit, quemadmodum in his qui corroso uenarum corpore, Canabrosim dicunt, in hunc affectum incidunt.

Contrà

Contrà uerò tolerabilius habebunt, ut uerisimile est, euacuati. Cum hæmorrhoides, purgationes 'ue muliebres substituerint, etiam periculis erumpente sanguine liberabuntur. Eadē accie dit ualitudinis cōmoditas ijs qui uase ob redundantiam rupto sanguinē edunt, nisi propter hūcus, aut immodicam inanitionem ledantur. Iam uerò quæ ad uasorū erosionē refertur sanguinis euacuatio, nunquā prosperè succedit. Atqui si per uomitionem egeratur, confessum est, quòd ex partibus quæ ad stomachum, aut uentriculū attinēt, effertur. In quibus & per secessum ad inferna proritatus aliquando euacuatur: sin autem cum tussi, à spiritus officinis proficiscitur. At si spumofus fuerit, & elāguescens in cādidum, et ex interuallo absq; ullo dolore angustiaq; extrahatu, hunc è pulmone latum arguit. In quib. tēporis progressu & febris cōtinua sequetur, præcipuè ex eis quibusdā uasis, & aliquid substantiæ pulmonis, aut asperæ arteriæ circulus, aut uena reddetur. Nouimus uerò quempiam, sanguinē è pulmone sputo eijcientem, procedente tempore maxima cum tussi, & sanguine copioso, lapides expuise quaternos aut quinos, asperos, tribulorum modo, magnitudine siliquarū trium aut quatuor, et cōtinuò quidē leuatus meliusculè habuit: haud multo uerò pòst tabe cōsumptus, fato finitus est. Si uerò pituitosa excreatur cum leuiore tussicula, aut sreatu, spumofusq; ac leue egeratur, ex asperæ arteriæ reijci cognoscito. Quòd si sanguis ater fuerit, atq; in exigua frustula, quasiq; minimos globulos cōcretus, dolorēq; loci præferat, à thorace efferri portenditur, per pulmonem siue guttur facta transumptione. Qui uerò cum sreatu, ex faucib. per palatum eijcitur. Si quādo autem à capite destillauerit, cum irritatione quadā & tussi redditur, defluente eo in summitatem arteriæ, & iterum sursum regurgitāte. Hæc aut acer magna ex parte catarrhus, aut capitis dolor, aut grauedo præcedit. Nonnunquam aut per palatum sanguinis fit euacuatio: idq; deglutita birudine, et indidem alicui partiū adhærescente. Cæterū in cō

O

mentario

mentario de Letalibus uenenis super hac fusius prosequemur.

Curatio.

Qui catarrho afflicti sanguinē expuunt, ijs uenā mox aperire, nisi uehemēter acris fuerit destillatio, et intra excessum, habita uirium perpensione, detrahēre conuenit. Extremas ad hęc partes uinculis excipere, cumq; oleo ueteri calido, aut sicyonio, excepto capite, perfricare. Alantur esculentis frumentaceis, quę succum aliquē austerum commixtum habeant, cuiusmodi est mali punici, pomorum, pirorū, aut eadē ipsa unā decoquantur. Sub somnum orbiculos ex succino concinnatos exhibeto. Tertio die mellis despumati momētum delingēdum prębeto. Si hęc à morbo diutius permanente uincantur, de tonso ad cutim capiti ē stercore syluestrium columbarum medicamentū imposito: & post treis horas medicaminē dēpto, in balneū perducito: ne tamē caput unquā perūgatur. Deinde ubi sorbitionibus enutriueris, noctu dormituro theriacen antidotum dato: rursumq; postridie eadē pręstās, pari modo corpus uniuersum pręter caput perfricabis: cui utiq; ceratum ē thapsia, aut aliud quoddā inducēdum, rursumq; sorbitiones repetendę. Si malū non aboletur, cucurbitula occipiti adglutinandā est. At si acrior humor destillauerit, deuitanda est sanguinis detractio. Alimentis uerō & pręsidijs, quorū usum esse profligādo catarrho suprā, huic rei dedicato sermone docuimus, atq; his quę mox enumerabuntur, utendum. Qui propter frigoris iniuriā sanguinem expuunt, ijs calfacientibus & exiccantibus thorax fouendus est, confectioq; ē duobus piperum generibus suppeditanda, unā cum eo qui ex succino constituitur pastillo. Iam uerō ex instrumentis respirationi dicatis, disruptis oris uasculorū, aut apertis, sanguinem reijcientibus, ueniam, nisi sanguinis copia erumpat, secato. Omnes uerō locis acri expositis decūbant, lecto immobili, figura sublimi, cauētes ne uehemēter uel respirent, uel eloquātur. Fouendę autem afflicte partes spōgijs posca tepida imbutis. Post septimanam uerō

LIBER TERTIVS.

218

uerò lanis succidis cū rosaceo, aut myrteo, aut lentiscino, nunc
 quidem cum aceto, nunc uerò cum uino astringente. Plurima
 autem si fuerit eius quod eycitur copia, pollinem & mannā
 cum aceto imponamus, aut alumen & acaciā, aut malicoriā,
 aut gallā cum aceto, aut palmulas cum polentis, aut malis co
 tonis in uino austero decoctis. Post hæc uerò & ex salicibus
 emplastrum superaccommodandū, præcipuè si mediocris fue
 rit sanguinis eruptio. Per os autē hæc sumpta cōferunt: Por
 tulaca cōmanducata, bene facit: efficacior uerò multo succus
 ipsius epotus, balaustrū, rubi fructus et flos, quercus fibrosum,
 siue liber, & quæ subiecta est putamini glandis membranula.
 potissimū uerò ipsis elixis utatur: phagi ilicisq; tunica maior
 efficacia est. Samius aster, ad omnem sanguinis reiectionē fa
 cit. Lemniū item sigillū, lapis hæmatites læuigatissimus cum
 succo mali Punici, aut herbæ sanguinalis. Lapidis uerò quan
 titas erit scrupuli unius. Cōposita præsidia sunt: Pastillus ex
 succino, & qui ē corallio, & qui ex Aegyptia spina concina
 natur. Puluis item cōpositus ē terra Samia, quæ aster dicitur,
 Lēnio sigillo, corallio, symphyto, amylo, singulis æquilibrium.
 Sed qui hoc malum erosioni acceptū referunt, his maximè, si
 catarrhus præcesserit, opū partem semissem admiscemus. Et
 quod accipit Samiæ terræ, agerati lapidis, Lemniū sigilli, &
 quale pōdus: utile est, cochlearia duo in binis succi arnoglossæ
 cyathis potare. Aliud: Lemniū sigilli drachmas sedecim Sa
 miū asteris drach. duodeuiginti, amyli drach. octo, sarcocollæ
 quatuor, gūmi duas, pulueris eius cochleariū cum decocti pal
 mularum cyathis duob. Sorbeatur insuper posca gelida, aut
 palmularum, aut malorū, aut pirorum, aut capreolorū uitis,
 uel eiusmodi cuiuspiā decoctum. Si robur exigit, alatur circa
 horam secundā aut tertiam: sin minus, circiter quartam. Esto
 autem panis lotus aqua gelida, aut halica, aut chondrus cum
 succo quodā frigerifico: uerbi causa, mali Punici, aut myrto
 rum, aut omphacometitis: aut oua sorbilia, aut bellariorum
 quiddam

quiddam quod è lacte conficitur, cum aliquo astringente. Ex
oleribus aut, intybum, cichoriū, plantago, cum oleo ex imma-
turis oliuis expresso, atq; aceto decocta. Ex pomis aut fugaci-
bus, mala, pira, mespila, mala punica, corni fructus. Potus his
qui non febriunt, uinum erit aquosum, perexiguū. Qui febre
carent, aliquid ex prædictis poculentorū, aut cibyriticum hy-
dromalum. Sed qui sanguinē uomitu reijciunt, ijs dē nutriendi
sunt: cauendum modò, ne crebrius cibi porrigantur. ex facili
nanq; hoc uitio oppressis succurritur. Quoniam remedia quæ
potantur, ad partes ipsas quæ sanguinem fundunt, illico acce-
dunt, & cōgrediuntur. Vbi aut sanguis in uentriculo grami-
modo globulatum cōcreuerit, coagulū bibendum est, maxime
leporinum, aut ficulneum lixiuū cum aqua, aut thymum, aut
cunila cum aceto. Aut lacte fībili eos euacuare oportet, aut a-
loe. In his qui ex palato per screationē sanguinē expuūt, gar-
garismis inspirandi uim habentib. utendū, frontiq; & capiti
adhibēda sunt, quæ ijs quia sanguinē è narib. reddunt, expedē-
unt. Hæc cruenti sputi est curatio, quam summo exequi studio
cōuenit, eo quòd laborantib. ex immoderata eius euacuatione
discrimen immineat. Multitudo nāq; euacuati sanguinis, quæ
admodū in his qui strangulantur, lethum præsentaneū infert.
Si affectus perseverauerit, in tabē mutationē minatur. Omnia
bus igitur sedulò secundum rationē perpetratis, & subsistente
iam sanguinis eiectione, uires ipsis instaurandæ sunt, roburq;
reficiendum, iuuenum porcellorū petiolos, & cerebella porri-
gentes, corpus perfricari præcipiētes. In primis frequentē u-
sum balnei, potationem uini, iram, & rem uenerēd cauentes.

De pectoris suppuratione, & tabe quam Græce
phthisin nuncupant. Cap. 32

Empyema, quod purulentam excreationē Romani appel-
lant, in cauo specu thoracis, siue in succingēte costas memo-
brana colligitur, quandoq; ob sanguinis reiectionē, hulcere ad
sicatricem non perducto; hinc phthisis cōfestim sequitur, si ex
pulmone

pulmone fiat excreatio. quandoq; ex inflāmate subordina-
ta. Deinde quū abscesserit, & disrupta fuerit, ut in laterali do-
lore aliquādo accidit: aut ex cōfluxu à capite proueniente. Si-
gna itaq; cōsistentis empyematis sunt, grauitas thoracis, tuſſis
uehemens & arida cum doloribus: interdū etiam humiditas
quædam accedit, qua leuari nō nihil uidentur, febriculæq; in-
tra initia statim ignauæ, errantes, et difficilis decretori affli-
gunt. Quū uerò uomica abscessus appetit, acrius cum horrore
aliquo febrili, inq; sermonis proprietate spiritu turbati præ-
cipitantur. Rupto abscessu, pus reijcitur, modò purū, modò fe-
culentum. Quandoq; superius erumpit abscessus, unde grauius
incumbit periculū: interdum uerò deorsum. atq; id quidē quod
descendit, partim in uentrem & intestinū transfunditur, par-
tim uerò in uesicā, facta per uasa quædā trāssumptione, delabi-
tur. Febrili aut febre hectica usq; ad totius materiæ repurga-
tionem: quæ nisi accuratissimè procuretur, breui æger sanio-
sus in tabem rapitur, pulmone exulcerationē sustinente. In
qua iam tabe conclamata, genæ pallescunt, frons atq; ceruix
sudoribus rorescunt, carnes contabescunt, ungues incuruātur,
& crassiores, candidioresq; aut liuidi apparent. Malo autem
magis inualeſcente, uenter conturbatur, hypochondrium sur-
sum conuellitur, dira sitis, & ciborum auersio cruciat: quodq;
excreatur, grauiſſimi odoris fluxum emittit.

Curatio.

Ante igitur omnia, puris collecti maturatio promouenda
est spongiarū fotu, cataplasmatibus ex farinīs hordeaceis cum
caricis discoctis, & resina exigua, & stercore columbarum,
nitroq; et hibisco. Adiuuat aut rupturā, in latus sanum decubi-
tus. Sorbeatur præterea ex temporis interuallo mulsa, & cre-
mor ptisanæ admixto melle: sed quibus plus roboris inest, ius
hyssopi & thymi melle adiecto bibant. Promouet etiā ruptu-
ram uomica salsamentorū esus, & catapotia hieræ ex colo-
cynthide sub somnū, in cubilis ingressu sumpta. Vbi pus expe-

florari cœperit, hyssopi denuð & iridis atque glycyrrhizæ decoctorum in mulsa potionē repete. Vel glycyrrhizam cum sesamo tritā exhibe: aut pollinem in mulsa & oleo percoctum cataplasmatibus modo inducito. Quum autē hūcus expurgatio ni per superna renititur, ad compositorū usum deueniendū est: uerbi causa, medicamenti quod ex marrubio constat, tum simplicis, tum cōpositi. Et eius quod ex eruis constat, & quod ab ingredientū numero Græcè dodecatheon dicitur, itē quæ ab autore, Philoxeni nomenclaturā sortita est, cōfectionis. Porro qui in tabē decidunt, his porra capitata in chondri ac ptisanæ sorbitionibus liquefacta dato. Iam uerò & hæc per se bis decocta exhibēda sunt. Potus aqua pluuialis esto, & ex eo melis cratum. Circa initia uerò relaxationū, imponantur cataplasmata ex semine lini, & polline, ex decocto fœnogræci, aut maluæ, olei, mellis, & foliorum altheæ. Temporis uerò progressu ad cerata ex butyro, oleo cyprino, laurino, & iride transeundū. Mnasæi item emplastrī usus probatur. Thoraci autem fluxione oppresso, emplastrū ex salicibus imponendum est. Propinanda insuper iampridē in saniosis enumerata simplicia, atq; ex compositis nōnulla. Si anxifera tussis grauer urgeat, thymum et hyssopū cum succo glycyrrhizæ melle decocto excepta, & in tessellas redacta, sub lingua cōtinenda exhibeto. Conuenit amplius ipsis ex tēporis interuallo præstita Mithridatis antidotus, & quæ ex uiperis conficitur. Vtilissimum uerò fuerit auxilium, bolus Armenia pota, Hesperæq; antidotus nihilo minus quā prædicta subuenit.

De dolore laterali pleuritide ue. Cap. 33.

Dolor lateritius, quem Græcè pleuritim dicunt, propriè membranz costar succingentis inflāmatio est. Comitatur hunc anhelitus difficultas, tussis, febris continua, dolor ad clauiculam usq; & præcordia pertingens. Discerni autem pleuritidis ab inflāmatione iocinoris, in qua omnes hæ notæ apparent, hisce indicijs potest: Pleuriticos quidē dolor punctilis in festat,

festat, & tussis quandoq; arida, quod morbum crudum portendit: quandoq; cum sputi reiectione, quod humorem qui morbum creat, innuit. Rubrum etenim & sanguinolentum excreatur, sanguine naturæ modum exuperante. flauum uero & in pallorem languescens, cum flaua bilis superat: quemadmodum rursus albibicans & subspumofum, si pituita. In melancholico uero humore, nigrius reijcitur. Pulsus durus ac ferræ modo denticulatus subest. In iecoraria uero inflammatione, nullus dolor compungens, neq; durus adeo pulsus sentitur, sed arida tussis quæ nihil expuitur, usq; molestat: facies pallidior apparet. Quæ uero laterum compunctiones ex musculorum externorum inflammatione oriuntur, hæc quidem nothæ pleuritides appellantur: in quibus absq; tussi, absq; excreationibus, cum molliore pulsu, locus affectus manu attrectatus, dolore afficitur: et nisi suppuratus tumor discutiatur, post sectionem ad exteriora prorumpit: quæ pleuritis ex inflammatione membrulæ costas succingentis creata, eò non feratur. illa namq; nisi uel foras, uel intus à purulenta colluue expurgetur, multo citius in uomicam peripneumoniacam transit.

Curatio pleuritidis.

Si igitur ad clauiculam usq; dolor protendatur, uena incidenda est: sin uero ad præcordia usq; perueniat, purgandum. Recentiores autem omnibus sanguinem secta uena detrahunt: formidantes (ni fallor) turbationem, quæ purgationem libenter committatur. Reclamantibus autem uiribus imbecillis, neutrum faciendum, clysterijs acrioribus utendum. Quod si dolor mediocris affuerit, à clysteribus aqua mulsa, & ptisanæ aut chondri cremor propinentur. In morbi decremento, cremoribus porrum adijciendum, aut nepeta, aut pulegijs & urticæ semen cum melle delingitur. Si dolores uehementer affligunt, post euacuationem demulcendi sunt lanæ calētis, uel sulphuratæ impositu, aut fomentis ex milio, & furfuribus in sacculo adhibitis, aut calida aqua, seu oleo uesicula excepto. Lanā præterea succidā cum

O 4 oleo,

oleo, uinoq; marina diluto: siue alia iniicienda, aut ex semini-
bus cataplasma imponendū, cum decocto chamæmelorum, al-
theæ, aut carycarū, ireos, absinthij, mellisq; momento cum o-
leo nardino. Circa quartum uerò diem sorbitionib. nutrito, ad-
iecto melle perexiguo. Septem aut diebus lapsis, lincus ex a-
mygdalis, semineq; urticæ melle contritis, offeretur, aut eclig-
ma ex butyro, melleq; decoctum. Et hypoglottide ex melle de-
spumato utendum. Epithematis porrò, tū uidelicet, quod quia
fœdissimi odoris est, dysodes appellatur, tum eo quod ex sam-
psycho constat: & peganera emplastrum, affectis applicabi-
tur locis. Bulbi præterea cum axūgia appositi, sæpenumero
satis præsidij tulerunt. Iniiciendū insuper eo morbo oppressis
per inferna medicamentū ex butyro & terebinthina. Sed ef-
ficacior lincus est, qui ex fructu piceæ: item ex amygdali ama-
ri, seminis linei, nuclei pinei, & amyli æquilibrio cum melle
conficitur. Quos autem uigiliæ torquent, eos medicamentum
è papauerū capitib. delingere competit. Bx antidotisq; atha-
nasia, & alijs ad hanc prouinciam cōpositis utamur. Post de-
cimum uerò & quartum diem, si malum non cesserit, cucur-
bitulæ ipsis imponendæ, ægri in extenuatoria uictus ratione ser-
uandi. Deinde ubi morbus remittitur, in lauacrum ducendi, fri-
gidum uitandum. Victus solidior adhibendus. Quod si inflam-
matio costas succingentis tunicæ non discussa, in pus conuer-
tatur, antea commemoratis utendum.

Ad lateris sine febre dolores.

Lateritis doloribus sine febre bdellium succurrit, & co-
stus. brassicæ caulium deustarum cineri & adipi mixta, Nam
hoc medicamentum impense discutit.

De affectibus cordis. Cap. 34.

Cor si primario affectu fuerit læsum, procul à medicorum
præsidio abest, uitā cum morte subito commutans, quum
inflammationes & ignitas rubedines, quæ erysipelata dicun-
tur, uehementesq; intemperaturas in acutissimis febribus, san-
guinis

guinis item fluxum, ex leui potissimū sinus cordis uulnuscūlo, experitur. Si aut per consensum afficiatur, ex cerebri, iocino-
ris, oris uētriculi affectu, siq; ex mœstitia et metu, alijsq; com-
plurib; causis, syncopē appellatū, quæ repentinus est uirtutis
casus, oboritur: quæ resolutionib; et animi deliquijs, exiguo
arteriarum percussu, extremarūq; partium perfrictionibus,
et circumfluis sudorib; significatur. Quæ si ualidior est, nullæ
remediorū suppetiæ succurrere possunt. Virtute uerò adhuc
uel tantillum constante, nonnunquā subuenire datur. Validæ
ad hæc cordis palpitaciones subinde ex multitudine, aut fer-
uore sanguinis in eo cōcepti oboriuntur. Cor uerò idem super-
excalsactū, magnam et frequentē inducit respirationē: refri-
geratum autē, exiguā atq; raram. Omnē autem cardiacarum
syncoparū emendationē, secundo libro inter febrium casus re-
censuimus: tantum hic loci adijciendum, quēadmodum uincente
iam symptomate, extremis partib; perfricatis et illitis, pur-
gamētis item pauimēti iniectis, et alia quacūq; recreatione
adhibita, inducēda sint, sudore diffatis partibus, myrtus læui
gata, aut creta cimolia, aut succinum, aut malicoriū cum man-
na, aut terra Samia cum gummi. Membra uerò extrema per-
frigerata usq; ad pubem et alas, sinapi, aut pyrethro, aut adar-
ce obducantur. Alimentum esto panis ex aqua, seu uino frigi-
do temperato, pedunculi suilli, articuli, rostra, alæ, omnia fri-
gida. Caput et frontem oleo ex oliuis immaturis, aut aliquo
stypico cum gummi, aut decocto rosarum perungito. Præcor-
dijs autem, stomachoq; cataplasma ex palmulis, rosis, cenan-
the, acacia, hypocystide, et alumine imposito.

De palpitatione cordis.

Novi quendā, inquit Galenus, quotannis uerno tēpore pal-
pitationis cordis acceßione diuexatū: qui cum per triennium
se à sanguinis detractione adiutum intelligeret, anno quarto,
priusquam accidens illud denuò inuaderet, sanguinis missionē
repetiuit, nec amplius eidem malo obnoxius fuit: sicq; plurib;

○ 5

deinceps

deinceps annis facitauit, & consentanea post hæc uictus ratione usus est. Sed nihilominus is etiam ante senectam morte præuentus est, quemadmodum & reliquorum plerique omnes, quorum in acutis febribus nonnulli repente animo destituti, pari modo interierunt. Quidam ipsorum citra animi deliquium tamquam syderati, subito uitam in mortem commutarunt. Magna ita affectionum pars ætatem agebat quinquaginta quidem annis inferiorem, sed quæ annos quadraginta excederet.

De mammillarum uitiis. Cap. 35.

Ac à partu casei more sæpenuerò in mammis concretum, inflammationes suscitât. Hisce itaque rebus à principio utendum. Spōgia mollis, posca tepida madidata atq; expressa imponitur, & alligatur appositè. Aut palmulæ cum pane in posca læuigatæ. aut ouo etiam toto utendum, admixto rosaceo, cum cerato perexiguo. aut alumen, & pulicaria herba cum coriandro, aut portulaca superaccommodantur, aut Pyrites lapis tritus cum cerato impositus alligatur. Cæterum distentione oborta, aut lacte in grumos coacto, panem ex hydrelæo, aut œnomelite cataplasmatibus instar applicato: aut panem cum perdicio uiridi atq; cerato, bis in die: aut fabaceam farinam cum aqua mulsâ, uel defruto. Quod si pōdus non ferât, irrigatione olei dulcis calidi cum lanis delatioribus utendum. Fouendæ sunt mammae cum uapore aquæ feruidæ, aut fœnogræci decocto, aut althææ, aut seminis apij. Cataplasma præterea imponendū ē polline triticeo, & semine lini, aut fœnogræco cum hydromelite, aut sesamo cum melle butyro uel cōtrito. Exultationem porrò mammarū uitare expedit, quoniā lactatio maiorem lactis colluuiē ad ipsas proritabit. Cum autem inflammatio remittit, istiusmodi ceratis utendū: Betam oleo, donec liquefacta sit, elixabis. Ipsa autē proiecta, oleo ceræ mediocrem mensuram adycito, atq; utere. Aliud: Ouorum crudorū lactea decem cerato cōmisceto, quod cōstet ceræ uncis duabus et semisse, rosaceiq; uncis quatuor, & spatha ubi permoueris, muricæ

muricæ quātum suscipere potest, in iyce: denuoq; cum rudicula agitaueris, utitor. Ad mammarū porro duricies cōfert medicamentum ē melle, & omnia quæ emolliendi uirtutē obtinent medicamina. Vbi tumor in abscessum transit, illis, quorum capite de Parotidibus facta est mentio: item ijs quæ in sermone de Apostematis recensēbimus, utendum est.

Archigenis, aduersus erosiones māmillarū cum malignitate.

Vini Hadriani boni sextarij uiginti, rhus coriariorū libra, galbulorum cupressi libra, gallæ immaturæ atræ uncia sex, cassiæ tantundē: quæ simul cōtusa, in uino diebus decem macerato, deinde coquatur, cōmota assiduo rude cupressina, usq; ad dimidias fermetum herbas quidē porrice, succus uerò elixetur ad mellis usq; spissitudinē, deinde in uase uitreo reponatur. Vtere in his quæ depascendo erodunt, mero. At si crassius fuerit medicamentū, uino liquidius reddatur: mammarū nomas, aures quæ cum purulentia fluunt, gingiuas ob humiditatē putridas, & dysenterias impositū sanat. Mitigat idem dolores, lacte temperatum. Alijs mammarū exulcerationibus, haud aliter quā cæteris quibuscunq; hūlceribus medendum.

Quæ mammas conseruent.

Cyminum cum aqua contritum mammis emplastri modo accommodato, mox sponsa exterius posca imbuta imposita, pectus fascijs constringito: transactis uerò tribus dieculis, cymino sublato, mammis florē bulborum cum melle superinducito, & cinctura denuo deligatum per triduum finito, idq; ter in mense facito. Aliud: Cicutam in puluisculum læuigatam per dies nouem imponito, & spongiam foris, ut dictum est: et aliquot diebus interpositis, idem facito. Naxiæ item cotis ramentum, uirginum mammas custodit.

Aduersus alarum graueolentias atq; sudationes. Cap. 36.

AD birquum, sudationesq; axillarum, aluminis liquidi portionibus duabus, myrrhæ una, uino dissolutis utere.

Aliud: Plumbaginē crematā, uinoq; fragrante extinctam cum uino cōterito, myrrhæ momentū usq; ad strigmeti balneorum

crassia

crassitudinem adiiciens utitor. Aliud: Spumæ argenti drac., sedecim, myrrhæ duas, amomi unam, uino excipito. Aliud: Aluminis liquidi drach. octo, amomi, myrrhæ, spicæ nardi, singulorū drach. quatuor, uino diluatur, & in usum adhibeatur.

De stomachi, præcordiorum, uentrisq; affectibus. Cap. 37.

DE appetitus à cibis auersione, quæ febre correptos infestat, grandi fame, appetentia canina, debilitate stomachi, animi deliquio, de siti præterea, singultu, nausea, & syncope, inter hæc quæ de febribus libro superiore comprehensa sunt, abundè determinatū est. Rursum igitur super iisdem uerba facere cōsentaneum non est. Cæterum inflammationes oris uentriculi, atq; iocinoris, semper opus habent cōstringentium rerum admixtione. Nam si quis sola relaxanti ratione mederi studeat, uitā in discrimen duxerit. Proinde oportet, siue oleum fuerit quod superfunditur, siue cataplasma, quippiam cui adstringendi facultas sit, adnectere: uerbi causa, absinthium, aut unguentum nardinum, aut melinum, aut malum cydonium elixatum. Ceratū autē quo cōtinuè utimur, est huiusmodi: Cere candidæ uncia, æstatis lēpestæ drac. septē, aloes, mastiches, uniuscuiusq; drachma, olei oliuarum nōdum maturarum, aut melini, & nardini, quantum usus ad spissitudinē exigit. Quod si adhuc maiore adstrictione indiget, ut qui alimentis superior esse non possit, prædictis olei omphacij drachmā, aut absinthij succi parem modum, ad hæc tertiā partem hypocistidis, floris labruscæ, & cremoris rhus adycito. Addere deinde oportet cerati quantitātē, quæ numero aliorum medicaminū proportionē respondeat. Quod si in uetustatem incidit inflāmatio, ac indurefcit, medicamēta uaria magis sunt adhibēda, & quæ aromaticum aliquid emollientiū & dyscicientiū habeant. Cuius fariuæ est, quod ex meliloto confectum est, & Philagrianum, & quod à fragrantia Buodes nominatur. Viridis iaspidis torques collo appēsus, ita ut os uētris attingat, pro amuleto est. Verū in calidis stomachi intemperiebus & ardentibus, cum resolu-
tione

tione eius, uel animæ defectu, aut aliqua cibi fuga, nulla omni
 no occasione excepta, quàm feбри, aquam gelidā potui dato,
 cum succo uuæ acerbæ, aut malorum cotoneorū decoctum, aut
 clauiculæ uitis, aut seminis cucūeris ius, uel puluerē ipsius ex
 aqua frigida. Stomacho præterea uesticā gelida aqua fartam,
 aut cucurbitæ ramenta imposito. Catapotia item, quæ extin
 guendi sitim potentiā habēt, ceu iam pridē de siti memoratum
 est, exhibenda sunt. Stomachus porrò qui cum humore languē
 dus flaccescit, refrigeratur et roboratur isto remedio: Foliorū
 rosarū uiridium drach. sex, succi glycyrrhizæ quatuor, uino
 dulci excipito, & tessellatim formulā, quæ linguæ subdi com
 modè possit, digerito. Sed in quibus propter crassitudinē pitui
 tæ calorificis & incidentibus opus est, hoc fuerit præsidium:
 Corticis radicis fœniculi sextans, aceti sesquiseptarius, aloes
 uncia tres, mellis libræ quatuor: radices cum aceto elixæ ex
 primuntur, porriciunturq;: mel uerò iniectū usq; ad crassitudi
 nem decoquitur, et tum deniq; aloë leuigata inditur. exhibe co
 chlearia tria, cum aqua. Nonnulli uerò idem absq; aloë confē
 ciunt. Et diacalaminthes ita habentib. idoneum est. Quibus au
 tem cibus acescit, seminis coriandri drachmā, polentæ instar
 subactam, aqua propinato: siue mastiches cochleariū, siue la
 ducæ albæ seminis cochlearia duo. Cōpositū aut illud proba
 tur, quod habet piperis drach. seminis anethi drach. treis, cya
 mini quatuor, lauigata exhibebis somnū inituro cochleari uo
 no in uino temperato. In quib. porrò atra bile infectus stoma
 chus est, & inflatione tentatur, in exacerbationibus spongiæ
 acerrimo aceto intinctas imposito. Si his malum non cesserit,
 alumē cum ære lauigato melle exceptum superaccomodato.
 Potui autem dabis intybi succum, aut potioni mentam inferre.
 Quibus stomachus flatulētus atq; distentus est, nepetæ decocto
 symmetrum mellis & piperis mixtum præbeto. Aduersus
 stomachi subuersiones, succi acinorum mali Punici acidi par
 tes treis, succi mentæ partem unam, usq; ad unitatis concre
 tionem

tionem ubi decoxeris, ante cibum mystrium unum pro pinato.

Ad saliuam stomachi.

Saliuosus stomachus aceto scillino, aut oliuarum salfarū mis-
ria, aut summitatis nouae germinationis oleae decocto os-ablu-
tur, aut eius quāminimū deglutiatur. Nihil uerò perinde at-
que aloe aqua irrigata confert. Ad curationē uerò eorum qui
cibum continere non possunt, quos ueteres propriē stomachi-
cos nuncupant, fœnogræci farinā melli mixtā, & maluae se-
mē laeuigatum in puluere, cataplasmatibus instar imposito. Ce-
rotum uerò ē cera, & olei irini recremento, & castoreo.

De appetitus a cibis auersione, quæ anorexia dicitur.

Anorexia (quod fastidiū dicunt) à cibis est auersio, quæ à
stomachi intemperatura, uel ab exuperanti humorū copia pro-
uenit. Deprehenditur autem distemperamentū calidius, siti, ni-
dorosis & fœtulentis ructibus, si quid cibi præter uoluntatem
ingestum sit: promptiore item frigidarū rerum, & elaboratis
peruicacium coctura. Gelidā intemperiem cōtraria testantur:
neq; enim hac detenti sitiunt, neq; frigida tolerāt, & acida in-
terdum eructant. Qui ad humores ciborū auersionē referunt,
partim propter subtiles atq; mordaces succos hoc mali patien-
tes, mordentur stomacho, nausea magis afficiuntur, & uehe-
mentiore siti premuntur. Quibus uerò humores cōputruerint,
ei quandoq; etiā febriunt. Qui autē crassis glutinosissq; humo-
ribus laborant, morsu quidē sitiq; uacant, sed communiter om-
nibus accidit nausea. Si uerò sinum uētriculi humores occupa-
rint, eosdē etiam ipsos euomunt. Sin autē in tunicis ipsius im-
pecti combibitiq; hæserint, nauseant modò, nō euomunt: præ-
terquam cibos, si quos sumpserint. Quocirca qui ob calidā in-
temperiem cibos fastidiunt, hos frigida uictus ratione curare,
& præcipuē ijs quæ condiuntur aceto, oportet: panem igitur
posca maceratū esui, ipsamq; poscam, lac item acetosum, &
eam quā uulgò Romani melcā nomināt (quod ex lacte quodā-
dam est obsonium) potui dato. Intybaq; & lactucas, & non
nunquam

nunquam aquam gelidā, omniaq; mediocriter, secundum eius
 quæ iustum naturæ modū excedit temperaturæ contrarietate
 tem: quoniā immodicus horum usus non modò non conducit,
 sed etiā sæpe remedijs inexpugnabilem reddit affectum. Qui
 præ algore escas respuunt, contrarijs omnino medendi sunt.
 Vinum igitur uetus, conditū item, & hydrogarum, anisi præ
 terea ac rutæ, petroseliniq; decoctū propinandum est. Piper
 quoq; è cōmuni aqua calida, atq; ipsum quoq; quod à trib. pia
 perum generibus cognomē habet diatrionpepereon, aut quod
 diacalaminthes appellatur. Dabis etiā uiperarum theriacam,
 quæ utiq; his qui ad humorū copiam cibi fastidium referunt,
 aliena non est. Allia his, cūm nutrimenti, tum medicamenti no
 mine idonea sunt. Quum autē ex humorum multitudine deside
 rium edēdi proiectū est, tenues atq; mordaces humores per vo
 mitum uel aluū euacuabis. Vomitus facilis euadit, si æger tem
 peratam aquā, aut mulsam admodum dilutam antea hauriat.
 Præstātius uerò, si ante hæc humectantē exhibeas alimoniam,
 puta ptisanæ cremorē, aut ouorum lutea. Quomodo autem fa
 cilem quis uomitū cōciliet, uolumine huius operis primo com
 prehensum est. Sin uerò difficulter laborans euomat, præstat
 materiam in aluum dirigere, languentes prius copiosiore &
 temperato cibo humectando. Sed purgans medicamentum
 esto, uel ex aloë Amarum, uel ex malis cotoneis confectum,
 quod & scammoniam admixtā habeat, uel rhodomelite con
 stet. Quod si absq; scammonia fieri possit, aloes maiore po
 tius copia ipsos euacuare satius est, quoniam scammonia usus
 stomacho officit. Qui uerò propter crassos & tenaces humo
 res fastidio torquentur, his attenuando & incidendo succura
 remus, cum oxymelite, & ex hoc, muriaq; compositis, uelut
 cappari, oliuū, sinapi, & consimilibus. Neque uerò inidonea
 his sunt ea, quorum in illis qui simili malo præ gelida intempe
 rie conflantur, meminimus: præcipuè uerò post euacuatio
 nem, quam oxymelite Iuliano moliri cōuenit. Foris quæ tum
 calfas

calfaciendi, tum roborandi stomachum potentiā cōtinent, adhibenda sunt: ungenta q̄; & malagmata, cuiusmodi sunt potissimè id quod ex uua acerba cōtextitur, et quod marciatum appellatur, & quæ solēniter applicatur unguina. Epithemata insuper Baïum & Buodes, eiusq̄ classis cætera. Exercitationes item, atq̄ frictiones cum primis adhibeantur. Ad eorum curationē qui difficulter cōcoquunt, pariterq̄ appetitus auersione, propter frigidum simul & humidum succum, aut eiusdem qualitatis intemperie cōfluantur, ea quæ è malis cotoneis cōsistūt, pertinent. Dico aut id, cui Meloplacuntii cognomētum est, atq̄ id quod è succo malorum constat, & quod ex eorundē carnib. preparatur, cytrioq̄ malo confectum. Malagmata uerò proficiunt, Marciatū, & quod ex acerbæ & nondū maturæ uuæ cremore constitutum, omphacinū uocatur. Baion item, & Polyarchium, & eiusdē notæ cætera. Quod si hūlcus uel stomachū uel uentrem occupet, ut ab omnib. quidem acribus tum esculētis, tum poculentis, tum medicamētis abstinendum est, ita mitigantib. utendum: uerbi causa, sorbitionib. ex oleo, & quæ ex amylo, & terra Samia, & Lemnio sigillo, laetice itē, mellisq̄ momento quāminimo confiunt, ut citra morsum repurgent. Epithema accommodum est ex palmulis, cotoneorum carne, & polenta concinnatum. Cerotum è melino, aut rosaceo, cū gutta ammoniacæ, & thure proficit. Item epithema Nilei. Emplastra insuper, Diaiteū, quia salices continet, appellatum, & Icesion. Dinosces autem hūlcus speciem, uel ex sanguinis, uel ex puris, uel ex ramentorum uomitu.

Ventriculo soluto & debili, & ob id functionē suam in coquendo minimè obire potenti, aut cibū etiā euimenti subuenit: Aloes masuchæ, mastiches, styracis, singulorū sextans, absinthij triens, ænanthes quadrās, cōfectionis gleucini uncia sex, ungenti melini quadrans, uini quantū satis est. à quibusdā Cyphios, rosarumq̄ singuli sextātes adiiciuntur. Hæc omnia pariter læuigata, purpura, aut lana excipiuntur, stomachoq̄ imponuntur.

ponitur. Nonnulli ceræ selibrā adyiciētes, epithema cōcinnant.

Ad ileosfos stomachi affectus, hoc est uehementes
cruciatu, & conuulsorios.

Curandis ileosis stomachi affectionibus, ualet optimē pastil-
lus Amazonum. Cuius descriptionem, tum aliorum ad stoma-
chum commixtorum materiam, in uolumine de Compositis
medicaminibus, ad calcem operis comperies.

De uentris inflatione. Cap. 38.

Flatuum in uentriculo prouēns, ex humoribus uel alimen-
tis in uapores per tepidā caliditatem resolutis generatur.
Frigiditas nāq; eo q; sua natura nequit attenuare, atq; dissolue-
re, nullos producit spiritus. Vehemens autē caliditas cum non
extenuet solum, sed disyiciat etiam, flatus procreationē probi-
bet. Minor uerō caliditas, alimētum in stomacho diffundit quī-
dem & permutat, sed minore quā opus sit efficacia: inde fla-
tus omnis procreatur. Attenuare igitur ipsos medicamētis ca-
lorificis cōpetit, elixātes oleo cymini, apy, herba rutinalis, et
dauci deniq; semē. Frigore autē affectioni accedēte, rutam, bac-
cas lauri, nigellā, fœniculumq; oleo elixato, bitumēq; cum o-
leo laurino admisceto. Si uerō inflammatio dolorib. cōpulata
sit, calfaciētium loco laxātib. utēris: anethū coquens, cui adia-
pem gallinæ & anseris admisceto. Vtilis præterea flatuosus
spiritib. obnoxys, poly fasciculus percoctus, siue decoctū nepe-
tæ, admixto mellis exiguo, et piperis drachma. hæc quidē do-
lore acriore infestante adhibēda sunt: in mediocri sufficit fo-
tus ex milio. Cucurbitula uerō amplissima umbilicū undiq; cō-
plectens, sæpenuerō adutū toto liberat symptomate. Re-
medio quoq; castoriū est, cum posca epotū, & foris cum oleo
sicyonio impositū. Bisi cum tormine circa umbilicū flatus in-
cidant, medetur. Suillus item talus crematus, & in potu sum-
ptus, tormina flatusq; discutit, & aristolochia rotunda. Dolo-
ribus porro spirituosus, propter uentris obstructions, aut ex-
crauitudine, aut ob frigiditatem obortis, uinum meracius post

P cibum

cibum epotum praesidio est. Somnus, si superuenerit, malum ex toto profligit.

De Cholera. Cap. 39.

Cholera immoderata uentris perturbatio est, infra & supra per uomitū ex continua ciborū cruditate facta. Quae interdum propter multā cibariorum prauitatē, nonnunquā ob corruptos humores nimium aggestos accidit. Quocirca si nauaseabundus fuerit, & conturbetur aegrotans, manētibus etiam dum crudis in uētriculo dapibus, uomitus ciendi gratia aquam tepidā haurire iubebimus, ac digitos insuper aut pinnas in fauces inferere. Opitulandum ad haec alui deiectione. Superuacaneis humoribus eductis, quiete, & praecordiorū fotu, ex dulci oleo, cū uino nō multo, aut mastichino, aut nardino, si hyems sit, uti conuenit. Somnusq; inducendus. Lauacris, ad unguē facta concoctione, indulgendū, & boni succi alimentis uescendum. Atqui cum excessu facta euacuatione, ab initio quidē ea quae supra libro secūdo de Turbatione uētris memorauimus, abundē sunt. Perseuerante uerō fluxu, uētreq; collapsō, si pulsus tenuior densiorq; euadit, cataplasma ex palmulis cum cenanthe, acacia, hypocistidis liquore, & malicorio imposito. Aquae porro mediocriter frigidae cyathū ad sorbendū exhibeto. Ius uerō rosarū, aut cenanthes, aut rhois, aut capreolorum uitis, efficacius est, aut succus ex malo Punico acidae dulcedinis expressus, pusillo mētae superiniecō propinādus. Vbi uerō quae excernūtur, acriora extiterint, feruore sitiq; immodica superueniente, cucumeris semē cū aquae cyathis tribus offerendum: intybaq; et lactucas in posca elixas cibi loco māducent. Fluxu autem nondum suppresso, uinū aliquod austerū propinandum est. Si nulla febris infestat, palmatianū, aut aminacū, aut spathites, aut omphacomelites exhibeto. Febricitantib; uerō, uinum Punicū, id est, ex malis granatis, aut myrteū, aut cibyraticum, hydromelū per se poculentū, et cum mica panis, aut balnea, aut chondro. Quod si esculenta frumentacea fastidiant, fructuum

fructuum aliquid fugaciū, temporariorū ue, mespila nempe, aut pira, aut cotonea, aut mala granata mandentes, carnosū & durum expuent. Si porro cibum ne sic quidē cōtineant, cucurbitula quāmaxima levis stomacho est adglutināda. Quā iam adglutinata, aliquo ex prædictis nutriēdi sunt. Cæterum ad cōuulsificas cōtractiones calida linimēta oleo imbuta musculis circūponito, cerotaq; liquida castorij quippiā et sicyonij complectentia. Sed ante hæc, mēbra sunt aqua calida fouēda. Si peruigiles reddūtur, somnum accersire, his quæ uigilijs aduersari prodidimus, cōuenit. Si uirtus non prohibet, & diacodyon confectio miscenda est. Decremento autē morbi facto, in lauacrum ducendi sunt, & pullis gallinarū & columbarum, aut pedunculis suum, aut cōsimilibus ferculis recreādi. Profusus uerō alui fluor, qui cibariorum corruptela existit, magnā quidem parte sua spōte cessat, ægris alimēti nihil usq; ad consummatam decoctionē, & absolutam corruptorum inanitionem sentientibus. Si remaneat, iisdem præsijs quæ in cholera comprehensa sunt, occurrendum.

De intestinorū leuore, hienteria ue, & affectione cœliaca. Ca. 40.

DVplex leuitatis intestinorum genus est. Vnum quidem ad superficialiū intestinorum exulcerationē, nonnullis uerō ad cicatricē etiā ab intestinorū torminibus magnā parte excitatam, seu ad alias fluxiones refertur. Alterum uerō ad imbecillitatem uirium, quæ alimēta in stomacho distinent; hanc alteram leuitatis differentiam cum cœliaco, ut uocant, affectu confundi & misceri arbitror: in quo utiq; imbecilla stomachi uirtute, cibi neq; coquūtur, neq; in corpus distrahūtur, sed crudi, perliquidi, imperfectiq; excernuntur, lubrico fluxu tentata in omnibus alao. Sed in leuore intestinorum celerius quā in cœliacis, quæ assumpta sunt alimēta, deiciuntur, tamq; intēsa cruditate, ut assumpti quoq; nutritiū genus liquidō cognoscatur. et his quidē unicē à cœliacis discernūtur. Semē igitur linicū palmulis hac affectione obnoxys, cataplasmatis instar indu-

cendum est. Summè aut̃ prodest lentiscus & rubus cū oxymes-
lite decocti. Si uenter spiritu inflatur, cuminum quoq; & ane-
thum, & ruta cōmiscenda sunt. Cum aut̃ magis increscit flus-
xio, mala cydonia, alumē liquidum, acaciā, hypocystida, gal-
lam, aut horum nōnulla, aut pariter omnia inferentur. Cerota
insuper ex oleo myrtino, cum uino quopid̃ astringente. Epithe-
mata calidiora quidem, è baccis lauri, & quod ex seminibus
cōstat. Vehementius uerò adstringūt diacēnanthes, id est, per-
labruscā: diagigarton, hoc est ex malorum granatorum aci-
nis concinnatum: & cuius pater Antylus est, et Brythry, ad-
miratione dignum. Inueterata uerò iam ægritudine, dropace
uenter illiniatur, & ex sinapi cerato, necnō & ipso per se si-
napi. Potiones cōducunt, simplices quidē, semen plantaginis,
aut semen rumicis, aut mali Punici cortices, uel sorba arida,
aut omphax aridus ex Aminea uua trioboli quantitate, nō fe-
briētibus cum uini adstringentis cyathis sex. Febricitantib. ue-
rò, cum aqua pluuiā. Minus uerò stomachū tentat gallicaceus
uenter siccus potui inspersus, & quæ cient lotia: uerbi causa,
apium, adiantū, et id genus alia in potu sumptā, materiā auer-
tere moliūtur. Ex mixturis uerò probātur Polyidæ sigillum,
pastillus ex electro, itē ex Aegyptia spina, & qui clidion ap-
pellatur, & diaspermatū. Cæterum hoc primam habet boni-
tatis æstimationē: Lapatbi syluestris seminis uncia una & se-
mis, plantaginis seminis uncia, hypocystidos succi drach. sex,
gummi seu acacie denarij terni, malorū cotoneorū ad tertias
decoctorum iure diluuntur. Aliud: Cymini, piperis, rhus Sy-
riaci, floris syluestris Punici, singulorū unciam unam & se-
missim, malicorij uncia, laseris, siue succi medici unciam dimi-
diam, aut pulueris ipsius drachmā potioni inserito, aut oxys-
melite macerata, cū mane, tum uespere misceto. Aliud:
Myrtorum nigrorū cochliarium unum & dimidium, anisi,
rosarum siccariū, cēnanthes, uniuscuiusq; cochliarij semissim,
palmulus uiginti, in pastillos digerito, atq; drachmam cum
aqua

aqua, aut cum uino plus satis diluto propinato. *Palma* hic bonitatis obtinet, ea quæ è uiperis concinnatur *theriaca*. Porro quod ad alimēta attinet, si quæ egeruntur, acria ac biliosa fuerint, è *chondro*, *oryz*, *alica*, & consimilibus erunt, in quibus quædam adstringēdi facultate prædita incocta sint, *pira*, *malacotonea*, *messila* et id genus alia. *Lac* quoq; excoctū, his salutare est. Potus autē esto uinum aquosum & tenue, aut aliqua dulcis potio. At si pituitosior fuerit excretio, contrariis omnino edulys enutri di, semina quædā stomacho grata admiscenda, *anisum*, aut *cyminū*, aut *apij* semen. *Lenticula* recocta sæpenuerò ita oppressis subuenit, cum aceti momento aut *oxymelite* mansa. *Brassicæ* etiā ipsæ his coctæ auxilio sunt. Præstat autem alteram eorundem elixationem in posca fieri. Ex uinis uerò uetustius calidiusq; bibatur.

De Tenesmo. Cap. 41.

Tenesmus quandoq; intestinorū tormina præcedit. Sæpe uerò numero ipse per se paulatim creatus cessat. Est autem adfectio hæc, implacabile ad deijciēdum desiderium, quonihil præter exigua, cruenta, uel mucosa egeruntur, quæ tantum non totius mali causam constituunt: factaq; in recto intestino, tumore non mollem resipiscēs inflammatio, hærentium illic excrementorum opinione, & excernendi ea cupiditatem inducit. *Galenus* uerò scribit, à forti eiusmodi excernendi conatu lapillum quempiā ex sede deiectum. Frequenter uerò obstructionem stercoreis in tenui intestino impacti, tenesmus secutus est, qui stypticis quidē & obstruētibus remedijs plusculum adauctus sit. Clysteribus uerò acrioribus, uerbi causa, mulsa adiectis salibus, aut aliquibus quæ per os sumpta emolliūt (cuiusmodi *Damascena*, aut *ficus*, *mercurialis*, *serū lactis*) excreto stercore illico desinit. Quocirca si citra eiusmodi causam prompta hæc egerendi sine effectu uoluntas eueniat, lenire inflammationem hordeacea polētia calida, & asperginibus ex uino, oleo *myrtino*, aut *rosaceo*, aut *omphacino* lumbis ac pe-

lini applicatis, competit. Caterum mucosa quæ intestinū res-
tum obstruunt, mulsi quoq; infusione abstergito, muriaq; non
rarò indita, id quod res expostulat ipsa, perficit. Satis uerò
sunt, salis drach. sex, cū aquæ calidæ hemina. Mitigātur præ-
terea dolores et distēiones infessu fœnogræci, aut maluæ, aut
feminis lini. Quidā uerò sæpius hanc etiā infessionem usurpa-
runt: Rubi, myrti, cytini, lauri, & cupressi uiridium æquales
portiones in aqua decoquuntur: est autē Marcellium. At si in
profundo inflāmmatio et irritationes torqueāt, frumētacei cre-
mores unā cū quibusdā stypticis percocti, ab infernis infundē-
di sunt. Oleū uerò dulce immissum, atq; plurimis horis deten-
tū, dolorē discutit. Si autē crebrius quis ad oletandū exurgat,
glomus ex spissamētis calidis ano subdetur, uel fursures calidi
in fascia, aut spōgia, aut aliud quiddā eius generis apponatur.

De Dysenteria, quod est, intestinorum torminibus. Cap. 42.

Dysenteria, quā Romani tormina nuncupant, intestinorum
exulceratio est, quæ nunc quidē degenerāti tenesmo, aut
uentris præmemoratæ cuipiā perturbationi succedit, nunc ue-
rò à se originē trahit. In qua excremēta primū biliosa et ua-
ria profluunt, mox iuxta proportionē cruenta, postremò cor-
rupta et saniosa, cuiusmodi ex mortuorū cadaueribus proflua-
re cōsueuerunt. Sed quæ ab atra bile inchoat, exitialis est, cum
exulceratione cancrū insinuat. Si igitur cum stercore mixta
exulcerationis signa cum doloribus, & circa umbilicū torsio-
nibus cernātur, in gracilibus intestinis exulcerationē esse co-
gnosco. quæ per os remedia cū primis expetit. Sin uerò ole-
tum sincerum egeratur, hulceris crassorum intestinorū nota
est, quod clysteribus magis obtemperabit. Vbi autem plurimus
cruor solitariè deijcitur, affectionē, cruentā uocitant dysente-
riam. Excernitur quippe aliquādo nigrior, quā secundū na-
turam, sanguis, lucidusq; seu floridus, quū iecur digestum ali-
mentum prauē cōficit, imbecillaq; cōtentrīx ipsius uel altera-
trix facultas debiliior est, sæpenuerò per uenirē loturæ re-
centis

centis carnis haud abfimile egeritur. Iecorariam autem hanc dysenteriam indigitant, qua de in sermone super iocinore narrabitur. Comuni itaq; curatione, iisdē præsidijs quib. coeliacis, ac alijs præter naturā excretionibus, succurritur. Propria uerò, Lemnia sbragis pota, et per aluū infusa, absterfo prius aqua mulsa intestino, depascenti etiam dysenteriae medetur. Deinde muria, et portulacae succus potus dysentericis peraccommodus est, atq; ipsa etiam per se portulaca in posca elixa et comestae. Plantago itē, rubiq; cum fructus, tum folia: necnon et altheae radicis decoctū cōueniunt. Hippuris ex aqua uel uino pota, eiusq; succus Mori item immaturus fructus ubi aruerit, adhuc etiā magis rubi mora consimiliter arefacta prosunt. Quin et oua ex aceto cocta, mansaq; alui fluores exiccāt. Satius fuerit, si ex his alia quae ad tormina spectant commixta, in sartagine torrefacias, atq; esui exhibeas. Praestantissimū uerò omnium est omphacium, rhus rubens, et succus eiusdē, malicoria, galla, acini uinacei, messila, myrta, corna, cochlearū integrè tostatorum cinis. Cōpositum uerò illud probatur: Cochlearū cineris partes quatuor, gallae partes duas, piperis partē unam in puluerem cōtusa, obsonijs inspergito: aut ex aqua uino ue cādido aquoso potandū exhibe. unice iuuat dysentericos, quibus bulcus nondū cōtabuit. Et canū ossa uorantiū sterces aridū cum lacte, in quo marini calculi igniti sint inieci, haustū. Cōposita uerò præcipue prosunt, ex Aegyptia spina pastillus, atq; Phippi: itē qui ē cornu ceruino, necnō ex seminib. cōficiuntur, et Trygonis: catapotiaq; ex macere cōsarcinata, admirandae uirtutis sunt. Praestantissimus est, qui cōtinet: Opj, croci, lycij Indici, acaciae, rhus, thuris, gallae, hypocystidis, corticū malorū puniceorū, myrrhae, aloës, et quis partib. ex aqua præbe triobolū.

Aliud: Rhus denarij octo, gallae, malicorij, singulorum denarij quatuor, cochleare unum ex uino propinatur. Aliud: Rhus drach. octo, gallae, acaciae, gummi, uniuscuiusq; drach. duae, opij drach. in uino temperato exhibetur. Hic autē linderus dysentericis

conuenit: Myrtorum nigrorum sextarium, rhus Syriaci tantundem, palmularum Thebaicarū libras duas, carniū malorum cotoneorum librā, mala punica acida cum corticibus decem. uini astringētis sextarios duodecim, ad tertias usq; decoquito: Percolatis, mellis libras sex inycito: coctumq; ad crassitudinem, lingēdum exhibe. Constat uerò, quòd cataplasmata quoq; ex astringentibus, quorum syluā ad manum habes, usui sunt. Enemata porrò dysentericis propter affligētes tenesmos competunt, ex cremore oryzæ, aut chondri, siue id genus alie cuius, cum adipe caprino, siue hircino, & quæcunq; in capite de tenesmo memorata sunt. Quòd si sanguis excernatur, polygoni succus per inferna inyciendus est, aut plantaginis cum acacia, uel hypocystidis, uel alterius eiusmodi. Sin urgeat fluxio, cohibens sanguen, aliquod remediū inycito: uerbi gratia, lanæ succidæ cinerē, uel spongiæ inanīs pice liquida, seu sanguine bouillo irrigatæ, aut cum alumine liquido crematæ, aut fimi asinini cremore. Andronius etiā pastillus præstans medicamentum est, item Musæ, & his nō absimiles. Necnon & ea quæ subiiciuntur collyria, multo in id efficacissima sunt: præsertim in quibus cum doloribus alui excrementa eijciuntur. Sed huius ubi depascendo serpens intestina occupauerit, id quod ex graueolentia & putredine recrementorum, quodq; non ab initio statim, sed interposito tandē tempore ortū sit, deprehendimus: clysterib. crustā inducētibus utamur, cuius classis sunt pastilli qui Faustiani cognomentum obtinent, et ex charta, pastillusq; nomine Bithynus & Thronius: itē ex suberibus confectus cum lēticulæ decocto, aut astringentiū quopiā immissi. Cæterum & hoc sæpius à me expertū est enema: Glandium calycis cremati (est autem calyx concauum illud, unde glans querna enata est, quo coriarij utuntur) auripigmenti, solida ginis, rhus Syriaci, æquas horū concussorū partes, quantum uidelicet duo capiunt cochliaria, oryzæ cremore excipito, et succo anchusæ spinosum grandeq; & nigrū folium habentis, quam

quam chærospethon nuncupant. Quorum item albuginis si militer ad uncias duas, aut treis immittito. Epithematū porro facta est in uentris mentio. Vētris insuper inunctiones è materia astringēdi arefaciendiq; potestate prædita cōflatæ, cum aliquo glutinatorio gummi, thure, glutino taurino, polline, in id genus cataplasmatīs locū habeant. Alimentum sic habentibus principio puls ex ovo & lacte parata, mox frumentaceæ sorbitiones per se, & cum lacte elixæ, esto. Lac quoq; modicè decoctum, præstantissimū est. Holerum usus neutiquā necessarius: possunt tamen gustari cichoriū elixum, intybum, plantago, brassica bis cocta, & poma astringentia, carnibus ipsorum porrectis, aut quæ aliàs exasperare possunt intestina. Quod si calor in multā uenerit intemperiem, intybum etiam crudum exhibendū erit, aqua gelida propinanda. potū alioqui præstet aqua pluuialis: stomacho autē affecto, etiā uinū. Volucres deniq; aridiores, & cōcoctu faciles māducētur. Lauacris utantur ex aquis dulcibus. At si fluxū inde experiantur, prægrandē spongiā, uel micæ panis siliginei, uino ascalonite, aut aliquo calido adstringēte irrigatas, uniuerso abdomini superaccommodabis, fasciāq; ubi deligaueris, ita lauari præcipito.

De ægritudine colica. Cap. 43.

Colon crassioris intestini pars, à dextra iliorū parte oriēs, in modū zonæ ad sinisteriorem excurrit. Cruciatus in eo pluribus de causis suscitatur immensi. aut enim propter crassum pituitosumq; humorē, qui intra ipsius tunicas insidet, aut propter spiritum etiam crassiorem ac turgidum inclusum, aut propter inflammationē intestini, aut propter acres, uiq; mordaci uellicantes succos. Quibus itaq; crassus pituitosusq; humor cruciatū infert, his dolor per uniuersum funditus epigastrium diffunditur. præcipuè uerò, ubi sensu coli situm terebra perforari autumat. Torsiones hos circa umbilicū excruciat: rudus item, & nauisæ, uomitionesq; uariæ, sed in primis pituitosa; alius grauius impedita adedò nihil excernit, ut ne fla

tus quidem præterlabi queat. Excretum autem quandoq; oleu-
 culum, ueluti bubulum cernitur, leue, & spiritu refertum. Præ-
 cedunt hæc uerò maximè, gelidorū, craſſiq; humoris eſculens-
 torum frequens uſurpatio, ſatietas, cruditas, ociū, & id genus
 alia. Qui uerò dolorē flatulento ſpiritui acceptū referunt, ex-
 tenſionis potius ſenſu torquētur. Qui autem ob inflātionem
 tormenta ſentiunt, loci feruore deprehenduntur, quem febris
 haud ignaua comitatur, unā cum ſtercore lotiū retinetur, pul-
 ſus uentrē perturbat, ſitis, æſtus, ac nauſeæ inſeſtant, uomitio-
 nesq; bilioſe potiſimū, quæ nihil malū ſubleuāt. Ea quidem
 ut uno uerbo eloquar, omnī inſeſtiſſima eſt colicarū affectio,
 quæ in gracilioris inteſtini morbu, quem ileon Græci nuncu-
 pant, tranſitū minitatur. Hiſ qui propter acres & mordaces
 afficiuntur humores, perinde atq; cum ſubeſt inflātio, cor-
 pus æſtuat, ſitis et uigilia moleſtant. Febriunt autem omnino,
 aut paulo minus illis, lotiū acre emittūt, & bilioſum deſciunt,
 ſæpenumero in alui deiectione plurimū torquētur, & edulio-
 rum potuumq; excalfacientiu uſu grauius irritantur. Medenda
 dum itaq; doloribus, qui ad gelidos, tenaces, et ſpiſſos humores
 referuntur: prouidendo, ne uehementer calida adhibeātur re-
 media. nam ab admodū calorificis præſidiorū materijs lique-
 facti funduntur; magisq; in flatulentū ſpiritum rediguntur hu-
 mores eiſcemodi, quos circa morbi ſtatim exordia medicamē-
 tis minimè inflātibus, attenuatoriæ & ſiccificæ naturæ, abſq;
 immodica calfactione, incidere et cōcoquere expedit. Proinde
 aluo prius oletulo clyſteribus idoneis exonerata, oleum in quo
 elixum ſit cyminiū aut ruta, cum adipe anſerino, uel gallina-
 ceo, uel radicū ſylueſtris cucumeris decocto, myrrhaq; dena-
 rio, melle & ſicyonio oleo inſiendū eſt. Quin & oleum com-
 mune inſuſum nō rarō pituitā uitreā extraxit, inſeſtantiq;
 protinus dolorē ſedauit. Sed ſi præ nimio cruciatu enema con-
 tumaciter retineatur, collyriū ſuppoſititiū ex melle, cymino,
 nitro, rutæ ſemine arido, braſſicæ caule pulchrè polito, et mu-
 ria

via irrigato, uel brassicæ cinere melle imbuto, aut colocynthidis de trita cū melle, nitro, ac cymino sedi inferendū est. Caterū glandes digitorū senum lōgitudine sunt, ut per sedis fibulam in aluum penetrēt. Anus præterea cyclamini succo, & nitro, uel centaurio cum melle & nitro illinendus est. Perseuerante autem cruciatu, clyster præmemoratis adiiciendus est. Resinæ terebinthinæ uncia, siue opoponacis drach. aut galbani drachmæ quatuor, bituminis aqua portio, cum nitri drach. et aquæ uncia, & olei rutacei uncys quinq; uel plus. Dolentesq; partes ex cymino, uel anethino, uel sicyonio oleo fouēdæ sunt. Cataplasma insuper Trispermion nomine, cum cymino, baccis lauri, & semine apij imponatur. Epithemata uerò cōmendantur ex seminibus, è baccis lauri, & ex melilotis concinnata, atque Polyarchium. Inseſiones item ex fœnogræci, altheæ, chamæmeli, artemisiæ, anethi, lauri, & id genus aliorū decocto salubres sunt. In oleum insuper calidū, uel hydrelæum descendere ex usu est. Potioni absinthiū, & cuminum æquis portionibus, aut panax cum aqua uel castorij, uel anisi, piperisq; drachma cum oxymelite præbetur. Quod si cruciatus his remedijs non cedunt, potionandi sunt confectioe quæ è tribus piperū generibus constat, uel theriaca. Sinapismo ad hæc, & dropace in dolorum remissionibus utendū, & sua sponte emergentibus balineis. Caterū ex aqua potabili lauacra effugiant, nisi ob doloris afflictionē cogantur. Cum iam prædictorum aliquo medicamine aluus stercore prius leuata fuerit, lauacris se credere, uaporariq; ignitis filicibus, aut inter candentes parietes iubeto, inspersis aliquibus nitrosis smegmatibus. In uehementioribus tormentis, mediocriter mitigantibus præsidys utendum est: cuiusmodi cēsetur è castorio cōfectus pastillus, cū per superna, tum per inferna immissus, & alia eiusdē generis medicamenta. Nam quæ uehementer torporem afferunt, cauenda sunt. Quoniā ad præsens quidem tormenta paulisper leniunt, sed diuturniorē affectionem reddunt, materiam incrassando, meatusq;

meatusq; intestini cōstipādo. Pituita uerò iam attenuata, hiers
amarulenta, uel globulis huiusmodi purgare expedit: Aloës,
euphorbij, cocci gnidiij puri, scāmonia, æquis cuiusq; partibus
modus est ad scrup. duos. Viçus adhæc ratio calidior & ari
dior conuenit. A primordio quidē morbi perferenda est inea
dia: mox inde acriora manducāda. Porra itaq; tosta eiusmodi
afflictioni detentis esui dentur, cum condito. Apiū quoq; et pa
lustris asparagus, allia cruda, præcipuè his qui talibus minime
offenduntur. Verū conditū ipsum quoq; potent, panēq; cum
ipso sumant. Escas etiā reliquas inculpati succi, & cōcoctioni
nihil renitentes exhibebimus: ita quidē, ut cautius à saturitate
& cruditate tueantur. Vbi uerò flatulentus spiritus dolorem
suscitauerit, post enemata quibus flatus dissipātur, potionēsq;,
cucurbitulæ etiā perquā ingentes succensæ, & inanes unia
uerso uētri impactæ, nonnunquā satis adminiculi præstiterūt.
Quod si intestinū inflammatio torquet, è cubito sanguis detra
hendus est. Si uerò mictionis difficultas exercet, uena à malleo
lo secanda est, & iam pridē enumeratis utendum remedijs, ex
ceptis acribus, & uehementer expurgantibus. Lenientes po
tius clysteres infundi, cataplasmata admoueri, imbrequ; cona
gruo foueri debent. In oleum quoq; descensus cōmendatur. Cu
cubitulis interim utiliter adglutinabimus. Ceretariumq; epi
gastrio applicabimus, quod ceræ quidē habeat quincuncē, cha
ma melini olei sextantem, rosacei tantundem, fabacæ farinæ
semunciam, lutea ouorū quina. Hæc lentitia seminis lini cogū
tur. Tenuis & febricitantiū peculiaris uicçus, usq; ad irflame
mationis solutionē sic habentibus congruit. Quod si acres &
mordicantes succi cruciatus pepererint, oleū per aluum infun
detur, in quo elixatū sit scenogra cum, aut alibea, cum molli
adipe recenti anseris siue gallinæ, uel cremore quoq; ptisanæ,
cum rosaceo, aut lini seminis etiā liquore. Potionādi uerò sunt
antidoto ex aloë amara. Lauacris ex aquis dulcibus danda est
opera. Cibis utendū sorbilibus ex chondro, seu ptisana, piscie
busq;

busq; saxatilibus. Vno uerbo, omnis uictus ratio humidior frigidiorq; esto. Cauendū à cunctis acerbis cum dapibus, tum medicamentis. ex superfusionibus, cataplasmatibus, fotu, uiniq; potu, in primis autē uetuli. Si dolor admodum uiolentus laborantem exerceat, ijs etiam quæ stuporē inducunt, utendum. Multo quippe minus alijs lædunt id genus affectus, quæ tenues mordacesq; humores incrassant, & mediocriter refrigerant. Mea nanq; sentētia, colica ægritudo quæ nostra ætate incrudescit, ex talibus humoribus nascitur: cum ab Italia quidem finibus inceperit, per pleraq; alia Romani imperij loca, instar pestiferæ contagionis grassetur: unde non paucis quidē in morbum committalem, alijs uerò in membrorum resolutionē incolumi sensu, nonnullis autē in utraq; delapsis, magna pars eorum qui in committalem ceciderant, è uiuis excesserunt. Quorū uerò morbus in paralysem transierat, pleriq; euaserunt, perinde atq; in decretorio aliorum transeunte morbi materia. Hoc itaq; modo affectis, medicus quidā per Italiam curam adhibuit. suspectam sanē atq; infidelē quandam, frigorificā scilicet, multumq; temerariam uictus rationem de industria commentus. Lactucas nanq; crudas et refrigeratas, intybaq; consimiliter, uel ultra saturitatem deuorandū ipsis elargitus est. Præterea uuas, mala, duriorisq; carnis pisces, et quæcūq; crustacea, quæ Græci ostracoderma uocāt, bubulos pedes, bulbos, et id genus, nō facultate modo, sed tactu etiā frigida. Vinū sanē rarēter admodū admittebat, nec nisi aqua gelida dilutū. aquā uerò frigidā, uel poscam etiam frigidā propinabat. Ab alimento præterea omni calido, mediāq; materia, uehemēter abstinebat. Atq; ita sanē complures aliquot à morbo uindicauit: quospiam ex illis etiam, qui iam in Herculeum morbum, resolutionemq; neruorum prolabi cœperant, præter omnium opinionem seruauit.

De Voluulo, quem ileum dicunt. Cap. 44.

Cutissimum malū, & acerbissimi cruciatus ileos existens.
A casum quendam periculo grauiorē adfert: miserabili si-
 quidem

quidem morte tandem eo morbo detenti, alui retrimēta per os reddentes intereunt. Oboritur ex cruditatibus, & obfessa excrementorū semita, retentis quæ iam corrupta sunt: lethaliū item medicamentorum potu, atq; in scortū descendantibus intestinis, & inflammationē expertis, coli cruciatu præcedēte. Pueris igitur hoc malo oppressis, asperginib; cataplasmatib; clysteribus, collyrijs, atq; fotibus, quemadmodū in colicis memoratum est, succurrendū. Adolescentiæ autē, floridæq; iuuentuti sanguinis detractione absq; mora succurritur: sin minus, cucurbitulæ uniuerso uētri multæ atq; inanes sunt adglutinandæ, & in regione doloris cū scarificatu. Mēbra porro perfricanda, arctiusq; fascijs coercēda, tum clysteribus & enematis ualentioribus utendū: in seffu insuper olei calidi, antidoti, & purgationibus. In summa, omnibus quorū usus in colica ægritudine probatur, exemptis his qui ad acutos & uellicātes humores coli dolorē referunt. Mirificè uerò conducit ipsis, si euomuerint, anethū elixū & epotiū. Cōfestim uerò à potu panis incalidā demerso, buccam eius calentē manducandā porrigito. Sed cibū non continentibus, rbun & cyminiū in eadē leuigatum, in oxymelitis cyathis sex potui præbeto. At eos qui ex ueneno ileum patiuntur, aquæ calidæ potu uomere cōpellito. Cæterū omnium lethaliū uenenorū indicia habes uolumine huius operis quinto explicita. Deinde bibendū quoq; oleum calidum, aut ius pingue, quo denuō ciatur uomitio. Post aliquot dies theriaca propinatur. Perseuerāte autem oppilatione, lacte scisso, cum exigua scāmonia, uel aloë, aut purgante aliqua materia, aluus euacuanda est. Si ex intestini in scrotum prolapsu uoluulosa oriatur affectio, figuratis ipsis quam primū, ut in caput sublimes pendeant, delapsum intestinum intra inguen reprimendum, ligamentōq; coercendum.

De renum ac uesicæ malis, & primitus de calculo. Cap. 45.

Morborum cognatio nos seriē doctrinæ transgredi compellit. Cōmune quippe colica ægritudine, renumq; calculo

culo laborantibus, intra primordia statim uentrem cohiberi, summoq; cruciatu opprimi, cibū fastidire, cruditates pati, & intestinorum torminibus torqueri. Peculiare uerò, colicis hæc omnia magis intēsa offendūtur: Nephriticis aut̄ minus. Et colicus quidē cruciatu cum plurimū in dextris ilibus uexās, ad stomachū, usq; iecur itē & lienē pertinet: oleti omnino nihil, imò ne flatus quidē per inferna trāsmittitur. Et cū reddere alui cōpellitur, quod excernitur flatulentū est, et bouino neuti quā absimile. Nonnunquā etiā pituita uitrea deijcitur, lotium copiosius pituitosumq; editur. Nephriticis autē grauis in renibus dolor quasi fixus hæret, instar paxilli ad aëre referēs, & è directo subiectus testiculus dolore afficitur, femur eiusdē partis torpescat, alius quidē sua spē rariuscule respōdet. Clysteribus uerò iniectis, flatus et biliosius recrementū deijcitur. Lotium exigū, ac sabulosum magis redditur, meatusq; urinary constringuntur. Hæc indicia calculos in renibus esse testātur, quæ hominibus maximè adultis eueniūt. pueris uerò in uesica potius calculi cōcrescere cōsueuerunt. Notæ horū sunt, urinae cruditas, et in albedinē languescēs, cū sabuloso sedimine: pruritus creber, uerēda subinde laborātes contrectāt & arrigūt, identidēq; in lotiū urgētur, et destillat urina. Materiata quidē gignendis calculis occasio, crassus et terrestris humor habetur: effectrix uerò, flagrās renū aut uesicæ ardor. Caterum in renib. quæ calculos cōminuant atterāt, incidātq; utendū medicamentis est, nō tamē excellēter calorificis: cuius farinae utiq; sunt, Basilicorū asparagorū radices, rubiq; uitrū itē cōcrematū, graminis radix, adiantū, bdelliū, lauri radicis, cortex, altheæ semē, cicer nigrū arietinū, spongiarū calculi, acetū scillites, pbu, meū, asarū, carpesia, sarxiphages. Siū præterea cū māsum, tum potū, scolymi q; radix, irion, prionites: lauacris q; iugiter utantur, & à lauacro confestim eorum aliquid quæ memorata sunt, potent. Adsparginibus insuper, cataplasmatib; q; et fomentis, infusib; q; relaxantibus placantib; q; utendum.

dum, hoc ex colicis transumendo. Compositæ autem potiones probantur: Rutæ agrestis, & maluæ sylvestris, apijq; radices cum uino elixatæ. Liquorẽ inde expressum aqua tẽperatum, cochliaribus binis exhibeto. Maceratũ etiam illud in emplastrũ: Balsami fructus, calculorũ spõgia, pulegi aridi, maluæ sylvestris seminis, æquæ portiones cõtritæ, cochlear inde cũ uini diluti cochliarijs duobus propinatur. Aresadũq; sanguen hircinũ, cicadæ aridæ demptis alis ac pedibus, lapis iudaicus tecolithus appellatus, ex mulso in calido lauacri solio exhibetur: & quæ ex illis componuntur medicamina. Fusca in super nephretica, & quæ ad eam functionẽ cõparata sunt condita. Troglodites autem præcipui honoris inter remedia cõsetur. Est uerò passerulus auicularũ omnium, præter regulũ, quo uno maior habetur, minima, colore consimili, inter cinericiũ & uiridem medio, acuti rostri, in parietibus sepimentisq; maximè degens: qui totus sale conditus, & concoctionem non expertus, iugiter comestus, cõcretos iam calculos lotio expellit, & in posterũ gigni prohibet. Crematiq; integri cum pennis uiui cinis uniuersus per se, adiectoq; pipere, & phylli modico, ex mero melleq; potio idẽ præstare potest. Aduersus uerò sæuam cruciatus acerbitatẽ uigiliasq; celebratur Sotira, et Philonis medicamentũ. Dolorem plerũq; placauit sanguinis admissa detractio, ocysimè ad excretionẽ propellẽdo calculum. Arcent creationẽ calculi, primũ quidẽ cibaria non improbi succi, & moderata: mox etiã exercitationes, & insolentior leguminum omne genus, frumentaceorumq; usus. Casei item & lactis, quæq; inde præparantur obsoniorũ, uini adhuc atrii, et carniũ abundantia: et ut semel omnia cõplectar, omniũ quæ crassum generant succũ, quæq; admodum calidæ sunt potestatis, & acria, hydrogarorũ inquam, atq; conditorũ, & id genus aliorum abstinentia. Haud enim hæc modò nondum natos calculos cõpescere prohibent, sed iam ortos etiam cõminuere aut excernere possunt. Bibãt uerò oxymeli, adiecto aliquo ex
sum

simplicioribus, quæ lotij proritadi uim obtinēt, puta adianti, apij, graminisq; decocto. A balneo, ieiuni ante uinum, aquam temperatā potēt, et in medio prandij frigidā, nisi quid obstat, super sorbeant. Quod si prauorū humorum copiam sensu per ceperint, sanguinis detractio, seu alui deiectione euacuētur. Verūm ad tutelā negignantur calculi, omnium primum boni tatis honorē meruit. post balneum, ante uinū, nutrimentumq; aliud, aquæ temperatæ potus. Sed uesicæ puerorum calculos, efficacioribus adminiculis emolliere, delectu quidē ē prædictis habito. Quod si calculus supra modū increuerit, & ceruici ue sicæ impegerit, quassatu & tubuli, & demissione, uel incisio ne, perinde atq; in uolumine de chirurgia dicitur, utendum.

De inflammatione.

Quod si renes aut uesica inflāmationē experiātur, id quod regionis affectæ feruor cū grauitate cruciatus, febricula, alie na animo peregrinante sermocinatio, biliosus uomitus synce rus, meiēdi impotētia, præsertim uesica phlegmone oppressa arguit: sanguinis detractio quamprimum occurrēdum est, mitigatoriaq; facultate præditis asperginib. & cataplasma tis utendū ex ruta, anetho, fœnogræco, althææq; radice. Cly sterijs item mollibus, & enematis quæ ex oleo, & papauere, & adipe anserina cōstituuntur. In uesicæ uerò inflāmationi bus, opij quoq; obolus semis cum myrrha crocoq; ac oleo sedē immittendus. Mulsæ propinanda, abstinentum à ualde lotiuma cientibus, multaq; potione: nisi acris ac biliosus humor naturæ modum nimīū excedat, tum quippe copiosiori potui indulgen dum, & confertim semel eorum quippiā, quæ urinā absq; ros sione propellunt, ingurgitandū. Potent præterea seminis lini portiunculas binas, amyli partē unā, ligulæ mēsurā ex aqua. Sumatur itē cucumeris atq; peponis semē. Cum uerò igneum feruorē renes sentiunt, linteola uino & oleo rosaceo, aut aqua & oleo rosaceo melino ue imbuta inijcienda sunt: uel ceratū ē cera, rosaceoq; et chamæmelino oleo, siue melino, et ouorum

lutis,

lucis, cum aceto perexiguo, aut polygoni succo contextum.
Postea autē emplastro ex succis Diachylon appellato cū cha-
mæmelino utendum. Cauenda sunt nimium calida, quoniam
suppurationem creant. Et idem & impediō frigorifica: renes
namq; promptissimē ab his in scirrhum obdure/cunt. Abstine-
dum præterea à balneis est, cum imminet inflāmatio. Vidus
ratio quæ febricitantibus expedit, & ab arcenda inflamma-
tione nomen aphlegmaton habet.

De urinariorum partium abscessu & exulceratione.

Abscessum in renibus portendunt dolores iliorum, turbati
horrores & febres inordinatæ. In uesica uerò præter cōme-
morata, dolor etiā partis fatetur. Renum porrò affectum de-
prehendes, si homo in sanū decumbens latus, in opposito dolo-
ris ueluti suspensi renis sensum percipiat. In quorū curationē
inseñib. ex hydreleo utendū est, cataplasmatib; q; ex polline,
oleo, ac resina, aut farina erui cum melle, aut cardamomo, aut
stercore columbino, cum caricis. Pus uerò per lotiū cōfardim
excretum, ruptū abscessum, atq; in particula hulus esse decla-
rat. Cū uerò etiā absq; abscessu, rupto uase, uel exeso ab acro-
re materia, aut calculo radice urinarj meatus exulceratur,
distinguenda est renū exulceratio, ab ea quæ uesicā, aut uri-
naria uasæ exercet, ad hunc modū. Renibus exulcerationem
sentientibus dolor cum quadā grauitate lumbos affligit, & cū
tra impedimentū emingunt, lotioq; pus mixtum inuenitur, car-
nosus particulis innatantibus. Vesica uerò hulusculis intētata,
uehemens cruciatus pedinē inumq; uentrē impetit: urina ma-
gna cum anxietate redditur, & post mictionē pus in fundo ma-
tulæ subsidet, squamulæ q; in ipsa tetri odoris, aut lamineæ cir-
cunferuntur. Furfuræ uerò hypostasēs uesicā scabie laborare
significant. Quando autem meatus qui è renibus urinā ferunt,
exulceratione confluantur, puris mixtura medio quodā mo-
do, & capillamentis persimilia urinis innatant, tormentumq;
mediam inter renes & uesicā regionē urget. Si uerò pus, aut
sanguis

sanguis solus absq; lotio excernatur, prædictarum partium nullius, sed pudendorum hulus denunciat. Cum itaq; uasa per quæ urina fertur, exulceratione experiuntur, aqua mulsa, uel fœnogræci decoctū, unā cum melle, aut cucumeris semen cum passo propinetur. Purulentū cum lotio excernētibus, rubrica Armeniaca exhibenda est, uel ferularū crematarū cinis, quantum tribus digitis capitur cū passo. Sed & lac in potu magnifice sic affectis opitulatur. Mixturæ autē hæ, seminis lini, seminis cucumeris, tragacanthæ singulorum gemini denarij, in pastillos cōformantur. Aliud: Nucleos pineæ nucis uiginti, seminis cucumeris satui cochliaria quadraginta, amyli drachmā heminis duab. iuris in quo nardi, seminis apij, uniuscuiusq; denarij quini elixi sint, excipito. Verūm Archigenes in epistola ad Atticū, Dysuria, inquit, urgēte, sume papaueris albi torrefacti seminis cōtriti drachmā, iunci odorati rotūdi, uel calami, aut glycyrrhizæ decocto inspersam. Hulus naturā resia piscētes cruciatus illud adimit: semina cucumeris repurgati numero triginta, nuclei pineæ nucis duodecim, amygdalæ amaræ cortice depto trigintaquinq;, croci quantū ad colorem opus est, ieiunus quotidie cum lacte seu protropo ingerat. Mitius sanē fuerit, si loco pinearū tantundē seminis maluæ accipias. Sanare præterea affirmat exulcerationes uesticæ Cyphi, & ex hoc antidotos. Nos uerò in uetustiorib. hoc usū, nunquam alio magis uario indiguimus: Chamædryos, chamæpityos, singulorū drac. uiginti quatuor, asari, piperis albi, uniuscuiusq; drach. septē, cinnamomi drachmam quā fieri potest læuigatissimi. cochliaria duo exhibemus, cū passo Cretēsi. at si febricitet, cū aquæ cyathis ternis. Si mordax hulus, amyli cochliarijs duobus, et seminum cucumeris granis quindecim adiectis, uoti cōpotes euasimus. Hactenus quidē ex decretis Archigenis. Ex uesticaria itē medicamēta, & quæ ex syluestris maluæ semine cōstituitur antidotus, quæq; ex bellarijs cōfit, utilia sunt. Taurus imoq; uētri cerotaria accōmodentur ex æsipo lota, butyro,

adipe anserina, atq; styrace. In uesicā uerò clysteridio instruo
mento mulsam aquosissimā infundere, seu lac cum momento
mellis, aut cucumeris semine, aut alborē oui cum pōpholyge,
aut prædictorum medicaminū aliquo, cōuenit. Hulcere autem
pascendo serpente, pastillus ē charta immittendus est, aut By-
thinus. Cataplasma etiam ē palmulæ dactylis, & uuis passis
cum galla, acacia, hypocystide, & alumine superimponitur.

De eruptione sanguinis renum.

Renes haud rarò ex imbecillitate lotia cōtinere nequeunt,
sed latiores redditi, ē uena sanguinis aliquid excernunt, aliasq;
crassitudines edūt. Sæpe etiā numerò renes sanguinis fluxum
per circuitum, perinde atq; hæmorrhoides patiūtur: euacuati
uerò subleuantur. In quibus nihil protinus moliri cōuenit, san-
guinis fluxu represso. Quòd si cursus eius permaneat, sanguis
ex uena cubiti detrahendus est, & iisdē medicamentis, quorum
usus ad sanguinis scretū, & alias ipsius eruptiones in renum
atq; uesicæ sanguinis effusione probatur, utendum est. Vincit
symphyti radix, ac tragacātha uino macerata, ita affectis ex-
hibita: sanguinalis insuper & plantaginis suacus, cum posca,
aut amygdala amara cum passo. Siue hoc: Aluminis fissilis
drachma, tragacanthæ drach. duæ, gummi oboli quinq; cum
passo. Cataplasmatissq; more hordeacea polenta ex posca &
rosaceo: aut cataplasma ex palmulis, & siligineo pane cum
acacia, aut hypocystide in uino astringēte, aut posca elixis in-
ducitur. Vesica autē sanguinem fundente, cucurbitulæ quoq;
ilibus & coxendicibus sunt adglutinandæ. Cæterū quæ nam
particula sanguinē fundat, loci dolore deprehendes, & quòd
cruor lotio permiscetur: uel ē cōtrario, quemadmodū de pure
memoratum est. Sanguinis in uesica in grumos concreti indi-
cium est, quòd reddito sanguine urina raptim supprimitur.
quodq; concretus quidā cruor, ut consentaneum est, uel cruenti
humores effluunt. Tunc in potu decoctū artemisiæ porrigito,
beliochrysiq;, aut cunilæ, aut raphani semē, aut succū laserpi-

ty,

aij, siue cyrenaicum, siue apij in aceto temperatis singulis, uel leporis coagulū, uel hinnuli, uel hœdi in oxymelite, uel lixiuiū cum oleo exhibeto: aut spōgiæ foris ex muria, statēue calida adhibendæ. Si ne his quidē grumi dissoluantur, disseccare taurum perinde atq; in calculosa uesica, grumisq; sublati cono-
cinniter opitulari conuenit.

De renum duritie.

Quæcunq; durities in renibus suscitantur, dolore quidē uocant, sed ab ilibus quasi suspendi quippiā uidetur, stupēt coxendices, debilitantur crura, lotij momentum eijcitur, uniuersusq; corporis habitus aqua inter cutē laborantibus similis est. Hos ceratis malagmatis, frictionib. atq; fomētis emollire: ad hæc quæ urinam cient, offerre, uentremq; subluere conuenit.

De Diabete.

Diabetes pernix poculentorum transitus est, iisdem ut pota sunt per urinā redditis: quapropter siti inexplibili premūtur, unde dipsacon id uitij appellat. Ad retentricis potentiæ renum imbecillitatē, ipsius causa refertur, & attractricē robustiorem, uniuersum corpus propter immodicū calorem, consumentem refertur. Huic itaq; affectui repugnātes, alimenta largiora, quæ transmutationi resistūt, neq; admodū humida sunt, exhibeamus: puta halicā cum rosato, aut rhodomalo, aut hydromalo, aut uino nō ueteri, aut quopiā alioqui calido. Ex oleis intyba, serim, lactucas, pisces saxatiles, suū cū pedunculos, tum uuluas, pira, poma, mala punica, et potionē gelidæ. Potionandi præterea succo polygoni, inula campana ex uino nigro, palmularū item myrtorumq; diluto. Cataplasmatū modō præcordijs ac renibus applicāda sunt, polenta hordeacea ex aceto rosaceo, foliaq; uitis, & umbilici Veneris, & parietariæ, et portulacæ. Ad hæc sudores ciere, ac uomitus, à potu frigido, et omnibus quæ urinā proritat abstinere expedit. Intra uerò initia statim sanguinē detrahare, haud inutile cēsetur.

De stillicidio urinæ, difficultateq; meiendi.

Si neq; inflammatione, neq; calculo, neq; quopiam prædi-

et alio urgente, lotij acrimonia uexet, uniuersusq; habitus, uel reliqua etiā indicia bilem præferant, inde uel dysuria, uel stranguria prouenit. Proinde his quæ hanc immutant, temperatq;, uti cõuenit, ptisana cremore, piscibus, balineis, uicisq; ratione simili. Ab acribus abstinendū, uino, exercitijs, ira, & fero cibatu. Si lotij tenuitas cū albore cõiuncta, cæteraq; nocte gelidā testatur intemperie, merum calidū conuenit, & cõdita, et quæ urinā proritant medicamenta, et eiusdem facultatis esculenta, infususq; calidi. At si in lotio præter candorem crassities appareat, phlegmaticū humorē uesticæ ceruicē obstruxisse colligito, & aceto mulso occurruto, & poculis ex hyssopo, pulegio, aut origano, aut thymo, uel silphio, in aqua mulsa decoctis, et irrigationib. calidioribus. Si humor crassus, siue calculus, siue grumus, siue id genus quippiā oppilās urinae exitū impediat, fistula quæ catheter dicitur, educenda est, nisi inflāmatio particulā occupet. In febris. autē difficultati urinæ adspersionib. rutacei, uel anethini, uel ueteris olei medēdum. Cum aluus fuerit astricta, scæno-graci, aut maluæ decoctum per inferna inijciatur. Confert dicta affectione oppressis hydrelæo insidere, uel alicui prædictarū specierū decocto cum oleo. Vincit ceratū hoc: Syluestris maluæ radices in sicyonio oleo cum exigua aqua elixātes, donec torrefiāt: ipsæ quidem abijciantur, oleo uerò succus rutæ quarta parte, & ceræ & castorij quantum opus est, admisceatur.

De exoluta uestica per paraly sim.

Nonnunquam urinæ difficultas, interdum inuoluntaria mēdio resolutionem uesticæ comitatur, quemadmodum capite de paraly si comprehensum est.

De his qui urinam non continent.

Relaxatio musculi collum uesticæ ambientis, huius mali parens est, quapropter pueris ferè accidere consuevit. proinde communiter ijs quæ robur inferunt, potissimè utendum: puta ænelæo calido, & consimilibus. cauentes quæ ualidè refrigerant:

gerant: fouentes potius & ros, quantum fieri potest, calidis. Refrigeratio enim ueluti resolutionis uim obtinet. Naturaliter autem hæc faciunt: Gallinaceū guttur crematum aqua tepida ieiunis potui exhibetur, aut leucā hem flores, modò non absimili, aut leporis testiculus in uino bene fragranti friatus, bibendum porrigitur: nepeta item, myrrhaq; ante cœnā, aut rutæ syluestris semen tostū per tridū propinatur. Pudēda uerò eorū, creta cimolia cū succo perdicij circūliniri ex usu est.

De iocinoris affectibus. Cap. 46.

Ecur uarijs tentatur morbis. nam imbecillitate, inflammationibus, erysipelatibus, scirrhis, abscessibus, hūlceribus, & oppilationibus corripitur. Super debilitate itaq; ipsius uerba ante omnia sunt facienda: qua laborātes, iocinorosos propriè nuncupare assolēt. Si igitur alius excremēta in chylū quidem cōuersa, sed liquidiora deiciat, transmissione in hepar debilius uel neutiquā omnino peracta, uēire ab ægritudine immuni, at tradicē iocinoris potentiā infirmari lucito. At si loturæ recentis carnis cōparia uideantur retrimēta, cū alteratricem, tum sanguinis effedicē. Si autē ad calidā intemperiem referatur imbecillitas, progressu tēporis excrementū feculenius apparet, tetterimiq; odor: bilis ab̄de colorata, crassaq; descendit. iam uerò iecoris substantia, uniuersumq; corpus contabescit, & febriunt afflicti, et cibi appetētia carent, bilēq; euomunt. Sin frigidum distemperamentū fatigat, neq; cōtinuæ, neq; plures excretionēs fiunt: perscuerabit malū diutius, diebusq; aliquot cumulatus uēter deiciet, minus uerò olida, fecis instar, et sanguinis crassi, atræ bili finitimū. Multi præterea ac uarij deiectionū colores, frigidā indicāt intēperie, febrisq; comparēt. & uultus constans non collabitur, & cibū magis appetūt. Harū aut distēperātiarū, qualiscūq; fuerit, si alterutri ariditas cōplicetur secessus apparebūt aridiores et pauciores, et languētes maiore siti premētur. Si humiditas accedat, liquidiora et copiosiora erūt recremēta, ægriq; minus sitient.

Si inflammatione iecur confluetur, omnes quidem ex æqua dolor in dextris præcordijs affligit, qui sursum ad iugulū usque, deorsum uerò ad nothas usque costas pertingit. Febris præterea infestat acuta, tussis sicca, sitis, horror cibi, et anhelatio, irruptione suspiriū: lingua principid rubicūda, mox uerò nigra cōspicitur; bilis euomitur, aluus astringitur. Quoniā aut hæc indicia hīs quodāmodo qui costali morbo laborāt, similia existūt: quāto inter se discrimine dirimātur, capite de pleuritide explicauimus. Cū uerò erysipelas iecur affligit, ignei feruores (quas phlogoses dicūt) intēduntur, et æstuant ægri, et tabe consumuntur. Propriè uerò, si caudā iocinoris partem exerceat inflāmatio, nausea, uomitiones, à cibis appetitus auersiones, ardoresque flammæ gliscunt, animæ itē deliquia: et refrigerantur enormiter sepiusimè, ita ut hinc aqua intercutem aspicietur. Sed cum in gibbis huius uisceris partibus inflāmatio oritur, præter ea quæ memorauimus, tumor etiā euidēs in summa cute turget spectatuque tactuque facilis: hæc quidē uiolentā ac ingentē inflammationē produnt. At si obscurior quædā extiterit, iubebimus languentē summo conatu magnum respirare. Et si dextra præcordia dolore affici perhibeat, iecoris mediocrē subesse inflammationē colligendū est: sin qua subiecti muscoli porriguntur, grandis oblongiorque phlegmones tumor appareat, neque quicquā interim memoratorū præstō sit, illos ipsos inflāmari cognoscemus. Quod si grauitas cū distentione et dolore in dextro hypochondrio absque tumore ac febre sentiatur, uenarū, obstructionē præfert, qua parte quæ portas et simas iocinoris partes perreptant uenæ, his quæ in gibbis existunt, cōmittuntur. Cum autē in abscessum uertitur inflammatio, dolor ipsis cum distentione increfcit, et præter rationem rigores superueniunt, in læuūque latus decumbere magis iocinore laborantes nequeunt. Disrupto autē abscessu, uel per lotium, uel per uentrē, cumulata puris colluies excernitur. Quod si in durā iecoris dispositionē scirrhus similis tumor deciderit,

derit, dolores quidem comminuuntur, tumor uerò euidēs cum duritia existit, circumiacentesq; loci attenuantur. Progressu autem tēporis id cognitu fuerit difficile, quòd aqua intercutē properè comitetur, uniuersumq; hypochondrium humiditate contegatur. Quòd calidæ itaq; iocinoris intemperiei succurratur, frigdrificis, et uiscus mediocriter roborantibus utendum: è quorum albo habētur, seris, & cichorium mansum, interim crudum, interim uerò cum coriandro elixū: eius tē decoctum, succusq; epotus: quinetiā puluis ipsius aquæ mulse inspersus, cum calidæ, tum frigidæ iecoris intēperiei præsidio est. Intybum quoq; esculentū, & sonchus, paria præstāt. Prodest præterea succi mali citrj cyathus in mulsā sumptus, & filicis succus pari modo. Si autē cum obstructione modica fatigāt intemperies, ea ex uino quopiā tenui, & lotiū proritanti exhibeantur. Catapotium uerò quod sumit cichorj drach. quatuor, chamæpityos radicis drach. totidē in melle decocto, nucis pōticæ quantitatē exhibe: & aqua superbibatur calida: iam ex opij, seminisq; Apollinaris herbe confectura propinandū, & ipsa Philonis antidotus. In quibus calor intenditur, his rosaceum perquā præsentaneū existit, aut melinum potui ministratur. Cibus autē erit succus ptisanæ, uel chondri, cum hydrorosato, & panis consimiliter ex aqua, cum aliqua id genus dulci portione. In summa, edulia quæ mediocriter citra oppilationē infrigidant, assumātur. A uino prorsus abstinendū, nisi alia desideret causa, puta stomachi imbecillitas, tum quidē tenue, & nullarum fermē, uiriū, aquosum aliquod conceditur. Brysipelati iocinoris pari propemodum ratione medendū. Sed gelido distemperamento infestante, contrarijs occurrendū est. Panis igitur cum uino exhibēdus, & bis terūe cocta brassica: castaneas itē, uuasq; & ex gallinis quantū satis uidebitur, gustare expedit. Vinum bibatur, propinandū tamen, est eupatorium, seu asariū: aut medicamentū ex piperibus, & ex his quæ antea cœliacis & dysentericis congruere tradidimus, aptiora seli-

genda sunt. Sed cyphoides appellatae confectiōnes, ut ad calidas distemperantias nihil conferūt, nisi modicus quiddā calor cum humiditate copiosiore cōiunctus fuerit, ita gelidis inieperiebus praesentissima sunt praesidia: praesertim si cum iecoris humiditate et oppilatione copulētur. Caterū si obstructio fuerit ex crassū et glutinosi humorib. cōtracta, ruscū corrūbantur, atq; eius fructū in primis exhibe, laurūq; radicis corticem, eupatorium uē ex oxymelite, amarorū uē lupinorū iure, cūrta ac pipere, confert etiā farina lupinorū pota, et caparis radicis partes duae, costi pars una cū uino; et cōpositio diabacanu aduersus crassorū uiscidorūq; humorū obstructiōnes cōfert: praeterea iris, pistaciōrū cū fructus, tum cortex, marrubium, amygdala amara, et ex iisdē pastillus, dracunculū, ariq; radix, agaricū, et scilliticū nō tam acetū, quā oxy mel. Iecur uerō lupinū aridū friatū, ligulae mē iura sumptū, omnib. iocinoris morbis cū mero dulci subuenit. Theodoretus insuper antidotus omniū utilissima in iocinoris oppilationib. scirrhis, et inueteratis inflāmationib. remediū cēsetur. succurrit idē morbo colico, atq; etiā regio. similiter picra ex oxymelite. Cibaria sic affectis exhibēda sunt, calefaciēdi et aperiēdi potestate praedita: uerbi causa, porra ex oxymeliue, et qui in frutetis prouenit asparagus, capparisq; cōsimiliter, ceteraq; obsonia cū aliquot calidis et reserātib. cōdimētis elixa: unum itē tenue ac uetus. Cauēda sunt quae crassū humorē comesta relinquūt, et balnea frequētia, a cibo potissimē. Affectui autē diuturno, nō sanguinis detractio modō, uerū purgatio quoq; si nihil obsit, adhibēda est. Quod si inflāmatū fuerit hepar, uena in dextro cubito cōfi cū animo secāda est, sanguis auferēdus, et copiosus, si uires sufficient. Foris huic uisceri cataplasmatibus instar adglutināda est farina hordeacea, et foenograci, aut seminis lini, cū palmulis, aut malis cotoneis, meliloti florib. absinthio, chamamelino: atq; in uniuersum, cū emolliētib. semper cōfundēda sunt astringentia. Bpibemata autē hunc faciunt, Nilei,

Nilei, & euodes, hoc est odoriferū, iū Philagrianū, et Apolophanis, et ex sertula cāpana cōfectū, et cognomēto Coptū. Sed ad pręgrades inflāmationes, multa admodū experientia comprobatum est illud: comæ absinthij, nardi Gallicæ, asari, croci, singulorū uncia, iridis, myrrhæ, styracis, bdellij, guttæ ammoniacæ, thymiamatis, uniuscuiusq; uncia duæ, medullæ uitulinæ uncia quatuor, cerati lētiscini libræ quatuor. Oxymel eisdē exhibendū est, simpliciaq; præsidia, puta asarū, nardus Gallica, uel Indica, iūcus odoratus rotūdus, petroselinum. Aliū ad hęc ciere expedit cū urtica, herbaūe mercuriali, elixis et māducatis. Declinationis tēpore, epithymus et polypodiū in mulsā propinātur. Clystere etiā aluus euacuāda, ab initio quidē ex mulsā, cū sale seu nitro. Facta autē remissione uigoris, admiscetur hyssopū, uel origanū, uel cnicum, uel centauriū, uel colocynthis. Et in summa, caua hepatis per aluū, gibba uerò per lotia purgātur. Post hęc cibi loco dandus est cremor ptisanæ, in quo elixū sit apiū. Si erysipelatis naturā resipiscit inflāmatio, curatio superius cōprehensa est. Si abortus fuerit abscessus, rupturæ succurrendū cataplasmate trispermo cū resina, māna, pice, altheæ radicib. stercore colūbino, caprilloq; potādo prius poly decoctū, fumaricæq; herbæ, et ius ad tertias decocti thlapsis, aut cichorij, et chamædryos radicis, ruptura que facta, et pure erūpente, aquā mulsam, & quæ de renib. ex hūlceratis memorata sunt, adhibe. Extrinsecus aut cōpositio Mnasæi imponitur, et reliqua emolliēdi uim habentia. ad hęc medicamētū icesion, aut quod ex salicib. est cōfectū. Quod si iecur in duritiē occaluerit, exigua curationis spes est, affectu in aquā intercutē decidēte: æquē tamē emolliētib. admiscēda gutta ammoniaca, bdelliū, medullæ, adipēs, quæq; eandē uim obtinent. Potāda iū sunt, quæ oppilationē uisceris discutiūt et abstergunt. Quod genus sunt quæ lotium proritant, & calculos atterunt, cum his quæ antē ad huius uisceris obturationē conferre diximus, & alimento nimirum concinniter temperato.

De

De Cachexia, quod est, prauo corporis habitu. Cap. 47.

Cum corporis habitus primum in aquositate diffundi cœperit, Cachexiam appellare consueuerunt. succurrendum est huic, sanguinis, si nihil prohibeat, detractione, qui pedetentim & partitis uicibus per triduum aut quatrimum exhauriendus est. Euacuandi autem maxime sunt, qui per hæmorrhoidarum aut mēstrualis expurgationis retentionē in hanc affectionem inciderunt. Quemadmodū is qui ob humorum plenitudinem hoc malo conflictatur, ab euacuatione sanguinis per uenam abstinendū; omnino uerò hiera ex colocynthide apparatus purgandū. Viētus ratio hoc malo implicitis tenuis & sicca ex usu est. Naturalium aquarū usus conceditur maxime, quæ aluminis & nitri mixtura cōstant: deinde quæ sulphuris naturam habent, aliud uerò lauacrū ex diuturniore temporis interuallo admittatur. Varijs exercitationū generib. credentur languentes, sed primum is quæ per medicos reuētores uocatos fiunt. Postea autem ueratro perpurgetur. Mirifice autem ipsos iuuat delibatio iuris absinthij, et cottabismi, & dropaces. Quod si affectus in aquam intercutē deciderit, tum hydropico rē curatione, eo quē mox perscribemus modo, subueniendū est.

De intercute, seu Hydrope. Cap. 48.

Cum iecur nunc quidem per se impensius, uel phlegmone, uel scirrho, uel alio quodā affectu oppressum perfrixerit: nunc uerò ex aliarum etiā partium consortio, defectus generationis sanguinis accidit, et Aqua intercutē appellatur. In qua interdum multitudo spiritus cum exiguo humore, inter pelliculam peritonæum & intestina congregatur, ut uenter inferior percussus, sonū instar tympani edat: cuius ergo & tympanias hydrops appellatur, qui ex stomachi, alui, & coli inflationibus, diuturnisq; febribus conflat. Interdū ex peritonæi, aut in mulieribus uulvæ duritia, siue scirrho: nonnunquam rursus ingens humoris colluies cum momento spiritus in eisdē locis coaceruatur, perinde atq; in utre quopiā cōseruata: hinc ægritudo

Eudo hyderus ascites, hoc est, uentricularia nomē obtinet, ipſus quoq; ē cauſis iam pridē enumeratis cōciliatus. A' duritia uerō ac ſcirrho lienis atq; iocinoris, fluxibusq; inteſtinorum diuturnis, maxima ex parte prouenit, in quibus uenter turgere, reliquū corpus alimentū non ſentiens, eliquari cōſueuit. Quando que etiā in uniuerſa corporis mole frigidius ac pituitoſius ſanguen cōtinetur, cuiuſmodi quidem partim à iocinore deſluit; partim uerō ab uniuerſa corporis carne, tanquā in liquore reſoluta manat, uſq; adeo ut corpus albidū atq; pituitoſum, cadueri cōpar appareat, Leucophlegmatiasq;, hypofarcidios hydrops, aut anasarca nuncupatur, qui ex longis febris, et prauo ſtomachi habitu, retentis diutiuſculē hæmorrhoidibus, fluxu muliebri ſuppreſſo, reſpirationis anguſtia, uigilijsq; immoderatis citra rationem obortis, atq; id genus alijs de cauſis contrahitur. Quibus dum curationis manū admouemus, communiter ab euacuatione auſpicamur. Sed in Aſcite atq; Tympanite medicamentis, quæ aqueū humorē proliciunt, opus eſt. In Anasarca uincit ſanguinis detractio, maximē ſi mali occaſione præbuerit hæmorrhoidū retentio, uel menſū ſuppreſſio, niſi in praua habitudine præceſſerit ſanguinis diminutio. Hic itaq; ueluti in ijs qui malo habitu præditi ſunt, oportet per uices euacuationē moliri, poſtea excrementum bouis armēt arij arefactū, accuratē contritū, in poſca aut oxymelite elixatum, et ſulphuris quarta parte adiecta, emplaſtri modo toti uētris capacitati applicare. Aut ſimum caprillum in pueri lotio adſtrigmentū balnei craſſitudinē maceratum, cataplaſmatis more uentri imponere; per aluum id acriter ipſos expurgat. Cæterū ex fermento quoq; , ficubusq; aridis, calce, nitro, iride, cardamomo, ſulphure ignē non experto, gutta ammoniaca, baccis lauri, ſylueſtri ſtaphide, et agreſtiū columbarum ſtercore, uel omnibus, uel ex his quibuſdā cū aceto mulſo utendum cataplaſmatis. Deinde ex ſimo caprino, ſpōgium appellatum epithema, miro quodam modo humorem per abditos meatus, uentremq;

uentremq; educit. Siccifica post hæc imponenda sunt emplas-
tra, ex salicibus, Icesiu, uel Cureo adscriptu, uel ex baccis lau-
ri contextu, uel polyarchium, uel diaffermatu epithema. Sed
et illud mirifice humores funditus exhaurit, quod habet lapis
dis pyritis, sulphuris uiui, ammoniaci thymiamatis, cuiusq; de-
narios duodecim, cymini sedecim, nitri duodecim: quæ omnia
cerae mometo, et terebinthina resina excipiuntur, et corio in-
ducta uniuerso uetri superaccommodantur. Propinadum ius ra-
d cis ebuli, sambucine in uino decoctæ, aut cucumeris syluestris
in uino adstringente per triduum macerati. dato cyathu unu sin-
gulis diebus, adiecto cyatho usq; ad ternos. Ex uarijs constat
quæ subijcitur mixtura: Balsami, nardi, castæ, cymini, glycyrr-
hizæ, hyperici, rotundi iunci odorati, asari, dauci, amomi, myr-
rhæ, petroselinii, calami odorati, piperis, seselis, spodyli, et quæ
portiones sumantur. Cōducūt hæc singula seorsim, et quæcūq;
lotium proritat. Sed absq; grauitate mictione scilla tosta cum
melle eliquata linctus modo exhibita promouet. Verum pota-
turis in aqua etiā decoquetur. Quin et illud impedio cōducibi-
le: Visceris interni scillæ libras duas, in uini austeri sextarijs
tribus usq; ad tertias elixatas propinato ex uino quotidie, aus-
spicatus a mystro ad uncia usq; unā. Diureticū etiā illud præ-
stantissimū est: Aluminis liquidi quantitatē fabæ aqua dilutam
et linteo colatā potui per triduum, alternisue diebus porrigito.
Expedit etiā his picra ex oxymelite. et Theodoretus, atq; ex
amaris amygdalis pastillus. Habetur uerò aquacia propemo-
dum innumera, sed hæc experimeto magis cōprobata: Cocci
cnidij quadraginta aut quinquaginta, uel lathyrides uiginti
aut triginta, uel euphorbij siliquæ quinque aut septē, uel squamæ
æris denarij duo, seu tres cum micis panum exceptæ, et in glo-
bulos redactæ. Aut sambuci radice corticis succus cum cōdito
potus: uel oleaginis foliorum, et æris cremati siliquas quinque,
anisi tantundē in aqua administrato, intra primordia quidem
drach. unā; interposito uerò tēporis spacio duas, et plures. Et
quæ

quæ subiunguntur admiratione digna sunt catapotia: Aloes, euphorby, grani gnidy singulorum uncia, rhei dimidia, brassa succo excipito, et in pillulis redigito, ceratia sepius siue no uem exhibeto. Ipsa quoq; ex caryophyllo antidotus miro quoda modo aqua proritat. Vinu etia aqua eliciens præbere studebimus. Optimu uero tale erit: Scilla uncia tres, seminis apij, capparis radicis corticis piperis, uniuscuiusq; drach. quatuor, cocci cnidy repurgati drach. folij drach. malabathri pilulae duæ, uini quam optimi hemina duodecim, mellis coctionem non experti librae sex. trita, et per incerniculū traicta, uino perfunduntur. Scilla uero liquatur: modus est, cyathi tres. Post humoris euacuationē, theriaca quoq; utendū: fimi uero bubuli torrefacti lingulae mēsurā ex uino quotidie pota magnificè opitulatur. Acrorib. porro clysterib. uti cōuenit, nisi fuerit aluus sua sponte humecta: tum enim exiccare ipsam satius est. Atqui in mulieribus hydropē oppressis, pesi huius etia usus salutaris habetur: anisi, cardamomi, cymini, nitri, aristolochiae, fœnogræci, pulegij, ficuū interanei aqua portiones susino exceptæ subijciuntur. Post hæc naturalibus aquis cōstanter immergi, in harena sepeliri ac desudare, cæteris uero lauacris abstinere cōpetit. Quod si quādo lauare etia placuerit, in balneo insersionib. ex nitro, sale, sinapi, calce, atq; id genus utantur. Hæc utiq; etiam sine lauacro uilia sunt si arida cum oleo uentri adfricentur. In anasarca autē, reliquæ etia partes exerceantur, proq; uiribus, in sole aridæ perfricentur. Reliqua uero ratio aridior esto. Salsamenta itaq; edenda sunt. Et sinapi, et allia, ex uolucris syluestres et aridæ: ex holeribus asparagus, et gingidium, porra, sinapi, caucalis, et cætera syluestria. Sal theriacum uel ammoniacū obsonijs admisceatur, uinoq; tenui utantur uetusto, lotiū proritante. Si ad manū sit, marina quoq; aqua admiscenda est. Potus in uniuersum quidē circumscribendus: aqua uero ne gustanda quidē. Si cum febre hydrops infestarit, a calidioribus, multaq; acredinis esculentis, medicis

medicaminumq; adminiculis abstinendum, mixtimq; eis ad id quod urget instantes, utendū. In tympanite, ea quæ purgandi vim obtinent, & quæ totam corporis miscellā colliquant, casuenda sunt item cienda urinae efficacia. Sed quæ flatus attenuare atq; dyscere possunt, his tam intus quàm foris uti expedit. Cucurbitulae iugiter inanes uniuerso uentri imponantur. Qui postremo ascite impliciti sunt, his nisi superioribus auxilijs manū dederint, pertusio, siue punctio, quam paracentesim uocant, nulli aliæ hydropis speciei congruam, adhibenda est.

De affectibus lienis. Cap. 49.

SI lienis, ab iocinore humorem atrebilium (qui sanguinis ueluti fex atq; coenū est) trahere comparati, attrahrix facultas laborauerit, aut meatus per quem illum prius attraherebat, obstruatur, ater morbus regius sanguine impuro per uniuersam corporis molē dilabante suscitatur. At si grauitas, & distensio, siue dolor etiā splenem exagitet, obturatio significatur. Si nihil horū acciderit, attrahendi potētie infirmitas: si atræ bilis uomitus citra febrim, uel alium prauum affectū ingruat, retentricem lienis uirtutē agrotare portendit. Expultricis huius uisceris imbecillitas, à cibis appetitus auersionem inducet, dum non de more melancholici humoris retrimentum à liene ad os uentriculi defertur, & appetitū suscitatur: sed constipato in liene atræ bilis humore, primum quidē inflammatio oboritur, quam feruor, dolor, & distensio innuunt. Posterius autem in scirrhum transit, feruore cum dolore cessante, tumore autem duritiaq; persistente. Sic affectis os graue olet, gingiuae exeduntur, in cruribus hucera non persanantur: ob quæ iocinore pariter affecto, subtercus (ueluti prædictū est) nascitur. Huius igitur uisceris intemperiei, perinde atq; iocinoris medesmur. Phlegmone autē infestante, sanguinē è uena leui cubiti, siue ab extrema manu detrahe, quod ex prolixiore intercapedine fiat reuulsio, uel propter naturalē quandam cognationem. Deinde cataplasmatibus modo applicanda sunt, quæ extenuandi

uina

uim absq; euidenti ardore possident, adiectis quibusdam etiam
nunc astringentibus. Huiusmodi est suapte natura, qui salis flos
nuncupatur. Id etiā cataplasma admirandæ uirtutis est: Fœ-
nogræci triens, farinæ hordeaceæ, nasturtij, uniuscuiusq; un-
cia, ficuū pinguiū libra, uerbenacæ herbæ aridæ uncia: ficus
macerari aceto quā acerrimo, cumq; cæteris iam pridem
contritis elixari, inde rursum decoqui debent. Vel sterco cap-
prinum cum polēta hordeacea coquitur in posca, factōq; inde
cataplasmate imponitur. Adijcies autē, si uidetur, salis quoq;
florem, fomentis prius adhibitis, cyprino cū exiguo aceto ma-
lagmatis utitor. Primitus quidē simplicioribus, cuiusmodi est
hoc: Cere libra una et semis, centaurij libra, nitri quadrans,
resinæ terebinthine, seminisq; uiticis, et capparis radicis cor-
ticis, singulorū quincuns. decoctis quæ liquefieri debent, ari-
da inspergātur. Sed Nilei malagma bonitatis principatū te-
net. Cæterum si inflammatio in duritiē aridā, sensuq; non per-
ceptibilē incidat, uehementioribus opitulamentis utendū, quo-
ad cutis superficies exulceretur: è quorū albo, quod ex capra-
rum oleo constituitur, & citrinū habetur. Inter hæc sunt, em-
plastrum Machæronis, Curei, tum quod è baccis lauri, tum
quod è salicibus constat. Hoc etiā à me experientia comproba-
tum est: Auripigmenti, sandaraches, singulorū sextans, cere
terebinthine, picis aridæ, singulorum libra, galbani, liquoris
panacis, cuiuslibet uncia, corticis radicis capparis, myrobala-
ni, singulorū triens, ammoniaci thymiamatis drach. duæ, nar-
dini aut cyprini scrupulos quatuor. Et gutta ammoniaca cum
aceto illita, lieni sæpenuerò præsentaneū fuit auxilium. Pos-
tum etiam trium aut quatuor diobolorū pondere, cum uno ca-
storij, si sub ingressum balnei ficum siccā mādiderint, & man-
sam expuerint: aut guttæ ammoniacæ & castorij aquis por-
tionibus mixtis, dato denariū: hæc etiā scirrho oppressis sub-
ueniūt. ueluti & capparis cortex aceto laeuigatus, & catapla-
smatis modo inducū: qui sanē etiam ex aceto haustus, seu ox-

R mēte

melite crassos ac uiscidos humores exhaurit, quandoq; uerò etiam sanguinem euacuat. Salicis itē cortex similiter illinitur, cinisq; cochlearū cū cruda farina hordeacea ex oxymelite illitus. Itē centaurij succus extrinsecus impositus atq; epotus, et lupinorū amarorum ius cum ruta ac pipere sumptum, farinaq; ipsorū cataplasmatibus modo impacta. Aqua præterea in qua subinde candens ferrum extindum sit, febricitantibus quidem cyathis tribus sola exhibita, non febrientibus. uerò cum uini et aceti cyatho uno: aut rumicis erratici radicis cum scilla triobolus, aut trixaginis siue serpilli oxybaphū integrum ex oxymelite, anagallidis cœrulei coloris florē habentis succi diobolū potui præbeto cū posca: uel acetū scillites, aut oxymel. Cōposita uerò hæc: Panacis radicis, guttæ ammoniacæ thymiamatis, corticis radicis capparis, struthij, scillæ tostæ interanei, æquis portionibus drach. unam propinato. Cōfert etiā suspiriosis et hydropicis. Aliud: Myricæ fructus denarij quatuor, piperis tantundē, spicæ nardi drachmæ duæ, ammoniaci thymiamatis totidem, aceto scillitico eliquantur: drachma una in oxymelite administratur.

Ad lienis durities.

Cyclamini drach. uiginti, bryoniæ tres, dictamni duæ, scillæ tostæ octo, herbae lanariæ sex, capparis radicis tantundē, dabis pastillum triobolarem in oxymelite. Et qui ex eruca conficitur, peraccommodus est. Vincunt epulæ extenuantes, acris potentiæ, et arefacientes, cum potu paucissimo, exercitationes item, frictionsq; et sinapismi. Est etiam quando et cucurbitulæ cum scarificatione probantur.

De morbo Regio, quem icteron Græce appellant: Cap. 50.

ARquatus, bilis est per uniuersum corpus suffusio, interdum quidē atræ, qua de in lienosis uerba seruimus, nonnunquam uerò flauæ. Harū utiq; cōpluria habētur discrimina, quarum causæ notæq; sunt istæ. Nā si in febrili lāguore subito superueniens aurugo, febrim pacauerit, decretoriū innuit, materia ex alto

ex alto ad extrema prorūpente, conflatur: neq; ullo alio medicamento indiget, sed lauacris dūtaxat, mediocriq; frictione repētē discutitur. Quod si cū febre et biliosis deiectionibus oriatur, et in præcordijs dextris grauitas sentiatur, inflammatio feruens iocinoris ostēditur, cuius uiolētia sanguis in bilē cōuersus per uniuersum corpus diffunditur. Si uerò absq; grauitate feruor in ipso substituerit, ex sola calida iocinoris intēperie nascitur affectio. Sin citra febrim deiectiones albescāt, folliculi fel lei uitio malū adscribitur, siue meatuū ipsius, si grauitas in lateris dextri præcordijs sentiatur, oppilatorū: citra uerò hanc, uiribus inbecillium, uel attractrice ex iocinore humorē prolāciente, uel expellendi facultate ad intestina bilē protrudente. Sanguis nāq; biliosus nō purgatur, per uniuersum corpus spargitur, quēadmodū in atra aurigine fieri prædiximus: mox uerò his lotia etiam perquā lutea affatim demittuntur. Nasciatur etiā morbus regius ē feruido solidorū corporū distēperamento, quo in bilē quicquid eius alimēti ratione offertur, degenerat, ueluti in phlegmaticū humorē in hydrope anasarca nutrimentum trāsmutatur. Deprehēditur autē huiusmodi arquatus, quod nō cōfertim illico, sed pedetētim gignitur, nullo commemoratorum præsentē iam ex letalis etiā medicamēti potu, iūq; uirulento, foris ab aliquo pestifero animali illato, idem morbus euenit. De calidē itaq; temperaturæ hepatis, et ipsius inflammationis, uirūq; imbecillitatis curatione, haud multo prius in sermone huic uisceri consecrato, peregrinamus: quæ huc nullo discrimine euariāte transferātur, ne nobis eadē subinde sint repetenda. Quod si meatus uesiculæ, in qua fel excipitur, uiterq; aut alter ex his obstruatur, sanguis de cubito dextro detrahendus est. Nōnulli autē ex his et illis qui ob inflammationem hepatis regio morbo cōfliātur, iuxta paruū dextræ manus digitū uenā diuidūt. Cataplasmatīs inflammationē arcētibis utendum. Cum hiera clysteres quoq; idonei sunt. Potiōnandi sunt apij, seu adianti, seu rumicis, seu serpilli, ad tertias

R 2 usq;

usq; iſſre decocto, uel abſinthium potui inferitur. Summopere autem conducunt radiculæ cremoris gemini cyathi, cum uno uini cyatho poti. Succus itē cichorij cyathi bini aut terni priuatim, aut cum uino ſumpti. Ob iocinoris porro inflātionem iſtericos ænomelite, uel decocto tenuis ariſtolochie, aut hyperici, aut adianti, aut ſtruthij, aut rubiæ ſatiuæ ſimiliter, aut ramēti cornus ceruini drach. cum uino, aut iure paſtinacæ erraticæ in uino ad tertias uſque elixæ potionabis. Vel ſulphuris ignem non experti drach. in ouis ſorbeatur. Hæc et in obturatione iocinoris magnificè opitulantur. Seminis ad hæc atripliſis dioboli octo cum chryſattico, aut alio paſſo in balnei ingreſſu poti, felleum humorem abundè euacuant. Magna item cum utilitate picra porrigitur cum arida, tum ex oxymelite, & Theodoretus, quiq; ex amygdalis amaris cōſtat paſtillus. Cinnamomi inſuper quantū tribus digitis cōprehendi poteſt, in mulſi cyatho uno, aut aqua tēperata exhibeto. Vel myrrhā fabæ magnitudine cum piperis granis quinq; & cinnamomi tantundē. Qui ad calidā ſolidarū partiū diſtemperatūram Arquatū referunt, molli friſtioni, exercitationibus moderatis, inunctionibus, & lauacris credēdi ſunt. Cibo humectate & modicè frigoriſico, ſucco ptifanæ, intybo, ſeri, cichorio, piſcibusq; & uino tenui aquoſo alēdi. Cæterū de his qui letali potionē, aut morſu eorum quæ iſtu uenenū relinquunt, in Arquatū incidunt, libro quinto mentionem faciemus. Biſ le uerò oculos, uultūq; inſciēte, narib. in balneo elateriū erui quantitate cum lacte muliebri inſtillato: quamprimū in ſolium collocabis, præcipiēdo ne caput immergatur. A balneo, uictus ratione reſtituendis uiribus adhibita: rursus in ſole errhinum infunde. Cōfert item cyclamini ſuccus, marrubij, & nigellæ. Acetum quoq; acerrimum æger in lauacri ſolio deſidens, naribus attrahat, atq; ſic aliquandiu preſſis naribus contineat, & euacuabitur prodigioſe.

De

Prominentis umbilici causam, chirurgicamq; eius mali curationem, libro de ijs quæ manus opera administrantur, differemus. Sed quoniam nonnulli medicamenti beneficio in integrum restitui possunt, de hoc in præsentia referendum est: Aluminis scissilis drach. quinq; fecis uini octo, rosacei decem, gallarum immaturarū duæ, uino diluta, ad mellis crassitudinem redacta, umbilico insperguntur, superiniecta prius foris spongia posca imbuta, mox fascia circumligetur. Aliud: Faba fræscæ corticum, & gallarum, & balaustij pares modi in aqua decoquantur: ubi dissoluta fuerint, & accuratè contrita, spongia, quemadmodum prædictum est, imponantur. Aliud: Scobis plumbi drach. sedecim, cicuta, manna, cerussa, hy pocystidis succi, singulorum drachmam uino dissoluito, atque eo quo dictum est modo utere.

Quæ diu impuberes & imberbes, particulasq; naturales ac testes conferuent, inibiq; etiam psilothra. Cap. 52.

CRetam cimoliam, & cerussam æquis portionibus, alterci succo excipe, ita ut strigmenti balneorum crassitudinem induant: deinde olei lentiscini quantum satis est iniiciens, contunde & utere. Aliud: Cicuta succum, solaniq; herba apolaris, lupini tenerrimorum foliorum et psilly æquas partes cum læuigaueris, utere, loco prius absterso, lotoq;. Sed oportet pridie aquam bibere.

Psilothrum demoliens pilos.

Multipedum asellorum, qui tacti per domos rotundi oberant didrachmum, sandaraches uncia media, calcis uiuæ uncia, aceti ueteris cyathus, lixiuij ficulnei cyathus, in olla decoqui, & in balneo usurpari debent. Aliud: Cineris calcis uiuæ partes duæ, auripigmenti tantundem, cretæ cimoliæ pars una, in aqua ferueat, & ceu proditum est utere. Aliud, simplex & minimè graueolens: Lixiuij calcis uiuæ sextarius, sandaracha uncia elixetur, quemadmodum explicatum est, in usum

R 3 accomo

accommodato. Cæterum quæ abolendis pilis dicata sint, inter
ocularia memorata sunt.

De bubonocoe, enterocoe, & hydrocoe. Cap. 53:

Cum præciso peritoneo intestina delabuntur, longè opero
sior est curatio, quàm si ex eius raritate contigerit. Pueris
frequētius, utpote humidioris naturæ, uitium hoc accidit: et ple
riq; absq; manus opera, imposito saltē medicamentorū, et liga
turis cōpetentibus curatur. Medelis uerò subscriptis utēdum.
Hoc dñtaxat à nobis adiecto, quòd hæc uitia sola locorū diffe
rentia diuersam sortiuntur appellationē. nam si intestinum su
prà tantū in inguibus subsederit, bubonocoe, hoc est inguinæ
lis ramex: si autē in scrotum iam descenderit, enterocoe, id est
intestinalis ramex appellabitur. Mali igitur Punici corticis
drach. decem, gallæ immaturæ quinq; in uini austeri cyathis
ternis coctis læuigatisq; imposito, perfricato prius intestino,
& frigida cōspargenda, decimo die soluuntur, quiescendumq;
in lectulo laborāti est diebus triginta, bibatq; cupressi decoctū
cum uino, aut galbulorum eius triobolū ex uino plus satis dilu
to. Hoc medicamentū pueris efficax est. Aliud adglutinans:
Symphyti radice, marrubij succi, amygdalarū amararū, gū
mi, aquæ partes. Aliud: Terebinthinæ fescuncia, ceræ, thue
ris, myrrhæ, glutini pisciū, cochlearū cum testis, singulorum
uncia: gluten pisciū in aceto per triduum macerato. Aliud:
Pilularum cupressi unciā, gallarū tantundē, malicorij semun
ciam, glutini taurini quadrantem, mannæ, thuris semunciam
symphyti tātundē, cochlearum, cum testis unciā. Galbulos et
mali Granati cortices uino adstringēte plurimū cōcoquito, et
reliquis melius in pollinē tritis, exceptisq; utere. Aliud: A
loes, malicorij, thuris, hypocystidis succi, glutini fabrilis, pi
cis, bituminis, singulorū fescuncia, uini dulcis quantū satis est.
Alterū, quod etiā in hernia perfecta proficit, modò nō sit inue
terata, habet chrysocollæ, taurocollæ, sarcocollæ, ichthyocol
læ, lapidis gagatis, lapidis hæmatitis, rhus Syriaci quo coria

utuntur, acaciæ, singulorum unciam & dimidiam, lapidis pyritidis ignem non experti, magnetis cærulei coloris, aluminis scissi, mannae, thuris, uniuscuiusque unciam, picis Brytiæ quincuncem, cochlearum cum testis unciam, scorice argenti trientem, gallarum unciam, squamulae stomomatis unciam, æris tantundem, bituminis selibram, myrsinati quantum satis est, uino adstringente aridis exceptis, si decoctum ut digitos non inquinet, utere. Quod si iacere non sustineant, triangulari eos fascia crassiore & potente cōstringere, & ad interiora intestina cohercere, tuto deligabis. Arceantur à cibis infantibus, uini copia, crebro balneorum usu, & motu intenso; puta, cursu, saltu, clamore, atque id genus alijs.

De Ramice aquoso, & quomodo euacuandus sit humor:

Piperis grana centum, baccarum lauri octoginta, nitri drachm. viginti, ceræ quadraginta, olei heminae dimidio excepta in uinum accommodantur. Aliud præstantissimum: Floris Asij lapidis drachm. sex, uuarum passarum ab acinis mundatarum libras duas, cymini Aethiopici drachm. octo, nitri rubei tantundem, trita & læuigata impone, fouens serò ac manè. Non desunt, qui sulphuris quoque drachm. octo adijciant. Aliud: Calcem aqua non restinctam strigmento balneorum excipito, atque cum cerato imposito, & nitri momentum calci uiuæ misceto.

Aliud: Radicum brassicæ deustarum cinerem adipe suillo uetere eliquato exceptum inducito, tertio quoque die soluito. Quod uerò non magna fiat humoris collectio, utere malagmate isto: Ceræ librae duæ cum semisse, picis uncia quatuor, guttae ammoniacæ thymiamatis uncia totidem, aluminis liquidi fescucia. Conducit etiā medicamentum ex populo nigra, & cætera quæ ex alto in superiore parte extrahendi potestate obtinēt.

De testium & scroti inflammatione, deque cæteris eorundem uitiis. Cap. 54.

Scroti inflammationem deprehendes, si imposita manu diu statim dolor percipitur, cum partis feruore, intensaque

R 4 diurne.

duritie. Teste uerò inflāmato, ad suspensæ manus palpitatiōē
 minimē doliāt, sed impactis immanius digitis, rubor ac duris-
 tia ipsius per cutē minor uidetur: ualidiore aut compressu du-
 rities quædam ex alto obuiat, & febris nonnunquam oritur.
 Proinde peculiariter quidem testium inflāmationib. cōuenit
 sanguinis secundū malleolos detractio. Cōmuniter uerò omni-
 bus cataplasmata & cerota expediūt. Cataplasmatibus itaque
 modo inducitur lomentū cum uuis passis, pinguib. acinis exem-
 ptis, in uino plus satis diluto decoctū: cymini aut asphodeli ra-
 dices coctæ et eliquatæ miscētur cum farina pollinis pari mo-
 do, et emplastri instar adglutinātur: aut semen lini ex uino ni-
 mium diluto, aut scenogræcū ex aqua mulsa, aut lilij radicem
 in mulsa, aut recentis uini fecibus cum tenuissimo polentæ flo-
 sculo, aut senecion, & coriandrum uiride cum uuis passis, sine
 acinis. Si ingens cruciat ardor, folia alterci cum farina tritici
 ci, aut cicerum imponuntur, siue calami odorati folia, aut cuc-
 urbita cruda. Quod si malum in uetustatē inciderit cum duri-
 tie, cucumeris syluestris radicē in mulsa elixato, contritāq; cū
 loliacea farina, more cataplasmatibus adplicato. Verū in
 hoc nihil minus est subsidij, quod accipit uuarum demptis acie-
 nis quincuncem, cicerum sufferuefactorum sesquiunciam, cy-
 mini unciam, sulphuris dodrantē, nitri unciam, resinæ uncias
 treis cum semisse, quibus singulis cōtritīs cum melle catapla-
 smatis more utitor. Cerota uerò huc faciunt: Olei cyathus, co-
 lophonix uncia sex, plumbaginis, cumini, uuarum passarū, lo-
 menti, singulorū uncia quatuor, cera uncia duæ: plumbagi-
 nem cum oleo usque ad aliquantulam, crassitudinem decoqui
 to, deinde ceram ac resinā adijce, sublatum ab igne tepidum,
 uuis passis læuigatis, farinaq; infundito. Aliud: Olei anethi
 ni & rosacei, cera, resinæ piceæ singulorū quincuncem, cy-
 mini uncias duas cum semisse, stercore asinini unciam et dimi-
 diam, contere cum stercore asinino cuminum, & cerotum re-
 frigeratum misce, unaq; diluito, deinde inditum linteolo appli-
 cabis,

cabis, de superq; lanā imponito oleo omphacino imbutam, uel butyro, & resinæ æquis portionibus utitor. At si ex sudoribus hucera in scroto nascentur, gallam tritam, aut alumen axungie uel hircino felle inferre, et illinito. Cæterum ad testiculos aphtha oppressos, cretā cimoliā cū aqua prius illitā, sinito arefieri, calidāq; aqua abluito, myrtū aridā, smirnūq; momentū tritū emplastri ritu imponito. Iam uerò superexcresecetes testium carnes cinis uitis ceturionalis, nitro et aqua conspersus, et applicatus tollit. Scroti pruritū nitrū curat, & staphisagria, alumenq; liquidū aceto eliquatū, & rosaceo in balneo illinitū. Vbi laueris, partē oui albore cū melle perungito.

De incontinentia prolifici feminis, & libidinosis
insomniis. Cap. 55.

Gonorrhœa inuoluntarium genituræ profluuiū est, quod continuū citra penis tentiginē, ex imbecillitate retentricis potentiæ prouenit. In qua conquiescant, lumbiq; & pubes uelaminibus cum uino, & melino, uel œnanthino cōtegantur: deinde opus est cataplasmate ex palmulis, malis, œnāthe, acacia, hypocystide, rhu, atq; id genus. Collocandi sunt insuper in lentisci, rubi, atq; consimilium in uino elixationibus, uel etiam aquis. Alimentis præterea utendum est siccificis. Post primam morbi tempora exercitationibus, quibus toti corpori, languentibusq; particulis robur inducitur, credendi. Porro de seminis abundantia et fecunditate, libro de Tutela sanitatis primo perpensum est: ubi & super his etiā qui in uenerem congregi nequeunt, scriptum est. Itē quæ ad ueneris insomnia contulerint. Valet etiam his, grabatum frigidius, decubitusq; corporis in latus dextrum, siue læuum: cunctaq; medicamenta frigoris lumbis subillita, cuius farine sunt coriandrum, cicuta, cerussa, portulaca, omnia uerò cum aceto.

De Satyriasi. Cap. 56.

Satyriasis est genitalium palpitatio, quæ aliquam seminis lium uisum inflammationē cum intēsiōne comitatur: &

R 5 nisi

nisi conquiescat hæc palpitatio, eadem genitura cōceptacula
 in resolutionē, aut conuulsionē præcipitat, subitoq; intereunt
 hac cōuulsionē lāgudi, nō sine alui tumore, frigidoq; sudore.
 Fœminas etiā, sed rarius, hoc uitii exagitat. Venā igitur pro
 tinus secare, uictū tenuē, et abstemiū quotidie epulari, ligurire
 nunquā, sed paulatim ingerere cōgruit. Antecedit utilitate be
 ta, malua, mercurialis pusillum, et ius cochlearum. Probantur
 etiā ex simplicibus clysteres. Ea uerò quæ lotij ciendi potesta
 tem habent, uitanda sunt. Prodest itē lumbis refrigerantia ap
 plicare: uerbi causa, solani succum, aut portulacæ, aut alterci,
 aut cicutæ. Penē insuper, taurumq; mitigatorijs refrigeranti
 bus oblimire necesse est: puta spuma argenti, creta cimolia, ce
 russa, aceto uel aqua, aut uino dulci, aut sapa dilutis. Supinum
 quiescere perniciosum est: nymphae radix pota, iris item, et
 adiantū, rutaq; succus, cum ei qui genitali profluuiō, tum qui
 ueretri arrecti palpitatione laborat, proficit. Triticus cibus
 parca manu datur, et sitis imperatur. At si uitii non cedit, cu
 curbitulae incisa cute scalpello adglutinandæ sunt. Quod si re
 dundās materia adfuerit, hirudinib; etiā impactis inanire, et
 uentri hordeaceā polentam crudam inducere consilium est.

De Priapismo. Cap. 57.

Priapismus constans incrementū penis est, qui in longitudi
 nem latitudinemq; nullo in uenerē impetu intumescit. Fla
 tuosus nimirū hic est spiritus, qui turgidā reddit particulam:
 humorum glutinosorū crassorumq; soboles, moderati caloris
 officio. Perspicuū sanē est omnibus, quod in ea uitio particu
 lar calfaciendæ nō sunt, sed clementer refrigerandæ, rosaceo ce
 rato cum aqua cōtuso, et chamæliano coli et lumbis superac
 commodato. Victus et medicamenta extenuatoriæ uirtutis,
 absq; calore manifesto porriguntur: magna itē utilitate adhi
 bentur, quæ naturaliter operantur, experientia usq; cōpro
 bata. Potare igitur nymphaeam expedit. Semē uiticis, rutaq;
 uiridis obsonijs admiscendū. Hoc tamen neuiquam intra malū
 statim

statim primordia exhibendum est, quoniam calfacit nimium, sed post usum aliorum attenuandi potestatem habentium. Eua-
cuaturus uomitum ciecto: alui enim purgationes saepe uicinas
partes fluxionibus afficiunt. Exercitationes frictionesque ad ue-
tositatis discussionem utiliter adhibentur. Venus nemini me-
moratorum congruit, nisi quibus propter coitus abstinentiam
genituram redundare conijcimus.

De impotentibus particulis. Cap. 58.

Qui hoc morbo oppressi tenentur, nequaquam in uenerem
proruunt, animumque ob id deuouent. Horum autem ratio est
partium resolutio, aut seminis genitalis inopia. Cum igitur de
his quae genituram procreant, tum quae simplici uirtute ad con-
cubitus excitant, primo uolumine, ubi de tuenda sanitate agitur,
perpensum sit, fortiora in praesentiarum adijcienda sunt. Comu-
ni itaque curatione ipsae hic remediae quae acopa dicuntur, aduer-
sus resolutionem factis, utendum est. Priuata uero curatione stel-
lionem crematum laeuigato, deinde oleo adiecto, magnam dextri
pedis digitum oblinto, atque in uenerem cōgreditor: si cessare ani-
mus est, pollicem lotionem purgato. Iam medicamentum est stellioni-
bus ex pluribus contextum efficax habetur. Propinquetur autem
quae uenerem excitant, quorum hoc primum fuerit: Piperis, gra-
norum pini, petroselini, rameti pudedi ceruini, terebinthinae,
et quae portiones melle excipiuntur. Aliud: Cicerum crudo-
rum, nucum pinearum utrobique sextans, seminis erucae, piperis,
uniuscuiusque uncia, melle excipiuntur, bini denarii cum mero
exhibentur. Satyriaca item appellata multiphariam compo-
sita huic malo subuenit, et id genus alia. Considerandae praeterea
sunt aliae affectus causae, et singulis peculiares curandi
rationes accommodandae.

Genitalium sedisque praesidia. Cap. 59.

Genitalium, sedisque hucera citra inflammationem oborta,
aresfacientibus impense medicamentis indigent: cuius gene-
ris sunt, ex charta combusta, anethum crematum aridum, et cu-
curbita

curbita deusta. At si hulcera sicca, recentiaq; extiterint, aloes arida in pollinē trita & impacta, præsentī est remedio. Omnium uerò præcipuum indolorium, nulloq; inefficacius pompholyx est. Si humidiora contigerint hulcera, piceæ cortex per se, & lapis hæmatites. Si autē ipsis etiā profunditas quædam affuerit, manna admiscenda præfatis est. Si deuorādo sanas partes aggreditur, quod hulceris genus nomā dicunt, lentacula cum malicorijs illinetur. Coraco præterea ex oxymeli te cognominato utendū, & bithyno, atq; eo quod è charta conficitur. Rimis uerendorum, sedisq; quas rhagades uocant, medebitur resina fricta cum rosaceo in modum glutinis contrita, admixto oui uitello, & opio: uel hederæ foliorū aridorum cinis cum rosaceo, in plūbeo mortario subactis adhibeatur. Ad hæc ex œnelæo cōstitutus pastillus, & lapis phrygius, modis omnibus peraccommoda sunt remedia ad rimas et sordida putridaq; circa ani coronā hulcera, præsertim quā elidi nequeunt.

Aliud simpex, et acrimoniam retundens.

Cadmie, & piperis, singulorum sextans: florum rosarum abiectis unguibus selibra. puluerē loco dolenti apio prius absterso inferre. Cæterum ad condylomata conducit, chalcitidis, æsopi ceroti, medullæ ceruinæ, rubi foliorum par modus cum cerato, et ex œnelæo orbiculus cōsimiliter. Quod si in cole intra naturalium foramē hulus delituerit, pus aut sanguen sine urina destillans testatur. Primum mulsa dilutiore colluitur, mox lacte, deinde collyrium asteris lacti cōmiscetur, seu albus pastillus, uel dialotarion in plumbea pila tritus pyxide reconditus demittitur, uel pēna iam intincta inungitur: deinde tenue linamentum tortile illitum imponitur. Optimum est, quod cōstat ex gallæ, & pompholygis, amyliq; ac aloes æquis portionibus, rosaceo & plantaginis succo dilutis.

Ad pudendorum dolores.

Genitalium cruciatus placātur, butyri ac resinæ æquis portionibus scitē subactis, emplastri more illitis, aut seminis lini

marco

marcore, myrrha & resinæ frictæ æqui ponderis lenigati
impositu.

Ad tumorem pudendorum:

Mollium foliorum uitis triginta, cerussæ drachmæ quinque
contritæ, cataplasmatibus modo impositæ. Vtere præterea fotu
ex marina gelida, requie ite et religatione penis. Carnes uero
genitalium superexcrescentes, quas Thymos Græci nominant,
sanat, nec recrescere sinit, cinis sarmentitius cum aceto im-
positus, corticis item salicis deusti cinis. In uniuersum autem thy-
mus, formica, & uerruca pensilis pariter medicamentis ualide
exhulcerantibus euellentur, erodentibus uero enecabuntur. Pri-
uatim autem elaterium cum salibus impositum, id mali com-
pescit: grossi, cum aceto, nitro, et farina, succusque fici illitus.
Smaridis item caput salsum & combustum: rubigo cum sulphu-
re ignem nondum experto cremata, tithymalli succus illitus,
ocimi folia cum atramento sutorio, aut heliotropij maioris fru-
ctus cum uino cataplasmatibus more adglutinati.

Ad inflammationem ani.

Cerussæ triens, pompholygis uncia, aut cadmiæ tenera,
thuris utriusque uncia, succi sereos hemina soluiuntur, succus pau-
latim affunditur, donec consummatur, deinde factum ex ceræ
uncijs duabus et rosacei libra cerotum, ubi raseris commisceto,
& ualenter subigito. Immite autem per pylculi instrumentum,
& superdeligato. Confert autem insuper rimis in orbe ani
cum inflammatione enatis: necnon hulceribus quæ cum ignis-
to feruore, aut morfu in sede exurgunt.

Ad ignitos ani rubores, quæ erysipelata dicuntur.

Sumito medicaminis diachylon, id est ex herbarum succis
libram, rosacei quantum satis est, panis puri libram, croci un-
ciam, opij tantundem. cæterum crocus et opium passo maceren-
tur, panis uero aqua: deinde ipsis probe dilutis, id quod ex suc-
cis herbarum constat medicamentum & rosaceum immittitur,
subigiturque dum euadit liquidius. Facit autem ad calidissimas
etiam

etiam podagras. Aliud, quod conducit etiam ad inflammationem ani: Cerussa uino & rosaceo in pila plumbea, & cochleari eiusdem materiae contrita & illinita. Aut cerussa, & oui albore cum rosaceo in eadem pila, quoad glutinis lentorem induant concussis, sedem perungito.

Hedricum ad ingentes ani dolores.

Tenerorum foliorum alterci, foliorum tenerorum portulacae, micarum panis in uino maceratarum, luteorum ouorum assatorum & aquas portiones, rosacei quantum satis est: postquam locum affectum rosarum & meliloti decocto foueris, cataplasmate inducito.

Hedricum utilissimum ad ani inflammationes & excrescentias.

Cerussa, spuma argenti, ammoniaci thymiamatis, bdellii, singulorum dioboli sex, terebinthinae uncia, cerae uncia dimidia: arida succo solani, herbae apollinaris, aut portulacae contundito, quae liquefacta, illis permixta excipito, et liquefactis rosaceo utitor. Phicotyche porro medicamentum, & ex metallica plumbagine comparatum, ani inflammationibus prodest: item quod Graeci quoque diatonlotarion nuncupant, ad haec ex balicaccabo, rosisque, pastilli, admiranda laudem inter illa quae tum sedi, tum naturalibus adhibentur, meruerunt.

Medendis excrescentiis ani.

Si carnes superexcrescentes inflammatione confluerent, erit generatim praedictis, priuatim uero isto pastillo utendum: Cerussa quadrantem, pompholygis unciam, spuma argenti sextantem, mastiches scrupulos sex, alterci succo excipito. Si uero absque inflammatione infestent, cupressi pilularum crematarum cinerem affectae parti uino antea abstergo superaspergito: aut aridae cucurbitae corticis deusti, aut ossium palmularum cinerem similiter, aut testarum ouorum, faeniculi quoque cinerem, aut foliorum mali Punici succum aequali modo, uino albo locus deterfus diebus septem eluitur. Ad excrescentias autem quae in callum obduruerunt, calcem & auripigmentum cum acriore aceto dissolue. Nec alienum, si in sole perungas.

De

De hæmorrhoidibus.

Si uenulæ quæ in ani corona extant, plus quàm par sit euacuentur, habitus in aquâ intercutē resoluitur, affectiq; prauè cibi beneficiū sentientes contabescunt. Periculum uerò est superabundantis sanguinis profluuij, quemadmodū & eiusdem suppressionis in totū, unde perdifficilis redditur curatio. Proinde cum plures in orbe sedis uenulæ patent, unā purgationis gratia relinquere expedit. Nonnullæ uerò in exteriori parte existentes non apparēt, eoq; ægerrimè curantur. Cæcæ autē & latentes nihil excernunt, sed grauiore cruciatu fatigant. His igitur cyclamini succum inunge, & aperiētur. Aduersus uerò eas quæ largius iusto sanguinē fundunt, in aquæ heminis octo spinæ Aegyptiæ, foliorū sambuci, artemisiæ, singulorum quincunx, herba sideritidis triens, usq; ad medias elixentur, postea herbæ porriciuntur, aquæ uerò hic puluis cōmifecturæ metallici atramenti aluminis rotundi drachmæ octo, spumæ argēti quatuor, gallæ quadrās, misyos drach. duæ, sereos tantundem. In elixatione cū puluerē solueris, septies in die aspergito. Postera uerò die pari modo alteram confectiōnē aquali pondere irrorato. Tertio cōsimiliter. Quod si reliquæ quædā permāserint, quarto die acu cōpungito: si sentiat æger, aut sanguis profluat, decoctū similiter facit: pulueris uerò semissem admisceto. Vbi foueris, puluis, quod exactè deurat, adprimatur: ob inflāmatōnē uerò panē cataplasmatīs more imposito. Aliud: Panē purū garo primi honoris tindū in ficiili nondum alio liquore imbuto crematum, lauigatumq; inijcito, uino sede prius abluta. Facit etiā ad excrescētias. Aliud: Sereos drach. duæ, chalcitidis drach. una, misyos tantundē, atramēti sulorū drach. tres, aluminis fissi nouē, aris deusti una, melātericæ tantundē. uere arido. Epulæ nimium quidē inanitis pauca, et ab excrementis aliena cōueniunt, et quæ arefaciēdi cōstringēdiq; potestātē continēt, è quorū numero est chōdrus ex posca lotus, oryza, & halicæ, ex holeribus intyba, cichoria, et portulaca:

ex

ex uinis quæ adstringunt. In hæmorrhoidibus autē cæcis contrariæ congruunt: cum primis uerò loliginum, sepiarum, ac polyporum, torpedinis, et selachiorum qui squamis destituuntur, esus, pulchrè cōpetit: hæc etenim sanguinem conturbant. Et quæ mensium ducendi uim obtinent, ex usu sunt.

Ad procidentem anum.

Erices fructus, gallarum, cerussæ, acaciæ, hypocystidis succi, piceæ corticis, rhuris, myrrhæ Aminææ, æquas portiones aridas superaccommodato, sede prius uino austero detergâ.

Aliud: Recrementi plumbi, rhis Syriaci, singulorum denarij octo, floris rosarū drach. quatuor, myrrhæ Aminææ duæ, utere quemadmodum superiore. Aliud: Piceæ corticis, manna, spumæ argenti, uniuscuiusq; drach. octo aridorum galbulorum, cupressi, plumbaginis, singulorum drach. duæ, utitor ratione prædicta. Lotium item languentis calidum adhuc superfusum opitulatur.

De locellorum affectibus, & primitus de menstruorum purgatione. Cap. 60.

Plerisq; sanè puellis anno decimoquarto mensium expurgatio primū incipit: paucis ante tertium & decimum, aut duodecimum: plurimis uerò, post annum decimumquartum prorumpunt. Tempus autem cuiq; purgationi statum non est. Multis per biduum, aut triduum: maximæ uerò parti ad quintum usq; diem fluunt, alijs usq; ad septimum, ad duodecimum usq; diem rarius expurgantur. Sistuntur autem muliebres huiusmodi purgationes quibusdam anno ætatis suæ quinquagesimo, paucis uerò ad annum usq; sexagesimum protrahuntur: nonnullis à septimo statim lustro, et potissimum obesitas desinere menses cœperunt. Non respondente igitur menstrualis purgatione, circiter statum menstruorum tēpus, lauari, si sāmōq; prius, aut porro capitato, cum pipere & ruta unā decoctis ex passo cretico potionari debent, à cuius hemicæ haustu deambulationibus commouebuntur menstrua. Manducet interea loligines,

gines, sepias, polypodes, & quaecumq; id genus: nam proprie mouendi sanguinem uim obtinent.

De suppressis mensibus. Cap. 61.

Supprimitur quandoq; menstrualis purgatio, uniuerso corpore incommoda ualitudine affecto, interdum uerò locellis modò priuata ægritudine cōflictantibus ex frigore uernaculo, aut icu, aut natua distemperātia, uel acquisititia offensione, ut plurimum uerò ex aborsu, & primario alicuius principis mēori affectu: uerbi causa, iecoris, aut uentriculi, aut pectoris, aut alicuius id genus diuturno morbo oblati. Mensium autem suppressio, multarum & diuturnarū ægritudinum causam solet inuehere. Cum igitur ob aliquā interaneorum primariam affectionem abscinditur, aut remoratur muliebris purgatio, nihil utilius quā ei quod primario afficitur, occurrere: mox uulua rationē habere. Sed eorū notio in superioribus comprehensa est. At ubi nihil horū adfuerit, perspicuum est, locellos per se uitio teneri. Si itaq; neq; ætas, neq; habitudo corporis, neq; aliud id genus prohibuerit, sanguis per uenā detrahendus est, non ante tamē præscriptū mēsiū tempus. Vbi uerò iam præterierint, dies decē adiciantur. Auferatur uerò nō plus duabus libris cum dimidia, neq; etiā minus una, siquidē uenam secabimus: sin minus, hiera ex cucurbitula syluestri, duobus denarijs in mulsæ cyathis senis purgabimus. Quod si febris pariter infestet, hiera quidem utēdi locus non est. Opportunū uerò fuerit, in primis statim febriū dieb. sanguinē mittere. Post purgationem corpus muliebre paucis diebus reficiendum est: procedente autē deinceps tempore, exerceatur deambulationibus, partium inferiorū frictionibus, & balneis. Ex cibis conferunt qui facile distribuuntur, & humida holera, ac dulcissima cuncta, pisces saxatiles, aues teneriores, & lactis potatio, confectioes ex melle, quæ melittomata dicuntur, uinum tenue, colore candido, non admodū uetus. Non probantur carnes, neq; legumina, excepta ptisana. Vbi autē statū purgationis tēpus

s pro

pro foribus constiterit, ex maritimis piscibus, dentur chartilæ ginei, & ex osses, ut dictū est, Græcè selachia & malachia uocantur, & qui pro cute integuntur testa: porra item capitata, cum ruta ac pipere elixa sumant, ius quoq; eorū bibant. Infernae partes uinculis tribus quatuorue diebus ualenter constringantur. Aduentante autē stato mensium tēpore, laxentur compedes, bibatur myrrhæ obolus, aut fabæ quantitas, aut castorium ex passo, uel aqua mulsa, aut artemisiæ decoctū, aut salia uæ, post balneum ex passo & absinthite. Vinum autem absinthite per omne curationis curriculū propinetur. Si uerò solenni purgationis tēpore, ne tantillū quidē, uel nihil cōmentatione dignū, excretū fuerit, sub malleolo sanguis detrahatur, & auferatur denuō. Post septimū uerò aut octauum diem purgatione ex biera utendū. Et post quartū rursus diem, dropax summini, lumbis ac femoribus illiniatur. Aqua exinde in potu tri duo sumpta, sinapi cū æqua portione panis macerati ad æquinoctiū usq; imponitur: deinde lauet, sequenti mense ficus arida pro pane admisceatur in decocto fœnogræci, maluæ, pulegij, ruta, ac artemisiæ. In finē uerò pudoris, susinū, aut amaracinum infundatur: & pessus ex medicamento è nouē rebus constante, & ob id ennapha-macum nomē obtinente, aut libanius insinuantur. Est eautē pessus lana pectita, & quodcunq; aliud teres digiti speciē præferēs, quo medicamēta sustinētur. Hæc igitur curatio plerisq; ad ciēdos mēses abnōde fuit. Si autē ualidiora res postulauerit remedia, hæc fuerit eorū materia: Iris illyrica pota cū uino, cyperi, ariq; radix, & casia, rotūdi odorati iunci stis, nardus, inulæ radicis decoctū, et myrrhæ fabuli Græci instar, cū passo in dimidiato mulsæ cyatho, et dictamnī iuris cyathi duo, & gutta ammoniacæ, & sagapenū. Sed quæ stomachi uitio minus obnoxia sunt, opoponacis momētum in pilulas redactū, & incocto melle irrigatum assument. Iam & consueta nobis semina, muliebria ciere nata sunt, sed minore efficaciam: quale fœniculum, cymīnū, apiū, daucus Creticus, fœselē

seseli, ammi, sion, ciceres, cedri fructus, & omnia quæ urinam proritant. Prosthera porro ex myrrha, absinthij, aut lupinorum decocto, seu ruta succo contrita subijciuntur, bdelliumq; similiter. Styrax item, & sylvestris oleæ gummi, succus uerutæ compari modo, uel aristolochia longa in collyrij formam concinnata. Consimili præterea modo cetaurij grandioris radix, aut ueratri, aut liquor scammonia, & colocynthidos interior caro priuatim, & artemisia cataplasmatibus more cum ruta illita, galbanumq; , factio inde suffitu. Quæ factum etiam utero elidere naturæ suæ apitudine possunt.

De exuberante purgatione, & hæmorrhagia locellorū. Cap. 62.

Immodicæ mensium purgationes foemina contingunt, cum interdum sanguinis menstrui copia cōfertim & cū impetu, interdum in fine partus erumpit. Quæ magna quidē ex parte sua etiā sponte cessant. Subinde etiam post abortum uehementia sanguinis profluvia euellunt, ita ut sæpe comitetur periculi. Primū igitur artus extremi ab axillis et inguinibus fascijs constringantur. Posca nō frigida propinatur, eadēq; locus fouetur, plurimaq; lana, uino, oleo, siue rosaceo, siue melino, siue myrtino imbuta locis imponitur. Estur chōdrus lotus ē posca, aut oryza, aut balica. Vino abstinetur, hydromalū uerō austerum, aut omphacomeli, aut id genus quippiā ipsis conceditur. Propinandū insuper, in posca balaustrū, siue hypocystidis, uel acaciæ cremor, aut lycium, aut Samius aster, aut uicæ acerbæ succus aridus, aut rheum, aut lēticulæ in Italico uase fictili crematæ cinis, aut sesamū in posca, donec molliusculū & delicatū reddatur, maceratū, edendū præbetur. Pesti naturalibus foeminarū insinuatū, sanguinis eruptiones cōpescunt: hypocystidis succus, aut acaciæ cum manna aceto eliquatæ. Mirificè prodest spōgia, uino aut liquida pice tincta, & pesti modo supposita, uel deustæ ipsius cinis cū aceto, poscæ uel applicatus: pari etiam modo suberis Italico uase testaceo cōbusti cinis. Foris autem egregiè subueniunt epithemata quæ astringēdi naturam

habent, & ex dactylis palmae, cotoneisq; & quae malicoriae continent cataplasmata, aut ilicis glandem, aut rubi uirgulta, aut lentisfolia, balaustrum, acaciam, hypocystidem, gallae momentum, & alumen. sed omnium maxime illud: Taurinum glutinum, tantisper dum dissoluatur, posca maceratum, deinde lin-teolo robusto impactum, lumbis imponitur. Efficaciter ad hoc faciunt emplastra, quae glutinatoria uim retinent: uerbi causa, Armonia, Icesios, Athene, Meline, Indica, atq; id genus cetera. Pessariorum etiam talium ad sanguinis profluvia usus est: Gallae interaneum tritum, & thus aqua dilutum insinuatur: aut cytini, aut dulcia mala Punica consimiliter, aut seminalis laui-gata. Componuntur aut, aluminis fissilis, medullae gallarum, succi acaciae, mannae, singulorum drach. quatuor, ouorum assa-torum lutea quatuor, arida in succo plantaginis teruntur, & commiscuntur. Cum usus exigit, pessa laneo excipiuntur, rosa-ceoq; intincta naturalibus conduntur. Quin & cucurbitulae inanes spaciosae saepius sub mammis adglutinatae, tantum ut nihil desideres reuellat. Inseffus insuper his quae sanguinis e-ruptiones patiuntur, huiusmodi conuenit. Oxyschoeni, quod est iunci marini, capitis myrti, foliorum rhamni, rosarum, surculo-rum rubi aequalis modus in aqua decoquitur, qua insidentibus loci utiliter fouetur. Aliud: Mali Punici dulcis radicis corti-cis, myrti, corticis cupressi, singulorum partes tres, gallae pars una, aquae quantum satis est. Id uero et per uterinum clysterem, Graeci Metrenchite uocant, succum plantaginis, aut sereos, aut semina-lis, aut strychni, aut perdicij, aut psyllij, aut hypocystidis, aut acaciae infundito. Atq; haec quidem lana, aut digito, aut mela-pinnae ue in longitudinem format, usq; ad os uteri inseratur. Et Andronis pastillus per uterinum clysterem cum praedictorum suc-corum aliquo, aut uino adstringente infusus, efficax est remedium.

De muliebri profluvio. Cap. 63.

Muliebrium locellorum fluxus, est uniuersi corporis quod expurgatur, destillatio. Biuscemodi uero specie id quod

anachar

euacuatur, præfert, cuiusmodi humor, qui in corpore redun-
 dat: aliud rubrū quidē, instar saniei sanguinis: aliud uerò cano-
 didum, à pituita proueniens: aliud autē luteum, amaræ bilis so-
 boles: nonnunquam aqueū. Si autē sanguis syncerus, quem ad-
 modum in illius per uenā detractione, effertur, animaduerten-
 dū erit accuratē, ne qua in locellis enata sit erosio. Deprehen-
 ditur autē fluor, quod loci perpetuò dissidentibus colore humo-
 ribus madescent. Laborans pallet, alimenta non sentit, cibum
 odit, in deambulationibus spiritus difficultatē experitur, oculos
 habet intumescētes, interdum quidē cum dolore, interdum
 uerò citra dolorē, uel cum exulceratione, uel absq; illa, uel in-
 flammata, uel sordida, uel munda. Toti itaq; corpori arefa-
 cientibus succurritur, si morbus fuerit humidior, absq; euidentē
 calore: frictionibus itē corporis uniuersi, & illinitionibus ex
 melle affatim decocto. Pharmaca etiam quæ urinā cient, por-
 rignantur, è quorū numero habetur aqua in qua elixa sint asae-
 rum & apium. Per aluum præterea totum corpus euacuatur.
 Ad hæc portulaca commanducata, succusq; eim epotus subue-
 nit. Balaustrū item, rubiq; cū fructus, tum flos, et qui cortici
 querceo subest liber, et mēbrana quæ sub putamine latet glan-
 dis. Hippuris, potissimè rubens, profluuium, pota ex aqua aut
 uino, sistit: aut hypocystis, baccæq; lentisci frictæ cum uino po-
 tæ: Samis asler, Lemnium sigillū, coaguū leporinum, aut
 bædinum, aut agninum, aut uitulinū, aut ceruinū, acini uina-
 cei triti, myrti, omphax aridus, piceæ cortex, & quæcunq; ad
 locellos sanguinis profluuiū uexatos memorata sunt, modò ne
 sint quàm par sit efficaciora. Quādo autē cum cruciatu effertur,
 per uteri siphonē, aut clysterē succus halicæ, aut ptisanæ,
 aut tragi, aut oryzae, unā cum anodynīs aliquot remedijs im-
 mittendus est. In accessionibus morbi dolor mitigandus est. In
 remissionibus uerò (habet enim circuitū nonnunquā) utendum
 fuerit gestationibus uarijs, deambulationibus, uociferatu, un-
 ctionibus, cucurbitulis, dropacibus, particulis superioribus im-
 S i positis,

positis, aut apricationibus, frictionibus, unguentis depilatorijs, quæ psilothra dicuntur, smegmatis, sinapismis, uomitibus cum radícula prouocatis, ridu reparante, lauacris, mero, uarijsq; dapibus.

De locellorum inflammatione, & declinatione. Cap. 64.

Inflammatio uteri è pluribus causis originē trahit. Ex iclu nempe, ac mensibus suppressis, frigore itē, & inflatione, neq; minus etiā ex abortu, et partu parum dextrē eliso. Comitatur locellorum inflāmationem febris acuta, capitis dolor, tendinum, radicis oculorū, brachialis digitorū, colli deorsum conuulsio, & in contraria conuersio, stomachi per consensum dolor, osculi locellorū præclusio, pulsus parui & frequētes. Et si exigua fuerit inflāmatio, haud crudeli uulua dolore afficitur: sin ualidior fuerit, eadem uniuersa pulsatorio cruciatu torquetur, membro undiquaq; inflāmatione obfesso. Parte uerò inflāmatione modò depressa, eandē dolor magis exercet. Nam si posteriora ipsius solū inflāmatione cōflicentur, dolor lumbos excruciat: retrimēta alui specie oleti canini, compresso recto intestino, retinentur. Si uerò anteriora inflāmantur, dolor pectini insedit, urinaq; stillicidium, aut difficultas oritur, stris etia in arētā uesica. Si autē latera inflammatione tententur, inguina intenduntur, & crura ægrè mouentur. Si extrema ad fundū uteri pars inflammetur, partes umbilico circumiacentes dolore potissimū cum tumore infestantur. Vbi autē uuluae osculum inflāmatio occuparit, dolor in abdomine affligit: digitoq; immisso, durum ac rigidū occurrit orificium. In curatione itaq; fetus inprimis ex uino & oleo tēperato, uel uino et oleo rosaceo per uelamina, ex lana mundiore inferiori uētris regioni ac lumbis, citra deligaturā adhibendus est. Cibi commendatur abstinentia per triduum, à quo secta uena cubiti, sanguis, nisi quid impediāt, detrahendus est. Cōsummaturo ipsa chondro ex aqua mulsa, aut pane, aut ouis sorbilibus tertio quoq; die. Secundū quintū uerò diem cataplasma imponatur.

natur ex polline farinaceo, semine lini, fœnogræco, mulsâ ma-
ceratis, in qua capita papauerû decocta, & à mulsâ iam abie-
cta sint, & oleo. Si autē inflammatio erysipelatis naturâ resis-
piscens excalfacientibus magis irritetur, sertulâ campanâ in
passo elixâ, tritamq; ouorû tostorû luteis adiectis cū rosaceo,
aut melino, aut crocino cataplasmatibus modo applicato: aut pal-
mularû daſylos uino tēperato subferuefactos, cū tenuissimo
farinæ polline, aut aliquo ex relatis unguinibus læuigato ac
illinito. Malo autē remittēte, cerotû nardinû aut cyprinû inij-
ciendū est. Inter cūcta remedia, inſectus ex decocto fœnogræci
aut seminis lini, maluæ, artemisiæ, & oleo ex usu sunt. Sed in
his quæ calorē nō tolerāt, ex calida aqua rosaceo infuso. Pessi-
uerō et infusiones adhibeantur ex æsypo, butyro, medulla
ceruina, adipe anserino, unguento Susino, & cera Tyrrhenica.
In his quæ caliditatē ferre possunt, pessus ab auri colore Chry-
sus appellatus cōuenit, et enneapharmacus. Sed quæ hāc nō su-
stinēt, his ex ouo, et rosaceo, adipeq; anserino seu gallinaceo
cōficiantur. Cæterū aduersus ardētiores inflāmationes empla-
stro ex herbariū succis in duplo fictili uase cū rosacei liquefas-
cto miscetur succus plantaginis, aut sereos, aut cichorij, aut in-
tybi. Vel sequenti utitor: Adipis anserini suillæ sue recētis axū-
giæ drach. quatuor, cerati rosacei aut Susini uncia duæ, ouos-
rū assatorû luteorū uncia, croci drach. myrrhæ trioboli, opij
oboli duo, uel opij loco capitū papaueris decoctū. Si uehemen-
tissimus uuluum infestat dolor, succi papaueris lentis quanti-
tatem, cum lacte muliebri, & succo fœnogræci, subijciendum
pōrrige. Ad inflāmationes porrō cum durtia, tetraphar-
macum rosaceo liquatum subijcitur, uel infunditur. Declina-
tionib; uerō uulue secundum paroxysmos quidem, perinde
atq; inflāmationibus succurritur. In remissionibus & decli-
nationibus, blandioribus utendum. Si uetustas malum occupa-
uerit, remedijs metasyncriticis appellatis, pugnandum. Foris
autem durtie oborta, malagmatis, puta è sertula campana,

item Mnasi, & Icesy, Melina Sarapionis, aut pyrina. Vi-
 dus principid quidē tenuis esto: facta autē modica relaxatio-
 ne, laborantes in balnea ducantur, ciboq; magis uario ac ple-
 niore utantur.

De abscessu uteri. Cap. 65.

Cum inflammatio uteri in abscessum conuertitur, signa quae
 memorauius, intenduntur. In accessionibus febres inor-
 dinatae cum horrore inuadunt. Per initia quidē intensa cum
 doloribus. Postremò uerò ad suppurationem perducto aposte-
 mate, aliquantulū remittunt. Vbi uerò uomica eruperit, cru-
 ciatus saepenumero acriores, ceu punctorij incidere uisi sunt,
 febresq; feruentiores accenduntur, urina nonnunquā suppri-
 mitur, interdum aluus, factio iuxta affectū uteri partem impe-
 dimento, aliquando uerò tumor circa pubē attollitur, & tan-
 quam inundationis sensus, si abscessus grandior fuerit. Quod
 uerò in expositis locis consistit, etiā specillo instrumento locis
 inspiciundis idoneo, aut digitorū attactu deprehenditur, prae-
 ter quod dolores ob neruosam oris ipsius uteri partē acerbio-
 res infestant. Quemadmodū in fundo, circaq; sinū dolore mi-
 nus afficiuntur, & digitorū tactui tumor non occurrit, orifi-
 cium autē gracilius uidetur. Suppurationi igitur maturrimè,
 cataplasmatibus ex fœnograeco, semine lini, hordeacea aut tri-
 ticea farina, admixtis interim ipsis ficubus elixis, aliquando
 etiam columbino stercore opitulandum. Infectiones, quibus ad
 uteri inflammationem utebamur, crebrius adhibere prosunt.
 Pessuli item ex terebinthina, myrrha, cespito, atq; butyro con-
 cinnati. Rupto autē abscessu, si quidē pus in uesicā deferatur,
 lac, cucumerisq; semen potandū: sin uerò in intestinū rectum
 putris euaserit materia, lentium, malicorij decoctū aluo infun-
 ditur. At si aperto abscessu pus merū in sinū pudoris cōfluat,
 rosaceum infundito, aut ex amygdalo dealbato oleum, aut te-
 trapharmacum Basilicū, aut recens butyrū. Si sanies tenuior
 tetri odoris eruperit, quemadmodum ex hulcere depascendo
 repente,

repente, maiore astringendi vi, præditum erit enema ex myrto, palmulis, & lenticula. Si post humorum excretionem urgeat inflammatio, cataplasmatibus in seſſionibusq; perſeuerandum. Cum autē in uteri oſtiolo abſceſſus conſtiterit, neq; rumpatur, extenuatis circumiacentibus puri corporibus, ad pus expellendum chirurgica manu utamur: ceu in libro de his qui manu medicam exercent artem, memorabitur.

De exulceratione locellorum. Cap. 66.

Exulceratur ſubinde uulua ob difficultatem pariendi, uel propter foetus extractionē, uel eius interitum, uel acria medicamenta, uel fluorem, uel ruptos abſceſſus. Quapropter ſi prompta & ocalis expoſita fuerit exulceratio, ſpeculi artiſicio deprehēditur: ſi in alto recōdita, ab excrementis egeſtis. Humor nāq; diuerſus excernitur, inflammato quidē hūlcere, exiguus, ſanguinolentus, aut feculentus, cum ingenti dolore. Si ſordidū fuerit hūlcus, copioſior, et ſanies ſeroſa cū minore cruciatu profluit: ſi depaſcēdo ſerpat, teterrimi odoris, aterq; cū doloribus uehementioribus, alijsq; inflammationum indicijs. Irritantur ex medicamentis relaxantibus, & leuātur ex contrarijs. Ex mundo autē hūlcere, humor exiguus, æqualis, ſine odore, craſſus, albicans, cum facilitate excernitur. Inflammato autē hūlcere, ijs quæ ad inflammationē conducere docuimus, utendum eſt. Sordidum hūlcus, ptisanæ cremore cum melle illuendū eſt, aut tetrapharmaco, cum Suſino, ſiue mulſa in qua elixum ſit ſcœnogræcū, aut malua, aut furfures, aut lenticula cortice detracto. Cæterū quo exactius purgetur, etiam marrubium, aut eruum, ſiue mel, admixta erui farina, aut iris, alumen uer rotundū, uel ſimile quiddā inijciatur. Eadem & foris ex mulſa macerata, more cataplaſmatis inducuntur. Peculiaris opitulatur hoc medicamentū: Crocus optimus leuigatur lacte muliebri, deinde ceroto roſaceo exceptus cum adipe anaserino, flocco illinitur. Exquiſitius, et ad ingētes dolores diſcutiendum efficacius eſt illud: Calyces papaueris in paſſo tempe

S 5 rato

rato irrigatur per triduum: mox decoquantur donec liquefi-
ant, deinde teruntur cum foliorum rosaceorum drach. quinq;
eroci tribus, admixto capitū papaueris decocto: postea super
fundito his ceræ rosaceo liquatæ denarios duos, et in pessa cū
rosaceo imbuto subijce. Vincit etiā medicamentū quod ex ouis
crocoq;, ac rosaceo, adipe anserino, medullaq; ceruina cōtexis-
tur. Aegyptia itē sine rubigine ad exulcerationes mirificè fa-
cit. Depastio ubi fuerit cū inflāmatione, panis tepida macera-
tus, ex hydromelite, oleo, althæa, fœnogræco, palmulis pingui-
bus cataplasmatibus modo illinitur: immittendus uerò succus plā-
taginis, solani, seminalis, sereos, primitus quidē per se, deinde
uerò cū uino austero, siue aceto. Si citra inflāmationē depas-
tēdo serpat, inijcienda sunt efficaciora: exēpli gratia, decoctū
malicorū, rosarū, olea colliculi, cupressi: malorū cotoneorū,
rubi, myrti, lentisci, rhamni, rhus quo utuntur coriarij ē uino
astringēte: postremo aut aluminis, acaciæ, lycij, hypocystidis.
Ex iisdē etiā decoctis infessus cōstituitur: si nihil proficitur, pri-
mo quidē medicamentū ē charta immitte, deinde uerò acetum,
aut Antherā, aut chalcitem, aut atramētū sutorium. Huic ex
iisdem liquoribus, et quæ dysentericis congruunt. Alimentū
perexiguum boni succi ministrato. Expurgato iam hulcere,
lauare pluriphariam, et nutrire crebrius, et uinū præbere,
quod incarnatio uelociter fiat, expedit. Pessi autē uice indetur,
medicamē ex moris, dilutū cadmia, aut ladano, aut plūbagi-
ne. Foris autē abdomini atq; coxēdicib. empastrū cicatricē in-
ducēs imponendū. Quēadmodū enim cataplasmatū, ita et em-
plastrorū potētia per cæcos meatus ad interiora trāsferetur.

De uteri cancro. Cap. 67.

EX canceris uteri alij quidem hulcerati, alij uerò non hū-
cerati existunt. In cancro igitur non hulcerato, tumor in
uulue ostiolo reperitur durus, inæqualis, crepidinosus, colore
feculentus, rubicūdulusq;, interdū etiam subliuidus: cum uehe-
menti, circa inguina, in uentrē, abdomen, et lumbos dolore,
manuumq;

manuumq; attrectatione, et medicinarū uarietate excādescūt. Si cum hulcere cancer est, prāter dolores & duritias, tumoresq; hulnera exesa ac inaequalia cernuntur, magna ex parte quidem sordida, prætumida, albicātia, humore cōcreto deformia. Sed quæ munda uidentur, feculenta, lurida, rubentia, & cruenta apparent: sanies inde tenuis, aquosa, nigra, aut ignea, tetri odoris iugiter excernitur: nōnunquam uerō etiā sanguis erumpit, cæteraq; indicia quæ de utero inflāmato enumerata sunt. Hæc dispositio curationē non recipit, ceu ipsius etiā asserit Hippocrates. Placari tamen potest infestationibus ex fœno græco, maluaq; paratis, atq; id genus cataplasmatibus. Efficacissimas leniendi uires habent in exacerbationib. malua, aut alibæa in malsa subacta, colliquataq; cum pauco rosaceo, & instar cataplasmatibus adglutinata: ad hæc cōpositio ex ficubus aridis, fertula cāpana, ruta, thure, napoq; herba accuratē cū oleo cōtusa. Item cataplasma ex palmulis in passo decoctis, adiectis ouorum uitellis, atq; farina hordeacea, aut papauere, cum coriandro, aut seminali, aut seri: hæc quidē in ipso cruciatu tēpore prosunt. Post hæc uerō cerotū ex rosaceo, aut myrtino, aut cenanthino, aut melino cum palmulis in passo elixis admisceatur. Priuatim uerō cōpetit ceratū ex amurca in coratinis abenis inuenta, quæ testa læuigatur, ceratoq; rosaceo excipitur, tantisper dum consistentiā emplastro idoneā induat. Hæc quidē extrinsecus adhibētur. Interius uerō mitigat locos oleum. Si exhulcerati fuerint, lac quoq; muliebre infusum, tepidusq; plantaginis succus. Si cruentū ab hulcere manat, succus seminalis herbæ cum pauco thure cōmulcet. Mitigāt præterea pessi è croco, lacte muliebri, liquore papaueris, et æsipo. Omnium uerō efficacissimū est, & aduersus sedis etiam affestationes, quod accipit spumæ argenti Italicæ lotæ uncias sex, thuris masculi, æsypi, adipis porcini recentis, butyri noui, cera Tyrrhenicæ, singulorum uncias duas, rosacei quatuor. Spumam argenti in succo sereos contritam, liquatis injicito.

Cibus

Cibus qui facile in uentriculo uincitur, & in membra distri-
buitur, inculpati succi exhibendus est, uini aquosi paucissimū,
acriores cibi, satietasq; cauenda est: promptissimè nanq; ipsis
cibaria corrumpuntur.

De scirrho, & duritia. Cap. 68.

Obdurefcit uterus, quandoq; sanè dērepēte, nulla perspicua
occasione, plerunq; tamen præcedente inflāmatione, quæ
neq; discussa, neq; in abscessum permutata fuerit. In eodē ge-
nere habetur durities, quæ scleroma appellatur, in uteri cerui-
cæ magna ex parte obueniens, tumore quidem habēs similem,
sed minus renitentē, cum dolore mediocri. Accidit autem his
uteri declinatio in contrariū, tumor uehementer durus, & ta-
lūi repugnans cum grauitate, & difficili motu: non crurum
modò, sed uniuersi corporis, obeūdisq; uitæ functionibus segni-
tia. Superuenit nō rectè curatis deprauatus corporis habitus,
naturam aquæ subtercutē resipiscēs. Principiò igitur sanguis
secta uena auferendus est, alius Archigenis hiera sollicitanda:
deinde cataplasmata ex ficibus aridis, æsipo, nitro, absinthio,
& cucurbitulæ cum scarificatu adplicanda & malagmata,
polyarchiū, diaspermaton, & diadaphnidon, hoc est, ex bace-
cis lauri confectū. In seſibus utemur ex caricarum, artemisiæ,
pulegi, althææ decocto. Pessuli ex resina terebinthina, galba-
no, myrrha, iride, æsipo, dropace. Aquarum naturalium usus,
quæ nitri naturā aut bituminis præferunt, commendatur. Si
corporis robur non deſit, etiam helleborismus probatur.

Pessulus mollitorius.

Ceræ Ponticæ, unguēti nardini, uniuscuiusq; quadrantem,
irini, gleucini, cyprini, singulorū sextantem; adipis ursini, &
anserini, butyri, æsipi, medullæ ceruinæ, resinæ terebinthinæ,
singulorum unciam. Aliud: Polydrach. duas, myrrhæ qua-
tuor, cum uino Mēdesio tritas, irinoq; dilutas ad subiiciendum
exhibe. Aliud: Ceræ Tyrrhenicæ, adipis uitulini, resinæ te-
rebinthinæ, medullæ ceruinæ, mellis attici, olei ueteris, æquis
portio-

portionibus. Pessus metasyncriticus, hoc est, noxia ex alto euo-
cans, & restauratitius, & ad inflationes factus. Vuae passæ
candidæ, demptis acinis, quadrans, foliorū uiridis rutæ sex-
tans, aquæ marinæ unciam & dimidiam, cymini drach. qua-
tuor, mellis quantū satis est. Illitum autem pessum oleo cypri-
no immergito, atq; supponito. Cæterum Chrysus pessulus uo-
catus, atq; Libanius, necnon enneapharmacus, huic affectioni
accommodati, uerū peculiarius adhuc Titianus.

De Mola. Cap. 69.

Mola quoq; scirrhi naturam præsentans tumor est, nunc
uteri orificiū, nunc ipsum uniuersum occupās, & tophea-
team duritiam tactu referens, cum eorū quæ superiacent, hoc
est, præcordiorū retraditione, gracilentia, decoloratione, cibi
fastidio, mensium retentione, mammis turgentibus, ita ut per
inuitia in quibusdā ueræ conceptionis opinio suboriat. Teme-
poris uerò progressu discernuntur: nonnullæ uerò aquæ inter-
cutem præferunt suspicionem. Cæterū discrimen ex tumoris
duritia, & ex surdo digitorū percussu dignoscitur, quod inde
nullus, quemadmodū in hydrope, sonitus edatur. Quum inten-
ditur, re uera in hydrope conuertitur: nonnunquam uerò incu-
rabilis magna ex parte morbus nascitur, quibusdam sanguis
quoq; effertur. Omnibus itaq; ex æquo conclauī angustiore,
obscurō, modicè refrigerato, lecto immobili recubere confert,
ita ut crura sint aliora & quieta. Efficax quippe ad concie-
tandum quemlibet fluxū, est motio. At tumores, duritiasq; iſe-
dem medelis quæ in scirrhis uteri, scleromatib; scriptæ sunt,
medebimur. Suffusiones autē aquæ intercutē similes, remedijs
in capite de Hydropico morbo commemoratis. Bruptiones au-
tem sanguinis, perinde atq; profluiū sanguinis, & fluorē mu-
liebrē curabimus. Sunt qui molam asserāt carnē informem,
in locellorum tunicis consistentem, conceptus modo in lucem
edi. Hoc morbi genus uictu relaxante, quò maturius excutia-
tur, tractandum est.

De

Inflatur uterus ex frigore, uel corruptione fœtus, uel ex in-
Infelici partu ostiolo cōnuente, uel sanguine intus in grumū
 concreto, interim spiritibus in concavitate loculamenti ipsius
 collectis, interim uerò ex raritatibus corporis ipsius uulua:
 Quæ comitatur tumor pedinis, & imi uentris, cum duritia et
 dolore pulsatili, qui ad septū usq; transuersum, stomachumq;
 & inguina pertingit, percussuq; digitorum sonitus tympani
 instar editur. Curatur itaq; primū detractione sanguinis si
 nihil impedimēto sit: mox in affectus accessionib. inedia, fotuq;
 ex oleo rutaceo. In febribus item ex rutæ, pulegiæ, artemisiæ, ca-
 siæ decocto, et similibus. Cataplasmatibus ex seminibus apij, cy-
 mini, fœniculi, anisi, ameos, lolleaceaq; farina. Cucurbitulis
 insuper leuibus, & incisa cute scalpello. Si uitium uetustaten
 senserit, corpus hiera picra euacuabimus, dropacibusq; et si
 napismis, & naturalibus aquis utemur. Cæterū obstetrix in-
 fert digito oleo prius imbuto, incumbentem sanguinē in gru-
 mum conglobatum si assequatur, auferat clemēter ipsum resol-
 uēs: deinde rursus cataplasmatibus modo imponēda, ficus, nitrum
 & absinthium. Epithemata emolliēdi facultate prædita erūt:
 Polyarchium, diaspermation, & diadaphnidon. Pessuli deniq;
 ex ruta, melle, nitroq; formentur. Cum primis autem ille ac-
 commodatus est, qui ē ficuum pinguium contusarum dracha-
 ma, cymini duabus, spumæ nitri drachma cōcinnatur: sed pro-
 pter acrimoniam in lacte prius macerentur. Pessi postremò
 mollitorij, omnes huc sunt idonei.

Trangulatus uterinus est, uulua ad superiora retractio, &
Sconfortium afflictionis nobilissimæ corporis partes percip-
 iunt: uerbi causa, arteriæ, quas carotidas uocant, cor, & ce-
 rebri membranæ. Accidit autem languentibus appetente ac-
 cessione, torpor mētis, segnities, crurū debilitas, pallor faciei,
 species oleosa & hebes, ac tristis aspectus. Obruente uerò iam
 strangu

strangulatione, profundissimo sopore, desipientiaq; corripitur, instrumenta sensuum detinentur, uox obmutescit, crura contrahuntur, malæ demum rubescere incipiunt, & facies turgida repletur. Cum malo remittente ad se reditura est mulier, promanās quædam è muliebrib. locellis humiditas tactu percipitur, immurmurat uenter, & progreditur aliquid ex intestinis, ipseq; uterus paulatim laxatur, tum deniq; ad se redeunt, sensumq; recipiunt. Mouetur porro id morbi genus quodā circuitu, quæadmodum et morbus comitialis, facta uidelicet uulua, uel seminali, uel alia quauis materia, aut hac in eadem corrupta. Plures quidē rursus relatæ sunt: nonnullæ uerò in ipso paroxysmo uitâ in mortem subito cōmutarunt, citato primū arteriarum pulsu, mox inordinatim trepidante, postremò eodem in totum abolito. Tū exiguo per partes humore rorescit cutis. respiratio primū quidē obscuratur: postea uerò exactè intercidit. Hic affectus hyeme atq; autumnō frequēter ingruit puellis salacibus, sterilibus, & potissimè si ui medicamentorum infecundæ euaserint, et aliter refrigeratis. In exacerbationibus igitur, extremas partes arctius uincire oportet, & tota crura corpusq; uniuersum confricare, ut animo destitute ad se redeant: graueolētiaq; odoramenta narib. admoueātur: uerbi causa, scirpus lucernæ extinctus, castorium, pix liquida, cedria, uellera & linamenta combusta. Quidam uerò matulatis quoq; lotio ueteri siue oletulo foetentem naribus obtulerūt. Et cucurbitulas inguinibus, & imo uentri cum plurima flamma inanes, atq; cum scarificatione adglutinare proficit. Accessione autem longius protracta, etiam ea quæ discussis flatibus peditus agunt, utilia sunt: cuiusmodi sunt colica aluo indita, putta, cyminiū, nitrū cum melle, et stercus cum clystere subducere, ne torqueāt iniecta, congruit. Porro naturalib. fragrantissima unguēta infusa, detrahete uulua naturæ aptitudine possūt: ueluti amaracinū, malabathrinū. Sinapi uerò partim quidē naribus obijciatur, partim uerò pedib. cataplasmatibus instar imponatur.

In Hæ
stans

dos per penda

natur. Inclamabit autem et excitabit quispiam illas horrifico
uociferatu, propriaq; auribus nomina intonabit: quæq; sternu-
tationem proliciunt, adhibeantur, è castorio, struthio, & pipe-
re. Vbi uerò acumen remiserit accessio, ad uomendum cogito,
abstinentiâ imperato, aut perexigua alimenta præbeto. Post
septimum autē diem, hiera ex colocynthide purgandum: post
tertium uerò diem cucurbitulæ lumbis adglutinentur, & ilys.
Deinde castorei potionem utemur, quandoq; cum artemisia de-
cocto, interdū cum aqua mulsa. In quibusdam enim hoc uel so-
lum ad exactam morbi curationem abundē fuit. In seßus præ-
terea, & pessi emolliendi potestate præditi, in hunc usum ac-
cerfantur. Hæc quidem ad morbi impetū cōducunt. Cæterum
ad uniuerſi corporis instaurationē, à detractione sanguinis au-
spicatus, ad expurgationē cum hiera proficiscere. Deinde ex
aloe confectam picrā porrigito pondo drach. cum ternis mul-
sæ cyathis, diebus continuis: uel per tēporis interualla drach.
duæ, cum aquæ mulsæ cyathis sex. Dropacismis iam, & cu-
curnbitulis, & sinapismis, & ex euphorbio acopis utendum.
Ab his, exercitationib. indulgendum. Frictionib. item, & ex-
clamationibus, postremò & naturalibus balneis utendum.

De procidentia uterī. Cap. 72.

Procidit uulua rarius quidē, sed quā plures ob causas: aut
enim ex alto delapsa mulier, & in coxendices firmata, dis-
ruptis quæ uiscus id continent membranīs, hoc morbo corripi-
tur: aut secundis, quæ locellis adhærescunt, & eos secum de-
trahunt, uiolenter extractis, quemadmodum in difficili partu
contingit: aut fœtu incōsideratē eliso, aut ex idu, aut ob animi
affectus, ut si filiorū interitus, aut hostium incursus nuncietur,
aut ob nauigationem periculosa, aut aliquam id genus occa-
sionem toto corpore soluto, uulua simul prolabitur: aut muscu-
lis membranisque; uterum sustinentibus languidis & resolutis,
quod decedente ætate senescentibus frequenter accidit. Proci-
dit autē orificio suo maxime. Nonnulli uerò uniuerſum uterum
procidere

procidere affirmant, quòd sanè uidetur absurdum. Quo enim pacto reducta in suam sedem queat restaurari? Oportet itaq; in huiusmodi curatione, stercore prius per clysterè euacuato, et lotio excreto, quo undiq; ab anxietate libera sit uulua, laborantem supino corpore collocare, coxis accliuibus, & poplitiibus reflexis, cū diuaticis cruribus. Deinde hastulā laneam, forma & crassitudine pudendo muliebri conformē, tenui linoteolo circumuoluito, & in succū acaciæ, aut hypocyttidis uino dilutū demergito, subycitoq; uulue, & absq; uiolētia omnem uteri partem delapsam sursum retorqueto, quoad uniuersus tumor intra sinū recipiatur. Pedem præterea extrinsecus spongia in posca expressa operiendus est. Decumbat autem mulier extensis et coaptatis insertim cruribus, ita quidem ut alterum alteri inequitet. Post hæc cucurbitulæ sunt adglutinandæ, cum flamma plurima, umbilico & utrisq; ilys. Odoramenta naribus offerenda sunt perodora. Tertio die lana sinui imposita, mulier uini nigri & austeri in seßu quadantenus tepesacto utatur, siue in decocto myrti, lentisci, & malicorijs insideat. Post hæc, priore lana è pudendo sublata, altera eodē madefacta medicamento imponatur. Foris cataplasmata abdomini inyciantur, diaphœnicon scilicet ex farina hordei, aut lente, & malicorijs cū oxymelite, atq; hæc alternis diebus usq; ad exactam curationē rursus permutentur. Quòd si pars prolapsa diuturnitate temporis putruerit, amputetur, nullū prorsus discriminē ueriti. Totam etenim uuluam putrefactā quandoq; amputatam fuisse, & mulierem superuixisse tradunt.

De Muliebrium locorum præclusionē. Cap. 73.

Accidit angusta circa muliebrium locorum os præclusio, quam phimon appellāt, aut propter exulcerationem quæ præcessit, aut obduratam illic inflammationem. Succurrendum est igitur in seßibus qui mollificant ex oleo & aqua, & sceno græci decocto, cataplasmatib; eiusdem facultatis: pessis item emolliendo efficacib; adhibitis. Quòd si inueterauerit malum,

T suffia

suffimentis uaporibusq; aromatib. confectis utendum. Discutit etiam eiusmodi nexum pessulus ex cyprio, nitro, resina & terebinthina contextus, si nihil aliud quam uulue orificij conuenientia subsit.

Seerilitatis præsidia. Cap. 74.

Sine itaq; discrimine utriusq; sexus, tam maris quam feminae, corpus uniuersum in media et inculcata temperie conseruare congruit, & absq; laborū, ciborū, balnei, & reliquorum omnium excessu. Præcipuum enim est à sagina, ne obesiorē cōparet habitudinē, arcere: neq; enim habitiores progignendis liberis sunt idonei, eo quod pudendis inter se optimē conuenire nequeant, tum quod paucissimū seminis emittant: neq; uehementer extenuati procreare liberos sufficiunt. Cōferunt in hac cōstitutione, cuncta quæ calfaciendi, paululumq; inflandū uim obtinent. Vinum calidæ naturæ cum modo sumptum. Et ex holeribus eruca, nasturtium syluestre quod, hominumre, erysimon, & id genus. Ruta uerò & nepita prorsus sunt fugienda. Si autem prauorum humorum copia conceptus impediatur, eosdem expurgare, aut utili uitæ ratione temperare expedit. Priuatim uerò mulieribus utile est, summā uulue curam habere, ac mēsiū purgationē mediocriter & sine impedimento fieri. Cum igitur pro foribus est purgatio, cura mediocritatis non tā esculentorū quā poculentorū, quā fieri potest, maxima habenda est: & quippiā eorū quæ ad purgationem stimulant, sumendū: cuius farina sunt cum holera odorata, tum quæ acrimoniā præferūt, puta scandix, critibmon, fœniculum, apium, smyrniū. Prauam uulue temperiem emendare cōuenit. Frigidiores igitur arguit mēsiū retentio, uidus gelidioris potentia, & crassi succi, et stupor circa pectinem, lumbos, & crura. Quæ uerò ad summum sunt perfrigerata, ne uenerem quidē appetūt: expedit igitur cum alijs remedijs, tum fotibus quibuslibet, tum ys quæ suffutibus constant, reuocare calorem. Neq; abominandum fuerit, castoreum potare.

& fra

Et fragrantia semina, cuminum, anisum, pulegij comam Et iuniperi baccas, unicuique pipere commixto. Vteri uero fetus, partim uapores erunt, qui infernè per sedem in sinum pudèdè excipiuntur: partim calida aqua abluendo fiunt, in qua elixa sit salvia, artemisia, ruta, cyperum, pulegium, acorù, Et quæ bonum emittunt odoris fluxum semina. Cataplasmate ex singulis pedinem illinemus. Conducit non minus Polyarchium epithema. Frictio porro pedinis atque coxendicum nulli alijs præsidiorum cedit. Vtitor etiam pessis è myrrha, ruta, galbano, Et castorio, fomento genitalium locorum prius factio ex aqua mulsa, siue marina. Probatur ad hæc pessus qui appellationem Gonic obtinuit. Calidiores locellos testantur corpus totum calidius, mensium paucitas, qui cum labore erumpunt, et exulcerationes muliebrium naturalium. Succurritur itaque mediocriter humectantibus, Et perfrigerantibus: cuius generis sunt olera, lactuca, malua, blitum, cucurbita, cucumis, pepon, atriplex, portulaca, atque id genus esculenta alia. Vesicæ, imo uentri, lumbisque refrigerantia adhibentur cataplasmata, succique illinuntur. Quod si humiditate muliebrium locellorum infœcundæ non cõcipiant, in media re uenerea madore profunduntur, tenuioresque Et copiosiores defluunt menses. Vidus ratio sic habentibus proficit aridior, pariter Et labores, frictionesque superiorum partium, simul et uomitus, cibariaque sicca et mediocria. Ex re præterea usuque fuerit, ipsam quoque uulvam medicaminibus acerbis continere, è quorum numero habetur lentisci elixatio, Et myrtorum, Et rosarum, Et rhus, præterea mali Punici floris, Et foliorum rubi, atque gallæ. Vtero contra aridiori, cõtrarijs occurritur auxilijs: lauacris inquam, Et unguentis, cibisque humectantibus, Et holeracco nutritiuo mediocri, baud admodum ueteri. Si propter crassiores humores fœcunditas frustratur, siquidem mordax humor infestet, mulierem probè purgare à quolibet humore, familiari medicamento, maximè tamen picra ex aloë:

T 2 deinde

deinde sero lactis eluere, uiculusque rationem exquisitiorem dispi-
cere conuenit. Pituitosos aut humores exercitijs, sudationibus,
uomitionibusque, siue per inferna euacuare expedit. Oportet
insuper ex pharmacis epithymum, euphorbium, piper, semen
dauci, semen petroselini, singula contusa pondo duum drach.
potui dare. Hoc per uentrem etiam pulcherrime deducit, uul-
usque calfacit, quemadmodum saepe iam menses quoque rupit his, quae
purgatione non sunt expertae. Quando aut remedia profecisse
constat, mensuruis purgationibus recte expeditis, cessante purga-
tione, in uenerem congregari consultum est. Quandoquidem autem
spiritus similiter in utero conclusi, facultatem concipiendi pro-
hibent, notas ex his, quae de uuluae inflationibus prodita sunt, de-
prehendes. Medendum uero talibus primum cibi abstinentia, mox
cymini, anethum, apij semen, ruta, anisi, et aromata pleraque
offeruntur, partim quidem potanda, partim uero apponenda.
Conniuentes porro mulierum uuluas aperire conuenit, fragan-
tibus, iniectionibus lauaminibus ex malua, et semine lini foenograeci,
et oleo, interdum etiam melle. Vehementioribus item arte-
misia, cunilagine, nepita, pulegio, et anthemide: ad haec resina
quoque terebinthina, nitro, cucumere syluestri, elaterio, casta-
sia, et liquida pice. Quibus ostium hiat, his uiculus, fetus, media
camenta aridiora, et constringentia, cytini malorum Punico-
rum, lentiscus, rubi radices, myrta, et quaecumque in humidior
uulua expediunt, accommodantur. Perversiones denique uulua-
rum, fomentationes corrigunt, et mollitoria si inferuntur.
Coitus postremo qui a tergo exercetur, plurimum momenti ad
partus conceptionem conferre uidetur.

De uuluae rhagadibus, condylomatis, & haemor-
rhoidibus. Cap. 75.

In uteri ostiolo, rimae (quas Graeci rhagades uocant) quan-
doque ex uiolento partu proueniunt: quae primum quidem recen-
tibus etiamdum ex puerperio doloribus delitescerent fallunt,
postea uero paulatim sensu percipiuntur, nunc attrectatu, nunc in
congressu

congressu uenereo, dum ex attritu polluantur cruore. Agnos-
cuntur uerò sinu pudoris adaperto: scissiones enim, rimæq; in
ostij corona speculantur. In quibus sanè chirurgi operam, &
erodendi uirtute prædita medicamina respuentes, simplici-
bus infesionibus atq; pessis utemur. Cōfert etiā tetrapharma-
cum dissolutū. Quod si labris callofis fuerint rimæ, cōpositio
ne ex charta, cum rosaceo utendū. Si autem uehementiam eius
laborans non sustineat, iridem illyricam resina terebinthina
exceptā imposito. Hulusculis uerò cicatrice obductis, magno
cum emolumento adhibetur medicamentū ex cadmia, aut eos-
rum aliquid, quæ sedis affectibus dedicata sunt: cuiusmodi est,
quæ ex spuma argenti contextitur confectio. At ubi eiusmodi
fissuræ uetustate in condylomata degenerarint, consimilibus
discutiendæ, & ad cicatricem quamprimum reducendæ sunt.
Hæmorrhoides præterea in muliebrium locorū ostio siue cer-
uice nascuntur, quæ in partibus speculi artificio deprehendun-
tur, quia in exacerbationibus sanguinolentium, subrubrūq; tu-
berculum excrucians, euidenter apparet. In uitij uerò relaxa-
tionibus fluor dolore uacans, subliuidus, feculētus excernitur.
In quibus igitur loci commoditate fieri potest, per morbi indu-
cias, amputari mydio instrumento debent. Sin minus, medica-
mentis restringendæ sunt, nunc quidem aridis malicorijs, adie-
cta galla, aut quopiā eiusmodi adplicatis: nunc uerò his quæ in
sanguinis uteri profluuio cōprehēsa sunt, adhibitis: quæ etiam
diarrbis, & sanguinis fluxū patientibus congruunt. Hoc po-
tissimum discrimine discernuntur, quod uterus per interualla
continenter cruorem emittit, non eo solum, quo menstruas ex-
pedit purgationes, tempore.

De difficultate pariendi. Cap. 76.

Pariēdi difficultas, uel parturientis, uel foetus, uel loculi, uel
à foris euenientiū uitio accidit: parientis quidē, si nimium
crassa & præpinguis, aut uulua tota iusto arctior sit, aut do-
lorum imperita, aut pauida, aut inflammationē circa uterum,

T 3 aut

aut alijs partibus experta, aut quocunq; alio morbo affecta, aut suapte natura imbecillior, minus ad fœtū propellendum firma, aut quia parturitionē intēpestiuē accelerauerit. Fœtus aut cūitio, si inusitata magnitudinis, aut paruitatis, et modicæ grauitatis, aut amplissimi sit capitis, aut mōstrū (uerbi cau-
sa, biceps: aut mortuus) aut uiuens quidē, sed imbecillis, neq; potens in lucem progredi: aut si numerosi fœtus, quinos nanq; simul editos asserit Herophylus: aut si naturæ contrariam ha-
buerit in utero figurā. Naturalis etenim nascentis figura est: Prima quidē, in caput uergi, manibusq; in femora protensis, procliui directē ad orificiū capite. Proxima uerō, si fœtus res-
cā in pedes conuersus est. His exceptis, reliquæ omnes partu-
riendi formæ præter naturā sunt. Vitis autem loculi, partus redditur difficilis: si propter crassitiem non auellatur: uel si antequam conueniat, præ nimia tenuitate abrūpatur. euacua-
to nanq; humore, fœtus propter ariditatem ægerrimē delabi-
tur. Ex his quæ foris occurrant, ægra fit parturitio, uel fri-
gore, quod uterū cōdensauit: uel calore immodico, qui uires deiecit: aut alio quopiā euētū fortuito incurstante. Si igitur as-
trictio, quasiq; obturatio difficultatis paricēdi author sit, laxa-
tione primitus succurrito, infundendo largiter oleū dulce, et calidū, et decoctū scēnogræci, aut maluæ, aut seminis lini, aut etiam oua, doloris mitigandi gratia. Deinde pubem cum imo-
uētre et lumbis, cataplasmate illinito ex semine lini, aut aqua mulsa, aut hydrelæo, in se sibusq; similib. A balneis remedia quæ relaxent, cōmendantur, nisi febris, aut alia quæpiā pro-
hibeat occasio. Mouetoq; parientē lectica, in aere temperatē calido. Nonnulli uerō cōquassationes ualidas, sternutamētāq; adhibuerunt. Meticulosam adhortamur, in expertā doloris, docebimus, ut ualidissimē spiritum contineat, et ualidiore nisu conceptum ad os uteri protrudat. Quæ animi deliquiūm pati cœperit, ijs quæ stuporem arcent odoramentis recreanda est. Renocatā mediocriter, modico cibo reficimus. Præpinguem
ad

ad l. scutulum supinam collocabimus, contractis ad femora genubus, quod uulua pube uersus tendens, scutulo directe opponatur, quod cerotarys et inunctionibus delinire digitis conuenit, ac leniter aperire. Si quis praeterea morbus has partes infestauerit, etiam huic prospiciendum. Alui excrementum detentum, molli clystere extrahendum. Secundas autem clausas, digitis aut ferramento quod polycopon uocatur, in ipsis digitis occultato, diuidere oportet, laeva manu praetentante, et pinguem aliquem humorem in uuluae loculamentum per clystere rem immittimus. At si praeter naturam iufans figuratus sit, ad naturalem figuram redigendus est, nunc quidem impellendo, nunc uero adducendo, nunc flexendo, nunc uero dirigendo. et si quidem manum praetendit, aut pedem, membro apprehensus extrahendus non est, magis namque affirmatur, aut luxatur, aut membratim etiam dilaniatur: sed digitis humero aut coxen dici conceptus affixis, prominens eius particula denuo in locum conuenientem reuocanda est. Si toto foetu in sese conglobato perperam figuretur, sursum prius ipsum ab uteri orificio sublimem euomere: deinde prehensum denuo, ad os ipsum dirigere consilium est. Quod si plures uno foetus deferantur, iterum a superna infernaque parte reducito: uerum ut omnia leniter, et absque membrorum offensa traherentur, locis oleo perfusis. Tempus in sellam collocandi parturientem est, cum uuluae ostium apertum digito subcidit, et quod praeruptum est, prolabitur. At si quod mortuus sit infans, aut alia ob causam progredi moratur, extrahi necesse est.

De coxendicis affectibus. Cap. 77.

I Schias, hoc est, coxendicum afflictio, de genere omnino morbi articularis existit, nisi quod causa ipsius coxae inheret. Quae est crassus et pituitosus humor, qui in coxendicis copaege et articulo coeret innotuit. Dolor uero a natium gibbo pubeque ad genua usque, plerisque autem ad extremum usque pedis calcaneum peruenit. Quum igitur circa prima morbi rudimenta

menta in languentem incidimus, facta alui scyballorum per
 clysterem euacuatione, ex uena cubiti sanguis detrābendus est:
 si dolor inueterauerit, à malleolo affecti cruris detractio mo-
 liatur. Per morbi quidē insultus, istac irrigatione utemur: Cy-
 prini cyathi octo, aceti quatuor, nitri duo, seminis roris maris
 ni unus, lanis succidis calida imponuntur. Post id cataplasma
 ta applicentur ex amarorū lupinorū farina, cum oxymelite,
 farina' ue lolleacea, cum resina, et cucumeris erratici radice,
 & nitro, & nepeta, & semine roris marini, & baccis lauri.
 Cæterum nepita per se magna cum utilitate cataplasmatibus
 modo cum oxymelite, aut mulsā imponitur. Emplastro præ-
 terea mitigatorio utendū, in quo ceræ drach. centum, terebin-
 thinae uiginti quinque, eruginis sex, myrrhæ galbani, ireos, sin-
 gulorum drach. sex, cedriæ quinque. Cæterū potionandi prius
 sunt ipsi succo Cyrenaico erui quantitate, aut castorei drach-
 ma, cum opopanax triobolo. Porro capparis radice cortex
 potius, & cataplasmatibus immixtus confert. Quod si dolor in-
 tensus urgeat, tum anodyna medicamenta locū habent: uerbi
 causa, confectio Philonis, & quæ è duobus piperū generibus
 contextitur. Clystere uerò utimur illo: Mellis cyathus unus &
 dimidijs, olei sesquicyathus, aquæ cyathis bini, nitri denarij o-
 cto, terebinthinae drach. quatuor. His calidis aluo immixtis, cir-
 culum ani fouere expedit: ut per morulā longiorē continean-
 tur. mucosum humorē euacuat, nonnunquā etiam sanguinē,
 cum plurimum præsidij cōfert. Si his actis malū non cesserit,
 quod rarenter usuuenit, tum denuō frequentius id ipsum usur-
 pandum, aquæ loco cētaurij decocto admixto. Sanguinē uerò
 cit capsellæ herbæ semen infernè inditū: liquor item cucume-
 ris erratici, et medicamentū quod ex ipso cōficitur, uel oleum
 quod è radicibus eius contextum est sycionium: & salforum
 piscium muria, & oliuarum colymbadum per anum utiliter
 infunditur. Cucurbitulæ insuper sunt cum plurima flamma
 & scarificatu coxendici adglutinandæ: interdum etiam hiru-
 dines,

dines. Morante autem diutius hac ægritudine, aggrediunda est purgatio ex hiera, aut colocynthide, exhibendo medullam propè læuigatā & maceratā pondo drachmæ unius, in mulsi cyathis duobus, siue non multo plus minus'ue, pro uiribus languētis, aluiq; facilitate. In aqua uerò mulsa ruta elixetur. Puls item colocynthidos sic affectos probè expurgat. Vomitus insuper cū radiculis elicitus, intra initia quibusdā auxilio fuit. Morbo remittente, dropaces inungendi sunt. Utendum quoq; acopo ex euphorbio, præcipuè eo quod pœcilum, hoc est, uarium appellatur. Lauacra quoq; naturalia accommodata sunt: si hæc ad manum non sint, in alys lauare balneis, & memoratis indolorijs uti debent. Mixturisq; nitrīs, Asclepio, compositione ex euphorbio, adarce, nigro ueratro, castorio, pyrethro, pipere, et staphide syluestri, æquis portionibus. Post balneum picis aridæ uncie tres, sulphuris uiui duæ, calidæ adhuc cuti inspergantur, & cooperiantur charta. Si hæc nihil profuerint, reliquis morbi restatibus præstat sinapi cum caricis, aut per se cataplasmatīs more imponere. Persanat autē ipsos ex adissimè iberidis herbæ usus, quam & lepidiū, nonnulli uerò agriocardamum appellant. Nostras uerò fruticosa est, folia lauri cōparia, & longè maiora possidens: quæ multa experimenta sæpius nō modò in coxēdicis ægritudinibus, sed in alys etiā diuturnis affectibus dedit. Cæterū efficaciora multò sunt æstatis tempore. Quòd si tum nulla detur foliorū copia, radicis corticē cum adipe suillo cōtusum, emplastri modo linteolo denso impaētū, locis maximè dolētib. imposito, puta gibbæ, natium regioni, & femoribus, atq; tantisper dum nigrorē induat, aut omnino liuescat cutis, finito: deinde ipsum demito, lotoq; laborātī cerotarium illud impingito: Opopanacis uncie quatuor, aceti cyathis duobus diluuntur, & ceroto cyprino excipiuntur. Verū si tam ardentium usum respuunt, instaurantibus emplastris utendum: cuius notæ fuerit, Cerae, resinæ picæ, singulorum drach. duodecim, terebinthinæ, syluestrium

columbarum fimi feculae uini recentis crematae, uniuscuiusque drachmæ sex, galbani unam et dimidiam. Sed et ea quæ Lece-
na appellationem habet, est numero reficientium iudicatur. Con-
ferunt item quæ ex lixiuio quod destillauerit, et nitro conte-
xuntur. Potionibus nonnulli continuatis per annum usi sunt, et
quibus est medicamentum diateffaron, trixaginis libra, gen-
tiana uncia nouem, aristolochia rotunda tantundem, seminis
rutæ aridi sextarius. hæc trita et cribrata singulis diebus co-
chliary quantitate exhibenda sunt ieiuno, et ei qui probè confe-
cerit cum aquæ gelidæ cyathis duobus, per annum, quoad mor-
bus discutatur: necnon diabepta, quod est et sepiè compositum,
et quod Procli cognomenum habet, eadè pollicentur. iam ex-
ercitationes quæ in ambulando, cōtinuis flexionibus, saltibus,
et cursu perficiuntur. Alimentum sit mediocriter attenuans,
et quod concoctioni minimè resistat. Quod si nulli prædicto-
rum cesserit morbus, in suppurationem transit, quandoque laxa-
tis nervis ligantibus uertebra luxatur. Prorogante se igitur
longius ægritudine, iunctura tribus aut quatuor locis exuren-
da est, quemadmodum in opere chirurgico memorabitur: ad
compluresque dies hulcera aperta, ne cicatricem obducant, ser-
uanda sunt.

De Podagra & Arthritide. Cap. 78.

Podagricus et articularis cruciatus, non solum ex imbecil-
litate particulari corporis proficiscitur, quoniam acceßio-
nes indefinenter adfluerent, quatenus et infirmitas continuè
imbecillibus articulis adstet. Neque etiā ex humore solum, quo-
niam non in articulis modò insidet affeßio, sed utraq; et humor
præter naturā, et particulari debilitas, morbum articulare
suscitant. Cum enim membrorum nutritrix facultas debilior ob ci-
borum affluentiam defatigatur, cruditates continuè obueniunt.
Sæuiens igitur humor superabundans quæcunque articuli iunctu-
ram prius debilitatā occupat, colligantesque nervos distendens
dolorem excitat. Neque enim principales nervi, quibus arbitra-
rius

rius cietur motus, primaria affectione inflāmantur, quoniam in medijs articularū internodijs inflammationem oriri oportet: uerbi causa, cruribus, aut femoribus, aut genu, aut cubito, aut humero. Sed per consensum tamen, quem cum articulis ineunt, idē nerui afficiuntur. Quā diu igitur pedū articula-
menta humor infestari; duntaxat, podagra morbus nuncupa-
tur. Cum autē in reliquos corporis articulos causa penetraue-
rit, iam tum articularis morbus appellari cōsuevit: quo nomi-
ne uertebrae, humeri, maxillae, atq; uniuersi deinceps articuli
languore impliciti cōprehendūtur. Nonnullis aures quoq; &
dentes, & guttur, & interdū etiam iecur, & lien, articularijs
doloribus oblanguent. Quibus nisi protinus malū in articulos
crudet, laborantibus periculum imminet. Exuperans uerō hu-
mor, nunc quidē biliosus, nunc uerō sanguineus, quandoq; me-
lancholicus, magna uerō ex parte pituitosus ac crudus est, ex
alimentorū redundāte copia, et cruditatibus et ocio cōflatus.
In articulis nāq; si lōgiore tēpore inueterauerit, inspissatur, et
glutinescit, ita ut lapidosas articularum durities, quas tophos
Romani, poros Græci nuncupāt, efficiat. Nonnunquā uerō di-
uersi commiscētur humores. Proinde cognitu curatūq; diffici-
lius est uitii, & tantū nō immedicabile malū. Auliores huius
mali plerunq; sunt, labor immēsus, inambulatio uehementior,
iugis equitatio, et intēpestiuus rei uenereae usus, insolita gelidae
potatio, et frigidorū, aut pluriū, aut prauorū esculentorū esus,
& uini largioris usus. Quin et ex prolapsu quidā, aut propul-
sationibus, aut luxationibus, aut id genus, primā morbi tenta-
tionem auspicati sunt: antecedēte interim in corpore materia,
quae antea quiescebat, sed quam euidēs causa mouet. Mœstitia
autē, solitudines, uigiliae, & reliquae animae affectiones, non
solum prauum humorem concitant, sed etiam siue primariē,
siue per accidens pariunt. Variæ itaq; sunt afflictionis huius,
ceu dictū est, causae: humorū tamē negociū facientū differen-
tiæ, haud difficulter locis quibus impacti sunt, perspicuae red-
duntur

duntur, tum coloribus, tum cæteris accidētibus prodita. Biliosus namq; fluxus colore sublurido et rufo deprehēditur. Idem caloris insuper sensum ingerit, cruciatumq; acerbiorē efficit, & protinus ad supremā cutem, citra amplum tumorem erumpit, calidarū rerum impositu magis exacerbatur, quemadmodum ediuerso frigoris placatur: quod quidem cæteris ferē omnibus magna ex parte, peculiariter uerō alijs biliosis euēnit. Febris item sæpenuero in accessionū summis uigoribus accedit, ualdeq; sitibundi redduntur. Consimili modo et in melancholicis, atrioris coloris corpus deprehendas: sicuti in pituitosis, album & aquosum corpus cernitur, unde minus cruciantur, & serius tumēt particulae. Perinde atq; si sanguineus humor in corpore abundat, cruentum colorem membra præferunt. Sed ad exactiorem indicationem iuuabit te superior uicinis ratio, & cætera.

Curatio eorum qui ad biliosum humorem fluxum referunt.

Caput curationis eorum qui flaua bile confluantur, magisq; ipsius qualitate, euacuatione infestantis humoris, per medicamenta purgandi uim habentia tentabitur: cuius est modi potissimum quod ex rhodomelite contextitur, & quod ē malis cotoneis constat, & quæ ex hiera picra conficitur antidotus, & ex aloe præparata catapotia. In accessionibus uerō foris rosaceo cum oui luteo, modicoq; uino utemur, leniter particulam infricando, demulcentes herbas quoq; frigoris admo uebimus: uerbi causa, solanū, portulacā, herbā apollinarem, semperuium, lenticulā lacustrē, serin, papauer, seminale, rosarum folia, atq; consimilia. Quæ nunc quidē seorsim, nunc uerō cum micis posca irrigatis illinūtur, farinæ hordeacea cum rosaceo cataplasmatibus modo imponuntur. Cum autē erysipelatis naturā sortita fuerit artuum inflamatio, solatur eximie impositus cucurbitæ recentis cortex, peponis & cucumeris caro, cum per se, tum adiecto pane: perdicij item folia, & hederae cum pane, aut hordeaceæ farinæ polline: psyllium quoq;

quoq; cum polenta elixum, feruores flagrantium inflammationum mirificè lenit. Rosaceum itidem cerotum cum aliquo liquore frigorifico illitū, & ex lomento medicamentum. Constat autem ex his: Cereæ uncjys quinq;, chamæmelini duabus et dimidia, rosacei utriusq; uncjys duabus & dimidia, lomenti fabacei semuncia, ouorum luteis quinq;. Aliud cataplasma: Maluas uirides coctas contere, & psylliū separatim in lentorem redactū admisce: deinde ouorum luteis adiectis, oleoq; chamæmelino, cataplasmatibus instar impone. In multo ac intolerabili cruciatu medicamine è croco et glaucio, et opio utendum, posca dilutis & circumlitis, aut cum mica panis cataplasmatibus more impactis. Sed hæc Galenus cōmendat: Succī papaueris drach. quatuor, croci unā, cum lacte bubulo siue caprino, uel panis medullam iniice, & subactam rosaceo assume, cataplasmateq; utitor, uel opium, & crocū cum lacte trita, ceroto rosaceo excipe. Cerotū uerò ex turpēna eandem uim in paroxyismis obtinet, atq; oleum ex eadē expressum. Eiusdem generis est: Panis mica aqua uel posca macerata, semperuiuæ, uel strichni, uel portulacæ, & palmularū carnibus, et papaueris semine, æquis portionibus, cum ouorū assatorum luteis, & rosaceo quantū satis est, cataplasmate imponitur. Cæterum quæ membris torporē inducunt, minimè probantur: præterquam ad cruciatu uehementiā leniendam: plurimus quippe narcoticorum usus, meatus obstruit, tephaceas durities, & diuturnas motionis difficultates procreat. Post anodynorū itaq; usum, uel cōfectione ex succis herbarū facta cum chamæmelino temperata utendum, aut ea quæ constituitur ex althæa, aut aliquo eiusmodi medicamento. Vbi uerò pars affecta refrigerata, calfacientibus instaurata fuerit, robur membro, palmulato, diætijs quorūlibet nomināt, aceto rosaceo, aut uino rosaceo soluto inducemus. Quæ si detrectent emplastra, acaciæ succū è posca, aut lyciū cum croco, & glaucio, et succo perdicij cū posca illinito. Videtur insuper frigorificus et humectās expedit: uerū bī causa,

causa, ptisana, è chondroq; sorbitiones: & ex holeribus, mala-
ua, lactuca, intybus: ex auibus uerò domesticis, maximè pulli:
& ex piscibus saxatiles, echinus, pedines, atq; id genus. Deui-
tanda sunt omnia quæ calfaciunt, bilemq; pallidâ atq; flauam
pariunt: uina itē uetera, uermicola, nigra, satietasq;. Lauacris
uerò ex potabilib. aquis utendū, et circa ipsos noxi humoris
fluxus, quatenus causam exhibent: & cū absunt, si nihil prohi-
beat. Arceri etiam debet excandescencia, inedia, acrium esus,
ebrietas, labores immensi, & ueneris usus.

Curatio, sanguineo humore artus tentante.

In quibus uerò sanguineus humor abundat, in his sanguinis
detractione confidenter utendū est: enim uero id etiam in pitui-
tosioribus, aut ualde melancholicis: quoniā in eorum uenis hu-
mor plurima ex parte quantitate magis quàm qualitate infe-
stans cōtinetur. Tentāda est itaq; in prima statim ægitudinis
aggressionē, sanguinis detraçtio: quoniā qui sæpius huiusmodi
defluxionibus cōfliccati sunt, sanguinis euacuatione læduntur
magis, quàm adiuuētur, præcipuè quibus natura frigidius im-
becilliusq; corpus est. Post sanguinis uerò missionē, alijs etiam
humoribus redundantibus, pauculo temporis spacio, etiam ex-
hiera purgatione utemur. Verū oxymel Iuliani hos etiam
appositè purgat. Qui autē eiusmodi purgatoria medicamenta
abhorrent, catapotys utantur quæ recipiunt aloes, colocynthi-
dos, ueratri nigri, scammonia, singulorū unciam, euphorbij,
nitri, utrobique semunciam, succo brassicæ excipito, & pro ui-
rium ratione porrigito. Præstabit autē, si cū malorū cotoneo-
rum succo in globulos digerātur. Aliæ pilulæ in acceßionib.
& in remissionibus, cuiuscunq; humoris causa podagricis ex-
hibendæ: aloes uncia sex, agarici dimidia, croci tantundem,
costi, spicæ nardi, rotundi uinci odorati floris, carpobalsami,
singulorum uncia, castiæ duæ, scammonia tantundem, epithy-
mi uncia treis & semis. Dosis mediocris, dioboli duo: consum-
mata, dioboli quatuor. Catapotia similiter ex lapide Arme-

niaco

niaco mirificè purgant, & priuatim articularijs cruciatibus
 expediunt, tum in fluxionum initio tum in incremēto, tum in
 clināte morbo exhibita. Sed cum non desint, qui scammoniaz
 ceu stomacho officientē damnent, ministranda illis, præcipue
 pituitosa materia redundāte, hæc sunt: Colocynthidis interio-
 ris, bellebori nigri, bdellij, gummi, aloes, singulorum uncia, ni-
 tri Alexādrini, euphorby, uniu' cuiusq; uncia dimidia. Modus
 est instar diobolorum quatuor. Ego gummi loco epithymum
 posuerim. Quidā inter ipsas accessiones cuiusuis cruciatus ar-
 ticularis, hermodactylo ad alui subductionē utuntur. Cæterum
 attēctio opus est, stomacho nanq; hermodactylus officit: nam
 anxietatem inappetentiamq; inuehit. In solis igitur his qui ne-
 gocijs inuitabilibus obstricti sunt, eo utendum: breui quippe,
 & cum plurimum post biduum omnis inde fluxio cohibetur,
 ita ut consueta obire possint munia. ¶ Noui ipse quempiam, qui
 substantiam hermodactyli nunquam præbuit, neq; quippiam
 ex eadem compositorum medicaminum: sed herbe ipsius de-
 coctum, cum aliquo solenni medicamine, cuiusmodi est anisi,
 aut apij decoctum, potui dabat, & suspiciendo quodammodo
 uentre concitato, humoris impetū compeſcebat. Sed quoniam
 stomachum, ceu dictū est, lædit, his postea quæ stomacho con-
 ducunt, & robur inducunt, cum mediocri calfactione os uen-
 tris corrigere conuenit. Sed ex coronopodio medicamentum
 præstare Alexander asseruit, eo quod ex hermodactylo confi-
 citur: quod nō secus aluum subducit, dolores omnes discutiit,
 minimeq; stomachum offendat. Localia pituitosis imponan-
 tur: modico quidem dolore infestante, brassica uiridis cata-
 plasmatis modo adglutinata, apium, conyzæ, uerbenacæ ere-
 dior conferunt. In uehementi autem dolore, farina fœnogræ-
 ci partes tres, lolliacæ pollinis, farinae cicerum, utriusq; pars
 tem unam ex mulsa, aut uino tenui, cum exiguo cyprino, aut
 nardino, præsertim hyeme imposito. Et brassicæ radicis
 & caulium combustorum cinis, cum axungia cataplasmate
 impacta,

impacta, multis opem praestitit. Verum ad dolorem mitigandum, recentem esse oportet axungia: ad disciendum uero, ueterem & salsam. Et stercus bubuli cum farina hordeacea in mulsu decoctum, aut per se recens humidum, cum folijs brassicae cataplasmatibus more illitum iuuat. Itidem praestant pilulae caprinae priuatim, uel cum farina hordeacea in posca elixae. Quoniam uero quidam etiam per ea quae contraria esse uidentur, adiuti sunt, (nam diuersorum humorum miscella dignotionem praecedat requiritur) iam harum materia promiscue exponenda est. Conducit itaque atriplex, tam syluestris, quam satiuia, cum pane cataplasmate facto imposita. Aut uerbasci folia, cum bulbis & pane laeuigata; uel cum polenta, uel e pulte hordeacea cataplasma. In uniuersum, ubi abdita morbi causa est, uarijs quoque remedijs pugnandum est, nunc quidem consimilibus, nunc uero plane contrarijs, neque iisdem tamen diutius insistendum, si nullo sunt praesidio. Haec quippe in arte medica obeunda, quotidie continere cernimus idem remedium, articulum unum quidem iuuare, alteri uero in eodem & grotante inflammato, non modo non auxilium eodem die praestare, uerum quandoque etiam non sine magna demiratione offendere. Unus enim et idem saepe numero articulus ab eodem remedio nunc quidem iuuatur, paulo uero post ab eodem inflammatione concipit. Nunquam igitur cum uiscida & crassa materia praecellit, calidiora adferunt praesidia: acriter autem ac feruentiore humoris qualitate superante, refrigerantibus placantur dolores. Nihil uero mirum, si frigidior materies inflammationis tempore acceditur, aestuque ferueat, ut bilis, si ita contingat, admixtionem praeteream. Tophos porro in articulis coalescere, lupinorum farina cum oxymelite, aut posca, uel laserpitio, aut bryoniae radix cum pane prohibent. Et hoc sine offensione dolorem mitigat, et modice dissipat. Lycij unciam, guttae ammoniacae thymiamatis tantundem, trita cum uetustissimo uino, & oleo omphacino elixato, lomento quod satis est, adiecto, cocta mediocriter cataplasmatibus instar adglutinato.

Post

Post summum uerò uigorem, tumore relicto, bulbos per se, uel cum farine tenuissimo flosculo, usq; ad laniationē illinito, sic enim efficaciam exerunt. Quod si dolores cataplasmatibus nihil leniuntur, irrigationibus membrorum, calidisq; affusionibus ex alto opus est, præsertim si partes tumētes fuerint extremæ. Ex chamæmelorum, & fertulæ campanæ, aut centaurij decocto: nonnullis uerò solum capparis decoctū satis auxiliij tulit. Id uerò omnium efficacius fuerit: Thymum in aceto acerrimo, & origanum, & satureiam, & nepitā decoquito, eodemq; aceto locos affectos foueto: non semel modò, uerum sæpius in die fridenter: cō pluribus, namq; hoc profuit, non pituitoso solum humore languēibus, sed quibus flaua etiā bilis fuit infesta. Sunt qui quod infra scribitur, obseruauere: Illicis glandes læuigatæ contunduntur, & quàm plurimū decoquuntur, quo decocto ab initio statim articularis fluxus, extimi quidē artus ad bene longum tempus asperguntur: sed interiores particule spongij liquore tinctis fouentur: hoc enim modo impetū materiæ reprimunt. Idem his qui è bile hoc malo laborant, accommodatum est: quemadmodum & aquæ calidæ sine elixatione perfusio. Aduersus porrò eos qui ex intensissimo frigore oriuntur dolores, & constrictiones articularū, ualidissimum est remedium, quod habet olei ueteris sesquibram, nitri Alexandrini libram, resinæ terebinthinæ librā, euphorbij unciam, iridis sextantem, fœnogræci farine sextarium unum & dimidiū. His etiam ea quæ in coxarū morbis recensuimus, pulchrè conferunt: plurimi namq; in sic perfrigeratis, in remissionibus morbi etiam sinapi, cum caricis, & alijs phœnigmis usi sunt, aliqui etiā composito ex cantharidibus medicamēto: sed hæc in posterum noxam inferūt, nisi aliquo etiā ex mollificatibus utantur: qualis est compositio ex lanaria, diastrutheon uocant, atq; pyxide, et basilio, & medicamine ex abiete, item ex populo nigra, & bromio, & lysiponio, atq; acopis adhuc uehementioribus. Quorum autē articuli neruo potissimè consortio affliguntur, suc-

ciq; impaſſi ipsis conſtringuntur, ijs ex muli lotio ſotus, in ſum-
 mis præcipue morbi incremetis, gelidioribusq; de fluxib. con-
 fert. Pari etiam modo is qui è duobus ueratri generibus conſti-
 tuitur paſtillus, turgidis laxiſq; tumoribus congruit. fomenta-
 tio ite ex frictis ſalibus, aut aque aliàs marinæ calſactæ cum
 ſpongijs conſperſio, et ex ſalibus emplaſtra; et quæ ex ſtilla-
 titio lixiuio, nitroq; et his non diſſimilia cataplaſma poſt
 morbi uigorem opitulantur. Viſus ratio aridior ita habenti-
 bus conuenit, et ab excrementis ſuperfluis aliena, atq; inedia,
 aut cibi frugalitas: quotidianus balneorū uſus uitadus eſt. Poſt
 lauacrum uerò ex nitro, alijsq; abſterſionibus utantur. In dolo-
 rum relaxationibus exercitia, ac frictiones præſertim artuum
 magna cum utilitate adhibeantur. Balineis naturalibus, necnon
 ſabuloſis etiam fomentis uti alienū non eſt. Probantur et uo-
 mitiones ex raphanis, cibarijsq; elicita. Qui ſuapte natu-
 ra huc ſunt procliuiore, etiam cum ueratro, eoq; candido e-
 uacuabuntur, ſi per uomitum, uel per aluum etiam inferiorem
 expurgentur.

De his quorum ſanguinei humoris fluxus
 artus infeſtat.

Qui ſanguinei humoris influxui articulariū dolorem acce-
 ptum referūt, poſtquam ſanguis in principio morbi detractus
 eſt, prædicta ſubſidia foris inſiciantur. Bilioſior quidē ſi fuerit,
 et acrior, naturæ modum excedens ſanguis, ea quorum in bile
 propriè meminimus, adhibeantur. Si frigidior, pituitioſiorq;
 aut melancholicus redundat, his quorum poſtea mentionem fe-
 cimus, exceptis nimium acribus, occurrendū. Si malum inue-
 terauit, uſdē etiā ipsis locus erit. Verū illud etiā cataplaſma
 intra principia ſtatim expedit: malicoriū, rhus coriariū, atq;
 farina in uino eliquata, cataplaſmatis modo inducuntur.

Aliud: Folia braſſicæ cocta, et exquisitiſſimè læuigata, fece
 aceti iniecta, et ouorum crudorum bina lutea: et roſacci pa-
 rum, cōtritaq; ſimul identidem cum aſſidua permutatione im-
 ponuntur.

ponuntur. Alimenta quæ extenuant, parumq; nutriunt, assu-
menda sunt. A carnibus itaq; et leguminibus, luinoq; multo ac
nigro abstinence. At si fieri queat, uini potus ex toto deuitan-
dus. Non paucos equidem noui, qui ab hoc solo in totum ab-
stinentes, omnes morbo leuati sunt. alij nanq; in morbi confe-
ctis exordio prorsus conualuerunt: alij uero in posterum ra-
rius, et minus grauib; accessionū doloribus uexati sunt. Quo-
circa si non cōtrariū hinc eueniat, nihilq; mali inde speretur,
per uniuersum deinceps uitæ curriculum, uinum nunquam ad-
mittant. Quicunq; uero propter imbecillitatem aut frigidita-
tem succumbere uidentur, per biennium saltem uitam degant
abstemiam: mox ad consuetudinē paulatim reuersi, modicum
atq; aquosum perpetuū bibāt. Oportet abstemios in locū uinē
decoctum anisi, uel alicuius id genus seminis potare: à fugacia-
bus pomis, & reliquis refrigerantibus, uenerisq; usu pro uiri-
li abstinentes. Atqui sumptis anni spacio pharmacis, languen-
tes prorsus à morbo uindicare conati sunt, plures quidem pia-
tuitosioris & excrementitiæ naturæ iuuerunt: calidioribus
uero & aridioribus repentinæ mortis autores extitere, ad ali-
quod interaneum, puta renes, costas, aut pulmonem, aut prin-
cipem aliquam partem, translata materia. Satiùs igitur fue-
rit biliosioribus, plurimoq; sanguine præditis, uini usum ex to-
to uitare, quum nemo ex hoc memoratis inciderit periculis. In
frigidioribus autem, & excrementis redundantibus, theriaca
è uiperis utere: crebrius quidem, si concocta fuerit materia, &
præsertim hyeme: rarius uero æstiuo tempore. aut enim inde
ægritudo discedit, aut saltem lenior redditur absq; prædicto-
rum membrorum oblesione. Verum quoniā nos cōmemoratis
aliqui uti cogūt antidotis, genere nō dissimilibus: scito id quod
Damasoniū, et Agapetium nūcupatur, et atacton, et octaidon,
& quod ad Proclū autorem refertur, quod ex scordio, itē ex co-
rallio præparatur, atq; cōplura deniq; alia proficere. Omnium
tamen tutissimū est, et sæpius experientia comprobatū, quod ex

corallio constituitur, & lapidosas etiam articulorum durities in tophum confirmatas dissoluit. Horum uero omnium facultates, & utendi rationes, mali item huius euitandi consilium, in uolumine de Medicamentis inscripto reperies: pari etiam modo medicaminum quæ psilothra uocant, aduersus articulares cruciatus, compositiones, & usus modum in eodem habitu, pituitosiore inquam. Alij uero, qui à toto morbo liberari contendunt, uulpes totas in oleo discoquunt, quo articuli morbo medentur: alij quidem uiuas, alij mortuas capacissimo libeti coquendas iniiciunt. Simili modo & benas elixant, oleum distrahentis potentia conficientes, deinde solia eodem implent, in quæ articuli morbo conflati postquam descenderunt, immorari ibidem diutius, artusque perfricare præcipiunt: sequitur inde, ut non articuli tumores modo, uerum uniuersum etiam corpus euacuetur.

De tophis.

Quoniam inter articulos sæpenuerò topi, interdum quidem ex crasso & terrestri inherente humore, interdum uero ex medicaminum usu, quæ distrahendi & arefaciendi impensius, nulla autem molliendi facultate prædita, conflantur. Sciendum idoneora esse medicamenta, quæ emolliendi pariter et dissoluenti uirtute obtinent. Molliunt itaque adipēs uetusti, medullæ, gutta ammoniacæ, bdellium, oleum perquam uetustum, & styrax. Discutiunt autem et arefaciunt, nitrum, sal, lixiuum stillatitium, adarce, euphorbium, & id genus. Cæterum ad tophos in articulis priuatim facit caseus antiquissimus, & acerrimus, cum carnis suillæ pinguis et ueteris decocto tritus et impositus. sua namque sponte, topho debescere, quotidie fit euacuatio. Probatur uero ex compositis medicamentum ex perna, experimento comprobatum, quod bifariam concinnatur. Et quæ ex stillatitio lixiuo diximus, & id peculiariter, quod habet spumæ nitri, terebinthinæ, lixiui quod primum destillauerit, propolis singulorum trientem, ceræ dodrantem, colophonice libram, olei uncias sedecim, quibus mixtis tum in tophis, tum in abscessibus uiitor.

Atqui.

Atqui illud è cinnabari admirandum quidem aduersus topheos tumores, aliaq; plurima remediū præstat, sed inuētū admodum difficile medicamentum est. Quippe quod è leptocaryis constructitur, præter quod efficax habetur, etiam parabile est: neq; robusti ribus tantum, sed subtilibus etiā corporibus accommodatum si sumat quis confectiois ex melle, aut ex oraci tunica partes duas, ad illius medicaminis unam. Vbi uerò hæc in præoptu non fuerint, dapsimythiū quoq; nõ raro æquali pondere ipsi confunditur. Aliud ad topheos: Sandaracham resinam læuigatam uisco quercino excipito, atq; poris discutiendis illinito. Aliud quod ad fistulas et ægilopas confert: Olei sextarium, spumæ argenti uncias octo cum dimidia, auripigmenti unciam: Spumâ argenti atq; oleum, donec manus non inquinet decoquito, deinde auripigmenti farinam inspergito: et priusquam uestionem senserit, ab igne tollito, ac utitor. Epithemata porò ex flore Asy lapidis, in morbi remissionibus imposita, ad omnes quæ singulis articulis incubunt, collectiones ac nodos conueniunt, uniuersaq; ægritudine ueterum quorundam testimonio liberant. Creditur item medicamentum ex flore salis contextum, in morbi relaxationibus, compari modo applicatum, reliquias tumoris dissipare.

De euitanda podagra.

Vbi iam podagra, uel morbus etiā articularis constiterit, difficillimè citra commemoratam methodum eliditur. A non dum oborta uerò seipsum tueri et asserere, facilius, si quis cibos circuncidat et ys quæ in corpus facile distribuuntur, superfluitatibusq; uacant, mediocriq; uino utatur, et exercitationibus quantum satis est, indulgeat. Sal in oleo coniritum, et articulis cum frictione impactum, cunctos qui podagricum morbum euitare student, magnificè adiuuat, nisi aridam nimium corporis intemperaturam sortiti sint. Vti autem eo manè, et uespero toto uitæ spacio, et post inflammationum relaxationes oportet.

Ad perniones qui in planta pedis, imisque calcaneis
eueniunt. Cap. 79.

Perniones bulcerosa sunt affectiones, quae in digitis manuum pedumque brumali frigore emergunt. Quas oportet tepida marina, aut betae, aut lenticulae, aut erui, uel albuci radicis decocto fovere. Post fotum, lenticulas coctas in uino laeuigatas, cataplasmatibus instar imponere: aut ficus tritas cum oleo, aut alumen cum farina hordei aequis portionibus in uino distemperata adplicare: aut fecem subaridam, aut bulbum recentem uino tritum adglutinare: Vel allia in oleo fricta, tritaque, & ceram cum mediocri oleo liquefactam injicere. Aut malis coria cocto in uino, & laeuigata, cera rosacea excipere, atque uti, irrigatis antea membris rore lupinorum decocti. Vel mannam, aut sulphur uiuū cum melle elixo impingito. Sed alterci etiam succus continūe illitus, inflammationes & dolores sopit.

Marcellium ad perniones.

Rapi radicem excauato, inque capacitatem eius cerae uncias duas injicito, oleique lentiscini unciam, & in uase duplici cum aqua marina, seu muria aut decocto lupinorum elixato. Partim superfundito, partim ceratum in rapo liquefactum frigidum imposito. Sed in pernionibus exulceratis, thuris, scissi aluminis, minij, resinae, aequales portiones adipe suillo exceptas illinito. Ceterum ad bulcera cum inflammatione medicamento hexapharmaco utendū, quod habet olei dodrantem, aurini adipis, & fellis, uniuscuiusque librā, lithargyri uncias sex, colophoniae trientem, mellis selibram.

Ad manus digitorum, totorumque pedum rimas.

Picem liquidam inunge, aut cancrum fluuiiale marinum uel super carbones crematum, testae ramentum, cum oleo ad melis crassitudinem contritum, abstersis prius scissuris instillato. Conducit uero & scillae interaneum oleo feruefactum, & resina terebinthina eliquata, & cornu caprinum deuſum, caprilloque adipe exceptum. Sed callos undiquaque purgare, deinde medicamentis uti expedit.

Ad

Ad calcaneorum, plantarūq; pedis rimas, anthera.

Calcis uiuæ drach. decē, cerussæ uiginti, ceræ tantundem, aut triginta, porcinæ pinguedinis recētis septuncem, colophonia dodrantem, cremoris seminis lini cyathum, olei dulcis uncias quadraginta. Tam planam mollemq; plantam, quàm ul lum aliud reddit. Aliud: Adipis caprillæ, ceræ, olei, æquis portionibus uiere. Aliud: Malicoria in aceto elixa, cataplasmatibus modo diebus quinq; impone: deinde scissuris circumpurgatis, calcem uiuā cum oleo & balneorum strigmento adplicato. Aliud: Scillā oleo elixato, ipsam quidē frixam porricito, in oleo autem terebinthinam liquefacito, ac utitor.

Medendis attritionibus calcaneie longo decubitu.

Ceræ, olei, spumæ argenti, mellis, singulorū partes æquales, ad omnem plantarum et calcaneorū palmæ, atq; internæ digitorum partis exulcerationem conducunt, præsertim si bulcus ungui uicinum sit.

Ad sordida plantæ hūlcera, emmoton. Prodest etiam ad ea quæ pudendis adnascuntur.

Amurcæ cyathum, aceti tantundem in æreo uase ad mel leam usq; crassitudinem decoquito: separatimq; trita, squamæ aris drach. duas, manncæ tantundē, mollis lanæ succidæ quantum manu capi potest tæda contectæ, & crematæ cinerem totum excipito, ac utitor. In uulneribus quidē uino resoluuntur: in pudendis uerò plantaq; pedū passo. Aliud: Amurcæ, mellis despumati par modus, hoc ipsum gingiuas etiā expurgat.

Ad porrigines ex calce amentorum attritu.

Pulmo agninus, & porcinus, atq; caprillus conducunt: sed corium ueterum sandaliorum combustum, inflammationem quidem sanat minimè: sed inflammatione sublata, opis plurimum suggerit, uel cepa cum adipe gallinaceo copiosior inycitur, aut galla concremata inspergitur, uel acacia aceto diluta illinitur.

Claui prius undiq; repurgatis, aliquid ex erodentibus sue perinducito: uel rubiginē rasilem, uel sandarachā, uel puluerem Syringiacum, aut collyrium Syringiacū gummi loco, gutta ammoniaca exceptū. Est autem clauus, circinatus in orbem callus, colore cādido, clauorū capiti similis: omnibus corporis partibus, sed pedū planta digitis q; potissimē oriēs. Longiori autem tempore euellitur etiam, si scalpello ferreo apex clauī continuē abscindatur, aut pumice atteratur: pari etiam modo & callos. Prosunt uerō lupinorū crudorum deustorum cineres cum melle, aut misy liquida pice exceptū: nigella cum urina pueri uenerē non experti, uel oui croceum, uel putamen fabaceum cum aceto decoctū. Ad hoc in frequēti experimēto est, Cantharidum, atramēti sutorij, castorijq; æquales portiones, terebinthina, emplastri modo exceptæ, et clauo prius undiq; repurgato impositæ. Aliud: Fecis, calcis uiuæ, uisci par modus cū stillatitia lixiuia, uel lotio pueri uenerē nō experti.

De unguium uitiis, & primum de paronychiiis. Cap. 81.

Reduuiā, quam Græci paronychiam dicunt, abscessus est, qui iuxta unguis radicem suppurat, quem utiq; etiamdum pusillum inchoantemq; galla cum melle reprimat, & radices agere nō patitur, uel Musæ pastillus, uel iris ex aqua. Sed ubi iam præter naturā caro excreuerit, scopus medicationis est, eam non mordicantibus consumere et rūpere. Faciunt autem ad reduuias, aurii sordes, & lycium. Cum in suppurationem maturuerit hunc, acu, ut humor effluat, compungito, spongiamq; aqua imbutā imposito, aut lenticulā aqua eliquatam adglutinato, aut palmulatū cum uino, aut rosis uiridibus, aut aridis aqua irrigatis, leuigatisq;, aut farinā hordei cū aqua. Prodest itidē ad paronychias lupinorū farina, melle uel mulo so macerata. Ad exulceratas uerō reduuias expedit: Aeruginis, spumæ argenti, sarcocollæ, uniuscuiusq; drach. quatuor. Super linamētū cōcerptū ex uino, itē spongia imponitur. Sed
necessē

neceſſe eſt carnem undiquaq; ab ungue diuellere ac diducere.

De pterygiis.

Pterygium, carnis incrementū eſt, partem aliquā unguis operiens, ex reduuia neglecta, uel alia eiufmodi occaſione obortū. Cui auripigmentū, uel manna æquis portionibus inſpergitur, deſuperq; motū ex uino atq; ſpōgia imponitur. Aliud: Chalcitidis, ſquamæ, malicorij, æquas partes ficubus affatis, & melle excipito, aſperſo prius decocto ſtibij. Cæterum arcu factam pterygij partem circumuellito.

Ad putrefcentia digitorum pterygia, naturaliumq; hulcera.

Thuris, ſquamæ, ſingulorum drachmam, æruginis rafilis ſemunciam, mellis cyathum, cōtere in ſole, tantisper dum ſubflauum induat colorem: deinde utere cum ſplenio, loco prius uino irrigato.

Quæ breui pterygia exiccant & perſanant.

Soreos toſti drach. duæ, thuris tantundem, æruginis rafe drachma cum melle ſubaſta, pterygio imponūtur. Facit uerd idem ad reliquas etiam, quæ in iſdem locis oriuntur, hulcera malefica, nigredines, & hulcera putrida. Aliud: Squama æris palmularum carnibus, aut ficuum ſubaſta adhibetur.

Aliud: Fimum palumbinū cum tenuiſſimo farinae floſculo in paſſo elixato, atq; conterito: calidumq; applicato. Squamula item per ſe inſperſa arefacit pterygia. Sed frequenter oportet angulum unguis pterygion pungentem, auſum, copario inſerto amputare.

Ad ungues contuſos.

Myrtum, & mali Punici tenerrima folia unguibus adglutinabis.

Ad ungues cruentos.

Vtiliter hordeacea farina cum pice mixta imponitur.

Vt ungues qui doluerunt, abſcedant.

Sulphur læuigatum adipe ſuillo exceptum applicatur.

Vt ſcabri ungues abſcedant.

Viſci quercini, ſandaraches, ſanograeci, ſingulorū uncie

V 5 duæ,

duæ, cantharidum, thapsia, uniuscuiusq; uncia, aceti quantum satis uidetur. Aliud: Propoleos Atticæ, ceræ, bituminis, uniuscuiusq; drach. duæ, sulphuris ignem non experti drachma, oleo non inquinentur. Vbi usus poscet, calfactū unguibus circumlinitur. Aliud: Picis liquidæ, ceræ, colophonice, terebinthinæ, guttæ ammoniacæ thymiamatis, sulphuris uiui, spuma nitri, æquis portionibus, cauendū ne polluantur, manusq; inquinent. Aliud ad tollēdos scabredine affectos ungues ab/ꝑ exulceratione: Sumantur bituminis, auripigmenti, sandarachæ, sulphuris ignē non experti, singulorum drach. quatuor: quibus contritis, resina excipiantur, atq; utere, septenis diebus dissoluens. Aliud: Erui farina, bile ouilla, aut lotio ouino temperata utere, aut calce aqua non extincta cū oleo, aut etia cum opobalsamo. Vel atramentum sutoriū, & sulfur ignē nō expertum, uisco quantū satis esse queat exceptum, corio im pactum imposito. Vel herba pediculari aceto diluta utere. Vel resinæ terebinthinæ drachmam, sandarachæ binas, simul unguis radici adglutina, fascia accuratē circumligans. Cum uero exciderit unguis, ceratum myrtinū, in quo medicamento ex resina compositi momentum contineatur, superinducito.

LIBRI TERTII FINIS.

HYPOTHESIS LIBRI QVARTI.

In hoc uolumine operis uniuersū quarto, de affectionibus quæ foris in corpore potissimum nullo certo limite, sparsimq; insurgunt, tractatio est.

CAPITA LIBRI QVARTI.

De Elephantiasi.	Cap. 1	De papulis, quæ Græci exanthemata uocant.	8
De lepra atq; psora.	2	De epinyctidibus.	9
De impetigine.	3	De pustulis, quæ phlyctænæ dicuntur.	10
De prurigine.	4	Ad ambusta.	11
De leuce scabiei specie.	5	Ad uerberibus percussos.	12
De alphis candidis & atris.	6	Quinam pili ambustis renascantur.	
Aduersus stigmata ex decretis Archigenis.	7		

LIBER QVARTVS. 315

tur.	13	Ad dolentia & inflammata hul	315
Ad apofymata.	14	cera.	38
De formicis et uerrucis.	15	Ad immatura necdum purulenta	
De ganglio.	16	hulcera.	39
De inflammatione.	17	De hulceribus cauis.	40
De abscessibus qui foris corpus		Quæ hulcera sordida expur-	
infestant.	18	gant.	41
De gangræna & syderatione.	19	Aduersus hulcerum uermes.	42
De herpete.	20	De carnis excrementia.	43
De erysipellate.	21	De nomis, semipedonib. et pha	
De pano, bubone, et furunculo.	22	gedænis.	44
De dothienibus, tumidis absces		De hulceribus cicatrice carenti-	
sibus.	23	bus.	45
De termintho, tumore nigro &		De maleficis, quæ chironia & te	
tereti.	24	lephia dicuntur.	46
De carbūculis anthracib. ue.	25	Ad cicatrices nigras.	47
De canceribus.	26	De sinibus.	48
De œdemate laxo tumore.	27	De fistulis.	49
De inflatione.	28	De ruptis hulceribus.	50
De luxatis & contusis.	29	De hulceribus articularum.	51
De carnibus contusis, & sangui-		De palis, lignisq; fixis, telis, spi-	
ne in contusis concreto.	30	niscq; & id genus aliis corpore	
De fractura & conuulsione.	31	extrahendis.	52
De scirrhis.	32	De sanguinis eruptione e uena	
De strumis.	33	et arteria.	53
De steatomatis, & atheromatis,		De percussione neruorum.	54
& meliceribus.	34	De articularum tensione.	55
De fauis.	35	De luxatis artubus.	56
De simplici hulcere.	36	De lumbricis.	57
Quæ conglutinare hulcera pos-		De ascaridibus.	58
sint.	37	De dracunculis.	59

F I N I S.

PAVLI



AIOREM oportere semper remedijs, quam aegritudinis uim esse, bellè Cappadox, arbitror, Aretæus docuit: indeq; fieri, ut curari Elephantias minime possit quoddam scilicet medicina nulla superior inueniatur. Nā si Cancer, qui singulorum modò corporis membrorum Elephantias quidē est, inter morbos immedicabiles ab ipso etiā Hippocrate cēsetur: quā non sit Elephantiasis, qui cancer quiddā corporis uniuersi existit, multò potius, longè curabilis minus? At siquid bile, cuius soboles hic morbus habetur, bifariā prouenit (aut enim è melancholico seculētoq; sanguine, ac ueluti sanguinis limo, aut è flaua bile, utrisq; supra naturæ modum assatis, originē habet.) Elephantias quippe per rubros initio res ferè, aut, ut uerius loquar, malitiosos minus prima bilis atræ differētia gignit: Reliquos uerò qui infestiores sunt, et corpus totū ulcerosū reddūt summaq; decidere faciūt, altera flauæ bilis nimium cōbusta proles parit. Morbo igitur iā uicis, manus admoēda non est. Auspicatē uerò prius in morbo, ita ut nihil ab extremis deciderit, nulla etiā fœdarit cutem exulceratio, neq; extuberationes admodū exurgūt, uultus tantum liuido rubore magis quodāmodo suffunditur, sed ne utiquā admodū indecorus apparet, mederi tentabimus. Quidā etenim, atq; hi sanè non pauci, morbum inchoantē plerisq; sola capitis adustione, ne suppuraret, prohibuerunt. Ocys itaq; nos, ubi morbus primū suppullulare cœperit, sanguinem secta uena detrahimus, et uerno potius tempore, quādo frequens iste affectus ingruit, et accessionibus suis exacerbescit. Sed paucis inde diebus nouem aut decem interpositis, pulio

pulte colocynthidos hac lue oppressis purgabimus: nō semel,
 sed identidē ex proportionē uirtutis medicamētū quantitatem
 adauduri. Proficiū etiam talibus per hierā purgatio. Rursum
 uerō diebus circiter decē intercalatis, serū lactis scissi offeren-
 dum est, neq; sanē minus tribus heminis, neq; ultra quinq;. Se-
 quentibus uerō diebus, non scisso, sed recens emulso alantur.
 Inter hæc, morbus si remittat, alimento eodē utantur si autem
 permanet lacte abstinendū. Vomitus acrium ciborum esu, ra-
 phanis, & cibarijs prouocet. Probatur post hæc ueratio can-
 dido facta expurgatio bis quidē si queat fieri in uere, si mel ue-
 rō autumnali tēpore. Conclamatīs neq; uenam secare, neq; ue-
 ratrum propinare cōuenit: quum inde materiei neq; in altum
 ex cute deriuatio, neq; ulla etiā diminutio fiat. Ceterum in al-
 uum atq; intestina materies deriuāda est, remedijsq; noxiā eua-
 cantibus utendū, arefaciendo atq; astringendo summā corpo-
 ris cutem. Cucurbitulæ itaq; inanes ori ueniris & præcordijs
 affigantur: easdemq; partes dropace illinito: pusillo inde tem-
 poris progressu denuō ad principia reflectendū, a purgatione
 quæ per hierā fit auspicando: sanguinis missionem plūs detra-
 menti quā emolumenti allaturā, uitantes. Eodem. duā ter
 aut quater in anno repetito, tempore aut uerno potissimum,
 atq; autumno. iam uerō his etiā potiones expediūt: Aceti cy-
 athus unus, cum cedrini liquoris cyatho, & succi brassicæ cru-
 dæ cyathis duobus cōmixtus potui cū manē, tum uespere ex-
 bibeatur: Aut uertemni herbæ folia arida pondo drachmæ
 unius in uini cyatho. Vel cornu ceruini drachmā, et aceti scyl-
 litici cyathi mensurā, post diluculariam inambulationē quoti-
 dianam potui datur. Cætera uerō pro loco ac tempore ysdem
 porrigantur: Vel scyllæ seminis drach. quinq; in aqua mulsa,
 aut in melle instar linctus exhibetur: Vel succi Cyrenaici crui
 quantitas mellis atq; butyro subacta: Vel boris rasuræ drach-
 mæ semis, cum uini cyathis duobus: Vel cymini Aethiopici
 drachmæ tres, cum melle eligmatis modo. Atqui multo præ-
 stantius

stantius auxilium quàm hæc præstiterit, theriacorum pastillorum drachma, in uino generoso cyathi unius mensura læuigata & epota. Pari etiam modo scylliticorum pastillorum drachma bibatur. Nepetæ insuper liquorem, tanquam efficacissimū in potu præsidium summis encomijs euehūt, absorptū. A cyathis tribus auspicandū, et ad senos usq; transeundū perbibent. Verūm omnibus facile efficaciam palmam surripuerit è uiperis contexta theriace, cum in potu sumpta, tum foris illita. Quod si ad manum fuerit uiperarum copia, non est aliud efficacius, quàm harū carnes comestæ, albo iure ex aqua largiore, salibus, porro, atq; anetho, usq; ad spinarum discretionem probè elixæ: capitibus ipsarum primò, caudisq; ad digitos quatuor amputatis, & intestinis omnibus exemptis, pelleq; detracta. Theriaci uerò sales eadem pollicentur, cum obsonijs assumpti. Nam qui ijs hoc pacto utuntur, illis squama quandoq; aut ueluti uulpis pellicula quædam à cute decedit.

Victus ratio eiusmodi conuenit.

Post somnum manibus leniter permulceatur, recrementisq; alui depositis, gestationibus, uocis exercitio, frictionibus, uariisq; gymnasio, partim saltu, partim altoribus & folle utatur. Postea detergo sudore, ursino, uel uulpino, uel hircino, aut uolucris alicuius adipe, uel butyro recente perungatur. Modico autem interuallo temporis interposito, lauacris operam dantes, fœnogræci, aut ptisanæ cremore, aut gutta ammoniacæ perexiguo in aceto liquefacto delinetur. A balneo deterfus, oleo lētiscino, aut cœnanthino, aut myrteo perfundatur, & uino modico cum alumine, gutta.ue ammoniacæ strigmenti balneorum crassitudine. Absterfus denuò tenerrimis linteolis, horæ dimidium quiescat: à quo aqua hausta euomat, digitis in fauces, pinnis.ue demissis. ubi euomuerit, uinum absinthites, uel origanites bibatur. Alimenta erunt, panis hordeaceus, mazæ ex polentis. Ex oleribus beta, lactuca, rapha-

nus, porrum, & brassica, bis aqua ad dulcorem usq; elota, & capparis. B' maritimis autem admittuntur ostrea, pelorides, herinacci, peñines, tellinæ, cum beta decoctæ: salsamentum uetus ceu medicaminis uicem obtinet. Mero omni morbi tempore abstineatur, & coitu similiter. Paucissimum modò uinum, ac tenue & aquosum, quando uires restaurare post purgationes uolumus, assumitur. Tunc acris quoque præter condimenta circumcidenda sunt. Adhæc utiliter offeruntur ptisana, oua, chondrus elotus, lac, mel cum pane, malua, rumex, sisarum, & piscis teneræ carnis: Bx auibus, quæ inculpati succi sunt: Bx fructibus, ficus, uuae, & uua arefactæ: Bx dulciarijs mellitis conueniunt, ex nucleis pineis, uel ex amygdalis frictis placenta, & cnico, his qui bis in die nutriuntur: molestum quippe ipsis, semel duntaxat cibum capere. Vbi corporis interni habita fuerit ratio, smegmatis quoque usus commendatur in balneo, ex decocto betæ, aut scenograeci, cum spuma nitri, aut sapone, aut myrobolano: & nonnunquam psilothris utendum. Exterit & portulaca cum aceto contrita, tenuëque semperuiuum: rumicis radices aceto concoctæ, alumen cum salibus, & sandaracha æquis portionibus in uino & lentiscino. Facit huc medicamentum alphis dictum, ex alcyonio, nitro, myrrba, sulphure, ficusq; syluestris folijs aridis, cum aceto læuigatum ac illitum. Præstat idem quod constat ex sepiæ testæ combustæ, pumicis, nitri, cretæ cimoëlicæ crematæ, commeosq; & gallæ immaturæ, æquis ponderibus, aridum inspersum, aut cum aceto affricatū. Illud etiam admirandū: rumicis radicū fasciculus qui manū impleat, nitri drach. quadraginta, thuris uiginti quinque, sulphuris totidē ex aceto Aegyptio circumliniuntur. Vincit itidē, si inducatur cui insunt auripigmēti drach. decē, sulphuris igne intadū octo, costi duodecim, calcis aque non restinctæ quatuor, ceræ tantundē, baccarū lauri aridarū duodecim: hæc simul cōteruntur, et macerantur foliorū populi albæ succo, uel crasso decocto: et

cuna

cum iam mellis crassitudine prætulerint, illinuntur. Aliud: Radicum rumicis fasciculi duo in aceto decoquuntur, & in pila contunduntur, & læuigantur: deinde alcyonij libra, aphronitri uncia octo, sulphuris uiui libra, cochlearij testarum crematarum uncia quatuor, chamæleontis cum radice totidem, conterantur pariter omnia usque ad balneorum strigmentitiam crassitudinem, deinde corpori circumlinantur: æstatis quidem tempore in sole sæpius, hyeme uero in balneo, tantisper dum exsudent. Cæterum Asclepij aridum smegma his bellè cōueniet: et omnia cōmuniter absterfua, quæ dicturi sumus, ad Alphos facta, quemadmodum etiam quæ in præsens aduersus illa relata sunt. Turgida uero corporis eminentia inflāmata, uel exulcerata, delinentur lycio Indico, aut glaucio, aut aloë, aut Andronis pastillo, aut polyidæ sigillo. Cataplasma insuper accommodabitur ex chōdro cum succo herbæ seminalis, aut plantaginis, aut parietaria læuigata. & milesiæ herbæ uiridis folia, cum axungia cōtusa. & cataplasmatibus more imposita, mirificè prosunt: rubescunt quippe inde partes quibus imponuntur, subsidunt autè facile pane superinducto, aut cerato ex oleo amygdalino, rursumque naturali suo colori restituiuntur. Exulceratis uero emplastra congruunt ex diphyrge consarcinata: & ex uino, melinū, & coracion, et quod ex aceto mulso constat, necnon Andronius pastillus, & bulla quæ pompholygem dicunt, & cadmia. Cæterum morbum totum leniri indicat, si cicatrix primis hulceribus inducatur. Cōtra uero difficultatem anhelitus laborantium elephantiasis, millepedas sub aqualibus degentes quinque aut sex, ex mulsiæ cyathis tribus potui dato. Communiter uero & eorū nonnulla huic affectioni cōpetunt, quæ suspiriosis conducere prodidimus. Aquarū porro sponte emergentium usus ueluti necessarius seligendus est, atque in primis aluminosarū, & quæ ferri naturam obtinent, et si fieri potest, frigidarū. Vtiles etiam ipsis plurimum fuerint potæ. Maritimi etiam sabuli usurpatio eiusdem semper est potentia, omniaque

niaq; sudorifica. Quoniam autem hic morbus nō minus quā pestis cōtagiosus est, quā procul ab urbibus, in loca mediterranea & refrigerata, & quibus est hominum infrequentia, ta be illa affecti habitandum ablegandi sunt. Si possibile est, hinc etiam ad proxima loca migrabunt, tum propter se, tum propter eos qui (ut uerisimile est) ipsis incident. Ipsi nanq; ita salu briore aere fruuntur, & alios hac lue non inficient.

De lepra & pfora. Cap. 2.

Lepra pariter et pfora summæ cutis scabredo est, cum pruritu & corporis colliuatione, ex atrabilario humore orē ginem trahens. Sed lepra profundius circularibusq; erosionibus corporis cutē depascit, et piscium instar squamulas ex se remittit. Pfora uerō summā corporis cutem uaria erosionē figurat, furfureaq; ex se corpuscula edit. In quibus sanē sanguis detrahendus est, si humorib. redundare corpus appareat: sin minus, idem omnino purgante pharmaco airabile exonerandum est. Extrinsecus uerō utroq; ueratro cōmuniter utendum. Calcemq; ablutā seruato aridā, cumq; usus poscet, aqua diluens ad strigmentitiā crassitudinē illinito. Aliud: Saluicæ, oliuæ, Aethiopiciæ lachrymæ, singulorū drach. octo, radicis corticis capparis, gummi, uniuscuiusq; drach. tredecim, illinito ex aceto in sole. Sed lepras peculiariter exterunt ac dimouent anemonæ appositæ, uitisq; cādidæ radix. Composita uerō: Lolleacæ farinæ chænicæ, cardamomi albi drachmas quatuor, spumæ nitri unā, atramenti sutorij octo, asphodeli radicis mediæ quatuor, tritas in aceto, et in cerati spissitudinem subactas circumlinito, nitro prius loco deterso. Vbi solueris, solues autē die tertio, & ablueris aqua gelida, denuō illinito.

Aliud: Radicum hastulæ regiæ succi uncias sex, sulphuris ignem non experti, mannae, uniuscuiusq; drach. decem, nitri octo: aceto subacta inungito. Cæterum ad pforā propriè conducunt: Ex simplicib. quidē, uua syluestris, lupini amari, carmomū cum aceto, lily radix cū melle, resina terebinthina,

X sulphur

sulphur, ciceres, fimus caprillus, Cōposita uerò, misy unā cum chalcitide & quis partibus ex uino, psoris humidioribus illinito. Aliud: Rhododaphnes teneriora folia in olei sextario decoquito, tātis per dum arefiant, ramulisq; porrectis adijce oleo ceræ candidæ quadrantē: ubi eliquaueris refrigerato, sulphurisq; uiui unciam insperge atq; illinito, idq; uel sub sole, uel in balneo. Sunt qui unā cum rhododaphne scyllā etiam in hunc usum decoquant. Aliud: Accipe confectiōis diachylon, hoc est, ē succis herbarū sextantē, ceræ tantundē, rosacei unciam, spumæ argēti, cerussæ singulorū quadrantē, picis liquidæ se librā, stercoris argenti, sirici, cuiusq; sextantē, aceti quantum ad læuigationē aridorum satis est. Aliud: Cerussæ unciam dimidiam, amyli tantundē, plumbi unciam, lotariorū rubrorum uel anchusæ sextantē, ceræ se librā, rosacei dodrantē. anchusam egregiē unā cum rosaceo elixato, deinde reliqua inijcito.

Aliud: Oua decem, uel quot opus fuerint in aceto acerrimo macerato, donec cortex ipsorū emollescat, inde eodē aceto lutea ipsorum decoquito, rosaceo eliquato, & reliquo aceto, & spumæ argenti symmetrū strigmentitia crassitudine illinito.

Aliud: Ouorum maceratorū in aceto uitellos treis, rosacei se librā, sulphuris uiui quadrantē. Prius eliquatis & contritis cum aceto uitellis, & sulphure, inijce ceratum. Spuma quoq; argenti aceto rosaceo læuigata, ut emplastri formam induat, acriores psoras expurgat. Porro ex rumice etiā, atq; pleraq; quæ elephantiasī medendo sunt facta smegmata, communiter lepræ & psoræ accommodata sunt.

De impetiginibus. Cap. 3.

Mixtis saniebus serosis, tenuibus, & acribus, cum alijs humoribus crassis, impetigines oriuntur, quæ procliuiter in psoram & lepram cutis aspredines transeunt. Quocirca uehementer arefaciētibus egent phar macis. Proinde post uniuersū corporis, si opus sit, euacuationē, simplicia quidem ipsis conueniunt: Cicer, ueratrū, echinus saxatilis, pix cerato et resinæ mixta,

mixta, crocodili terrestres stercus, et sturnorum, cum oryza
solum epulati sint. Non pauci unico hoc impetigines, quæ in
mento aut aliàs proueniunt, medicati sunt: Plurimū tritici su-
mens, incudi cuiusdā ignitæ imposito, humidūq; ex eo defluēs,
etiamdum calidū impetiginibus inungito. Puerorū uerò liche-
nas salua humana continenter perfricato. Hos etiam gummi
pruni illinitū adiuuat. Quibus uitium inueterauit, uiticis folia
aceto trita, cataplasmatibus modo adglutinātur, aut pari modo
folia capparis. Cōposita uerò hæc: Sulphur cū thure, uel cum
gutta ammoniacæ, eliquatum aceto illinitur.

Pastillus aduersus impetigines.

Glutini fabrilis drachmæ quatuor, thuris tres, aceti cyathi
dimidium: aceto diluta illinūtur. Aliud: Chalcitidis, gummi,
uniuscuiusq; drachmæ octo: sulphuris uiui, misyos, singulorū
drachmæ sex: squamule æris, acaciæ, uniuscuiusq; drachmæ
duæ aceto inunguntur. Aliud: Sulphuris ignē non experti,
nitri spumæ singulorum drach. quatuor, seminis roris marinæ
grana sexaginta, contere cum aceto: uerū locum tantummo-
do affectū illinito, sanam partem nihil inquinās, arefactū frigē-
da aqua eluito. Aliud: Veratri albi drach. octo, farine lupino-
rum tostorum, buccinorū cinis, nitri, uniuscuiusq; chcenix, in
puluerē redactis fricētur. Iam uerò feras lichenas appellant,
qui à mediocriter arefacientibus nihil iuuātur, sed acrioribus
exacerbantur. Exhibenda sunt igitur medicamenta, abundē
quidem efficacia, sed quæ non plurimū erodāt: cuius est modū
quod habet glaucy, thuris, alcyonū, bituminis, sulphuris, gum-
mi, uniuscuiusq; unciam, si cum aceto illiniatur. Aphricam pē-
tem cum aceto elixam, liquefactamq; illinito. Aliud ad im-
petigines et pruritū: Atramenti sutorij, sulphuris ignem non
expertum, nitri, thuris, æquis portionibus, ad impetigines cum
aceto, ad pruriginem autem cum uino utitor. Aliud liche-
nium: Gutte ammoniacæ thymiamatis, erui farine, farine
lupini, æquas partes, cum aceto illinito.

PRURITUS qui senibus accidit, ex toto nunquam curatur, placatur autē subordinatis remediōrū auxilijs in cæteris ætastibus. Si malus humor author fuerit, hunc quāprimū euacuare expedit, siue biliosus, siue pituitosus, siue putris, siue salus extiterit. Deprehenditur autē id quidem ex ætate, temperatura, uictu, anni tēpore, regione, atq; reliquis hisce cognatis. Quocirca si uenæ pariter cū sanguine fartæ, redūdare uidentur, à detractione sanguinis auspicandum est: Sin qualitate potius molestat, congruis eo medicaminibus exinanito, ad externam uertamus nos curationē. Lauacro itaq; utendum omnino etiam dum ieiuno est. Verū nonnunquā etiam post exiguum cibum sumptū, denuō lauandum. Aegrē nanq; humedatur affectio. Decoctio autē fenogræci detergitur, uel betarū, uel furfurum, uel maluæ syluestris & satiuæ, uel ptisanæ. Lomētum ad hæc, farine uel lupini, uel myrobalanorum, uel peponatum præparatū ualent. At si uitium uetustatem senserit, lauacris consimiliter indulgēdū. Fotus ex decocto saluicæ, myricæ, mercurialis, origani, pulegi, baccarū lauri, cucumeris syluestris radicis, capparis, lixiuia stillatitia, & muria acida cōmendantur. Deinde nitro arido consperguntur, uel cum fece aceti, uel eo quod accipit nitri spumæ sextariū, thuris, sulphuris ignē non experti, uniuscuiusq; librā, cretæ cimoliæ libram dimidiam. Vel illud: Spumæ nitri, sulphuris uiui, alcyonij cremati, æquæ portiones, quib. uel cum prædicto decocto aliquo utere. Quod si uidetur, ueratro etiā arido cōsperge, sine pingui. Illinitur autem cum oxelæo pedicularia herba trita, uel sulphur, uel sandaracha, uel simul omnia: uel sinapi cū myrobalani succo expresso, et oxelæo. Vel cochleis combustis læuigatisq; in melle, uel rumicis radicibus, uel ex iisdem rebus confectis smegmatis, uel uti paulo antè in capite de Elephante proditum est, uel quibusdā pforæ consecratis. Quod si partes bulcerib. cōstiterint, parygro, uel ea quæ diapompholygos

nomen

nomen obtinuit, compositione utendum: uel ceræ uncia liquefacta, in cyprini cyatho, cui sulphuris uiui uncia admixta sit.

Aliud contra pruritus: Nucum iuglandium rancidarum unciam, sulphuris tantundē, apij succo contritis, utere in balneo, abundē membra perfricās. Hoc unū auxiliū satis plerisq; scabiosis, & alijs pruriginosis præstitit. Apiū item per se, uiride, contusum, & affricatū in balneo, magnificā opem contulit. Pari quoq; modo perdicū, & acerna resina cum rosaceo dissoluta, ac illita iuuat. Aliud: oryzæ purgatæ atq; admodum albæ quadrantē tusum, incerniculoq; traiectū, aceto acerrimo, donec strigmentorū spissitudinem induat, dissolue: adiecitq; læuigati sulphuris uiui uncia, pulchrè cōfusa, in balneo utere, diu perfricans. Verū in his qui excrementorū nimia multitudine obruti sunt, æquis illorū portionibus commixtis, longē præstantius reddetur subsidium.

De Leuca. Cap. 5.

Leuce, uutiligo à quibusdā appellata, coloris quædam cutis ad candidius immutatio est, ex uiscida glutinosaq; pituita proueniēs. Quoniā uerò non quælibet leuce remedijs illinitur, notas ipsius istiusmodi censeo: Acui in superficie leucen compungito, ita tamen ne ultra cutē penetret: si sanguis promana uerit, curabilis est: si nō lacteus humor, conclamata existit. Vel laneo panniculo asperiore ipsam perfricabis: si rubicundior euaserit, curationē recipit: si uerò in eodē cutis colore permanferit, remedijs nullus est locus. Et quæ plura corporis loca occupauit leuce, magis desperata est, quàm quæ pauca fœderit: & inueteratæ potius quàm recentes, curā respuere putādum est. Nonnulli quidē ferro candenti leucen exurēdam autuma uerunt, & hoc solum ceu compendiū sanationis probauerunt. Alij adustionē dolorosam, atq; ex hac cicatricem nō minus ac leuce indecorā fore arbitrati, medicamentis crustam inducentibus usi sunt: cuiusmodi perhibent, quæ cicatricē concolorem efficiunt. Alij uerò repudiātes horū uim perdifficilē, tincturis

uti maluerūt, impostura magis, quae circa haec accidit, quam utilitatis rationē habētes: qui sanē reliquis omnib. magis sunt auersandi, propterea quod statim reuertitur affectio. Utendū igitur subiectis est remedijs: Adarca, seminis roris marini, sulphuris uiui, æquis portionib. singulatim tussis, et priuatim cretis: deinde simul cū aceto sat multis diebus læuigatis, in sole illi nito, nō cōfertim, ne cutis exbulceretur: procedēte uerō tēpore exiguū quippiā hellebori, gallæq; tantundē admisceto. Aliud: Fici atræ uirgultis in aceto maceratis et cōtritīs, nitri spumā, sulphur uiuū, myricæ fructus, æquali cuiusq; pōdere adȳcito: ubi locū prius nitro defricaueris, illinito et insolato, obseruās ne exbulceratio inde cōsequatur. Cæterū Archigenes folijs fici, calcis quantū satis est cōmiscendo, similiter usus est: Vel helleboro, inquit, cādidō fricatas leucas quoad sudādo reliquo corpori cōcolorē speciē induant, sinopide aut mediade illinito: uel acubus trāfixis pūctas, donec cruore inficiātur, sinopide cū aceto perūgito: uel absterfis prius locis rectē fici succo, ut dictū est, in sole illinito, et folijs eiusdē aliquandiu obnixē cōfricato.

De alphis candidis & atris. Cap. 6.

Alphorum generatio eiusdem speciei cum leucis est: uerū hae altius penetrando cutē immutant, ita ut pili etiam consimiles sibi enascantur. Alphi uerō summā cutem deturpant, licet ipsi quoq; si in uetustatē incident, profundius recedant, ut pili in eis albi, ob subiectū humorem procreentur. Ex pituita namq; cādidi, nigri uerō ex atræ bilis humore nascūtur. Communiter igitur utrisq; cōgruit calx abluta, aqua dissoluta, uel dracunculi radix cū aceto cataplasmatīs modō imposita. Pari item modo ueratrū utrunq;: Lupinorum amarorū elixatio adpersa, ipsorūq; farina ex aceto melleūe acetofo impaēt: radices itidē capparis cortex cum aceto, lilij radix cum melle, cepa cum aceto in sole illita, crocodili terrestris oletū, itidem et finus sturnorū, cum oryzā modō comederint, tosta q; sepiæ testæ. Compositum uerō hoc efficax est: Alcyonij, nitri, uniusq; cuiusq;

cuiusq; uncia binæ: ueratri candidi, sulphuris ignem non experti, singulorū uncia: nonnulli uerò uini fecem concrematam adhibuerūt. Aliter: Sulphuris uiui, nitri spumæ, singulorum drach. quatuor, seminis roris marini grana septem, læuigato cum aceto. sed non nisi alphon perunge. nihil inquinans membrum incolume, are factum uerò aqua gelida dilue. Aliter: Farinæ lupini, buccinorum, & nitri, uniuscuiusq; chœnix, ueratri albi drac. octo, arido locum deterge. Aliter: Erui farinæ libras duas, seminis crucæ, amygdalorū amarorum, cucumeris agrestis radicis, singulorū librā, œnomelite pariter eliquata, alphis illinito, & tempore interposito cum spongia abstergito. Proficit idem aduersus lentigines, asperam & discolorē ceu à sole cutem, uaros, summāq; cutis maculas.

Ad alpos candidos experientia comprobata.

Sulphuris uiui sextarij duo, calcis uiuæ albæ triens, albores ouorū quinq; olei nardini et aceti aliquātulū: sulphur ante omnia læuigatur, deinde ipsi nardinū oleum superinijcitur, ac deinde cōteritur, ab hoc acetū instillatur, rursusq; diluitur. Calcē uerò priuatim lotā semel, bis, et ter sulphuri immittimus, undē cū ouorū albugine, et rursus læuigamus, coactūq; liquore effundimus. Modicū autē relinquētes, quo illini ungentū queat, atq; ita cum opus est utimur. Aliud, quod ad Archigenē refertur: Sulphure ignē nō experto, folijs fici aridis, aphronitro, alcyonio, creta cimolia, myrto cum aceto utere. Aliud Archigenis: Fici foliorū exiccatorū in umbra, sulphuris, aluminis, æquas partes cum aceto illinito. Vel foliorū fici drach. quatuor, nitri duæ, alcyonijs tosti totidē, aceto in balneis illiniatur. propriē uerò alpos nigros efficaciter discutit sandarachā, cum parte sulphuris dimidiata: præfricata uerò cute nitro, sub sole perūge. Ceterū cādidos alpos atramēti sutorij, æruginis, æqua portio, nitri duplicata absq; pinguedine exterit. Vel seminis roris marini, sulphuris ignem nō experti, adarces, par modus cōtritus, cum aceto infricatur et illinitur. Vbi uerò aruerit, la-

uato cutem perfricans, quod medēdis etiam leucis efficax est.

De stigmati, ex decretis Archigenis. Cap. 7.

Stigmata curabis si lotij feces quæ matula adhærēt, aceto primo cum aceto superinducas. Vel calcis uiuæ partē unam, nitri assati flauī dimidiū cum aqua sub sole inungito. Vbi uerò locum exulcerauerit, perinde atq; bulcus ad cicatricē perducito. Verum enim uero Crito medicus iussit, confricatæ nitro prius cuti resinam terebinthinā illini: deinde linamentis colligatam sex diebus relinqui, septima die solui, acūq; stigmata compungi: breuiq; tēporis spacio interiecto, sanguinem fluentem spongia detergi, tenui sale locum confricari: tum ad dies quinque medicamentū inponi, quod habet thuris, nitri, calcis uiuæ, ceræ singulorū drach. quatuor, mellis octo. Quod ubi solueris, nigrū in medicamento deprehendes. Aliud unguentum: Piperis drach. duas, rutæ quatuor, sandarachæ tantundē, auripigmenti drachmam, mellis quantum satis est illinito, loco prius nitro confricato: atq; alijs perinde atq; in superiore peractis, per tridū soluito, nigroreq; deterso rursus oblinito. Tollit etenim, inquit, uiginti diebus aded exactē, ut neq; exulcerationem, neq; cicatricem relinquat. Aliud, quod Criticum appellatur: Thuris drach. quatuor, nitri duæ, atramenti sutorij quatuor, ceræ sex, piperis, calcis, thapsiæ, singulorum drach. tres, auripigmenti sesquidrachma, sandarachæ drach. tres, mellis quantū satis est, haud aliter atq; superiore utitor. Oribasius affirmat, batrachium illitum, uel capparis folia stigmata expungere. At si altius radicibus actis non tollatur, sed obiter cuti insederint, crusta gelido cauteri inducta exterminabis.

De papulis, quæ exanthemata uocant. Cap. 8.

Papularum eruptiones, quæ Græcè exanthemata dicuntur, ex densatis in cute crassis humoribus, magisq; ubi densior pellicula superficies extiterit, propullulant. In quibus itaq; si profundius humorū subsedit copia, ante omnia purgare expedit. Nam si quis id facere superfederit, tentaueritq; prius dissecare,

circumfusam, quamuis impleatur. finito. Conniuente uulnere
 pustula denuo cōpungatur, consimiliq; modo exprimatur. ser-
 uandaq; ut prius cutis ambiēs, donec id quod sub ipsa exbulce-
 ratum est, in cicatricem cōtrahatur. Quocirca priusquam pus-
 tula aperiātur, lentem elixam, cum aqua eliquatam illinito.
 Aut mali Punici frōdes cinere calido tepesactis applicato, lo-
 cosq; attingito. Quōd si fiat eruptio, et bulcus oriatur, adipem
 suillum liquefacito, spumamq; argenti eliquatam admisceto,
 et in linteolum impaciam superimponito. Vel lily radicem
 coctam in aqua, tritamq; cum cerota superinducito.

Ad epinyctidas & phlyctēnas.

Spuma argenti, sulphurq; uiuum, & quis portionibus cum
 aceto, et myrtus laeuigata, strigmenti illinitione, adiecto oleo
 et uino applicatur. Cōducit ad hēc, et ad calidas eruptiones,
 et papulas quae ab ebulliente feruore perizemata dicuntur, et
 mandātia capitis ulcera, incipientesq; furunculos, et exustio-
 nes, et plumbagine et ex ouis confectum medicamentum.

Ad ambusta. Cap. ii.

Ambusta igni modicē abstergētia medicamēta efflagitant,
 ita quidem, ut eadem ipsa neq; excellenter calfaciant, neq;
 admodum refrigerent. Terra proinde Chia, Cimolia, et Cre-
 tica, omnisq; terra non pōderosa circūlita aceto haud ita acri,
 aut aqua admixta egregiē proficit, pustulasq; exoriri prohi-
 bet. Idē sanē praestat ouum candidū crudū integrū quamprī-
 mum impositū, uellere molliore exceptum: mediocriter nanq;
 perfrigerat, et absq; morſu exiccat. Scriptorio adhēc atra-
 mento igne uſta perunge, uel lhus aqua maceratū, uel lentē eli-
 xam et laeuigatā, uel eruum cataplasmatīs modo impingito.
 Cāterū ad exustiones feruētis aquae, priusquam pustula exo-
 riātur, oliuarū salsarū aqua cōtinuē cōſpergito: ipsasq; oliuas
 sale cōditas, cū polēta eliquatas inducito: uel alumē ſciſile cū
 aceto tritū illinito: uel taurinū fel cum aqua permulta lique-
 factam circūlinito: uel lixiuū stillatitū garo uel muria super-
 fundito; aut bulbos lilyorū, uel hyacinthorū, uel narcissorum

cu

cum rosaceo tritos, strigmēti balneorum crassitudine inducā,
illinito. Cæterum Marcellus hoc modo compositū tradit: Lin
teolum melle irrigatū, hordeiꝑ; succo imbutū cōburito, et cine
ris drach. octo immittito, cerussæ quatuor, butyri octo, ceræ,
adipis caprilli, rosacei, cuiusq; sedecim. Sed medendis pustulis
excitatis iam, Rhun et farinā hordeaceā cum melle læuigata
impingito. Vel calcē uiuā cerotæ confundito, & panniculo il
litam superimponito. Medicamentū cognomēto Sphæron ad
hæc est utile. loca exulcerata porris læuigatis obducuntur
uel portulaca trita cum polenta, uel sterqus columbinū linteo
inuolutū exurito, oleoꝑ; dissoluens, cinere ipsius utere. Mirum
sanē quā præsētaneū perhibeatur: Pini aut picæ cortex,
seu adiantū aridum friatū, myrti' ue folia cōcremata, et in le
uorem contrita insperguntur. Conducunt autē hæc etiam sin
gula, si cū cera concinrentur. Necnon quod accipit rubeæ an
chusæ radicis aridæ, contusæ, & friatæ uncias quatuor, ceræ
cādidæ nouē, rosacei octodecim, postremū cōpositio ex cerussa
cum momēto medullæ ceruinæ, exquisitū præstat remedium.

Ad eos qui uapulauerunt. Cap. 12.

Medendis flagris, cerussæ, et spumæ argēti æquas partes,
ceræ quadruplū, cum susino aut rosaceo, in emplastri mo
dum imponito. Primo die lilino tantū seorsim utitor, uel cro
ci, tragacanthæ, singulorū drachma, ouoꝑ; integro absq; eruis
unita percussis inducito. Pellis præterea ouis recens excoriat
ta calida circumposita, reliquis omnibus efficacius naturalis
dici spacio cæsis medetur.

Quomodo pili ambustis renascantur. Cap. 13.

Capilli ambustis renascuntur, si folia ficus in olla cremata
cum cerato emplastri modo imposueris: uel caricæ drach.
octo, amaraci drachmam, læuigatis cum oleo ad cerati consi
stentiam utere. Aut ramentorū lapidis drachmas centū, squa
mule æris decem cum aqua in pastillos subactas reconde: &
cum usus poscet, partē unam cum cerotæ partibus octo dilue.

Ad

Ad abraſa. Cap. 14.

SI cutis aliqua corporis parte auellitur, & ſuperficies ipſius
hulceribus cōſtātatur, primis diebus uel uino, uel aceto, aci-
dāue muria conſtringito; ſequentibus autē ad inducendā cica-
tricem, liparis & ex albis emplaſtris tripheris utitor. Maxi-
mē uerō iuuat, quod ceruſſa recipit partē unam, guttae ammo-
niacae dimidiā, myrtei quantum ſatis; gutta ammoniacae aqua
læuigata, ceruſſam admiſce, myrtinū ſuperinfundēs, et utere
lipara, aut ſcobe lapidū, quod marmorarij deradūt, ſquamam
aris admiſcens, & myrteo conterens utitor; uel cretam cimo-
liam, & argenti ſpumam cum uino & ricinino, & myrteo
læuigata uſurpato.

Ad paraſyrmata, intertrigines, hulcera inueterata,
& ſeniles mollesq; cuticulas.

Spuma argenti chryſitidis drachmae quinquaginta, cerae
uiginti, reſinae aridae ex picea duodecim, olei cyathus unus &
dimidiatus. Argēti ſpumā & oleū ubi coxeris, reliqua inſyce,
rudiculaq; cōmotis, & in pila emollitis utere. Abraſam uerō
cutem hulceribus amputare non conuenit, ſed inducere reme-
dium. coit nanq; & conglutinatur hoc pacto, etiā ſi nigreſcat.
Denudata uerō carne, ægrē cicatrix cōtrahitur, uellicatione
et ſordibus infeſtato hulcere. Cæterū ab inflāmatione apo-
ſyrmata conſeruat rhu rubrum cum melle illitum, uel iunci
rotundi odorati coma cremata, & cum melle impoſita.

Ad Abraſa, & flagellata, & contuſiones articulorum,
dolorem ſedans medicamentum.

Spuma argenti, ceruſſa, uniuſcuiuſq; ſextans, cerae ſeli-
bra, olei puri uel roſacei ſeſquilibra, amyli ſextās. Prodeſt ad
hec eadem; Pelarium ex recremento argenti, & medicamen-
to ex ouis confeſto.

De formicis & uerrucis. Cap. 15.

VTrūq; uitium exigua quædā in cute excreſcētia, calloſa,
et magna ex parte notāda eſt. Hoc uerō dirimūtur disci-
mines

mine: Formica quidem latiore basi seßiliq; est, in scalpendo & attritu simile morfiunculis formicæ sensum adferēs. Verruca uerò, quam acrochordona nuncupant, basim habet angustam ac pensile, ita ut chordæ nexu suspensa pendere uideatur. Hos sanè tumores è medio tollunt elateriū cum sale impactum: thuris item lachrymæ cum aceto, grossi cum aceto & farina, nitroq; succus fici illitus, itidē thymalli, smaridisk; caput salsum, crematū. Aerugo itē cum sulphure igne intacto cōbusta, ocymi folia cum atramēto sutorio, quod ex palmitibus etiam dum uiridibus cōbustis destillat, retrimētū ouium cum aceto, birci fel illitū: herbæ solaris maioris fructus, cū uino cataplasmate inductus: ruta cū nitro et pipere, nitrū cum lotio puerulū uenerē nō experti, sterqus bouis armētarij in aceto adhibitū.

De Ganglio. Cap. 16.

G Anglion, neruorum est concretio ex percussu, uel labore proueniēs, in plerisq; corporis quidē partibus, præsertim uerò motui consecratis, puta manūū extremis, et pedum plantis. In quo utiq; malo Archigenes iubet calcē uiuā cum adipe anserino & terebinthina imponi, crebrò tamen ex achate lapide medicamento utitur. Oribasius uerò usus est illo, quod habet cerussæ, resinæ pineæ, olei ueteris, uniuscuiusq; unciam, guttæ ammoniacæ thymiamatis, galbani, singulorū unciam, ceræ trientem. Aut plumbeum orbiculū crassiore, uertebæ instar, magnitudine ganglion excedentē, imponi & alligari præcipit: porderē nanq; suo ipsum longo tempore dissoluit. Et nos illo quoq; utimur.

De inflammatione. Cap. 17:

Q Voslibet calidos cū dolore & ardore tumores, phlegmonas Græci, Latini inflammationes appellare consueuerunt. Caterū pro diuersitate materiæ ipsos efficientis, horum quoq; differentiā euariari perhibent. Sanguine nanq; bono, et moderata crassitudine in partē aliquā confertim subito confluente, & ob nimiam copiam inibi impacta, peculiaris cognominē

menti inflammationem excitari asserunt. Bile uerò flaua in ali
qua corporis parte hærere, herpeta uocât. At ubi sanguis unâ
cum bile flaua simul influxerit, erysipelata cōstituit. Cū uerò
influens sanguis calidus admodū fuerit, atq; crassus, carbuncu
los parere solet. Ab ea igitur inflammatione quæ propriè pble
gmone appellatur, quæq; in permulis usque accidit, inchoan
dū. Ba tumor quidā est rubēs cū dolore multo, renitens tactui,
calēs q; , ex sanguine, ceu relatum est, non prauo oriū habēs, quī
aliquādo ex uniuerſa corporis mole fertur: nōnunquā in aliā
quam modò particulā nimīū incūbit, ita ut in uasis nō cōtinea
tur, sed roris instar in media partiū spacia uacua excidat. Vul
nerationib. adhæt, ruptionib. itē, bulcerib; q;, et alijs complie
ribus, quæ foris ingruunt causis hæc accidit affectio. Cum igi
tur pars corporis aliqua subitō absq; præcedēte causa euidentē
inflāmatur, toto uerò corpore in partē contagiū mittēte, uni
uersum tū corpus sanguinis detractione leuandū est: mēbrum
aut inflāmatum irrigandū, et illinitione consolandū, non calo
rificis & humectātibus, sed humorū illuuiē repellentib. auxi
lijs, quodq; in loco hæret affectio, euacuantibus. Cataplasmatīs
igitur modo semperuiuū, & mali Punici corticē in uino deco
ctum, ceramq; cum polenta subactā impingito. Cum dolor ue
hemēs nullus excruciat, hoc fuerit et similibus utendū. Maiori
uerò cum dolore parte fluxu infestata, ne tum quidem calidā
aquam aut oleū adhibeto, uel quæ ex farina cōtexuntur cata
plasmata: hostilia nanq; hæc rheumaticis affectionibus sunt.
Mitiganda uerò doloris uehementia medicamētō ex passo, ex
rosaceo, ceraq; exigua, uelleribus sordidis œsypi quāmpluri
mum cōtinētibus, æstate quidē frigida, hyeme uerò tepida ex
cipiuntur et applicantur: ita sanē, ut superiores affectarū par
tium loci spōgia uino adstringēte et austero, siue posca gelida
imbuta cōprehendātur. Admiscēda porrò sunt cataplasmatīs
ad eā provinciā utiles herbæ. Parietaria idcirco omni inflam
mationi accōmodata est, cū intra exordia, tum etiā in incre
mento:

mento: Glaucium non dissimiliter, atriplex, et malua, lactuca item, et cucurbita, calidis illitæ. Valēt etiam tribuli utriq; ad eas quæ ex destillationibus oriūtur inflāmationes. Brassica uerò ad tumores facit indurescētes. Cæterū cum immutatio oboritur, purisq; nihil subsidet, ex chalcitide emplastro curabis, uel aliquibus eiusdē generis defluxionib. cōsecratis. Purā porro lanā uino imbutā austero, extrinsecus medicamēto superacōmodabis. Medebere itaq; hoc modo his qui ad fluxū referuntur inflāmationibus. At quæ occasione cuidā adscribuntur, huc meditando eas, calfaciendoq; non lædes: etsi quādo res ususq; feret, scarificare easdē haud erit absurdū. Verū si eas quæ ex fluxu originē trahūt inflāmationes scalpello incideris, præsertim ab initio, auctor ingētis cuiuspiā incōmodi languēti fueris.

De exterioribus corporis abscessibus. Cap. 18.

Qvòd si tibi suppurationem prohiberi non posse uideatur, panē in hydrelæo coctū cataplasmate impingito: uel hordeaceam farinā cōpari modo præparatā. Fouetur mēbrum aqua alibæ radicis incoctæ. At si tumor ægrè in suppurationem perducatur, aut cute imperspirabili difficulter distrahatur, cataplasmate ex ficis siccatis utere. Oportet autem dulces et præpingues ficus elixas eliquari in aqua, et aquā mellis instar tenuis efficere, farināq; hordei inycere: et si dissipetur quidē tumor, sed minus quā opus sit, cum ficis hyssopum aut origanum coquito. Si quando uehementius exiccare uolueris, salē decoctioni immittito. Exquisita autē diligētia attendendū, ne propter uehementiorem ariditatem membrū obdurescat. Si quando eiusmodi quippiā conspexeris, aqua cucumeris syluestris radicē, aut althææ, aut bryoniæ decoquito. Efficacior autem, et in discutiēdo uehemētior dracūculi radix est. Ipsum ad hæc ex dracūculo medicamētū ualidius eiusmodi uitia disycit. Interdum igitur hunc solum decoquas, aliquando uerò etiam ficus aridas inycias. Farinam quoq; cū adipe. Et oleū anethinē discutiendi uim habet, humoresq; crudos ac tumores incoctos dissipat,

disipat, & maturat. Pix quoq; duriores & crudos tumores uniuersos indita cataplasmatibus concoquit, & præcipuè liquida. Medicamentum compositum, quod iam concocti abscessus extirpantur, ita ut in splenio pus subinde deprehendatur, incocti uerò exactè discutiuntur: Lapidis pyritidis drachmæ duodecim, guttæ ammoniacæ læuigatæ tantundem, fabaceæ farinæ denarij sex: pice liquida excipiantur, & alutæ illita imponantur. Sed spleniū ne tollas, quoad ultro decidat. Remedium tamen illud baud ita diu antè est præparandum: arefit enim ocysimè. Si uerò ob hæc tumor nihil distrahatur, pus autem subiaceat, parte scalpello diuisa, id ipsum euacuandum. Vitari deinceps conuenit, ne oleū quis aut aquam applicet: uerū si abluendū interim bulcus fuerit, aqua mulsa poscāq; ac uino, necnon mulso utendū. Et si inflammationem experitur, è lēte cataplasma inijcimus: sin nulla adsit inflāmatio, aliorū quippe medicamentorū in istiusmodi sectionibus forma emplastri usurpemus. Neq; etiam minus quod conflatur ex chalcitide. Spongiam insuper, aut lanā uino imbutam acerbo superimponere. Vulneri autem nullum pinguetudinem præferens medicamentum admoue: cuius notæ tetrapharmacum est. exactius nanq; gliscit arefacere.

Quæ rumpant abscessus:

Quoniam autē nonnulli ferro abscessus disseccari non tolerant, usu etiā medicamentorum extrahentiū & disrumpentiū dissectionem moliemur: narcissi radicem in læuorem tritam, et in mulsa cum irino coctā illinito. Vel mollem arundinis radicula cum melle minutim contere. Quod si dura fuerit, in aqua mulsa prius decoquito: uel aristolochiā cum melle cataplasmatibus modo superinducito. Disrumpūt præterea picis aridæ, propolis Creticæ æquales portiuncule, et cicatricē inducunt.

Dionysia medendis abscessibus admirandæ uirtutis, & ad mamillas & bubones, extrahendi potentia regnans, per abditos meatus distrahens.

Olei ueteris, aquæ, uniuscuiusq; libra. Hydrelæum illud decoquit,

coquito, mox spumæ nitri uncias sex immittito, misyos unciam unam, seu duas. Decoquantur quousq; recrementis per cocturam separatis inquinandi finem fecerint: deinde adijciatur mannæ, thuris, ceræ, terebinthinæ, singulorum selibra.

Ad neruorum abscessus.

Ceræ, colophonice, butyri, uniuscuiusq; libra: picis aridæ mellis, singulorū libræ duæ & semis, æruginis quadrās, uiscē quantum satis est. Aliud epispasticum: Gutte ammoniacæ thymiamatis uncias sex, ceræ, terebinthinæ, uniuscuiusq; uncias quatuor, sulphuris igne intacti uncias treis, nitri tantundem: et Smelion quod uocant medicamentū, & diascordon, niolenter ea quæ iam mutata sunt, disrumpūt. Id etiam quod ē cremore seminis lini fit, discutit, et transmutat, rumpitq; commodissimè. Sed ad mansuetiora apostemata etiam quæ contra abscessus, secundum atq; post aures dicta sunt, expediunt phar maca. Hæc igitur super demanante ex inflammatione abscessu. Galenus autē asserit abscessum nonnunquā, etiam si nulla inflammatio præcesserit, posse cōsistere, quæ ex sanguine inculpato originē trahit. Cōfestim nanq; ab initio, inquit, per aliū quempiam humorē excoiatur tēporis spacio subiectæ partes adhærētes, & abscedunt, & ob id sectæ quoq; omnigenam humorum & solidorū corporum intra sese speciem habere inueniuntur. Olet enim et lotio, grumoq; atq; humori mellis speciem præferenti, & mucoso, & ossibus, unguibusq;, & capillis, in abscessibus similia reperiuntur corpora: certè & animalcula non rarò deprehensa sunt, cundis ferè quæ ex carie nascuntur quàm similima. Porro lapidibus et harenis, testis, lignis, carbonibus, argillæ, sordiū strigmēto, amurcæ, & feci deniq; (infit) cōparia, in abscessibus præsertim inueteratis ex humorū decubitu conflatur. Proinde absolutior apostematum extra corpus significatio quàm compendiosissimè dicenda: & eorū quæ adhibitis remedijs dissipari nequeunt. Est igitur abscessus carniū, carnosarūque partiū, uerbi causa, musculo

X

rum

rum, uenarum, & arteriarum corruptio, mutatioque. Horum alij quidem tunica continentur, ueluti atheromata, steomata, melicerides. Alij uero tunica destituuntur, generis uocabulo nomenclaturam sortiti, de quibus in praesens uerba facimus. Abscessus suum generationem magna ex parte inflammatio praecedat, de qua disputauimus. Caeterum quandoque confestim etiam a principio, ceu iam pridem diximus, oritur abscessus. Abscessus comitantur ardor uehemens loci, spaciosus tumor, rubicundior solito, & durus, cum dolore punitiuo, pulsu, & grauitate, ita ut uideatur partem aliquid suspēdi. Quod si locus princeps fuerit, febris quoque inuadit, & horror inordinatus, & per noctem impensius dolent, ac febriunt. Bubo adhaec nonnunquam proximis in glandulis exurgit. Cum autem consummatur abscessus, magna ex parte minuitur: stimuli uero pruriginosi obueniunt, & torpere nonnihil incipiunt, tumorque magis in apicem mucronatam fastigiatur, tangenti lenis cedensque, & superficies in acumine detrahitur. Dico autem haec de ijs qui foras rumpuntur. Siquidem igitur uel medicamentis, aut sua sponte rumpantur, emmoto curentur, particula iam euacuata pure. Sin contra, abscessus, eo quem in chirurgicis praescribemus modo, aperiendus est.

De gangraena & syderatione. Cap. 19.

Quando inflammatio neque distrahitur, neque in pus conuertitur, frequenter in gangraenam & syderationem, quam sphacelon nuncupant, commutatur: de quibus in praesentiarum agemus. Gangraenas quidem esse dixerunt, cum ob inflammationis amplitudinem pars aliqua mortificatur: neque iam consummatur, sed etiam dum confuit, ita cognominant. Huius affectionis tanta uis est, ut nisi quispiam rupta omni mora, praesentissimas tulerit suppetias, pars afflicta promptissime mortis habitum contrahat, & hominem interimat. Cum uero exade sensu carere locus coeperit, non amplius morbum gangraenam, sed iam syderationem nominant. Accidit autem haec labes ipsis etiam ossibus, cum eisdem circumfusa caro, deprauata gignens saniem, eadem madefecerit.

& cor.

Et corruerit. Cum igitur membrum ex toto interierit, quāvis
 viciſſimē ad sanam uſq; partē attiguam eſt amputandū. Cateo-
 rum in gangrænæ curatione, ſanguis ex male affecta parte,
 quā fieri poteſt, euacuandus eſt. aut enim uenā incifa uittatus
 ſanguis, cum in eadē parte uena turgens conſpiciatur, exhau-
 riendus: aut tota corporis cute pluribus et altis plagis diſſecta.
 remedium putridis dicatū accommodari debet, cuius ceræ eſt,
 farina cruina, aut loleacea, aut fabacea ex mulſo acetoso. Si
 quis harū uires intendere deſideret, ſalem immittat, uel paſtil-
 lum Androniū, aut id genus aliquē. Conferunt et gangrænīs
 nuces peruetuſtæ. Perpurgat uerò ipſas cortex ſeu urtica, cre-
 morq; tithymalli, in loco ac tēpore modoq; exhibitus. Cōducit
 ipſis irrigatio ex lupinorū amarorum decocto. Nonnulli poſt
 putridæ partis præciſionē, tutioris exciſionis gratia, cauterijs
 adhibitis mali radicē exurunt, in quibus ſale cum porro uten-
 dum. Poſtremo ad cruſtas et ſquamulas dimouēdas cataplaſ-
 ma adglutinandū ex pane, uel hordeacea, uel triticea farina in
 hydrelæo decocta. Et cephalico puluere cum melle, tetraphar-
 maco item, et Macedonico quod uocāt, utendū. Probè itidem
 cruſtas detrahit panis cū apio læuigatus, eliquatūq; aut ocy-
 mo, uel iris, aut panax, aut ariſtolochia, acorūmue cum melle,
 uel etiam rhus. Belle etiā cruſtas abducit Machæronis medi-
 camentū. Et Iſis, linamentaq; conſcripta ex melle. Sed in cor-
 poribus delicatis ſufficit farina erui cum melle.

Ad gangrænas, ex Oribaffo.

Rubiginis rafilis, rubricæ, aluminis ſciſſi, æquas ſingulo-
 rum portiones aqua liquefactas, gangrænīs inungito circum-
 qua; ſcarificatis. Loleacea itē farina raphano et ſale cata-
 plaſmatis modo impaſta gangrænas remouet, quādoq; etiam
 cum aceto: Vua paſſa acinīs demptis cum cortice adiecto ſale
 et oxymelite, idem præſtat. Iuglandium item medulla, myr-
 tiq; folia in uino elixa, et detrita cum melle. Raphanus cum
 aceto cruſtas ad os uſq; eſfringit.

Y 2 D6

Flaura bilis nullo confusa humore excreta, in quampiã corpore
 poris partē decumbens, herpetem procreat. Qui si essentia
 sua crassior & maioris accrementi fuerit, altius totā, usq; ad
 subiectam carnē, exulcerat cutem: & appellatur herpes exa-
 edens. Sin tenuior, minoreq; acrimonia, & calida fuerit mate-
 ries, exiguas bullas, paruasq; pustulas in summa cutis superfi-
 cie milij seminibus persimiles excitat. Miliaris herpes à simi-
 litudine nuncupatur: quanquam Oribasij opinione, mixta fla-
 uæ bili pituita, miliarem herpetem constituit. Vniuerso igitur
 corpore felagio prius medicamine exinanito, locis deinceps
 languore posseßis, frigorigica, siccificaq; applicantur medica-
 menta: intra principia quidē capreoli uitis, rubi & plantagi-
 nis folia, deinde lēticula his admiscetur interim, mel item atq;
 polenta, & quod traditū est ad inflammationes ex destillatio-
 ne, cataplasma, absq; semper uiuo. Exulceratis uerò locis pa-
 stillos passo, uinōue tenui et adstringente, nō uetere, uel posca
 aquosa subactos illinito, & glaucium, eiq; similia ex aqua. Si
 nihil proficit, aceto temperatū adhibebis: succo autē plantagi-
 nis, aut solani, uinoq; diluta magnificē opitulatur: uel semen li-
 ni arefactū, inq; uino & oleo elixum, in pollinē tritum super
 inducito: uel cretam cimoliam solani succo dilutā inūgito: uel
 spumæ argenti trientē, & porri cremoris cyathos septem, be-
 tæq; succi tantundē, læuigata illinito. Vetusis iam hūlceribus
 pastillus Musæ & Andronis accōmodus est. Aliud ad am-
 pullosum herpeta: Recrementum plumbi in uino adstringēte
 tritum inducitur, superinducantur cataplasmatibus modo folia
 betæ in uino decocta, uel ceræ uncia quatuor, myrtei sedecim,
 recrementi plumbi quatuor, uino diluta illiniātur. Hūlcere ue-
 rò serpente represso, ex recremēto cerato utere, uel lēticulam
 elixam cum melle adglutinato. Cæterum ad herpeta sub cute,
 recrementū plūbi, rutæ contritæ succo excipitur, uel ceratum
 myrticum rutæ loco. Aliud: Lanæ ueteris succida, thedacco
 ligno

ligno crematæ drach. duodecim cum dimidia, ceræ uiginti
quinque, stercoris plumbi oxybaphi semissem, adipis caprilli
depurati, & aqua abluti drach. uigintiquinq; myrtini uncias
quinq;. Aliud ad herpetas acriter depascentes: Corticum
dulcis mali Punici, spumæ argenti, uniuscuiusq; drach. sex, la
næ succidæ thedaceo ligno circumplicatæ & crematæ treis,
ceræ duodecim, cerussæ octo, thuris, aluminis scissilis, cuiusq;
drachmam, uino & oleo myrtino excipe.

De igne sacro, erysipelate' ue. Cap. 21.

GAleno autore, tumor ex feruente tenuiq; sanguine excita
tus, priuatim & propriè erysipelas uocitatur: ex utrisq;
sanguine pariter & bile creatus, ex dominante in mixtura hu
more nomen obtinuit. Sanguine nanq; iustum naturæ modum
excedente inflammationē erysipelaceam: flaua autē bile præ
pollētē, erysipelas inflammatus nuncupant. Cōmunius autem,
tumor ē sanguine biliq; feruētioribus factis cōflatus, plurima
ex parte erysipelas nūcupatur. Verū utro modo dicas, nihil
adeo ad opis ferēdæ usum interest. Id uerò ignorandū non est,
difficiliora esse erysipelata, quæ caput inuadunt: proinde nisi
efficaciore subueniatur adminiculo, languentes interdū suffo
cant. Quamobrem ab initio confestim simul atq; apparuerit,
uenam in cubito præsertim humeralē aperi: si ea non compa
reat, obuiam. Sin uerò sanguinis detractiōē quippiam uetet,
medicamento flauā bilem ducēte corpus euacuabimus, quo in
cæterarum etiam partiū erysipelatibus utere, uel maioris effi
caciæ clysteribus. Erysipelataq; perūgito, his quæ influētē
materiam frigorifica uirtute retundūt: acruatā uerò modicē
calfacientium & humedantiū beneficio dissipent, priusquam
particula liuorē aut nigrorē contrahat. Cura perpetuò adhi
bita, ut liquidis perungantur, sic ut crebrius cōmutentur, prio
ribus per spongas probè tinctas, ablutis: multa nanq; & fer
uida membri incensio ocysimè in uaporem erumpens, eadem
exiccat. Initio itaq; erysipelata, ut dixi, refrigerantia cum hu

Y 3

miditate

miditate absq; adstrictione indigent. Cuius classis censentur, semperuiuum, portulaca, herba pulicaris, lenticula palustris, seris, cucurbita, solani, herba apollinaris, lactuca, glaucium, aliquando etiam apium, ramniq; folia cum per se, tum addito pane cataplasmatibus modo impacta: necnon cerotum ex aqua gelida. Admiscetur uero his opij nonnihil, succiq; papaueris, cicuta, et mandragora. Concinnenturq; composita medicamenta, fiatq; cerotum ex cera de albata, rosacei quadruplo admixto ex oleo omphacino absq; sale facto. His in pila emollitis, aquae frigidae quantum suscipere potest, superfunditur. Quod si aceti tenuis et cadiidi nonnihil admiscueris, praestantius medicamentum conficies. Iam polenta quoq; cum herbis aliquot praedictis refrigerantibus, frigoris quantum res postulat, inducit. Et palmarum dactyli pingues cum horum aliqua mixti. Illiniatur praeterea membrum cum cerussa, aut creta cimolia, aut terra figulari cum solano, aut spuma argenti cum rosaceo, uel chalcitide adiecto oleo et passo, uel cerussa cum aceto et lycio, uel acacia cum aceto. Remittente porro seruore, probatur usus simplicium, sulphuris igne intacti, menta q; cum oxyrhodino, aut ruta cum absinthio, aceto, et oleo: uel spumae argenti, adiecto porri beta q; succo. Compositorum uero priuatim quidem in capite, commendatur usurpatio pastilli: spumae argenti, cerussa, croci, sulphuris igne non experti, opij cum uino passo. Communiter uero uniuersis, rubricae sinopis, chalcitidis, misyos cremati, rubiginis, atramenti sutorij, aluminis scissi, et quis portionibus, cum aceto utere. Aliud: Sulphuris uiui, cerussa, opij, acaciae, pares singulorum partes cum aceto. Cataplasma ad ignem sacrum, hucera serpentina, abscessus, parotidas, et ambusta: Altheae recentis foliorum mollium libram elixam in hydrelao probe conterito, etingere rosacei uncias quatuor, spumae argenti, cerussa, uniuscuiusq; uncias duas cum dimidia: de quo cum coriandri succo laeuigato, uel cremore semperuiui, aut solani; inde panis micas inyce, donec formam induat emplastrum.

Ari, & superinducito. Atqui emplastro etiam illo utitor: Rescinini libra, myrtei tantundem, ungenti unciae quinq; , spumæ argenti quatuor, eruginis rasæ duæ: aceto dissoluantur rubigo & spuma argenti. Ceratum ad erysipelata & igne usta: Cera dealbatæ triēs, rosacei quadrās, oua sex, perdicidis triēs. Cessante autē inflammatione, aut in uetustate incidēte, priusquam liuescat membrū, cataplasma ex farina hordeacea illinito. Quod si luridum iam fieri cœperit, cuti scarificatæ, cataplasma inducendū. Irrigandum autē est ex unda dulci calida, interdum uerò & marina, aut muria: nonnunquā etiam cataplasmati talis liquor cōmiscetur. Postremò prædictis medicaminibus cōpositis utendum, animum cum medela applicando. Nam si diutius perseueret inflammatio, in suppurationem uel in putredinem commutatur.

De pano, bubonibus, et furunculis. Cap. 22.

Secundum Galeni sententiam, bubo, panus, & furunculus glandularū affectus sunt. Bubon quidē inflammatio: Panus uerò glandulæ inflammatio, suppurare incipiens. Aliorū autem quorundam opinione, tubercula communiter omnia, è quouis membro præter naturā erumpentia, ita quidē ut abscessus naturam referant, phymata, hoc est, Pani uocātur. Tradit enim Hippocrates, quibuscunq; phymata in urinario meatu erumpunt, in suppuratione facta in uomicā prorūpente, liberantur. Quicunq; autē bubones ex collisu, uel alijs hūceribus, doloribus excitantur, periculo uacant. At qui febribus superueniunt, sicut præcipuè in lue pestilentiali incidere cōsueuerunt, pessimi sunt, siue in femoribus, siue sub alis collōue proueniāt. Verū priores, intra initia, quemadmodū quæuis inflammatio, præsidijs refrigerantibus & constipantibus repelluntur: uel spongiæ impositu è posca, uel lance ex uino, & oleo ex oliuis acerbis & immaturis expresso, uel rosaceo, uel melino, aut lentiscino, uel myrteo: inde eis quæ discutiendi uim habēt, utendum. Si corpus omne humoribus æquabiliter redundat, prius

euacuandum est: Sin excrementis uacauerit, hūlceris, in qua
 cunq; corporis parte prouenerit, habenda est ratio, perinde
 atq; in sermone de hūlceribus pressius agetur. Ceterum glan-
 dula inflammatione oppressa, lanis oleo quodā relaxante im-
 butis mitigatur, membrumq; uniuersum ipsis circūuoluitur.
 Cum tumor ad suppurationem spectauerit, non promptē inci-
 dere, uerū medicaminibus ceroti formā imitātib; dissipare
 tēto: qua in re primas facillē tenet medicamentū ex perano,
 et botanicum, id est herbaceum. Si per haec non dissipatur, ad
 sectionem, perinde atq; in reliquis abscessibus, deueniendū est,
 consimiliterq; illis medendū. In his autem quae in febribus, uel
 omnino humorū copia proueniunt, arceri debent repellentia,
 ne retrusa profundū repetat materies, sed à discutiendi facul-
 tate praeditis cōfestim auspicandū. Et si nullū impedimentum
 obstet, puta etatis, aut uiriū, ex uena cubiti prius sanguis de-
 trahendus. In loco autē affecto, fots ex decocto chamæmelos-
 rum, aut anethi, aut id genus aliorū adhibeātur. Reliqua uerō
 medicamentorum materia, huc ex his quae proximi uoluminis
 capite de parotidibus inscripto memorata sunt transferatur:
 neq; ex his etiā minus, quae nuper admodū mihi ad inflamma-
 tiones conferre dicta sunt. Quemadmodum et furunculorum
 quoq; curationē tum hinc, tum ex his quae ad erysipelata con-
 ducere recensuimus, sumito, Atticus insuper aster herba, quae
 bubonium, hoc est, inguinalis etiam ob hoc ipsum appellatur:
 nō solum cataplasmatīs instar impacta, sed alligata quoq; bu-
 bonibus, opitulari creditur. Panos peculiariter discutit, si in-
 ducatur adiantū, atriplex, helxine, altheae radix uino elixa,
 gutta ammoniacā cum melle eliquata et imposita, uiscus cum
 resina atq; cerato. Rumpit item propolis: lupini amari cum
 aceto illiti, cucumeris syluestris radix terebinthina
 excepta, radix capparis consimiliter,
 nitrum itidem cum fermento
 uel ficibus.

De

De Dothienibus. Cap. 23.

Dothien, quem furunculū appellant, tumor est abscessionis faciem præferens, ex crassis humoribus in carnosissimis partibus proueniens: clemens quidem, cum in sola cute coierit: maleficus autem, curatuq; difficilis, cum altius radicibus adis in cutem erumpit. Dissipat autem dothienas, & maturat, triticum dentibus friatum & impositum: mastiche Aegyptia: uuae passae exemptis acinis sale contritæ, & cataplasmatis more impaetæ, hunc uel distrahunt, uel diffindunt. Fici aridæ ex hydromelite adglutinentur, aut resina ficis commixta imponatur. Aut ipsæ ficus aridæ dum fuerint pingues diuise, aut fermentum cum nitro, aut semen lini cum melle, aut aliter folia læuigata cum butyro. Mixta uero prosunt ex fermento, ex polline farinaceo, & medicamentum suo nomine Dothienicum appellatum conuenit. Fetus uero ex spongijs mollibus continuè in calidam aquam immersis competunt, deinde sic medicamenta inducuntur.

De Termintho tumore atro ac tereti. Cap. 24.

ORibasius terminthum phymatis speciem esse asserit, supra quam pustula nigri coloris adiacet: qua rupta, subtus simile quiddam desquamato apparet: quo quidem dissecto, pus deprehenditur. Discorides uero Alexadreu, Terebinthi, inquit, cutis eminentiæ sunt rotundæ & oblongæ, atrouirides, terebinthi fructibus consimiles. Quocirca his quoq; perinde atque alijs phymatum tumoribus, succurrendum, ex prædictis huc transferendo præsidia.

De Carbunculis anthracibus ue. Cap. 25.

Cum sanguis copiosiore atra bile infectus & feruidus cuiuspiam corporis parti incubuerit, carbunculi exoriri solent, quæ crustacea sunt hulcera, magnaq; parte ab ampulla, igne ambustis non dissimili incipiunt: quandoq; sine ea emergunt. Loci omnino pruritus quiddam præcedit, mox una interdum quidam pustula, nonnunquam uero plures etiā pusillæ milij instar

Y 5 sequuntur

sequuntur: quibus disruptis, crustaceum huius succedit, cuius
 modi ferramentis candentibus excitatur, cum crusta nunc ci-
 neritia, nunc colore nigra, sic ut imæ radici adhæreat, et quo-
 dam modo affixa serpat. Caro in ambitu reliqua feruidissi-
 ma efficitur atra, et bituminis aut picis modo splendida. eius-
 modi autem bilis est exquisitè atra. Verum qui carni tantum
 inhæserint carbunculi, breui circumscribuntur: qui uerò in
 membranis aut nervis gignuntur, longo tempore durant, et
 subiectas partes ad affectionis cōsensum trahunt, ita ut inflam-
 mationes erysipelatosæ in ipsis excitentur, non paucis in supe-
 ratione uertatur: plurimis febres superaccedunt. Oboriun-
 tur autem et ex populatim grassante aliqua causa carbuncu-
 li. Occurrendum autem ipsis, nisi per pusilli sint, sanguinis è
 uena ad animi deliquiū usque detractione. Mox à phlebotomia,
 locū profundis punctationibus ob humoris crassitiē scarificare
 alienū non est. parti uerò languenti, quæ reprimendi et discu-
 tiendi uim habeant, adplicabimus: cuius est modi cataplasma
 ex plantagine, et quod ex lente elixa, panisq; conficitur, su-
 mendo panis fornacei molle, quem neq; purissimū, neq; sordio-
 dissimū esse cōuenit. Ipsi uerò hulceri, uehementius aliquod medi-
 camentū inducimus: cuius generis est, Andronis, et Polyidæ, et
 Pasionis, diluētes eadē passo usque ad strigenti balneorū consi-
 stentiā. Massaleoticū itē aridū, uel et ipsum pariter eliquatū,
 dracunculiq; radix, uel aristolochiæ uel laserpitij liquor, uel
 Cyrenæici, singula ex aceto scitè illiniuntur. At quæ erysipe-
 lis naturā sortita sunt, præsidys eidē uitio suprā dicatis delin-
 centur. Quæ uerò partes ad affectionis cōsortiū duci creduntur, la-
 na succida, œnelæo imbuta irriganda sunt. Placato iam ferro-
 re, carbūculis, cerata cephalica, remittentiāq; filatim discer-
 pta linamenta, admoueantur. Præstantissimū est, quod ex hen-
 bis, et quod ex nitro constat, et quæ hulceribus depascenti-
 bus conferunt, arida, priuatim et cum rosaceo admota. Duri-
 tia autem perseverante, melina Serapionis utendum. Dandaq;
 opera,

opera, ut quamprimū ad suppurationē ueniant carbunculi. quod fiet, si bis quidem interdū, noctū uerò semel cataplasmata remediaq; cætera permutentur. Sed quo radicitus carbunculos euellas, & loca continuè uicina asseras, mala Punica acerba minutim discissa, in aceto elixato: & ubi tabuerint, læuigato, linteoq; illita superimponito: ubi aruerint, aceto humectato. Carbunculos ad suppurationem perducet & diffringet nucis basilicæ ueteris nucleus, uel etiā non ueteris interius frustum. Cupressi folia, & uirgulta, recentesq; et teneriores galbuli, cū polenta, uua passa acinis excussis, ficus aridæ in uino elixæ: papaueris cornicularis flores, liquor laserpitij cū rusta, exiguoq; melle, pix liquida, cum uuis passis, et adipe suillo

Ad carbunculos impendio utile.

Spumæ argenti libra, olei ueteris sesquilibra, auripigmenti uncia: oleū, argentiq; spumam tantisper dum recrementum exuat, decoquito. ubi ab igne sustuleris, auripigmentū immitto: rursusq; donec nigrore suffundatur, decoquito: tritis in mortario, linteolis filatim conceptis utere.

Ad gangrænas, uetera hulcera, chironia, strumas, podagram, & proprie ad carbunculos, eosq; comprimis qui in palpebris oriuntur.

Opj, acaciæ, misyos torrefacti, squamæ aris, uniuscuiusque drachmas duas, atramēti sutorij unā, seminis herbæ apolarinaris tantundē, læuigatis ex aqua utere. Confert etiā eximie tetrapharmacum quintā partē thuris continens. Ad pudendorum carbunculos: Chalcitidis, atramēti sutorij, singulorum drach. octo, spumæ nitri duas cū aqua terito, & utere. Subuenit etiam fimus ouillus torrefactus, cum melle subactus. In Alexandria sarapiade (quæ etiam orchis atq; triorchis uocatur) uiridi, cum mica panis, modo cataplasmatibus aduersus carbunculos & omnia crustacea utuntur. Vbi uerò crusta deciderit, trivialis hulceris modo reliquam curationem proseguere.

De

Cancer in qualibet corporis parte oriri potest: siquidem in oculis & locellis (quemadmodū de ipsis suo loco tradidimus) atq; alijs corporis partibus bene multis, uerū præcipuē in fœminarum mammis prouenit: quoniam natura laxæ & fungosæ crassissimum atræ bilis (unde hoc malum gignitur) materiam promptius excipiunt. Ex eo nanque humore cum referbuit, canceri contrahuntur: qui si acrior fuerit, cum bulceratione. Ob hoc, colore atriores quā inflammationes sunt, citra caliditatem tantam: uenæ circa id malum turgescunt & intenduntur instar pedum animalis canceri, unde etiā appellatio huic uitio indita est. Quidam uerò hinc nomen sortitiū asserunt, quod ab his, quas occupauit, partibus ægrè euellatur, ueluti cācer animal aquaticum. Hoc malum ob humoris crassitudinem nulla medicina eliditur, ut quod neq; repelli, neq; discuti queat, neq; purgationi totius corporis cedat, uel quod mitiora remedia contemnat, asperioribus autem irritetur. Possunt uerò canceri inchoantes, quo minus augeatur, impediri, si atribilarius humor priusquam in mēbro affecto radices egerit, euacuetur. Euacuabimus autem primitus quidem, nisi quid obstet, sanguinis detractione: mox purgatione, simpliciora quidem intra primordia statim exhibendo: uerbi causa, epithymum quatuor unciarum & semissis quantitate, in sero lactis, aut aqua mulsa. Deinde hiera, quæ helleborum atrum assumpserit, euacuentur: Solani succus loco languenti illitus, sine molestia exbulceratis subuenit, si linteolū molle duplicatū in ipso irrigetur, et imponatur. Foris autē circa ipsum lana mollis, eodem succo madefacta, iniicienda est: prospiciendumq; eadem succi infusione crebrius repetita, ne exarescat. Utatur insuper quis longo tempore exbulceratis canceris ex pompholyge medicamento. Expediunt etiam, quæ libro tertio de fœminarum locorū canceris descripta sunt, remedia.

Ad

Ad cancerosa & malefica, adq; sedis tuberosa hulcera,
pudendorum item aut testiculorum, mamma-
rum ue inflammationes.

In plumbeo mortario cum pistillo plumbaceo, lemnia si-
gillatam è posca & mulsa, lacte ue conterito, ut nigrescat, uel
rosaceu, uel omphacinu oleum, uel succu semperuiui, uel um-
bilici Veneris, uel lactuca, uel laserpitij, uel uuae acerba, trita
cõpari modo illinito. Manducet aut languens cremoris ptisas
nae plurimum, serum item lactis: ex oleribus malum, atriplex
cem, blitum, cucurbitam: Ex piscibus uero saxatiles, & aues
omnes, exceptis ijs quæ in paludibus degunt.

Archigenis ad carcinode & malefica hulcera.

Cancrorum fluuiatiliu combustorum, & cadmiae æquas
singulorum partes læuigatas insperge: uel eiusdem animantis
cinerem cum cerato superinducito, uel erysimi semen subas-
tum cum melle superaccommodabis.

De œdemate, laxo tumore. Cap. 27.

QVum super tumoribus qui ex calidioribus succis generan-
tur uerba fecerimus, rursum de contrarijs tractabimus:
principiu à tumore laxo, quod œdema Græcè uocant, sumen-
tes. Quemadmodu enim ex biliosis humoribus sacer ignis, quæ
erysipelata appellant, gignitur: ita pituitosi humoris cõfluxu
œdema, mollis quidẽ & doloris expers tumor exurgit. Neq;
nos fugit, œdemata præcipuè in pedibus in aquæ subtercutem
afflictionibus, in tabe & prauo corporis habitu, contrahi. In
his quippe, istiusmodi tumor affectionis hominẽ opprimentis,
accidens est, nullã peculiare medelã efflagitans. Abudẽ enim
est, si crura perfricetur, interdum quidẽ cum oxyrhodino, ali-
quando uerò cū oleo & sale, uel oxyrhodino sale adiecto. At
si propter pituitosi humoris in membrũ aliquod confluxum,
œdema coeat, opis interdũ satis tulerit spongia posca madẽs
cū ameto clementer stringẽte imposita, ex inferioribus quidẽ
partibus inchoans, superioribus uerò terminans. Caterũ spon-
giam nouã esse conuenit. At si ad manũ non sit eiusmodi, eam

que

quæ in proptu est nitro, et lixiuio potius stillatio appellat^{us}, mundabis. Quod si his tumor non reprimatur, poscæ nomen tum aluminis admisceto. Idoneum item fuerit elychnion molissimum, humore eiusmodi imbutū, atq; impositum. Probat^{ur} etiam glaucium. Si cedema uetustas occupauerit, illito prius cum oleo membro, spongiam ex lixiuio stillatio imposito, uolentiusq; constringito, & sanabis. Distrabit uerò & comprimit tumores laxos quælibet terra illita, & uehementius Aegyptia, & isatis satiua.

De inflatione: Cap. 28.

Spiritus flatuosus, sub cute aliquando, interdū sub membranis Sossa uel musculos ambientibus, collectus, inflationē producit. Congregatur aut quandoq; in uentre, & intestinis, & inter utraq; ipsorū, et peritonæū membrā, ceu in tympanis, ut uocant, intercutibus. Dirimitur hæc ab cedematibus, quod digitorū cōpressioni cedens, non tantā relinquit fossulam, quam illa dū premuntur, & strepit instar tympani. Efficit aut corporis densitas, crassariq; partiū spiritus, ne idem spiritus halitu diffletur. Vnde curationis scopus est, corpori raritatē inducere, crassiorē spiritū extenuare, quod medicamentis tenuium partiū, calidæq; potentia absoluitur. Quamobrem ad uentris & uiscerū inflationē, oleum tenuiū partiū in quo ruta fuerit elixa, aut cyminiū, aut apij semen proficit: non raro cucurbitula ingens, nō incisa cute scalpello, umbilico bis aut ter adglutinata, flatus discussit. Cum aut musculi ob cōtusionem, ceu in pulsationibus inflantur, membra calidis admodū rebus acrioribusq; indignantur, doloresq; intenduntur. Quocirca à principio statim mitigatibus remedijs, plurimū occupari expedit: in declinatione uerò, discutientibus. Sapa igitur cū oleo exiguo utendū, quod lana succida calide excipiat^{ur}, uel ceratum ex œsypo cōfectum immiscetur: cura adhibita quò caliditas permaneat, frigus enim nō expedit. Mitigato iā membro, & agro mitius se habente, acetū admisce, nitrūq; uel nitri spiritum,

mām, post hæc percolatū lixiuiū. Postea emplastris discutiendi facultate præditis, ut inflatio subsideat, utitor, cuiusmodi est quod subijcitur: Balneorū strigmentum elixatū excolato, ut purū reddatur, atq; rursus in cacabū conijcito. Et calcem extinctā farinæ modo contritam, tantisper dum cœni crassitudo inducatur, inspergito, et uteris. Cæterū efficacius quàm hoc tensetur pharmacum è fico Aegyptia, quem sycamoron uocant contextum.

De luxatis, intortis ue & contusis. Cap. 29.

ADuersus articulorū luxationes & contusiones conferunt lance succidæ, uel spōgia oxelæo irrigata, et imposita. Bulbus elixus cum melle, tenera uiticis folia, sal, nitrū assum, læuigata cum cerato: utere item fotu aquæ dulcis, uel marinæ calidæ. Sed ubi iam inflammatio doloresq; sedati fuerint, membra eluxata perfricentur.

De carnibus contusis, & sanguine subter cutem collecto. Cap. 30.

CArne à graui aliquo corpore illapso contusa, exilibusq; in ea uenulis disruptis, sanguis exudans per subsultū trāscolatur: qui sub cute collectus, ecchymoma appellatū inducit. Cute nullum diuortii experiente, tumoris instar moles tactui cedens, liuidi coloris absq; dolore ut plurimū comitatur. Noster igitur medendi scopus eò tendit, quò grumi sub cute contenti distrabantur, idq; sine mora, prius quàm nigredo superueniat. Inter principia statim astringentia quædā discutientibus sunt admiscenda, eo quòd tunicæ uenarum contusæ condensari postulāt. Post hæc uerò sola discutiētia admouebimus, scarificatis initio ecchymomatis, ita deinceps reliquam curationē aggredimur. Ad inueterata ecchymomata accommodatus est raphanus, cataplasmate adglutinatus: discutit enim ipsa, ubi erodere cœperit: uel raphanorū cremor cum micis panis impactus. Species aut ecchymomatis sunt suggillata, et rupturæ uenarū, liuoresis ex ictu proueniētes, hyposphagmata nūcupata,

cupata, & sanguinis ex plaga inter ungues coitus, de quibus suis actū est locis, uolumine tertio. Atqui de unguis uitis in chirurgico opere fusius explicabitur.

De ruptione & conuulsione. Cap. 31.

Ruptura nunquam sine ecchymosi prouenit. Succurritur aut medicaminibus mediocriter calorificis: cuius classis habetur, è nigris populis acopū, et quæcunq; uiribus huic, naturaq; respōdent. Oportet autē ruptionibus, acriora, magisq; incidentia adhibere. Proficit ita afflictiis cucurbitulae usus. Siquidem per halitū confestim fuerit uniuersum ecchymoma discussum, facile diducta caro coalescet. At si malum in uetustatem inciderit, sordesq; subtus alta succreuerit, ruptio deinceps uniri non potest, labia tantū fracturae simul inuicē colligentur, ita ut quauis occasione facile separentur, spaciūq; inter ipsa medium humore aduentitio repleatur, & continuē quodā modo ecchymoma creetur primo persimile: nisi quod hoc quā illud citius discutitur, ueluti saniem tenuē continēs, cum illud ab initio ex grumis sanguinis cōstaret. Conuulsio autem contusis et distractis neruorū fibris contigit. Quæ solā mitigationē usq; ad indolentiā requirit: cōglutinari namq; fibræ nequeunt. Aristolochia igitur rotūda, rupturis & cōuulsionibus, si quid aliud, accommodata est. Compari etiam modo & centaurij grandioris radix, eiusq; succus, rheum, costus, bdellium, cum oxymelite hausta.

De scirrhis. Cap. 32.

Exactus quidē scirrhus, præter naturā tumor est insensilis, durus et insanabilis. Sed non exactus uix sensibilis est, non incurabile quidem, sed nō faciliē tamē medicabile malū. Oritur enim à tenaci crassoq; humore, indissolubiliter mēbris induratis impacto. Quādoq; cōfestim intra principia coit, et augetur. Plerunq; uerō medici eius mali autores sunt, cum sacros ignes et inflāmationes immodicē refrigerauerint, astrinxerintq;. Quamobrē si quis quæ uehementius dissipant medica

menta

LIBER QVARTVS.

352

menta corporibus scirrhus oppressis adhibeat, manifesta scirrhi diminutionem breui tempore efficiens, reliquias passionis reddet insanabiles: tenuiore quippe humiditate ipsius discussa, reliqua arida et perinde atque lapidea elinquitur. Oportet itaque medicamentum diaphoreticum aliquam etiam emolliendi uim, citra uehementem calfaciendi et arefaciendi potestatem habere: cuius facultatis sunt medullae omnes, atque in primis ceruina et uitulina. Ex adipibus probantur, leonis et pardalis, ursinus et taurinus. In auibus uero, anserinus, gallinaceus, et phasianicus: aridior uero, caprarum et hircorum. Ad haec praeterea, gutta ammoniac, quae ad odorem uaporatur, et bdellium, praesertim Scythicum, et styrax liquidior ac pinguis, mastiche item Aegyptiaca. Quocirca in alijs quidem partibus scirrhus infestatis, his seorsim utendum est, et his quae inde componuntur. Caterum in tendonibus et linamentis, lapidem igneum aceto acerrimo extinguere expedit: si copia est, pyritem sin minus, molarem, in quo languentis membrum hinc inde permoueatur: atque ita agitetur, ut uaporem sublatum excipiat. Post hoc denuo remedium emolliendi uim habens, praestat imponere: tenuiumque partium oleo, non aqua, membrum ab initio ad morbi metam quotidie fouere: interdum in oleo altheae radix, uel cucumeris syluestris elixatur. Lauacris uero continuus uel in totum, uel magna saltem ex parte abstinendum. Scirrhus autem mediocriter mollificato, gutta ammoniac pinguis aceto peracerrimo liquefacta, membrum afflictum ad plurimos dies perungemus. Deinde rursus ad emolliendi uim habentis remedium usum reuertendum, quod galbano et opopanace pinguisimis compos sit: cuius generis praecipue habetur, ex perna conflatum, et Amythaonis, atque ea quae strumis consecrata sunt medicamenta.

De strumis. Cap. 33.

Strumae glandulae sunt obduratae, quibus collum, axillae et inguina frequentissime occupantur. Communiter curatio

Z

ni proxi

ni proximè de scirrhis in mediū allatæ subijciuntur. Priuatim
 uerò lupinorū amarorum farinā in oxymelite decoctā cata-
 plasmatis modo inducito: eadē & tuberibus phymatis ue pro-
 dest. uel bubulum stercus cum aceto elixum, cataplasmate im-
 ponito, id quod tumores etiā obduratos omnes discutit. Egre-
 giè uerò strophas disijcit calx aqua non extincta, melle, uel
 strigmeto palæstræ excepta, uel oleo, uel adipe suillo. uel cal-
 cis uiuæ & nitri par pondus, nasturtij & fœnogræci quas-
 druplum cum melle, instar cataplasmatum impadum, durities
 distrabit, et in pus cōuersas rumpit. Ioleacea farina cum fimo
 columbino, & semine lini, in uino decocta: grossi syluestres
 atq; satiui, aut nasturtium candidum cum pice liquida cōtris-
 tum in malagmatis specie imponitur. Vel cucumeris agrestis
 radicis aridæ, et foliorum lauri aridorum crematorum cine-
 rem cum resina terebinthina superinducito: uel herbæ pedicu-
 laris, nitri parē modum, erucæ duplum cum resina immittez
 uel stercus capriuum aut bubulū in aceto percoctum: uel erui
 farinam in lotio pueri uenerem non experti maceratam, &
 pice, & cera, & oleo eliquatis exceptam. Vel serpentem ex-
 tinctum in aulā coniectum, et gypso illitam, in fornacem quo
 concremetur ponito, cineremq; ipsius cum tantundem fœno-
 græci misce, atq; melle excepto utere. Compositio ex aspidi-
 bus ad miraculū usq; remedio est, atq; ea quæ ex struthio con-
 stituitur: necnon quæ è cucumere syluestri, & è cedrio itidē
 liquore conficitur. Strumas ad suppurationem perducunt, uel
 diffundunt, myrrhæ drachmæ decē, guttæ ammoniacæ thy-
 miamatis duæ, uisci quercini drachmæ octo, galbani drach-
 mæ quatuor, propoleos drachma, in pila contūdantur. Ad
 strumas mammarum, & duritias, uisci elaborati, resinæ ar-
 idæ, ceræ, uniuscuiusq; libra, galbani uncia tres conferunt.

Ad strumas ex h ulceratas, et h ulceribus carentes:

Accipe ceræ, resinæ piceæ, adipis porcini insulsi, marru-
 bī, eruginis rasæ, singulorum uncias sex.

Chæradicū,

LIBER QVARTVS.

53

Chœradicum, hoc est strumis curandis factum.

Olei ueteris libras duas, ceræ unam, colophonie uncias quatuor, nitri tantundem: allia duodecim detractis tunicis, in oleo per triduum macerato, deinde donec frixa sint elixata, porrice. Vbi ab igne detraxeris, eliquatis oleo, læuigatissimè quoq; nitrum inspargito: abscessus etiam rumpit. Aliud: Cineris ex ficu arbore sextans, aluminis fissi uncia, nitri spumæ tantundem, liquidæ picis uncie septem.

Erodendi uim habens chœradicum.

Aluminis scissi, sandarachæ, uniuscuiusq; semuncia, squamæ æris denarius, auripigmenti tantundem, arido strumatis cōssperge. Quod si cācri speciē sortiti sint, rosaceo maceratis, bis per diem utere.

De steatomatis, atheromatibus, & meliceridibus. Cap. 34.

Quum hæc in genere abscessuum (quemadmodum in illis explicuimus) enumerentur, singula propriâ à rerû quæ in tumoribus continentur, similitudine, nomenclaturam inueniunt. Est etenim earum quædam instar adipis pinguedinis quæ alia uerò mellis specie, & alia pulti similis. Scopi autē curationis cōmunes sunt, quod tunica illa inuolutum continetur, discutere, uel totum medicamentis exedere, uel sectione auferre. Nonnullis enim ex his tumoribus triplici hoc consilio subuenitur, hisce nimirum qui tenuiorem humorem possident, ut est meliceris. Quidam uerò duplici solum ratione curantur, quale est atheroma, quod non tam abscindere, quàm remedijs tollere licet. Steatoma neq; medicamentis exedi, neq; dissipari potest, sed manu ac scalpelli dūtata præsidijs curatur. Vniuscuiusq; igitur horum agnitionē in opere de Chirurgia reperies. Eorum uerò quæ discutiendi uim habent materiam, inter hæc quæ de strumis edocuimus, inuenies. Priuatim uerò meliceridas discit illud: Vuas passas excusis acinis octo, squamæ drach. treis, parti prius fotæ imposito. Aliud: Ladani, bdellij, galbani, ammoniaci, thymiamatis, propolis, terebintbinæ, cuius libet portiones æquales in pila cōtūde. cōducit id quidē etiā

Z 2

strophis

strophis, post, secundumque aures abscessibus, dothienibus, phymatis. Contra meliceridas, Archigenis sententia, spuma nitri, ueratrique duplum cum cerato duriore imponitur. Medicamentis uero exedendi uel praeditis, cute circumfusa uti non licet. Meliceridas itaque et atheromata, uel ipsas etiam strumas medicamentis adurentibus denudare expedit: est quorum numero simplicius quidem est, quod constat ex calce aqua non extincta, sapone, lixiuioque stillicidio. Varium autem magis, et quod repositum seruari potest, habet calcis aqua non extincta drach. quatuor: sphecles, quae uini fex est, crematae, nitri liquidi torrefacti, singulorum drach. duas, minij unam, dilue in lixiuio, mellisque liquidioris spissitudine inducatur ter feruefacito, donec aliquantulum consistat, et in plumbae pyxide recode, instillans lixiuium, ne subito areseat. Confert ad acrochordanas uerrucas, formicas, pterygia, clauos, callos, cicatrices eminentius excrecentes, uini fex non admodum uetusta, duorum modum mensuram, cuti illita. Quod simulatque arescere coeperit, spogys madidis lota rursum inungito: ubi nigror contraerit, denuo is quae crustam inducunt, lauabis. Postquam crusta deciderit, medellae erodendi facultate praeditae adhibeantur. Erodit autem citra morsionem abunde, quod habet squamae aeris drach. quatuor, sandarachae, atri bellebori, singulorum drach. duas, utere cum rosaceo. Aliud: Squamae, sandarachae, seminis urticae exiccatae, aequali pondere: utitor cum rosaceo. Aliud: Brinae ceorum deustorum, saepiae testae, auripigmenti aequas partes cum rosaceo: omnes uero particulas, quae in circuitu sunt, circulatim prius delinito cerussa cum oleo. Efficax etiam compositio, quae ex calcis aqua non extincta et illaboratae partibus duabus, chalcitidis parte una, auripigmenti tantundem conficitur.

De fauis. Cap. 35.

Fauis tumor est pluribus et continuis in cute foraminibus te-
rebratus, per quae mellis crassitudine humor emanat. Vnde
igitur passae ipsi sunt imponendae, cum ruta, uel fici folia mollissi-
ma cum melle, uel nasturtium cum semine lini et melle; uel cucume-
ris sa-

vis satiui radix cū melle, uel sulphur ignem non expertum, ce-
rato aut terebinthinæ commixtum. Cæterum expeditius ma-
gisq; uarium remedium reddes, si quæ superiore uolumine, de
manantibus capitis huiusmodi relata sunt, huc transferas.

De simplici hulcere. Cap. 36.

Quoniam hulus simplex non nisi hiatus quiddam est, cuius si
quis labia diducta, fascia undiquaq; coronæ instar circū-
posita committat, dissite partes facile absq; ulla alterius rei
ope coalescēt. Vbi uerò in aliquo labiorum foraminibus per-
foratorū hulus trāuersim spectauerit, hinc deligaturā molis-
ri, atq; in cōtraria uertere competit. Si utraq; eò labia detor-
quentur, apprehendendū est duobus initis ligamentū, et labia
hoc pacto contrahēda; siquidē nihil, ueluti neq; pilus, aut are-
na, aut oleū, aut festuca, uel id genus quippiā inciderit, hulus
omnino cōglutinabitur. Quod si hulus adeo magnū extiterit.
ut nequeant diductæ partes omnino prædicta deligatione glu-
tinari, cōsutionibus ipsæ prius sunt cōmittēdæ: deinde hoc pa-
cto sutura commissæ, remedijs cōglutinandi uim habentibus
utendū, et quæ arefaciendi consumendiq; humorem collectū,
et ne alius quispiam se insinuet, arcendi potestatem obtinent.

Quæ hūlcera glutinandi uim habeant. Cap. 37.

Conglutinare hūlcera possunt quercus folia cataplasma-
tis modo impacta, et salicis brassicæ, fructus oleaginis fru-
ticis, quæ chamælaia nuncupāt, folia item et cortex et succus
austerioris plātaginis. Papyrus posca uel uino irrigata, orbis-
culatimq; circumdata. Recētia uerò hūlcera cōglutinant pini
et picæ folia, et cortex recēs amēti modo circūactus cū aqua
aut posca, uinōue, caseus recēs solutus. Foris aut rumicis folia
applicato, aut uitis, aut betæ, siue lactucæ. Cæterū caseus, qui
eo quod ex acido lacte fit, oxygalactinus nomē obtinuit, uulne-
ra quoq; ampliora committit. Pyra itē syluestria, quæ achra-
des dicuntur, fluxū reprimēdo sistūt. Equisetūq; ut cataplasma
impactū, etiam si nerui dissecti fuerint. Isatis sauiua in durioris

bus quidem corporibus, etiam si in capitibus musculorum extiterint, pulchrè admodum hulcera conglutinat: item cupressi folia et ramuli, galbuliq; iuuenes et molles in corporibus duris. sed admiscere conuenit tenuissimum farina puluerem, qui à pariete molæ propinquo assumitur. Myrrha cum aqua illita, uel lachryma thuris, et lubrici terræ, neruorū præcissiones glutinant pentaphylli folia cum melle, alliaq; tosta cataplasmatis instar imposita. Hulceribus autem uetustis conducit anagallis cū cerato, hordeū com bustū, cerussa, cū cerati myrtei triplo. Capitis porrò hulceribus myrrha arida inspersa, nō irrigua, prodest, celerrimè nanq; cōglutinat. Vel aloen aridam, uel aristolochiā tritā, melliq; et uino simul, quoad in mediocrē crassitudinē deuenierint incoctā, in linamentū conceptū illiniens imposito. Ex cōpositis autē cōglutinandi uirtute præditis, sunt, Barbara et chrysa, et medicamentū Nicolai. tū quod ex salicibus, quodq; dictāno cōstat, et id genus alia, quæ ingentia potissimum uulnera contrahere possunt.

Ad dolentia & inflammata hulcera. Cap. 38.

Idolor et inflammatio uulnera exercet, adhibenda sunt Siccifica, et quæ inflammationē extinguūt, medicamēta. Ex liquidis igitur probatissimū creditur uinū, deinde posca. Si uerò cū sordibus angat inflāmatio, etiā mulsā aquosa conuenit. Ex aridis autē pharmacis cōmuniter expediūt, quæ aduersus inflāmationes facere prædicta sunt, demptis oleosis et acribus. Priuatim illud commendatur: Mala punica dulcia uino elixa, et cōtrita, cataplasmate superinducito: suspiciendū id, et multiplicis usus. nam capitis quoq; hulceribus cōducit, et ad uerēdorū et uniuersi corporis infestātia hulcera, item cōtra oculorū inflāmationes. Quod si erysipelas, aut simile quiddam hulceri accesserit, ijs utēdū est præsidys quæ illis dedicata sūt.

Ad immatura & necdum purulenta hulcera. Cap. 39.

Recentia quidem hulcera, atq; ob id etiamdum inflāmata, necdū suppurantia, maturant, et ad suppurationē ducunt, simplicia

*simplicia quidē aqua temperata inspersa triticea farina, uel chondrus, uel panis, uel glutinū quo in libris utuntur, cum te-
rebithina illitum. Adhæc cera, crocus, thus, pix, rosaceum:
adeps porcinus, et uitulinus. Ex compositis autem tetraphars
macum emmotum rosaceo imbutum. Cæterum hulcera anti-
qua & callosa maturant, ex simplicibus quidem uua passa sa-
tiua, styrax, galbanū, myrrha, ladanum, pix, resina, butyrū,
mastiche Aegyptia, et æsypū. Cōposita uerò ex rhicinino ace-
ros GALENI, medicamentū liquidū quod linteolis cōcer-
ptis excipitur, uulneribusq; inditur, oleo uetere aut rhicinino
subactū: drichromos itē, & Basilicū, atq; eius generis cætera.*

De hulceribus cauis. Cap. 40.

HUlcus cauum amissæ carnis instaurationem expetit: cuius
procreandæ materia, sanguis cū moderatus, tū inculpa-
tus est. Huius ergo commodationē ex sufficiente cibo concia-
liabimus. Medium uerò temperamētum, non tā ex probis ali-
mentorum succis, quā ex bona membri, quod hulcere premi-
tur, temperatura. Cæterū recrementum quod excernitur, ulce-
ris statum arguit: siquidem tenue, humidius efficit hunc: cras-
sum uerò, sordes ipsi coaluisse innuit. Quamobrem medica-
mentis mediocriter arefacientibus & abstergentibus indiget:
qualia sunt, thus, farina hordeacea, fabacea, eruina, iris, ari-
stolochia, cadmia, panax, & pompholyx. Vbi uerò medica-
mentum ad incarnandum adplicatū non profecerit, ad aliud
est transeundum. Verū siquidē sordities ingenti multitudine
scateant, humidiusq; hunc sit, sciendum est, medicamentum
infra id quod requiritur desiccare, eoq; mellis admixtione in-
tendendum esse. At si mundum & siccus deprehendatur hunc,
nisi desiccauit, & oportet cerotum oleo permulto dilu-
tum adhibere. Accidit autem aliquando ut medicamento po-
tentiore caro eliquetur, ita ut sordidius humidiusq; appareat
hunc, simile ijs quæ minus quā requiritur, exiccantur. At
qui hunc hoc eliquatū, cauius se ipso euadit, protuberantibus

in cauitate labris, rubefcente praeterea cum inflammatione quada-
dam crepidine. Saepè etiā numero morfione manifestam lan-
guens percipit. Alterum uerò, quod praesidijs minore arefas-
ciendi facultate praeditis humescit, nihil horum potest subse-
qui. Quamobrem lignorum caries, atque eorum in primis quae
moderatam constringendi, abstergendique facultatem sortita
sunt, ueluti ulmus, expurgat, et carne replet hulcera iam pu-
ra, uel anemonae appositae. Pini quoque corticē detrahitum, atque
cum cerota contritum, penicillo illitum, cauis hulceribus praeser-
tim recētibz, superinducito: carnē etenim ea implet. Com-
posita uerò, mundatis iam hulceribus probatissima cēsentur,
ex ostreis compositio, Manaethonis medicamentum ē uini fe-
ce confectum, item illud ex aloe: necnō Meletera cognomen-
to aridum, et quod constituitur ex amyli, mannae thuris, alis-
cae, erui, aequis partibus. consimiliter etiā quod thure constat.
et Aphroditarium. Sordidius uerò quodammodo hulus, quae
cephalica nomen sortita sunt, arida expetit, et quae linteolis
concerptis medicamenta excipiuntur: quaeque Trophos appella-
tionem obtinuit: et Isis, et cui titulus Athena, et ex colo-
rustica (atracylis appellata) confectum. Est praeterea cui ap-
pellatio Italicum est indita: et breuiter, quorumcunque fa-
ctum est periculum.

Quae sordida expurgant hulcera. Cap. 41.

Sordida hulcera, siue caua, siue plana, egregiè aristolochia
cum melle purgat. Resina itidem terebinthina cum pari men-
sura rosacei et mellis, uel loco rosacei butyrum, iris Illyrica
cum melle, oliuae salsae colymbades uocatae, cataplasmatibus mo-
re impactae. Ad ea uerò quae neruosa occupant, terebinthina
liquefacta cum butyro adhibetur. Sed immodica sordium ui-
obrutis, et eorum quae depascendo serpunt, naturam resipi-
scentibus, marrubium cum melle expedit, hoc etiam crustas
porricit. Mixta uerò praesidia haec sunt: Amurcae decoctae,
mellis despumati, aluminis phorimi, quod est liquidi, par mo-
dus.

du. Aliud: Sarapiadis herbæ, quam triorchea dicunt, aridæ ireos Illyricæ, marrubij exiccati, mali terræ, singulorum drach. octo. farinæ erui drach. decē: arido utere, atq; cū melle. Porro aduersus hulcera impura, Aegyptia quoq; facit: nec non ex salibus cōtexta cerota colliquata, Indiceq; et Athene, & uiridia diluta, ex pumice præterea, & ex eruo consarcinata arida: ad hæc Melanchloros pastillus, consimili deniq; modo & Ocriogenes.

Ad hulcerum uermes. Cap. 42.

ARcendis quæ in hulceribus prognati sunt uermiculis, primum quidem omnium est, humiditatem putrilaginēq; uermium parentem abolere. Interimunt autem uermes in genere quidem cuncta, quæ auriū lumbricis dicata sunt. His uerò qui in hulceribus nascuntur, Archigenes cerussam et poluē aquis partibus, cum liquida pice illinienda asserit.

De carnum in hulceribus præter naturam incrementis. Cap. 43.

CArneis in hulceribus superexcrecentes medicamēta acriter arefacientia demoluntur: è quorū numero est diphryges calaplasmatis instar inductum, & squama æris, & quæcunq; testacea cremata, erinaceiq; combusti, tam terrestres quàm marini, cum toto corpore. Verū hæc non admodum eximiè purgant, & superexcrecentia compescunt. sed Asiæ petræ flos longe ualidius id muneris obit: hoc adhuc uehementius, sory, sarcocolla, chalcitis, & misy: uerū deusta minus rodunt, flos itidem æris. Cæterum ærugo uiribus omnia præcedit. Sales porro combusti carnes cum humore flaccidas consumunt. Consimiliter & linamenta filatim ex reijculis pannosis discerpta, in muria maioris acrimoniæ irrigata, & denudò arefacta atq; imposita, mediocres carnum excrecentias auerruncant. Sed rubigo cum squama æris incrementa potentius retinet. Composita autem Rhodia (quæ dicitur) arida, psaron, præterea xanthum, absque morsu excrecentia supprimunt.

unt. Vastissimas uero carniū excrementas in altum usq;
crusta obducunt Phaulstiani pastilli friati atq; insparsi, & he-
liocæs, à solis aestu appellatum, aridum. Conducit pariter,
quod accipit calcis aqua nō extincti, squama æris, mannaq;
partes æquales: idem incrementa immodica, et fungis similia
cum melle repurgat, & cum cerato carne implet.

Aridum incrementa carniū coercens.

Spuma argenti, chalcitis, rubigo, plumbagocon, & quis por-
tionibus. Aliud efficaciter sine morſu reprimens, subueniens
præterea nomis, et epulidibus, hoc est carnis gingiuarum ex-
crementijs, & dentes deniq; candidans: Calcis uiuæ libra, au-
ripigmenti uncia sex: auripigmento arido aqua læuigato, cal-
cem aqua non extinctā, cadmiæ modo lotā adyctio, cōtritaq;
arefacito, & utere. Ex pastillis Pantolmius, & quicunq; po-
lypis medendis dedicati sunt, scitè admodū hulcera reprimūt.
Emplastraq; uiridia, præsertim quod ex Cappadocicis salis
bus cōfectum est. Isis item summè carnem in hulceribus super-
crescere prohibet.

De nomis, putredinibus, atq; phagedænis. Cap. 44.

Vincunt hulcera, quæ depascēdo serpunt, putridaq; existūt,
fomenta ex aceto & posca, uel uino adstringēte, aut aqua
gelida, aut marina, aut iure lenticulæ, malicioriorū, balustio-
rum, lentisci, myrtorū, spinæ Aegyptiæ, aut aliquo ex ijs quæ
astringendi & arefaciendi uim obtinent. Cataplasma ita af-
fectis accommodabitur, ex erui farina, alumine liquido, panis
filiginei mica: gobio ueteri, uel alio salsamento antiquo car-
nis illotæ: terebinthina insuper liquida æquali pōdere læuiga-
ta imponitur: uel malū terræ, uel rhiciniorum foliorum cre-
mor æquis partibus, rubiginis dimidiū ex aqua mellis crassi-
tudinem habens illinito: si crusta non deciderit, elaterij aqua
pars ærugini admisceatur. Putridis prodest sory læuigatum,
& insparsum, & super carptum linamentum aridum. uel
malum terræ rotundum, uel gallus, æquis partibus cum oleo
inungito:

inungito: uel cucumeris syluestris radicem, uel brassicæ, aut betæ, aut rumicis folia illigata calidis cineribus reconde. Quæ autem remollita fuerint, cū sale trita impone, efficaciter repurgant. uel extremos ramorum oleæ colicolos teneriores, in uino decoctos, cum melle illinito: uel chalcitim cataplasmate superinducito: uel apij semen contritum, uel semen lini friatum cum atramento sutorio impingito: uel ex thymo, & uua passa, & ficibus decoctis cataplasma adhibe: uel ex ficulneis folijs læuigatis cum melle: uel nitrum & cuminum, & farinam cum melle imponito: uel cucumeris syluestris radicem, uel scillam coctā cum melle. uel foreos drachmas duodecim, chalcitidis decem, misyos quatuor, cum aceti acerrimi dimidio acetabulo donec exarescāt conterito, detractisq; utitor, specillum intingens, huleriq; circumagitando inuoluens, & superne duplum linteolum ex cœnelæo imponito. Quod si inflammatione confluentur, altercum cum polenta, uel brassicam cum melle adplicato.

Ad putredines quæ singulis locis contingunt, & hulnera depascentia.

Calcis non extinctæ, chalciteos, uniuscuiusque drachmæ duæ, auripigmenti drachma: hoc aduersus etiam digitorum pterygia, & phagedænas proficit: contra carbunculos pudentorum cum melle, in reliquis aridum utiliter adhibetur, splenio supernè ex resina superaccommodato.

Ad serpentia omne genus hulnera, quæq; os affligunt, & ad sanguinis eruptiones, & excrementas carnis coercens multiplicis usus puluis.

Habet chalcitidos, misyos, utriusq; crudi drach. uiginti, squamæ ferri drachmas sex, gallæ immaturæ drach. octo.

Medendis depascentibus & putridis ulceribus.

Salis drach. duodecim, aluminis qualiscunq; combusti drachma, squamæ, pumicis cremati, æquis portionibus. bene etiā facit

facit rubigo rasilis cum misyi deusto, pice liquida excepta, & squama ferri cum oleo.

Ad serpentina uerendorum hulcera.

Non tam hæc, quàm dictum meleterium conueniunt: Confectio ex acuta myrto, et ex charta medicamentum aridum, ad depascentias quasque proficit & ex oxymeliæ Coracium, atque Andronis pastillus, & id genus alij. Cæterum hæc eadē ipsa medendis quoque phagedænis apprimē quadrant. nam & phagedæna hulus est depascens, nomæ naturam resipiscens

Ad hulcera cum humore flaccescentia, tetrico odoris.

Lemnia sphragis ex aceto, uel aceto mulso, uel posca, aut uino subacta, tantisper dum cœnosam induat crassitudinem, illita optime facit. Vel cupressi folia, ramuli & galbuli molliusculi, uel cucurbitæ aridæ deustæ cinis, uel platani corticis tosti, & anethi cōbusti similiter, uel lanæ sordidæ crematæ, uel plantago, uel isatis per se, uel cum polenta, aut peucedani radix arida.

De hulceribus cicatrice obducendis. Cap. 45.

SI carnem hulceris quæ cicatrice egent, desiccemus, et astringamus adeo, ut non id modo quod præter naturam redundat discutiatur, sed id etiā quod secundum naturam est, attingamus, extimam carnis superficiem cuti similem efficiemus, & cicatricem, ei inducemus: ad quam functionem idonea sunt, galla immatura, & malicoria moderate exiccantia: & quæ præter astringentem citra morsum arefaciunt, eadē cicatrice quoque obducunt, ueluti myrrha, spuma argenti, ostrea combusta, si inspargantur, arida. Hæc quoque cicatricem sæpe inducunt, cortex pini cum cerato myrteo, hederæ flos cum cerato, liliæ radix cum rosaceo, resina pityina arida, pumex affatus, squama æris, pari potest, aridis utitor: hoc etiam reprimat. Vel pumici trito, manna & diphrygis cuiusque momentum admisceto, & utere: uel spumam argenti partem unam, diphrygis dimidiam, cum cerato ut splenium impone. Veteribus cicatricem inducunt, uiscus cum thure, ærugo cum diphrygis tantundem, atque cum cerato myrteo:

teo: uel centaurium minus recens adglutinatum. Sed humidioribus cyprini radicē impinge. Ad sedis & pudendorū hūlcera maximē inflāmata, aloē utere læuigata, arida, uel ex aqua: uel squamam aris, uel chrysocollam in sole cum cera emollita, superaccommodato.

Aridum ad cicatricem inducendam.

Ostreorū drach. duodecim, mannæ sex, cadmiæ quatuor, proficit et hūlceribus quæ depascunt. Aliud: Mali terræ denarij sex, corticis pini, mannæ, cuiusq; denarij sex, pumicis, colophonis, ireos, singulorum denarij quatuor. Aliud: Cornu ceruini deusti drachmæ quatuor, corticis pini scilicet, cerussæ triens, æruginis rasæ dodrans, cadmiæ denarij duodeuiginti. Aliud: Florum mali Punici, atramenti sutorij, singulorum sextās, squamæ aris, aluminis scissi, uniuscuiusq; uncia, gallæ drachma. Aliud: Cerussæ, spumæ argenti, uniuscuiusq; uncia octo, recrementi plumbi, gallæ, myrrhæ aridæ, singulorum drach. quatuor.

Cicatricem inducens.

Aluminis scissi uncia, læuigata in aqua sextario maceratur: ubi dissolueris, aqua linamenta concepta imbuito, et sic cati utitor.

Emplastrum ad cicatricem inducendam ex simplicioribus.

Ceræ drachmæ quadraginta, spumæ argenti triginta quinque, diphrygis octo, myrtini hemina dimidiata. Facit etiam ad hæc emplastrum ex dactylis palmæ Phœnicine appellatum, & ex cadmia, & myrsinatum, & id genus alia. Ad ea uerò quæ ægrè cicatricem contrahunt, ceræ, myrtei, singulorum drach. sex, cadmiæ uncia sex, plumbi, thuris, singulorū drach. duæ, aluminis scissilis, aris cremati, uniuscuiusq; uncia, rubiginis rasæ drach. duæ, alternis diebus soluuntur.

Inueteratis & cicatricem uix contrahentibus.

Cadmiæ, chrysocollæ, aluminis scissi, singulorum drach. octo, æruginis, squamæ aris, uniuscuiusq; drachma, resinæ ex pinu

pinu drach. quadraginta, ceræ drach. centum, myrtini quantu-
 tum satis est. Aliud: Ceræ, resinæ ex pinu, singulorum seli-
 bra, cadmiæ tantundem, chalcidis crudæ quadrans, myrtini
 quod sufficit. Cadmia in uino dissoluitur, & chalcitis, tēpori-
 bus Caniculæ platysmate utitor. super id aut linamētum con-
 ceptum, et spongiā ex uino, inducito. Aliud: Aeris tosti, alu-
 minis fissi, singulorum sextans, salis ammoniaci denarij duo,
 ceræ selibra, colophonæ tantundem, myrtei sextans. Arida
 ex aceto in sole diebus uiginti diluantur. Cum autem mellis
 spissitudinem acceperint, liquefacta & refrigerata cera mol-
 lificando miscetur. Confert ad hæc præterea medicamen-
 tum ex pumice, item lsis, & consimilia.

De maleficis hulceribus, quæ Chironia, Telephia
 dicuntur. Cap. 46.

Nueterata, & quæ ægerrimè ad cicatricem ueniunt hulce-
 ra, alij Chironia, tanquam Chirone medico excellentissimo
 in curatione egerēt: alij uerò Telephia, quod eiuscemodi hulce-
 re Telephus diu uexatus fuerit, nuncupant. Considerandum
 igitur, num uniuersum corpus prauo succo redundans, id ge-
 nus affluentias hulcēri transmittat, humorq; superfluuus ido-
 neorum medicaminum officio euacuandus est. Quod si uarix
 crura hulcere occupata quem infestauerit, tum etiam quem
 admodum in Chirurgia explicabitur, tollendum est. Vel san-
 guinis detractione euacuandum, non parè auferendo san-
 guinem: mox topicis utendum adminiculis, quæ instaurans
 di potentiam absque rosione contineant. Simplicia ergo quæ
 ex pumice, diphryge, squama, ærugine, calceq; mediocri-
 ter lota constant, alumen item scissile læuigatum insperget:
 Hyssopi drachmas quatuor, nitri duas, uuæ passæ quatuor, il-
 lito prius melle, cataplasmatibus modo inducito. Squamæ por-
 rō æris drach. decem, aluminis duas, cum ceræ drach. decem,
 subactis in sole, superimponito.

Compo-

Composita sunt hæc. Emplastrum ad Chironia.

Cerussæ uncia octo, aluminis scissi duæ, squamæ æris drachmæ duæ, salis ammoniaci, thuris, æruginis rasæ, corticum malorum granatorum, uniuscuiusque sextans, calcis uiuæ uncia, ceræ libra, myrti libra una cum dimidia. arida uino dissolue. Hoc callum statim à principio tollit, & depositum seruetur. Postremò autem remollitum myrtino, cicatricem inducit. Aliud: Spumæ argenti libra, olei libræ duæ, chamæleontis herbæ nigræ, radicis aristolochiæ, gallæ immaturæ, singulorum uncia, galbani, ammoniaci thymiamatis, thuris, uniuscuiusque uncia duæ: præparato, cum radicibus uiridum harum dinum mouendo.

Archigenis ad Chironia, cum in tibiis, tum in mammis cacoethe, strophulas & parotidas.

Adipis bubuli libræ tres, terebinthinæ quincunx, manne septunx: terræ Sardæ appellatæ, qua pictores utuntur, quincunx. his quæ liquari possunt lachrymæ, cum aridis confusis utitor. Aliud Archigenis: Ceræ triens, olei omphacini, polinis uel lachrymæ thuris, diphrygis, squamæ, singulorum drachmæ quatuor, cum aceto arida terantur, mellisq; crassitudine facta, misces cerato, & utere, linamentum conceptum immergendo. Aliud ad fœminarum, & aliorum tenerioris cuticulæ hominum maligna hulcera: Ceræ Tyrrenicæ drachmæ octo, pinguetudinis taurinæ, terebinthinæ, plumbi destili, & eloti, cuiusque drachma una: utere cum linteolis, rosaceo uel myrtino imbutis.

Ad cicatrices atras. Cap. 47.

Vscas cicatrices exerit oleum, in quo radix bryoniæ candidæ, & nigræ, donec succus extrahatur, decocta sit, impositum. Nepeta item in uino elixa, spuma argenti elota cum rosaceo candido. Quæ lichenas sequuntur cicatrices, & alias, reliquæ cuti concolores facit asininus adeps illitis, crucæ semen contritum cum felle caprino,

¶

Et bouillo, et ouino illitum, cum spuma argenti. Ouillus talus deustus uino adstringente leuigatus, ammoniacum thymiam cum suillo felle illitum. Composita porrò ex argenti spumæ, mentæ, thuris, æquis partibus cum melle. Aliud: Nitri, ammoniaci thymiamatis, sulphuris igne intacti, myrrhæ, æquas singulorum partes in aceto albo, uinòue aut aqua friatas, par cissima manu, ne exulcerationem excitent, illinito. Aliud: Cretæ cimoliæ, stercoris columbini, saponis, thuris, par pondus ex aceto. Smegma tollendis cicatricibus nigris: Cretæ cimoliæ drach. octo, spumæ nitri quinq; ueratri albi tantundem, liquoris glandis unguentariæ drachmæ quatuor, in balneo cicatrices absterge.

De hulcerum lacunis. Cap. 48.

Quando cutis quæ hulceribus adiacet, longo temporis spacio, subiecto corpori non coalescit, et cōglutinatur, Græci colpon, Romani sinum appellant. Proinde cum in superiorem hulceris partē sinus porrigitur, facili destillatione per os sanies excernitur, et promptius coalescit. Cōtrā autē, qui ad inferiora uergit, in hærens sanies cōtiguas aliquot partes intus corrodit: et nisi incisionē prius, quo subterfluat, machinatus fueris, nihil egeris, neq; ipsum carne replendo, neq; cōglutinando. Quod si lacuna alicui membrorum, uerbi causa, brachio, aut crure, insinuata sit, absq; diuisione ex aduerso facta poterit decliuis figurata cōglutinari. In brachio nanq; prope cubitum hostiolo existente, summā manus partē altius protendens, sinum in fluxionē conuerteres. At si in femore prope genu terminetur sinus, situm eius pronum reddes, si popliti ceruical molle subieceris, quò inguina inferiore sitū habeant quàm genu. Quapropter si carnis impletionē sinus nō requirat, cōtinuò per tubulum rectò perforatum uesiculam intus habentē ad abstergendā simul in hærentem saniem, aquoso melicrato potabili eluendus est: sed ad futurā cōglutinationem, uino uel mulso, deinde ad ea quæ cōglutinandi uirtutem habent, deuenia

LIBER QVARTVS.

deueniendum est. Sin cauus sinus incarnationē desideret, pri-
mum quidem est, exiguum medicamenti ē charta arida cū ro-
saceo immittere: proximum, linamento filatim concepto
ostium obturare. Ab hoc medicamentum Isidis, aut Machæ-
rionis, uel id genus aliud emplastrum, cum rosaceo cerato li-
quidiore cōpari modo inijcere. Sinu uerò moderatē iam car-
ne impleto, conglutinans aliquod medicamentū imposito, per
inde atq; recens cruentum uulnus curabas. Bius ordinis sunt,
Barbara, dichroma, et rubra, fuluāue adpellata: sed omnium
præcipuē id quod ex rhicinino, & metallicis, sine cera præ-
paratum est. Rubrum Galeni emplastrum conuenit. Post me-
dicamenta adhibita, spongia recens, uel ex mulso, uel ex uino
circunquaq; admodum molliſsimē adplicanda est. Deliga-
tura autem à fundo sinus inchoans, ad os ipsius terminabitur.
Vinculorum reuolutiones fasciæq; linteæ, fundum sinus citra
dolorem constringant: deinde paulatim remissæ usq; ad sinus
oris laxius connectantur, emplastro sinui foris circumposi-
to, forcipe secundum orificium ita discisso, quò sanies possit
excerni. Pusillo interim alio in excisi locū emplastriolo im-
posito, ex eodē medicamento ad effluxionem laxo. Sinito autē
ipsum ad solutionem usq;: qua tertio quoq; die facta, auferes id
ipsum, atq; permutabis, medicamento totum sinum ambiente
semper dimisso. Indicium autem tibi sit, nunquid profundior
pars sinus probè sit conglutinata, sanies emanans pauca &
concocta, uel si nihil effluat, sensilis. Præterea si eodem in sinu
neq; dolor quispiā, neq; tumor percipiatur, sed locus omnis cō-
tractus, aridus, & indolens appareat. Quin si pus quoq; matu-
rum in ore cōspicias pauculum, noli omnino de conglutinatio-
ne desperare: sin primo uel altero die sanies aliqua tenuior ē
sinu excernatur, de eodem conglutinando spem non abijcias.
Sæpe etenim medicaminis uires uehementer ex subiacentibus
partibus humore prætenuē exprimūt. quo quidē expresso, lo-
ca moderatē siccata contrahūtur et cōglutinantur. Tertio ue-

A a

ro, uel

sed uel quarto ab initio die, si cruda sanies per os appareat, sinum non coaluisse intelligito. Insistendumque eodem medicamento: et si, ut solet, propter madorem quempiam decidat, eadem etiam mutare, nihil est absurdum.

De sinibus ac laceris.

Si in abscessus curatione serius ad incisionem, uel medicamentum peritia, uel eius cui medetur timore deuentum sit, cutisque sinum ambiens tenuis, et dirupta ueluti attritum uestimentum euaserit, fieri nequit, ut memoratis collutionibus elidatur. glutinatorum idcirco medicamentum, substantia quidem liquidum, sed facultate aridum, utiliter applicabimus. Cuius classis est, compositio ex chalcitide, quæ Phœnicina adpellatur, oleo imbuta ueteri, quæ nondum induruerit, neque manus inquinare desuerit: mox uero cum uino mediæ ætatis macerata: deinde orbiculatim competenti cum deligatura imposita. Subuenit autem lacinia rum instar detrita, ceu traditum est, cuti haud parum, mel ad spissitudinem usque emplastri elixum, et superinductum. Satius uero fuerit, post illitionem per cribrum in sublimem suspensum myrrham in puluisculum exquisitissimè tritam, uel aloen, uel thus, uel pariter omnia inspergere. Expertus uero sum, testis centaurium admirandæ opis esse in hac re præsidium: proximè uero est simphytum: ab hoc tertium bonitatis locum habet Illyricæ iridis radix: post quæ eruinam comperi farinam cum primis utilem. Atqui inter coquendum nonnunquam eadem melli inferimus, cum auferendus est à flamma lebes. Præstiterit uero, si illo ab igne sublato hæc fiant: deinde agitetur, ubique tepidum euaserit, sinui imponatur, atque perinde ut tradidimus, illigetur.

De fistula. Cap: 49.

Fistula sinus est callosus: ex abscessibus plerumque oriens, sumpta per translationem ab harudinum fistulis appellatione. Quare si ad os usque decumbat, curari hanc absque manus opera impossibile.

impossibile est, nisi temporis spacio sua sponte squama uel os abscedat. At si in os non desinat, medicamentis callum elidentibus et cōglutinātibus curabitur. Sunt igitur hæc quæ callos adimunt: spondilij radix circumrasa & imposita, fistularum callos abscondit: ueratrum item nigrum fistulis impositum, in duobus tribus diebus callum expungit: amurca cocta, et ad collutionē offusa: Sory crudum uel tostum, cum exiguo uino immodicē diluto, infusum. Sory item, et crocomagma, cū hydromelite: aut elaterium terebinthina exceptum, in collyria formato, et superinducito: aut laserpitij radicis succū infundito. Cōsumit callos etiam illud: Aeruginis drach. duodecim, guttæ ammoniacæ duas, aceto exceptas, in longum fingito.

Collyrium quo ad erunctionem calli fistularum utimur.

Ammoniæ suffiminis, atramenti sutorij, rubiginis, misyos, chalcitidis, gummi, æquales partes excipiuntur aceto. Aliud ex Heliodoro Chirurgica: Cadmiæ, misyos, atramenti sutorij, æris cremati, gummi, singulorū drach. quatuor, chalcitidis crudæ drach. treis, lotio pueri impubis excipito, et in collyria redigito, de quib. uno fistulæ imposito, panis medullā aqua maceratā exterius applicato, mutans subinde, tātisper dū inflammatio quieuerit, et crusta exciderit. Aliud, quod in Alexandria accepi: Anchusæ radicē, misyos tosti, chalcitidis, æruginis, aluminis fissi, atramenti sutorij, aloes, singulorū uncia, cantharides quinque, aceto læuigata in penicilla coguntur. Aliud: Atramenti sutorij drach. duas, chalciteos, rubiginis, singulorum drachmam ammoniaco excipito, & utere. Callo autē discusso, rubigine tosta cum mulsæ purissimæ octuplo factis collyrijs, repurgantur. Vbi callus extricatus fuerit, remedijs earne replētibus utendū. Collyrium procreandis carnibus: Aloes, myrrhæ, guttæ ammoniacæ, ouorum testarum crematarum cineris, æquas partes aqua diluito, facitoq; collyria, & applicato. Aliud: Myrrhæ, aloes, thuris, malicorij, par singulorum pondus aqua excipito: sunt qui felle taurino excipiant.

Ad 2 Carni-

Carnibus etiam ex uuis acerbis succum in collutionem adhibent. Nouimus ipsi quempiam, qui cedrio liquore fistulas coluebat: et uoti compos subinde factus, admirandus habebatur. Postquam autem fistula carne expletur, medicamentum conglutinandi potentia praeditum, est adbibendum, eodem, quem in alijs sinibus explicui, modo. Sed cum angusta pariter et oblonga fuerit fistula, inquit Galenus, nec dum callum, sed sordium modò illuuiem contraxisse appareat, ante omnia lixiuium immisi: deinde in fistula tandiu permisi, dum sorditiem uniuersam radicitus emanasse sperabam: post hæc pharmacum imposui. est illud uerò, quod rhicinino oleo constare, superius dictum est.

De ruptis hulceribus: Cap. 50.

Hulcerum uerò nonnulla cicatrice obducta, postea tempore haud ita multo interiecto, denuò inflāmantur, ac dirumpuntur. Osse etenim quopiam male affecto, caro quidem ambiens faciliè cicatricem contrahit, ac sana in totum esse uidetur. Rursum uerò humoris colluuiē ualenter influente, ex osse sensim in alto contabescente, inflammatio cum purulentia cicatricem deradens superuenit. Curatio igitur istiusmodi hulcerum, tantam desiderat siccitatem, ut os afflictum decidat. Promptè igitur ossium lacunas replebunt papaueris syluestris, ficiq; folia, cum tenuissimo hordeaceæ farinae flosculo lauita, et uino cataplasmatibus more inducta. Vel alterci semen, et atramentum sutorium pari modo trita, imposita: peucedaniq; radix ossium squamas breuissimè remouet.

De hulceribus articulorum. Cap. 51

Articuli sicciores, carnosius sunt partibus: cuius ergo cum hulceribus impetūtur, aridioribus egent medicaminū praesidijs. Pastillus igitur Polyidæ cum uino, tantisper dum strigmenti balneorum crassitudinem induat, contritus, magnificè opitulatur: et quæ huic similiter exiccant medicamina. Melius insuper se habuisse uidimus, si aqua maris uel muria frequentius

quentius irrigentur. In articulis itaq; utēdum ijs, quæ maiore arefaciendi facultate sunt prædita.

Quæ paxillos, tela, spinas, & consimilia extrahunt. Cap. 52.

Tbla, spicula, culmos, surculos, & spinas educunt, anagal-
lidis utræq; species, aristolochia rotunda, gutta ammoni-
ca cum melle, herba apollinaris fructus læuigatus, & cata-
plasmatis modo impositus. Harundinis radix contusa, mel-
liq; commixta, in linteolum amplum illita, superq; accommo-
data, celerrimè extrahit.

De sanguinis e uena & arteria eruptione. Cap. 53.

Quando corporis membra sanguinem fundunt, situs ei qui
in sinibus relatus est, cōtrarius, competit, sursum uidelicet
uergens sed intra modum, periculum nanq; ne dolore confla-
to sanguis rursus e uase prorūpat. Nihil enim uero uehemen-
tius sanguinis eruptionem concitat, inflammationesq; adau-
get, atq; dolor. Sanguine igitur ex membris prosiliente, confe-
ctum digitum osculo hūlceris uasorum inijcito, clementer inni-
tens: & ne quem dolorē inferas, reprimens. pariter enim san-
guinem cohibebis, & grumum uulneri conciliabis. Quin etiā
si uas unde sanguis emanat, profundius deliteat, exactiore di-
ligentia perdisces cū positum, tum quantitatem ipsius, &
uenā ne sit, an arteria: post hæc uerò uase existente exiguo,
eorum aliquo quæ sang. & om. supprimunt, utendum. Præcis-
pua eius ordinis sunt ea, quæ obstruendi gratia inducuntur,
composita ex colophonia, farina triticea, polline, et gypso,
& quæcunq; id genus, oui albore eliquata, & cum leporinis
pilis imposita. Spacioso autem existente uasculo, hamulo im-
misso, ipsum extendito, & moderatè circummagito. Suppresso
uerò sanguine si quidem uena fuerit, citra laqueum conaberis
sanguinem ysdem ipsis medicaminibus coërcere. Sin arteria,
è duobus alterum facies, uel funiculo circūducto, uel toto præ-
ciso conceptaculo, sanguinis effusionē cohibebis. Filum quancū-
doq; magnis etiā uenis circumponere, quemadmodum & dis-

secare interdum totas transuersim nimirum cogimur. In hanc necessitatē deuenies in his uenis, quæ rectæ è profundiore corporis loco ueniunt, præsertim per angustias loci, uel principes particulas. Sic enim pars utrinque repellitur, & uulnus à corporibus adiacentibus premitur, & contegitur. Tutius uero fuerit utrumque facere, funiculum quidem uasis radici circumponere: quod autem inde profertur, amputare. Hæc ubi sic perpetrata sunt, uulnus quamprimum fieri potest, carne repleto, priusquam conceptaculi uinculum decidat. Nam si protinus carne impleatur, locus uero alibi uacuus offendatur, malum quod Græci aneurysma nominant, oboritur. Discernes autem, uenâ ne an arteriâ sanguinē fundat, quod arteriâ sanguis flauior & tenuior esse consuevit, et cum pulsibus exhaeritur. Venæ autem sanguis atrior, & sine pulsu. Omnium igitur, quæ nouimus, medicamentorum ad incarnationē optimum est, quo etiam aduersus sanguinis membranarū cerebri eruptiones tutissimè utimur, aduersusque ceruicis uulnera, et ad iugulares colli uenas. nam harū quoque, nullo adhibito funiculo, sanguinem compescit: Accipit autē thuris pinguis simi partem unam, aloës in delicatoribus quidē corporibus partem dimidiatam, in durioribus uero tantundem: & thuris præterea loco, pollinis eiusdem æquale pondus, cū oui albugine ad melioris consistentiam subiges: postea leporinis pilis mollioribus excipito, inde uasi & hulceri uniuerso liberalius imposito. Deligetur autem foris fascia ex lino, cuius primæ nexuum reuolutiones quatuor aut quinque, ipsi uasculo unde sanguis erūpit, injicientur. Postea uero ad radicē ipsius nexibus deuolutis distribuentur. Deinde ubi tertio die soluerimus, si quidem medicamentum hulceri etiā dum solidè adhæserit, nouū rursum orbiculatim superaccommodabimus, & madefacientes, contegētesque, haud aliter ac prius fasciabimus. Quod si primū linamentum reiectum sponte exciderit, leuiter summis digitis conceptaculi radicē premendo, ne quid influat, illud quidē sen-

fms

sem detrahe, sed alterũ applica, ab hoc curãdi ordine nunquã recedens, donec carne expleatur conceptaculũ, semper membrũ in accliuũ figura sine dolore seruãdo. Cãterũ quã crustas pariunt, glabriorẽ magis, q̃ secundum naturam fuerit, de lapsa crustula partem efficiunt. Plerosq; ex ijs quib. crusta decidit, difficulter cõpescibilis secuta est sanguinis eruptio: utendum tamen est illis, cum ingens urget necessitas. Extremã autem necessitatẽ utendi medicaminib. crustam inducentibus, uel cauterijs candentibus, censeo, cum ex erosione putredinẽ resistente sanguinis profluiũ oboritur. Vbi in id genus affectibus, totum quod putredinẽ sensit, exciderimus, minore cum discrimine, aut ipsius ueluti radicem deurere, aut remedijs incrustandi naturam tenentib. uti licebit. id uerò in uerendis et anopotiũ solet contingere. Scopus uerò medicamentorũ crustas inducentiũ erit, cum stipticitate caliditas, perinde atq; in chalcitide, misyi, et atramẽto sutorio existit. Sed quã è calce uiua constant, his uehementiora quidẽ sunt: sed quoniam constringendi uirtute calx destituitur, crusta citius ipsorũ applicatione decidũt. Prãstaret autem ut manerent diutius: festinat quippe caro ad basim ipsam supercrescere, & tanquam operculum uasis promanantibus effici. Cãterũ eiusmodi sanguinis profluium, isatis satiua si inspergatur, eximiẽ compescit, uel galla tosta: expedit autem cauteria ignita aceto uel uino extinguere. In summa, sanguinis profluvia supprimunt, incõposita quidẽ, aloe, ibus, manna, Samius aster, ærugo ferri, lanae rum similiter crematarũ læuigatissimus cinis, sterco asini & equi, malicoria, diphryges, galla, myrtus arida, alumẽ omne genus, tum crudum, tum combustum, colophonia, uitis cortex, uel folia arida platanorum, galbulorum puluisculus tenuissimus, prãsertim cum humorem concretũ abiecerint. Priuatim uerò narium sanguinis profluvia impositu sistũt, iunci marini semen, foliorũ urticæ succus, chalcitis, solastrum deustum, pili leporis, ferula dimidiũ crematum cum aceto, asininuma

A4 4 sterco

stercus siccum aut humidum, succus porri cum thure elychnio exceptus. Composita autem cuiuslibet sanguinis profluvij remedia hæc sunt: Spōgiam recentē liquida pice imbutā, & bitumine circumlitam in olla recēti combure: cineris uerò partibus duabus miscētur plumbi, & stibij, singulorum pars una. Aliud: Thuris, mannae, sulphuris uiui æquas partes infere. Aliud: Chalcitidis drachmā octo, thuris uel mannae sedecim, resinae frictæ octo, gypsi deusti tantundem. Aliud crustas generans, sanguinemq; cōpescens: Chalcitidis, æris tosti, atramenti sutorij, misyos assati partes æquales. Ad hæc, Rhodia cognomento, & Xanthe, sanguinem optimè cohercent.

De neruis faucis. Cap. 54.

Nerui faucij, uel puncti, ob sentiendi, qua præditi sunt, excellentiam, inflammationem doloremq; immensum experiuntur. Proinde febres & conuulsiones ipsis superueniunt: nonnullis uerò deliria, propter neruorum ad cerebrum continuitatem. Verum quandoq; in alijs etiam uicinis uulnerato membro locis, inflammationes & abscessus secundum neruum uulneratum, ob commercium quod cum ipsis obtinet, oriri assolent. Cutis itaq; uulnus nullo glutine commissum, diductumq; quo per id sanies excernatur, seruandum est. At si punctus in altum, ita ut in conspectum non ueniant, descenderint, duplici sectione et decussu se mutuò secante opus est. Sed quod ad opis ferendæ attinet iudiciū, si corpus deprauatis succis infartum sit, inflammatioq; magna affuerit, protinus à sanguinis detractione medendi inchoanda est ratio. Si uerò uitiosis scateat humoribus, medicamēto etiam purgante utendum. Pharmaca aut uulneri adhibeantur, quæ dolorem sopiunt, et aperiendo saniei emissarium promoueant, non facta præsertim dissectione. Aquam proinde calidam cæteris quidē inflammationibus utilissimā, scito uulneratis neruis esse quàm infestissimā, Satiùs ergo fuerit neruos intactos oleo tenui, adstrictione prorsus carente, ad sensum solido perfundere. Nec enim frigidū, neq; etiā tepidum aded

aded innoxii est. Cæterum ex medicamentis, resina terebinthina accommodatissima est, per se quidē cum pueris, tū sceminis, et carne mollicula præditis: eliquata uerò cū euphorbio, in carne durioribus. Et si quando duriora obuenerint corpora, cum oleo quopiam tenuiū partium macerata. Si nerui inflammatione confluentur, & putredinē sentiant: cataplasmatibus hordeaceam habentibus farinam, aut fabaceā, aut eruaceā in lixiuio stillatio cum oxymelite coctā, utendum. Citra cocturā uerò, in puncturis cerato etiā eiusmodi quis utatur: ceræ uncias treis, euphorbij unciam, uel sterces columbinæ: in duriusculis carne corporibus, olei uncias duas, & terebinthinæ nō nunquam uncia. Emplastri uerò instar remedium efficies, si in euphorbij unciam, ceræ, colophonice, olei & picis pinguis, singulorum selibram inijcies: uerū si resinæ loco propolim pinguiſſimam indideris, reddes id præstantius. Ad punctos sanè neruos illud excellens est, conferens etiam ictibus rabidorum: Aceti sextarium, picis pinguis libram, opopanax quadrantiem. Opopanax solutum aceto, amplius laeuigato, et picem eliquatam decoquito. Hoc neruorum puncturis expedienti est præsidio, non permittens puncturæ os conuiuere, ueluti neque rabiosorum morsuum hulus cicatricem ducere: sed duris duntaxat prodest corporibus. Sin uerò in pueris, aut mollioris carunculae hominibus punctis uti uelis, liquefaciendum est aliquo discutiente medicamento: uerbi causa, amaracino, uel opobalsamo, uel oleo ueteri. Cōuenit etiā medicamentū Basilicū, quod nitri aut calcem uiuā, aut euphorbiū, aut sulphur igne intaſum, aut syluestris palumbi fimum, aut opopanax, aut sagapenum, aut succum Cyrenaicum, aut castoriū continet. In libram uerò medicaminis, dictorum alicuius unciam conijcito. Conducit autem ad neruos uulneratos optimè, in primisq; compunctos. Poterit autem quispiam ruri, nullo horū ad manū existente, propolim recentē & pinguem uulneri imponere, uel fermentū, præsertim antiquū, per se, aut cū propoli

A 4 5

mixtū,

mixtum, uel unā cum succo tithymalli. Cataplasmatīs prātea
rea ex oxymelite, uel lixiuio stillatio, cum farina fabacea,
aut eruina, aut ciceris, aut lupinorū amarorū, aut hordeacea,
aut tenuissimo farinae polline: nō solū cū inflammationē expe
riūtur, uerūm ab ipso cōfestim initio, utitor. Cataplasmata ue
rō relaxātia, in neruorū uulnerib. semper uitētur. Quod si non
pūdim neruus, sed cāsīm euidēti diuisione sauciatus fuerit, ita
ut prāiacēte etiā cute diuisa, neruus nudus et rectus appareat,
minimē aut trāsuersim dissectus, prādictorū ex euphorbio
et alio tāte ac credinis medicamine nullo uteris. nudatus quando
quidē neruus, uehementiorē ipso uolentiā non feret. Calcē
itaq; assumes, iterū atq; iterū tempore calido ablutā, et libera
liore oleo irrigatā. Vtilis etiā cōfectio ex pōpholyge, necnon
ex melle contexta, in rosaceo multo eliquata. Neq; uel tantil
lū ex his uulnerationem cōtingat, cautio est. quoniā plurimū
sub sensum uenit neruus, et est tēperatura frigidus, ac summo
primariū partiū principi cōtinuus. Quin ne oleo quidē id ge
nus hūlceris, quoniā cōtaminatur inde, aspergendū est. Sanies
ergo tantū nucleari specillo, lana molliore implicato, abster
gēda est. Omnibus uerō ex animi sentētia succedentibus, citra
periculū datur passio madefacere. Atqui in fortioribus: Polyi
da etiā pastillo cū defruto calido, linamento discerpto illito
utere. Vbi uerō neruū denudatū contexeris, linteola discerpta
foris adhibēda sunt, aliquo eorū quā ad angusta uulnera con
ducūt adiecto: uerbi causa, medicamine ex euphorbio, aut ex
stercore columbino, ita ut ampliter sanas etiā partes ample
ctatur. Si uerō uulneratio per transuersum fuerit, magis peri
culū si obtegatur: uel maius conuulsionis periculū imminet.
Huic illiq; medendo eadē prorsus adhibēda est curatio: etsi in
uulneratione etiamdū recēte, cōsutionibus quidā usi sint, et glu
tinantibus quibusdā medicamētis. Verūm oportet cōsutiones
non admodū superficiarias moliri, ne profundiora incoalita
debiscant: sed altiores, rursus obseruando, ne neruum acu
compungas.

compūgas. Scire uerò in uniuersum oportet in neruorū uulneribus, quod medela puncturis subueniens natura calidior, non potest nerui hiatum sanare: mordicationem enim ipsarum, & effrenem feruorem sustinere non possunt. Neque quicquid medicamenti diuisionibus subuenit, punctiōibus statim congruit: quoniam uis eius altius non penetrat, quum arcta admodū existit cutis diuisio. Nutricatus hic tenuis esto, culcitra mollis: calidoq; oleo axillæ, caput, & ceruix perfundentur. Si eris, inguina, sumen, et finitima loca neruorū uulnera experiantur, ualeant in totū, usq; ad inflātionis remissionem (cum aqua attactus ipsis, ut dixi, infestus sit) balnea. Quoniam autem nonnulli propter solennē lauandi consuetudinē, lauacris abstinere non sustinent: siquidē membrum uulneratū fuerit manus, danda est opera pro uirili, ne hæc, aqua uel calida, uel multo magis gelida made fiat. Sin pedum uulnus exerceat, cum fieri nequeat, ut non irrigetur aut humectetur, sub balneum sauciæ pedis parti emplasticū aliquod medicamentū inducatur: foris insuper, multiplicatis linteis quamplurimis oleo madidatis muniat. Iterū extrinsecus uinculum ē linteo injiciatur, atq; post hæc rursum in balneo ligamentum oleo prius perfunde, iam ægro in solium descensuro: ubi lauerit, cuncta quæ adplicata fuerant porrice, uterisq; præscripta totius curationis regula. Contuso aut solum neruo, si cutis simul cōtundatur et exulceretur, appositū fuerit remedium ex farina fabacea, et oxymelitate cataplasma. Licet etiam interdum erui farinam & iridis adycere. Quod si cum contusione dolor infestet, picem liquidā admiscebis: sin cutis contusa nō sit, summū erit discussoriū, calido oleo, anethino inquā, aut rutaceo, aut irino, aut amaracino locū iugiter irrigare. Neruo aut uniuerso prorsus dissecto, discriminis quidem nihil incumbit, sed membrū languidū et ignauum redditur. Huic uerò curatio cum alijs hulcerib. compar adhibeatur. Hactenus quidē de neruorū sauciorū, quæ simpliciorib. adminiculis peragitur, curatione sufficiat. Nonnulli uerò

uerò ex pluribus rebus cōpositis uti consueuerunt, qualia sunt è metallicis confecta, cognomento Barbara, & Cissinum, & quod ex senecione præparatur, & Melanchlorū, ipsaq; Indica, Harmonia, & Athene: quorum compositiones, utendi rationem septimo reperiēs uolumine. Quoniam autem locupletissimi quidam sumptuosis in neruorum uulneratione medicaminibus uti dignantur, Galenus ad punctiones neruorū huiusmodi tradidit: Cinnamomi, dictāni, fœniculi, uniuscuiusq; uncia, amaraci sextans, ceræ bebis, opobalsami dextans, resinæ terebinthinæ uncia. Aliud: Liquoris Cyrenaici uncia, ceræ quadrans, succi balsami libra. Facit ad neruos denudatos: Ceræ unguentariæ uncia tres: unguenti spicati, aut phuliatii, uel nardini uncia duodecim: pompholygos, spica nardi, amomi, folij, singulorum uncia. Atq; hæc quidem ad miraculum usq; pollere, Galenus ostendit.

Ad contractos seu ligatos articulos. Cap. 55.

ANcylas & ancyloses nuncupare solent articulorum detentiones ex redundantium humorū infartura uel neruea quadam tensione conflatas. In quibus emolliēdi & relaxandi uiribus præditis medicaminibus opus est. Communiter his remedia, quæ in membris scirrho infestatis, adhuc rorò magis, quæ de dissolutis enumerata sunt partibus, succurrunt. Priuatim uerò confert ex hydrelæo fots, in quo cocta sunt semen lini, fœnogræcum, albæa, laurus, cucumeris syluestris radix, & ipsum quoq; sicyonium. Post hanc articulorū asperſionem adhibeantur acopa. primum quidē simpliciore, ueluti sunt ex nigra populo, ex abiete, bromium, basilium, pyxis: post quæ etiam Aristophanium, & quod ad Azanimum. Vehementissima uerò sunt, Lisoponiū appellatū, & Pœcilum: & ex emplastris seminis roris marini, non modò Amythaonis, sed & Anicetum. Probatissimum uerò: Bdellij, adipis uitulini, guttæ ammoniacæ thymiamatis, treos Illyricæ, singulorum drach. sedecim, opopanacis, galbani, styracis, thuris, uniuscuiusque drach.

drach. octo, piperis grana centum & sexaginta, cera libra dimidia, resinæ terebinthinae tantundē, fecis irini quantum satis est, uini quod sufficit. Tusile est medicamentum. Probatum etiā non contusum (aut laesitudinem tollens) dilutum irino, uel cyprino, uel laurino. Inter acopa uerò et emplastra numerantur ex petasone polymagmatum. Cæterum in acoporum usus cum molli et constanti frictione adhibebitur, factò prius periculo, nunquid flecti extendiq; possit affectus articulus.

De laxatis artubus. Cap. 56.

In diuturnis quæ cum febre sunt morbis, & in colicis, paralyticisq; ægitudinibus, articuli sæpenumero relaxati flaccescunt, maximè si calidior ipsos & humidior intemperies occupauerit: hinc etiam motio impeditur. Quibus acaciæ succus aqua dilutus, & fotu adhibitus, congruit: uel rubi, uel myrti, uel lentisci, uel ulmi radicum corticis decoctum, uel malicoria cataplasmatibus modo impasta, uel myrti folia unà cum cesrato myrteo imposita. Robur quippe neruorum nexibus est inducendum, cū stipandi & arefaciendi uirtute prædita materia. Huius itaq; farine artubus medicamenta sunt adhibenda, cuiusmodi ex salicibus constituitur, & oxyra, & phoenicina, quæ uino astringente, uel aceto constat. Permulti uerò ex algore istiusmodi languorem creari autumantes, calidioribus usi adminiculis, detrimentum multo acerbius intulerunt.

De lumbricis. Cap. 57.

Res sunt omnes lumbricorum differentia: una quidē, terti forma secundum crassitudinem est: altera uerò latiore, unde latos nominant: tertia, eorum quos ascaridas nuncupant. Omnium uerò generū origo ex cruda, crassa, pituitosaq; materia, & putrefactioni idonea est, cuiusmodi in pueris, & in alijs, qui plenis faucibus auidè liguriunt, colligitur: nunquam autem à calida, acri, uel melancholica materia. nam hæc nutrimenti naturam supergressæ, ad lumbricorū procreationē ineptæ redduntur. e contrario hos biliosa potissimū excrementa interimunt, si quādo unā cū lūbricis flaua bilis, siue per infer-

na,

na, siue etiam per uomitum excernatur, ipsos in intestinis consistere: biliosum uero humorem, uel in ore uentris, uel in aliquopiam membro hæere scito. Singularum itaque differentiarn specie, ortum, locum, notas, et curationem explicabimus, principium à tereti et rotunda sumentes.

De lumbricis teretibus ac rotundis.

Lumbrici igitur teretes formam nemini obscuram continent, quoniam hi reliquis frequentiores sunt in gracilibus. plerumque intestinis consistunt, et in superiorem uentriculum procurrunt: proinde per os non raro eijciuntur, nonnullis uero per nares. Quod quidem uermium genus infantibus, quam ceteris, peculiarius, et magna quidem ex parte cum febre existit. Verum si circa febrium principia proueniant, subsistentiam ex subiecta corruptione recipiunt. Circa summos uero uigores, ex morbi malignitate. In declinatione autem, totius in melius transformatione. Tradit enim Hippocrates, bonum esse lumbricos rotundos ægrimonia ad iudicatorium tendente, progredi, qui ocysimè etiam pereant. Accidit uero lumbricos teretes habentibus, morsus intestinorum, et uentriculi, tussis non magna, arida, et irritantes: quibusdam etiam singultus: dormientes palpitant, et sine ratione experrecti eriguntur. Nonnulli cum uociferatione expergiscuntur, sed rursus in sopore prosternuntur. Pulsus inæquales sunt, et augentur febres absque ordine, quæ cum extremarum partium algore, ter quaterue interdum uel noctu præter rationem inuadunt. Infantes superuacue mandant, et linguam temere exerunt, dentibus strident, oculis conuiert, silentium amant, excitantibus indignantur, oculi apparent, suffunduntur mala rubore, atque rursus mutato colore liuescunt: atque hæc quidem per exigua interualla. Quibusdam ad uentriculum procurrunt, nauseant, et morsum efficiunt: cibumque laborantes auersantur, coacti uero nauseabundi uix deglutiunt: et si quid sumpserint, euomit. Non paucis uero uenter etiam multas esculentorum corruptiones excernit, atque tympani instar inflatur. Reliquum uero corpus præter rationem tabescit, neque fame, neque ulla euacuatione immo-

derata

LIBER QVARTVS.

derata admissa. Cæterū nō in omnib. omnia prædicta sunt sin-
 gulatim inquirenda indicia, sed quæ principatū tenēt: aliquādo
 uerò plurima. Accidūt hæc, cum animalia sese in intestinis cir-
 cumuoluunt, et morsum inferunt, et febrilis ardor uapores ad
 cerebrum eleuat prauos, ex coaceruato in uentre putrido hu-
 more exhalātes, in quib. partim quidem utrisq; iuxtā cū fe-
 bri, tum lumbricis prospiciendū est: partim uerò febrim haud
 magnopere curātes, prorsus expellere uentris animalia cōue-
 nient. Pleriq; etenim cum lumbricos negligerēt, corrofi ab ijs-
 dem, conuulsiq; extincti sunt. Nec desunt, qui asserunt se uidisse
 se, per inguina languentis lūbricos prorepisse. Expelles autē
 ipsos, si prius enecaueris: enecatur autē præsidys potissimū ama-
 ris. Cum igitur quartanæ febris, et animalū uentris commu-
 nis sit curatio, expedient præsidia simpliciora. Ius igitur cha-
 mæmelorū, uel myxariorū, ut uocāt, potui, uel ipsa myxaria
 de cocta esui offerātur: succus item sereos, aut coriandri semē,
 cum aqua calida, siue cū posca, uel auriculæ muris herbæ de-
 coctum, uel cornu ceruini ramentū, uel etiam rubrica sinopis
 laeuigatissima: olei præterea, ex nondū maturis oliuis expres-
 si amari cochliaria duo paulatim absorbeantur. amarulentia
 namq; lumbricos perimunt, lubricitate uerò ipsos unā cum o-
 letulo expellunt. Inflammatione uerò distentioneq; uiscerū exu-
 perante, ē semine lini & farina lolleacea, absinthio & bryo-
 nia radice utendum cataplasmate ex hydromelite, uel aspero-
 gine cum oleo chamæmelino, uino fructuq; absinthij, uel aloë
 præcordys adplicata. Quū febres nō uehementer fatigāt, mi-
 scenda est myxarijs menta, atq; præbēda. Quū ad infebricitā-
 tionem uentū est, etiā efficaciora: uerbi causa, seriphij decoctū,
 uel nepitæ, uel filicis, uel semē cardamomi, uel mali Punici a-
 cidi radici ius ad tertias decoctum, uel fricti cimini, & nitri
 fului, uniuscuiusq; diobolos tres: uel sandonicū, uel abrotonū,
 uel utrūq; unā cū melle catapotijs factis, uel lupinorū amaro-
 rū dioboli tres, aut brassicæ, aut erucæ semē cōtritū, uel absin-
 thium

thium, quod unum sæpius satis profuit. Exhibentur insuper aloes lotæ dioboli tres, quod ex his quæ probantur est nobilissimum: in robustioribus etiam, illota usurpatur. Quoniam autem pueri aloem non admittunt, instrumento quo os diuarcatur, supinis fasciola ipsis uolenter detentis, ore distento, per clysteridium quodpiam fistula non fragili munitum, inuitis aloem quanto plus fieri potest intimius transmissam inijciamus: quæ quidem admiranda curandi ratio puerorum molestæ aloem ferentium est, quibus sorbilia sæpe etiam numero alimenta, ceu iis qui cibum respuunt, infundimus. Et Cyphi, et Masuaphium utiliter adhibetur. Cornu item ceruinum deustum, cum pipere et melle, uel oxymelite: et reliqua quoque ex aceto mulso tentanda sunt. Præstat uerò, si scilliticum acetum fuerit, præsertim in adultioribus: uel sinapi, cum olei et aceti cochliarij quantitate. Cæterum quibus lumbricorum culpa fluore aluius perturbatur, his succus plantaginis propinandus est: uel ipsa etiam arida exhibenda est plātago. iuxta namque utriusque suppetias cum defluxioni, tum lumbricis contulerit. Cataplasmatibus modo adglutinanda sunt, polenta hordeacea cruda, filix, absinthium, farina lupinorum, sandonicum, et abrotonum. Iam uerò malicoria quoque, acacia, galla, uel balaustium admisceantur. Quoniam uerò sæpe potionibus amaris offenduntur aliqui ex iis quæ iam pridem enumerauimus, haud euidenter amara exhibe. Adhæc etiam chamæpityn, marrubium, enulam campasnam, baccas lauri, cassiam, thymum, pulegium, carpesium, cyperum, polypodium, irin, cnicum, rubiam passiuam, spinam Aegyptiam cum pipere, æquis portionibus pondo diobolorum sex, uel decoctum mentæ, uel radicis mori succum, uel elixationem petroselini, et id genus alia fragrantia semina. Extrinsecus aloem cum melino, uinoque adhibeto. hoc utique et appetitum excitat, qui summo uix studio reparatur. Admiscetur non raro aloem absinthium: uel umbilicus felle taurino, additis aliquibus amaris enumeratis expleatur: uel oleum rhododaphneæ

phnes crebro illinetur: uel cedrius liquor priuatim, aut cum cerato uniuerso uentri inducatur: uel pix arida læuigata inaspergatur: uel mentam, aut melanthium cum rosaceo adhibe: uel seriphij decoctum ipsis admisce, uel fraxini Persicæ folia contrita cataplasmate imponimus. Iam uerò medulla quoque ceruina unguinis modo circa umbilicum, abdomen, imum uentrem & lumbos utendum. Ceratum insuper illud, si res poscere uidebitur, applicabimus: Aloes, absinthij, farinae lupinorij, seriphij, nigellæ, uniuscuiusq; diobolos sex, ceræ unciam unā & dimidiam, chamæmelini quantum satis est, felle taurino læuigantur quæ sunt arida. Malsa porro subinde est immitenda, ut dulcore mellis inescata eadē uentris animantia, subducantur per inferna. Atqui si iam putrefacti in profundo, nō excernantur, sed magis euaporationes ab eis exurgant, sunt uel aloes potu, uel ex hac medicamento amaro subducendit quandoquidem etiam ipsis neutiquam inutilis mediocris alui est subductio.

De tæneis lumbricis latis.

Latus lumbricus est, intraneæ succingentis intestina membranæ, in corpus quoddam instar animalis mobile (ut ita dicam) permutatio, quod per partes interdum redditur, plerumq; totum simul excernitur, incredibilem longitudinis speciem exhibens: dissolutus uerò non coalescit. Abundat quandoq; in non febrientibus, quandoq; febricitantibus per diuturnas ægritudines accedit, continuos stomachi morsus inferens, appetitusq; ad cibos intemperatos. Quod enim animatum est in intestinis animal, escam ita obiectam deuorat, ut confestim alia opus sit: quæ nisi præstō sit, arrodit intestina. Comittatur affectus corporis gracilitas, & pulsus imbecillitas cum inæqualitate. Infallacissimum autem indicium est, si cum alui excrementis quædā semini cucurbitæ similia excernantur. Curatio cum superiore concordat. propinationes enim acres, & alliorum esus, conueniunt: filicis item, uel centaury decoctio

Bb

pota,

pota, & aluo cenemate immiffa: aut nepitæ, uel dictamni, aut pulegij. Infundēda infuper ab infernis partibus interdum muria. Propinato etiā illud, quod neq; his qui alijs lumbricis conturbantur inutile, potiffimè fi liberi à febre fuerint: Nitri rubei, piperis, cardamomi, par modus, exhibentur dioboli tres in uino, aqua' ue calida. Alius linēdus: Piperis, baccarum lauri purgatarū, cymini Aethiopici, maffiches, par pondus, mel lis quantum fatis eſt, præbetur cochliarium unum, mane, & noctu ſomnū inituro. Quod fi id efficacius reddere uolueris, nitri quoque ruſi tantundem adijce. Aliter: Enulæ campanæ, ammoniaci thymiamatis, piperis, alijs ſilicis, ſingulorum drach. quinque cum oxymelite calido. Per interualla potui dato euphorbij drachmam, uel geminas ætate prouectioribus. Aliud: Filicis acetabulum, nitri drach. duæ, cochleare unum aquæ præbeto, iam antea euocato. Præſtantius redditur adiectione ſcammoniacæ momento. Aliud: Mali granati acidi radicis corticis, extima ſemota parte, drach. quatuor. piperis tantundem, cardamomi drach. ſex, marrubij duæ, in melle ei qui prius porrum ſumpſerit, exhibentur. Caterum quo æger exactè à morbo uindicetur, theriacen, niſi uehemens febricula uetet, porrigito.

De aſcaridibus. Cap. 58.

Aſcarides etiā, ceu modò demonſtratum, lumbricorū ſpecies ſunt, uermibus perſimiles, qui in extremo inteſtini recti & muſculi anum ſtringentis initio (ſphindere Græcis appellato) cōſiſtunt, uehementem his partibus pruritus inferentes. Quæ uentris animalium ſpecies, ex prauis alimentis, frigedine, ciborumq; corruptione prouenit. Buacuādi ſunt itaq; in pueris glandibus ex melle, cum ſalis momento, aut nitri. in natu grandioribus, ex acri muria, uel centaury decocto cum nitro & melle: uel colocynthidis, aut abſinthij, uel chamæleonis, uel anchuſæ, uel cnici, uel hyſſopi, uel pulegij, uel nepitæ, uel lupinorū decocto, Poſt clyſteres rectum inteſtinū ſubungendum

ingendum est, simplicibus quidē acacia, hypocyssideūe, addito nitro, uel rhu Syriaco cum liquido alumine. Sed quorum alius astrictior est, lemnio sigillo cum uino. Compositis uerō, Andronis pastillo, atq; id genus alijs. Liquor præterea cedrianus per clysterem multis foraminibus terebratum (cuius sunt modi, quæ metrenchyte nomē habent) discutiendus est: uel carnem salitam scitē adaptatam podici intrudemus, ligamentoq; adhibito, quā longō subsistere possit tempore sinemus, atq; hoc ipsum identidem repetemus. In uniuersum, omnes qui lumbricis infestantur, ichneumonis pili iuuant suffiti. Alimenta præbeantur probi succi, & quæ faciliē in membra distribuantur: nec lumbricorum effeāricem materiam accumulānt, neque corporis robur labefactari permittunt. Proinde uinum exhibebimus ualde aquosum. Crebrius uerō cibaria ob hoc ipsum affectis largius præbeto, ne nutrimento destituti lumbrici, morsibus impetant. potissimum autem alendi tempus, cum nondum inaniti copiam adhuc alimonie habent. Quod si profluium uentris adsit, sciendum est lumbricos magis redundare eduljs non distributis. Et iam sorbiles a grotantibus dapēs ministrare conuenit, adiectis quibusdam etiam adstringentibus, quale est pyrum, aut pomum cotonium, aut malum Punicum, præsertim acidum. Foris autem uentri remedia, quæ alui recrementa adstringunt, sunt applicanda, quorum sylua superius est enumerata.

De dracunculis. Cap. 59.

IN India, regionibusq; supra Ægyptum animalcula quædā lūua lumbricis similia, dracontia ab animalis specie nūcupata, in musculosis corporis partibus, puta brachijs, cruribus, suris: in pueris etiam in lateribus sub cute consistunt, aperteq; mouentur: deinde ubi diutius extremum aliquod dracontij remanserit, locus suppurat, & aperta cute foris progreditur dracontij principium. Si trahatur, cruciatus excitat, maxime quando disrumpitur. Cuius ergo laminam plumbi appendens

Bb 2

dam

dam dracontio quidam affirmant, ne uniuersim, sed particulatim graui plumbi pondere decidat. Alij uerò eam curandi rationem damnantes, propterea quod nihilominus grauitate plumbi dracontium abrumpatur, grauioreſq; dolores concitet, præcipiunt membrum in aquam calidam immergendum, quo dracontium percalfactum foras prodeat, mox digitulis membratim extrahendum. Soranus autem non animal planè principium, sed neruuli alicuius substantiam dracontium esse autumat, opinionem duntaxat animalis, eo quod moueatur, inducentis. Cæterum siue hoc, siue illud, cuius superius mentio facta est, fuerit: cum Sorano, tum Leonidæ, tum etiam cæteris uisum est, in his fotu calido, cataplasmatibusq; maturantibus esse utendum, nempe ex melicrato, farina triticea, aut hordeacea concinnatis. Emplastri præterea eiusdem facultatis usum interdum approbant. Ex re porro usuq; erit confectura è bacis lauri, et quæ ex melle conficitur adhibita. Ex horum namq; remediorum usu extincta iam dracontia, quod continetur corpusculum excidit. Suppuratione autè facta, nisi exciderit, diuide cutem, & parte denudata, quod continetur auferto, insinuatissq; cuti linamentis, consentaneam puris opificem curandi rationem deinceps aggreditor.

LIBRI QVARTI FINIS.

HYPOTHESIS LIBRI QVINTI.

In hoc uolumine operis uniuersi quinto, de theriacis & alexipharmacis, eo qui subiicitur ordine tractabitur.

CAPITA LIBRI QVINTI.

Quomodo quis se ab omnibus	quæ metu	3
communiter uirus eiaculanti	Aduersus non rabientium canum morsus	4
bus uindicet Cap. 1	De erabronibus & apibus	5
Communis omnium qui uirulentis animalis morſu ictusq; læsi sunt, curatio 2	De phalangiis	6
De rabiosi canis morſu, &c. 3	De craneæ ictu	7
	De scorpij ictu	8
	De sco-	

LIBER QVINTVS.

389

De scolopendra terrestri & marina	9	De chamaeleone	38
Aduersus ascalabotæ morsum	10	De alterco	39
Contra felis morsum	11	De cecianandro	40
De mure araneo	12	De pulicaria herba	41
De anguibus & uiperis	13	De cicura	42
De amphibæna & scytale	14	De papaueris liquore	43
De dryino	15	De carpesiæ succo	44
De hæmorrhoides, et prestere, et di	16	De mandragora	45
psade	16	De aconito	46
De hydro	17	De ixia	47
De cenchro	18	De ephemero	48
De cerasse & aspidæ	19	De raxo arbore	49
De basilisco	20	De solano furioso	50
De pastinaca marina & muræna	21	De sardonis herba	51
De dracone marino	22	De papauere corniculato	52
De scorpio marino	23	De pharico	53
Præparatio sanguinis testudinis marini	24	De toxico	54
De crocodili ictibus	25	De fungis.	55
De hominis morsu	26	De sanguine taurino	56
De uenenis	27	De lacte cui admixtum est coagulum	57
De uenenorum præseruatio	28	De melle quod ad Heracleam nascitur.	58
ne	28	De gypso	59
Communis quorumcunque uenenorum curatio.	29	De cerussa	60
Enumeratio simplicium uenenorum	30	De calce, sandaracha, & auripigmento	61
De cantharide	31	De spuma argenti	62
De buprestis	32	De plumbo	63
De salamandra	33	De argento uiuo	64
De pinorum eruca	34	De ueratro albo, thapsia, elaterio, agarico nigro, ruta sylvestris, nigella, & pappis	65
De lepore marino	35	De familiaribus & contubernali	66
De rana rubeta siue palustri.	36		
De hi rudinibus.	37		

FINIS.

Bb 3

PAULI AEGINETAE

LIBER QVINTVS, ALBANO

Torino interprete.

Quomodo quis se ab omnibus communiter uirus
eiaculantibus uindictet. Cap. 1.

De feris uenenum iaculantibus tractaturi, ab
his quæ in omnibus eiusmodi communiter cõ
ferunt, exorsi, præcautiones primùm quib. se
ab illarum iniuria quis tueatur, exequemur.
Quocirca si urgente aliqua necessitate, soma
num capere alicui, in locis ubi uenenatæ complures bestiolæ
diuersari consueuerunt, contigerit, præsertim ubi salamandræ,
aut phalangia, uel serpentes aliqui magna copia degunt, ob
turanda sunt ferarum lustra allio cum aqua contuso, uel alia
quadam ex his de quibus agemus, herbula. Adolenda sunt fuso
fitus gratia cornua cerui, ungulæ caprarum, aut pili, gagates
lapis, bitumen, bdellium, galbanum, cupressi uel cedri scobes,
nigella, peucedanum, uiticis folia, nepita, sagapenum, castori
um, radix roris marini cachryn ferentis, conyza, uel aliquid
id genus aliud tetrum odorem spirans. Culices autē peculiari
ter arcent, suffitus ex atramenti sutory, nigellæ syluestris se
minis cymini portionibus æquis, & sterco bubulum: adhuc
etiam crebrior ignis accensus: magna etenim ex parte bestio
læ ignis splendorem fugiunt. Substernenda est culcitra: ex al
bucis, nepita, uitice, pulegio, polio, conyza, abrotono. At si
totius huiusmodi culcitrae usus non datur, imponenda saltem
sunt stratui. Attendere item animum oportet esculentis, quæ
coctione experiuntur, aquis, uasisq; uinarijs, ut accuratè sem
per cooperiantur. Focus autem sub arboribus quibusdam non
instruetur, maximè sub picea, aut pinu: in his enim uero sala
mandræ aut bruchi pestilentes scatent, qui quum aliquē ignis
teporem senserint, decidunt in fercula, uel in alias patellas,
si casu

si casu non fuerint operculata. Sed quæ adhuc tutius seruare
studemus, eius cerotam liquidiores illinemus, ex cera & rosa
ceo, et galbani momento, & ramento, cornu ceruini modico,
aut cymino quoq; Aethiopico. Ab apibus uerò & crabronibus
compungi prohibent folia maluæ, oleo læuigata, & illita.

Communis omnium qui uirulenti animalis morfu pun-
ctu ue læsi sunt, curatio. Cap. 2.

Quod si contingat ab animante quopiam uirus iaciente, per
cuti aliquem, aut morderi, adutut exuatu utendum est.
Qui exadionis munus obit, ieiunus non sit, sed uino etiã os col-
luat, & oleum in eo contineat: deinde loco admittente, cucur-
bitulam cum plurima flamma ad morsum adhibe, proximaq;
loca scarificato: uirus nanq; cū flatus ac sanguinis attractio-
ne iuxtã educitur. Inurere uerò morsus, & ad crustã produce-
re, adeoq; amputare expedit. si morsus feræ letalis sit: ut aspi-
dis, cerastæ, uiperæ, et consimiliũ. quemadmodũ Galenus me-
morat, uinitore quempia morsu à uipera petutum, ubi animan-
tis naturam cognitam haberet, falce protinus digitũ cõmmor-
sum amputasse, periculũ omnino euasisse. Quod si uirus iã cor-
pus subierit, sanguinis detractione quamcelerrimè utendũ est,
præsertim si morsus omnibus pariter humoribus scatere ui-
deatur. Cũ cibo edendũ piper et alliũ præbeto. Potui uinũ po-
tens, quo recētibus uaporibus, caloreq; naturæ cõgruo corpus
repleatur. Post hæc cataplasma quod uulnus calfacere et ex-
hulcerare possit, inducatur: cuiusmodi est cinis brassicæ, aut si-
ci arboris aceto mixtus, aut lixiuio stillaticio, uel garo, et cæ-
pe cū polëta, panëue, et porri plurimũ cū sale, uel pix liquida
cum sale calida, aut cedro, aut recremento caprarũ. Competit
præterea ipsis conspersio aceti calidi, in quo nepita elixa sit,
uel ex aceto & aqua marina, uel oxalme. Locis insuper iãtis
gallinæ superimponantur, & potius galli gallinacei, aliãue
animalia per mediũ dissecta calida: uirus nanq; exugũt, et do-
lores leniunt. Utendum et medicamentis emplasticis, ex sale
& rorẽ marino, atque adarce, & in totum quæ acrioris sin-

Bb 4

potentie

potentia. Cæterum omnibus cõmuniter morsicatum pũctimq; à bestia uirulenta petitis, nisi partes profundiores nõ omnino inoffense uideantur, ex uino propinanda seris est, uel erice, uel astragalus cum aceto, siue bitumen, paliurus similiter, aut rhu ueteris decoctum: uel mustelæ inueteratæ drachmæ duæ ex uino sumptæ, omnium ore probantur: uel testudinis marine sanguis, uel castorij drachma, addito uino nimis diluto, uel libanotidis drachma, uel sicyonice radicis aut porri cremor, uel chamæpitys, uel smyrnium, uel cinnamomum, uel aristolochia, uel uiticis semẽ, uel galbuli cupressi, uel seseli, uel piper, uel trifolij semẽ, uel baccæ lauri, uel cæcri fluuiatiles tã tosti quàm elixi. Vtilis ad hæc theriace composita est eiusmodi,

Theriace aduersus uenena, herbas toxicas, morsus uiperarum, ictusq; scorpionum.

Bryonia, opopanax, iridis Illyrica, roris marini radicis, zingiberis, singulorum drach. quatuor, aristolochiæ quinque: thuris, rutæ syluestris, uniuscuiusque tres, farine eruacæ duas, uino redige in pastillos, & cum uino porrige triobolũ. Purgatio deniq; omnibus proderit, & sudoris proritationes, & theriace, quæ ex uiperarum carnibus constituitur.

De rabiosi canis morfu, & aquæ metu. Cap. 3.

Super rabiosi canis morfu præ cæteris sermonẽ facere maluimus, quoniam id animantis frequens & cõtubernale est, rabieq; concitatur identidem, & uitatu perdifficile, & periculum ex eo fit inuitabile, nisi quis ope multa, atq; ad hanc rẽ factis utatur præsidijs. Corripiuntur autẽ rabie canes in uehementiori æstu potissimè: sed ut Lycus memoria prodidit, interdum etiam per intensissima frigora. Rabidi autẽ cùm escula lenta, tum poculenta auersantur: sitibundi quidem sunt, potare tamen nolunt, anhelant quamplurimum, auriculas demittunt, sputum largum atq; spumofum eieciunt, & sine uoce atq; amentes redduntur, adeo ut ne domesticos quidem agnoscant. Erruunt sine latratu in omnes, feras pariter ac homines, & nullo

nullo discrimine mordent. Vbi momorderint, nihil infestum primò, nisi pro vulneris ratione dolorem afferunt: temporis autem progressu morbum, quem Græci hydrophobiâ, id est, aquæ timorem adpellant, inferunt: qui cum nervorum conuulsione, rubore totius corporis, maximè uerò uultus, cum sudore, languore, suiq; et suorum ignorantia euenit. Fugiunt aquâ intuentes, admonitiq; alij humorem prorsus omnem auersantur. Sunt qui canum instar latratus edunt, & interuenientes mordificatim impetunt, mordicibus que suis in alios eiusdem rabiei causam transferunt. Aliorum porrò symptomatû causa manifesta est, ubi uirus scilicet uniuersas corporis partes occupauerit. Formidinem autem aquæ, nonnulli quidem ariditati immensæ adscribendam censuerunt, quasi in contrariû habitum mutata penitus eorum substantia. At Ruphus insanix ex atra bile genus id esse testatus est, quod id uidelicet uirus illum æmuletur humorem, haud aliter quàm alios atra bile insanientes nouimus alia timere, quæ utiq; causa nihil discrepat ab ijs qui perhibent canis, à quo demorsi sint, spectrum in aquis opinari se cernere. Eorum uerò qui ad id peruenerunt malum, neminem nouimus seruatum, dempto ex historia uno aut altero: eosq; non à rabido cane morsos, sed à morso homine mordicus petitos. Verùm ante huius affectionis occupationem, non pauci etiam à canibus morfi sospitatem recuperauerunt. Hinc itaq; auspicanda est curatio. Sed quoniam frequentissimè eo quod non confestim hydrophobica corripit afflictio (plerunq; etenim post quadragesimum à morso diem solet ingruere, quibusdam uerò post sex menses, alijs fertur etiam post septem) nonnulli canem qui momorderit non fuisse rabie percitum arbitrati sunt, & proinde cicatricem hulceri inducere festinauerunt, atq; hoc pacto ipsimet huius affectionis auctores fuerunt. Proinde huiusmodi usus experimento facilè deprehēdes, morsus rabiosi canis fuerit nec ne: Nuces iuglandes accuratè tritas cataplasmatîs instar hulceri adglutinato. Po-

stera die demptas gallinaceo, gallinae uel in cibo obijci, primum quidem non attingent: fame autem pressi, si uorauerint, curiosius attendito. enim uero si canis qui momordit, non rabierit, superstites euadent: si in rabie percitus fuerit, mortem obibunt post tri die, tunc ad uulneris dilatationem maturandum est. Eademque probatio post paucos dies iterum tentanda. Et si quidem non interierit gallinaceus, tum hulceri cicatricem inducito, nihil formidans periculi. Huius igitur indicationis autor fuit Oribasius. Quod si ex praedictis notis rabire canem exade cognouerimus, medicamentis aperiendi facultate praeditis repente utemur. Ex aperiuntibus itaque primum honorem habet, quod est pice acetoque; auferissimo, nec non opopanace conficitur. de quo in capite de neruorum uulneratione differuimus. Porro si morsus teneriore cuticula praeditus sit, diluendum est ipsum irino, seu balsamo, uel alio quopiam eiusmodi. Vel hulcera prius fota, allio obstruantur. Hic etiam puluis crustam inducit.

Aridum rabidi canis morsui crustam inducens.

Salis fossilis drach. octo, chalcitidis sedecim, scillae tantumdem, ruta uiridis quatuor, aeruginis rase totidem, seminis marrubii una. utere primitus arido, quo crusta inducatur: deinde cum rosaceo, ut excidant crustae. Custodiantur autem partes affectae, ne cicatricecant, dies ut minimum quadraginta duos.

Cataplasma quod in rabidi canis morsu os hulceris diductum seruat.

Cepam cum sale et ruta more cataplasmatibus applicato, uel laserpitium cum sale, uel salsamentum uetus, uel cinis sarmentorum cum oleo, uel allia, uel sambuci folia, menthae, seu apiastrum quodlibet per se, uel adiecto sale: uel iuglades cum cepa, sale et melle, aut cinis ficum, cerato exceptus. Abluendum uero hulus aqua, in qua chamaemelum syluestrisque rumicis radix elixa sint. Nec desunt qui causticis etiam ferreis hulus adurunt. Potionandi sunt affecti, ex simplicibus quidem lycio, absinthio, succo laserpitij, et trixaginis, scordio et polio. Ex compositis uero, Cancro rum fluuatilem, malleolorum uitis caudam in uase Cyprio aut

ancho

aneo tostorum cochliaria duo, gētiane radicis læuigatæ cochliariū, cū uini meraci ueteris cyathis duobus, potui per quadriduū præbeto. Quidā sanguinis perdicū cochliaria duo porrigunt. Ceterū cancri luna crescēte sunt capiēdi, priusquā sol exoriat. His qui eodē die potionem intermiserint, duplā postea portionē, aut triplā interdū præbeto. Quinetiā ex uiperis theriaca magna cōmoditate exhibetur. Purgādi aut sunt quotidie medicamēto ex sicyonia, cū saluie decocto, aut sideritidis Heracleæ, quam aliās dialyson uocant, propinato. Sunt qui canis qui morsum intulerit, hepar ad edendum exhibent. Porro uicūs ratio eiusmodi obseruanda est, quæ ueneni uolentiā pariter hebetet, ac extinguat, simul & penetrationē ad interiora prohibeat. Vtrūq; autē horum præstabit uini passi meracioris, uetusti, purioris, lactisq; potus: consimiliter etiā ally, capis & porri esus. Si autē commemoratis remediorum adminiculis ob impedimentum aliquod ab ipso statim principio uti supersederit laborans, minimē permittendum est quo caro scalpello circuncidatur, aut cucurbitulæ apponantur, aut bulcus aduretur, quum uirus iam altius penetrauerit: sed metasyn criticis potius adpellatis medicaminibus utendū, hydrophobica uidelicet affectione nōdū oborta. Vincit purgatio ex hiera, et lacte scisso. Sudoris itē excitatio, dropacismus et sinapismus particulatim per totū corpus adhibebitur. Efficacissimum tamē omniū auxiliū helleborismi frequētiōr usus deprehēditur.

Aduersus non rabientium canum morsus. Cap. 4.

Morsus uerō canum nulla rabie percitorū, quum & ipsi uenenosæ cuiusdā essentiæ sint cōpotes, protinus acetū irrogantes, morsum expassa palma uerberato: deinde uerō nitrū cū aceto contritū desuper ex alto destillabis, spōgiamq; nouā aceto, aut ipso acetoso nitro imbutā imposito per triduū, idipsum irrigās, malū enim tandē discutit: uel eruaceā farinā oleo maceratam impingito: uel spōgiā recentē, aut lanam succi dā, aceto et oleo madefactā imposito. Vel rubi folia cū aceto
contusa

contusa superinducito: aut capam cum melle subactam: uel origani coma, & sale, æquis portionibus cum melle: uel marubium nigrum, quod & balloten nuncupant, cum sale. Feruidis iam mordicibus, plurimum contulerit, si eruina[m] farina[m] melle maceratam imposueris, quandoquidē peculiariter hisce prodesse creditur. Sed eis qui iam inflammationem experientur, spumam argenti aqua contritam inungito.

De uespis & apibus. Cap. 5.

A Apibus percussos, dolor idus comitatur, & rubor loci, cum tumore partium in ambitu sitarum, aculeus in loco percusso relinquitur. Eadem quos uespa pupugit concomitantur, sed intensiora, præterquam quod spiculum uespa non relinquit. Succurritur autem utrisq[ue], si obliniatur locus luto, seu stercore bubulo, aut liquore ficulneo, uel sycamori folijs lauiis gatis, uel maluae, aut etiam farina hordeacea cum aceto ut castaplasma impacta. Fouendus præterea locus muria, uel aqua murina est.

De phalangiis. Cap. 6.

Percussis à phalangio locus quidem ipse quasi ab impacta aculeo rubescit: neq[ue] intumescens tamen, neq[ue] per ambitum calidus, sed mediocriter subrubidus, perfrictionibus horret, & pruriginosus est. Concomitatur à phalangys percussos, frigiditas, tremor, totius corporis grauitas, sudor gelidus, dolor intensus, pallor, & continuus eijciendæ urinae pruritus: quibusdam uerò eiusdem in expellendo difficultas, ueretri intensio, oculi humentes & lachrymosi, distentio rigorq[ue] circa inguina & poplites, conuulsionibus non dissimilis, uellicatio stomachi uehementior, linguae torpor, obscuritasque, ut impeditus reddatur sermo, uomitiones aquarum, uel aranearum textis similiū. Neq[ue] desunt quibus per lotiū aluumq[ue] eadem feruntur. dimissi in aquam calidam, dolorē nullum sentiunt, mox ualidissimè dolitant. Præsidio est, forinsecus cinis ficulneus appositus, cū sale trito in uino maceratus: uel radix syluestris mali

Punici

Punici cōtrita, uel malū terræ cū farina hordei aceto immer-
sum. Marina aqua calidiori fouēda sunt hūlcera, aut apiastrū
decocto, cuius etiā folia pariter sunt modo emplāstri inſciē-
da. Lauacris inſuper frequētibus indulgere utile eſt. Utendū
iā potionibus quæ ex abrotoni cōſtāt ſemine, anetho, ariſtolo-
chia, cicere ſylueſtri, cymino Aethiopico, baccis cedrinis cō-
minutis, platani cortice, trifolij herbæ ſemine, et fructu myr-
cæ: horū uniuſcuſq; drach. duas cū uini cyatho potui dato.
Et uiridiū cupreſſi foliorū galbulorū decoctū cū uino tēpera-
tū. Sunt qui cancrū fluuiatilē in ſuccū redactū, addito lacte
apij ſemine exhibitū, præſentaneam opem conferre aſſerunt.

De araneæ icū. Cap. 7.

Eſt quoddam etiam araneorum genus, quod ubi hominē pu-
pugerit, ualidus circa medium præcordiorum labor exci-
tatur: rubor itidē, et lotij expellendi difficultas ſequitur, quan-
doq; etiā ſuffocatio quædam. Leuantur autē iſci hiſce remedijs:
Cymino ſylueſtri Thebaico, uel uiticis ſemine, et populi albæ
folijs epotis, uel allia ſola ſumpta, conferunt: uini inſuper me-
racioris ſorbitio ob omni periculo ſubtrahit.

De ſcorpionis icū. Cap. 8.

Inſtammari cōfeſtim à ſcorpj icū percuffuq; locus incipit,
durusq; et ruber ac diſtensus, ſupraq; modum rigidus cū do-
lore redditur, et nunc quidem feruor, mox etiam algor alter-
natim occupat: quandoq; ſequitur dolor, qui itidem alternis
nunc decreſcit, mox iterum intēditur. Accedit inſuper ſudor,
horroris ſenſus, tremor, et extremarum corporis partium frī-
gus, extolluntur inguina, ueretrum intenditur, ſæpius item fe-
runtur cum ſtrepitu per ſedem peditus, rigent pili, diſcolor
redditur cutis, dolorq; tota percipitur cuti tanquam ex acu
pungente. Succurrit quamprimum inſtillatus uulnere ficula-
neus cremor. Ipſe etiā qui percuffit, plaga ſua diſſipatus, attri-
tusq; et impoſitus ſcorpj. Poſt hæc ſal tritus cum lini ſemē-
ne, et altheæ herbæ ſemen ſalubriter imponitur. Subuenit et
ſulphur

sulphur uiuū terebinthina resina exceptum. Prodest pariter et galbanū emplastelli more extēsum, et parti affectae impositū: nepita quoq; laeuigata, et cataplasmatīs modo imposita: et hordeacea polēta uino confecta, et in ruta decocto exhibita. Neq; minore efficacia succurrit semen trifolij herbæ, tritū uulneri inditū. Præterea potionandi sunt his satis efficacibus: Aristolochiæ drach. duabus, præcipuē corticis cū uino, gentiana tusca, pulegioq; ad summū elixato, lauri baccis numero decē laeuigatis, et nepita diu multūq; cum posca elixa. Cyperis etiam cum uino sumpta. Similiter et ruta, et ficulneū lac, et laserpitij, si ad manū sit: si non sit, Parthico liquore utendū erit. Conducit ad hæc trifolij et ocymi semen in potu sumptum. Valet etiam argentum statim plagæ præter opinionem impositum. Omnibus his præualet lauacrorū cōtinuus cum multo sudore usus, temperatūq; nimia aqua uini meracior potus. Cōposita uerò in potu sumenda hæc sunt: Sulphuris uiui, Aegyptiæ fabæ quantitas cū piperis granis octo in dimidiata uini cotyla, uel succus laserpitij cum cancro laeuigato in uino: aut nigellæ, cymini Aethiopici, uiticis semen, æquis cum uino partibus.

Aduersus scorpionum periculorum et phalangiorū ictus.

Fecis drach. sedecim, pyrethri quatuor, seminis rutæ syluestris tres: castorij, erucæ seminis, singulorū duæ, excipiātur sanguine testudinis marinæ: Dentur oboli quatuor cum uini meraci, aceti uel cyathis tribus. Aliud: Pyrethri, aristolochiæ cuiuslibet uncia quatuor, piperis uncia duæ, liquoris laserpitij drachma. Exhibeatur fabæ Aegyptiæ magnitudo.

De scolopendra terrestri & marina. Cap. 9.

Communiter aut̃ ijs quos scolopendra momordit, locus plagæ in orbem liuescit, & attollitur. Interdum fecis speciem præferēs, rariuscule rufus apparet, exulceraturq; sumpto à morsu principio, hunc quodā laborioso, et remedys inuincibili. Adhæc uniuerso quoque corpore quasi pruriginis sensus percipitur. Peculiariter uerò his quos marina scolopēdra pugit,

pugit, aquæ per similis, et ueluti transparens quādoq; insurgit tumor. Rubicundus aut̃ his, quos scolopēdra terrestris saucia uerit. In horū utriusq; igitur curatione, oportet circa morsum et plagam salem ex aceto tritum, aut cōcisam et lauiatā rutam imponere: uel cinerem aceto contritum et maceratū; seu scillam. fouendus etiam oxalme locus est. Ceterū Archigenes oleo largiore feruido, prædicta, eo quo dixi modo, imponere solebat. Potui uerō præbēda est aristolochia cum uino, uel serpillum aut nepita, uel syluestris ruta, uel trifolium, uel succus radicis albuci, mensura dimidiatæ serē hemina cum uino.

Aduersus stellionis morsum. Cap. 10.

Sesamum contritum cataplasmat̃ modo imponitur.

De felis morfu. Cap. 11.

Qui felis morfu percussus sunt, uehementiore admodum dolore afficiuntur, luridumq; uulnus redditur. Succurras aut̃ ijs, si quamprimū ictu cataplasmat̃ instar capas alliaue imposueris. Iisdem etiam uescentes, uini meraci sorbitione insuper hausta restituuntur.

De mure araneo: Cap. 12.

Muris aranei morsum cōsequuntur dolores pulsatorij, rubores secundum unumquodque dentis uestigium, pustulæ circa morsum sanioso humore turgētes exurgunt, liuorē contrahit propinquæ partes omnes, detracta q; pustulæ cuticula, candidum apparet huncus: ad membranas enim neruosas laceratur. Adhæc, depastione his quæ serpunt non absimili orata, partes corruptæ decidunt. Accedunt posthæc, grauissimus intestinorum dolor, lotij reddendi difficultas, gelidi que sudoris undique fluxus. Succurrit autem ipsis ex galbano splenium per se, uel tritum ex aceto impositum, uel hordeacea farina cum oxymelite cataplasmat̃ modo impacta. Quin et ipse araneus mus, qui morsum inflixit, dissectus, suoq; uulnere impositus, subuenit: et pyrethrum emplastri more adhibitum, malicoria q; dulcis mali Punici decocta, uel malua syluestris, allia item trita, et sinapi lauiatum cum aceto. Præterea

ex

ex calida muria facta fomentatio: deinde ex hordeo combusto cōcinnatum cum aceto cataplasma. Salutare est in potu propinare abrotonum cum uino decoctum, uel sisymbriū, uel serpyllum, uel herbam erucam, uel galbanum, uel saluiā, uel cusprēsi molliores galbulos cum oxymelite, aut pyrethrum cum uino, aut chamaeleontis radicem, aut coagulum hœdinum, asgnumitē, gentianæ radicē, seu uerbenacam: cæterum eadem cataplasmatibus quoq; modo impingitur. Murem etiam ipsum qui momordit, in pollinem contritum cum uino hauriunt. Prodest medicamentū etiam illud, myrrhæ drach. sex, corticis aristolochiæ quatuor. Cæterum contra aranei muris & scolopendræ morsum, sales cum liquida pice emplastri modo illinito, uel liquorē cedriū addito melle, uel alliū cum folijs ficulneis, aut cymino, uel folia nepitæ, seu hordeū etiā cum aceto.

De uiperæ maris & fœminæ morfu: Cap. 13.

A Vipera quum mare, tum fœmina, uel id genus alijs animalibus uenenum relinquentibus demorsos, intra principia statim dolor in loco morfu compuncto, inde in uniuerso corpore comitatur. Apparent autem bina in uulnere foramina perexiguū admodum interstitibus inter se spacijs, unde à principio sanguis saniosus, aquosusq; humor defluit, deinde oleosus, in omnibus indiscriminatim uiridi æruginis colore, quod uiperarum esse uenenum quidam autumant. Consequuntur tumores circa idē rubicundi ac luridi, pallor corporis, uertigo, resolutio stomachi, animi deliquium: nonnullis uomitiones biliosæ, mictionis angustia: insurgunt præterea iuxta locum haud aliter atq; in ambustis, pustulæ. Occupat & hylcus depascendo serpens, progrediens ad finitimas partes. cruentantur his etiam gingiua: accedit his tremor, sopor, et frigidi sudores. Minore uerò periculo euadere creduntur, qui ab echidna, id est, fœmina, quàm qui ab echi, hoc est mare, fuerint idē: sed minus etiam ex iisdem periclitantur, qui nutrimentum præsumpserunt. Cæterum in medendo efficacissimum præstat

stat auxiliū ally esus, meraciorisq; uini potio, adeo ut si quis ea
 ius sustineat usum, alijs sanè nullis opus habeat praesidijs. Co
 medant etiam porra, cepas, et salsamentum acerrimū. quidam
 Panarum ius, ipsasq; decoctas in cibo dederunt. Cōducunt hæc
 quoq; in poculis cum uino singula, marinæ testudinis sanguis
 exiccatus cum cymino syluestri, leporis hinnuli uē triobolari
 pondere coagulū, aridi ceruini genitalis drachma, anchusa te
 nuifolia tota: hanc uerò aliqui etiam pro amuleto, collo suspen
 dunt: porri liquoris dimidiata hemina mensura in melicato,
 foliorū apiastri succus, et ruta syluestris, cōtubernalium galli
 naceorum cerebrū, panacis radix cum uino decocta, agarici
 drachma, baccæ iuniperi, asphodeli radix, pistacea læuigata,
 uiticis semen, mustelæ inueterata & siccata drach. dua, echī
 ni cū radix tum liquor, cancri non tam fluuiatiles quā
 marini, cū priuatim, tum adiecta pediculari herba, saleq;
 & polio, mali terræ radix cum myrrha & gentiana, bac
 carum lauri æqua portione melle excepta. Mirificum porro
 contra uiperæ morsum, Oribasij illud: Anisi acetabulū, pipe
 ris drachmæ quatuor, aristolochiæ corticis, opij, castory, myr
 rhæ, uniuscuiusq; drachma. Passo diluta ad fabæ Græcæ ma
 gnitudinē in formato, habita cuiusq; uiriū ratione cū uini im
 modicè diluti cyathis tribus exhibeto. Aliud ex Lyci cōmenta
 rijs medicamētū, ad uiperarū morsus efficax: Myrrhæ, casto
 rij, piperis, sandarachæ, singulorū drachma, seminis anethi æ
 cetabulū, passo trita exhibe. Aliud ex Archigene, Cācros ui
 ginti cū sufficite farina triticea in mortario summa cura cō
 tūdito, nepitæq; salisq; momentū cōfundito, redige in pastila
 los, et arefacito. In usu uerò, cataplasmatīs modo cū lacte im
 pingito, unūq; cū mulsa potui dato. At si ad manū fluuiales, in
 quit, cācri nō sint, marinis utitor. Extrinsecus uerò opē stre
 nuē uiperinis morsib. fert stercus caprillū plagæ cū uino illis
 tū: uel lauri folia cocta cū oleo, aut baccæ lauri: aut nepita, er
 ce, ruta, apiū, abrotonū, galbanū, splenij modo iniectū, origa

nū uiride læuigatum: pulli gallinacei discerpti, ac calidi etiam dum admoti. Adglutinanda insuper crebro erui farina in uino macerata, raphani cortex læuigatus, scilla elixa, polenta hordeacea ex oxymelite, cucumeris syluestris folia cum tenuissimo hordeacea farine polline, fex uini pariter cū tenuissimo hordeacea farine flosculo: ruta, sale, melleq; adhibitis, fursures elixi in aceto, cinis cum aceto, cedrus liquor addito sale, pix liquida itidem cū salibus. Foueri locū trifolij decoctio expedit, aut pulegij, seu muria acetosa: Vbi uerò pustulæ sanguinolentæ euaserint, ipsas confestim scalpello exasperabis, ita ut cutem non detrahas, mox inde largiore aqua foueto, lenticulam coctam cum melle, donec sanitatem recuperent, illinito. Cæterum ex uiperis antidotus peculiari quadam efficacia in huiusmodi morsibus, pota & imposita opitulatur.

De amphibæna & scytale. Cap. 14.

Comparia in amphibæna & scytales morsibus eueniunt. Remedia sunt igitur eadem, quocirca priuatam descriptionem sortita non sunt.

De dryino, Galeni uero præfatio. Cap. 15.

Vitam dryinus in radicibus quercus agit, tam malefica parataq; ad nocendum ui, ut si quis calce modo eū premat, cute hominis pedes denudet, & totis cruribus tumore laxū ac spaciousum inducat. Ferūt præterea, quod maiori admirationi futurū est omnibus, nudari cute manus pariter eorum, qui curationem eius tractauerint: & si quis pœnam ab eo illatæ iniuriæ sumpturus, bestiolam perimere tentauerit, tetri admodum odoris fluxum emittere, suoq; graueolenti odore omnium aliorum odorum sensum tollere. Ab hoc animalculo percussis, circa morsus locum cum rubore tumor excitatur, & emergunt in iisdē partibus orbiculatim pustulæ, defluit aquosa saniei aliquādo humor, urgent morisiones stomachi, & circa umbilicū torsio. Succurrit cū uino pota aristolochia, trifolium item herba, et hastulæ regiæ radix pari modo sumpta, & quercus cuiuscūq; glandes cōcise, ac potæ. Illicis itidē radi-

ces

res tuse; locoq; idē cataplasmatīs more imposita auxiliatur.

De hæmorrhō & prestere, quod est dipsade. Cap. 16.

AB hæmorrhī morsu graues statim dolorū uexationes insur-
gūt, et ex cruciatūs cōtinuitate breuia strigosaq; reddūtur
corpora, multus etiā erūpit ex morsu sanguis: & qui quid est
toto corpore (in aliā ue parte) cicatricū rūpitur, & sanguine
manat, cruēta egerūtur excrementa. Et qui effluit sanguis, in
minimos quasi globulos dējatus est. A' pulmone sanguinē ex-
tusiunt, euomētes auxilio destituti ut cōclamati pereūt. A' di-
psadis morsu a'stus intolerabilis premit, sitisq; adeo indomita
ac pertinax, ut neq; satiari, neq; intermitti queat, poculētaq;
affatim ægri hauriunt: eadē tamen sitis perpetuo exeruciat,
haud aliter quā si ne tātillū quidē potionis sumpsissent ab inī-
tio. Idēq; iugiter totius, ex continuo licet poculorū haustu, si-
tis durat habitus: unde ab urēdo prester, et ab ardēdo causon,
ab inexplēbili siti dipsas appellatur. Cæterum à plerisq; pri-
scis autoribus hæmorrhō ac dipsade morsu, ceu deplorau et in-
sanabiles relinquebātur. Proinde si peculiaria aduersus bestio-
lā desiderantur remedia, cōmunia experiri operæ precii est.
Cōfodiēdusq; scalpello cōfestim et urēdus locus, etsi liceat par-
te præcisa mutilādus, deinde acerrima quæq; applicāda sunt
cataplasmata. Profueritq; omnis acrium eduliorū ad cīcādam
uomitionē esus, maximē ex alimentis sale maceratis quæsitus.
meraciq; uini potus, pariter et lauacrum. Expedit aut, breui-
bus hæc temporū interuallis continuare, priusquā grassentur,
quæ morbū comitātur accidētia: his enim semel emergētibus,
opem ferre nulla medicorū opera potest. Quæ uerò affectæ
parti foris adhibentur remedia, eorum syluam cōtra morsus
descriptam deprehēdimus. In dipsadis quidem morsu, portula-
cæ folia cum aceto trita, polentaq; & rubi folia accuratē ex
melle concisa, plātaginē item et hyssopū, allium albū, porrū,
rutam, urticam. Aduersus uerò hæmorrhū omnia sanē eadem
hæc faciūt medicamēta, atq; supra hæc uitis etiā folia elixa,
cū melle concisa et eliquata. Per os aut, hæmorrhī ipsius qui

morsum intulit, caput crematum potetur, aut scordium cum oleo irino: manducandæ sunt etiam uuæ passæ.

De natrice. Cap. 17.

A Natrice, quam Græci hydron dicunt, demorsus uulnus dilatatur, & liuescens spaciosum euadit, saniosus ex eodē humor ater ac largus, tetroq; odore spirans, perinde atq; ex desperatione profluit. Medicatio mali spacio tēporis, et ægrè succedit. Succurrit itaq; organus concisa, & aqua subacta uulnere superinducta: uel lixiuia querna cum oleo: uel hordeacea farina cū melle eliquato sumitur, & aristolochiæ geminæ drachmæ, in cramate, uel in poscæ binis cyathis. Deinde cremor marrubij, uel decoctum cū uino, uel nasturtium sylvestre, uel fructus hastulæ regiæ, aut flos, aut fœniculi semen cum uino, & fauus deniq; recens cum aceto comestus.

De cenchro. Cap. 18.

Cenchri morsus per omnia uiperino icui respondet, accedit putrida exulceratio, carnes antea prætumidæ ut in aqua intercutem defluunt: lethargici præterea, & ueternosi, & mali saporis delationi obnoxij euadunt. Erasi stratus iecur & uesicam, & laxius intestinum ipsis affecta esse prodidit. Dissectis namq; eorum corporibus, corruptæ quodāmodo partes offenduntur. His igitur lactuca semen cum semine lini castaplasmatis instar impositum succurrit: nec non & saturciæ læuigata, & ruta sylvestris, et serpillum cum asphodelo tritū. Potui autem quamprimum centaurij radices drach. duæ cum uini cyathis tribus, uel mali terræ radix itidem, nasturtiumq; pariter & gentiana salubriter exhibentur.

De cerasæ & aspidē Cap. 19.

Tres aspidis esse species Galenus testatur. nam unam ex eis chersæam, id est, terrestrem nuncupat: alteram chelidoniam, tertiam ptyadā. quæ omnium perniciosissima est: siquidem erecto in anteriorem partē collo, ex interuallo longitudinem quod satis fore coniecerit emensa, uenenum in hominis corpus iaculatur. Hanc ferunt Aegypti reginam Cleopatram, quum

quum deuictio Antonio, Augustum uictorem timeret, sinistrae mammae feriendae admouisse, ab eaq; demorsam occubuisse. Ita enim mortem longè celerrimam inuehit. A' cerasiis porro morfu, locus cum duritie in tumorem attollitur, & pustulas agit: ex idò autem loco aquosa sanies fluit, quandoq; nigra, interdum subpallida, & colore porraceo; uniuersum uaricum modo corpus tumet, pudenda arriguntur, mente capiuntur, oculorum caligo exoritur, conuulsione tandem rigentium modo decedunt. Ab asside idèis uulnus his quæ acu puncta fuerunt, simile, exiguum admodum, & absq; tumore apparet. Sanguis non multus, sed paucillus & ater destillat, caligo subita oculorum acies obnubilat, uniuersoq; statim corpore multiplex, sed leuis, nec sine uoluptate dolor urget. Proinde scitè Nican- der cecinit, Ac uir perit absq; labore.

Color demorsi permutatur, atq; uirescit, aliquantulus oris uentriculi morsus infestat, frons perpetuò conuellitur, palpebrae absq; sensu, quasi in somno uacillent, contremiscunt, et inter hæc mors inuadit, uix diei quadrantem immorata. Vtrisque igitur his ocyssimè mutilatio succurrit. Quam ob causam maturè pars idèa si fieri possit, à reliquo corpore amputetur: aut confestim omnis circumsecanda ad os usq; in uulneratis partibus, illisq; adiacetibus caro est, deinde etiam quæ supersunt cauterijs persequenda. Horum namq; uirus, ueluti & basilisci, taurino sanguini similiter, sanguinem in arterijs ac spiri- ritum pernicissimè congelat.

De basilisco. Cap. 20.

Hæc fera in mortalium conspectum rarenter quidem uenit. Erastistratus uerò tradit, quum basiliscus momorderit, plaga sub aureo colore fulget. Biusdem idibus suffragari putat castorij si potentur, drachmas treis, similiterq; papaue- ris liquorè. Nos uerò horum nihil experientia cōprobauimus.

De pastinaca marina, & muræna. Cap. 21.

Inter marinas, pastinacæ quidem et murænae cognitio om- nibus patet. nobiles enim, atq; omnibus cogniti, pisces sunt.

Cc 3

Morfi

CL 3

333 mor

Morsibus autem horum succurrunt succi ficulnei stiriac quatuor, uel paulo plures, cum folijs serpylli tribus aut quatuor pota, & quae aduersum uiperam morsus remedio sunt.

De dracone marino. Cap. 22.

Marini draconis ictus plumbo confricandus est, uel trito serpyllo, lentè ue decocta, aut sulphure cum aceto obstruendus, uel ipso dracone euiscerato. Locus hominis urina fouendus. Dandum insuper absinthium in diluta uini potione, uel saluia, aut ficulneorum surculorum ex dulci uino dilutum, aut piscis ipsius cerebellum.

De scorpio marino. Cap. 23.

Ictui scorpionis marini medetur nullus dissecus, & impositus, sulphur igne intadum cum aceto infricatum, baccæ laui tres tritæ, & in potu sumptæ.

Præparatio sanguinis testudinis marinæ. Cap. 24.

Testudinis marinæ sanguis ad reponendū hoc modo præparandus est. In ligneo fidili uase supinam testudinem inclinato, eiusq; caput protinus amputato. Congelatum autem sanguinem in plures particulas per harundinem secato, impositoq; uasi operculi instar cibro ad solem collocato: arefactū uerò auferens, in uiperarum morsibus, quemadmodum traditum est, utere, drachmis duabus cum uno aceti cyatho: sequenti die drachmis quatuor, cum duobus cyathis: tertio drachmis octo, cum ternis aceti cyathis.

De crocodili ictibus. Cap. 25.

Aduersus crocodili ictus, nitrum cum melle laeuigatum, tantisper dum hucus repurgetur, imposito: mox melle, butyro, medulla cerui, adipe anserino impleto. Galenus testatur à crocodili morsu percussos, adipe ipsorum uulneribus imposita, exactè periculo liberatos cognouisse.

De hominis morfu. Cap. 26.

Non ab instituto alium fuerit, cum uenenatis animalibus hominis quoq; morsus describere. siquidè longè perniciosiores cæteris hylceribus uidentur, præsertim si ieiunus mors

morderit, & prius legumina pro cibo sumpserit, maximè lentulam. Bapropter quæcunq; communiter alijs uirulētis prodesse docuimus, eadem in his quoq; extrinsecus morsui inter principia adhibere conueniet, exceptis nimium acribus, & deurētibus. Priuatim uerò morsu prius oleo peruncto, fœniculi radicem cū melle tritā ut cataplasma impinge, uel fabaceā farinam cum posca & oxyrhodino emplastri modo impone, identidem immutans. Emplastro aut utere ex squamæ aris, galbani, æruginis, uniuscuiusq; uncia, ceræ libra, plumbaginis libris duabus, olei sextario. Plumbago cum oleo prius elixata æruginem assumet, & squamulam: ubi coierint quæ lique fiunt, adiiciuntur. Postquam uerò inflammatio quieuerit, ueluti commune uulnus, hæc etiam curato.

De uenenis. Cap. 27.

Postquam de uenenum idu morsuue relinquentibus bestijs compendio tradidimus, consentanea ratione sermonem de uenenis quoq; aggredimur, simplicia quidem persequentes, & horum significationes remediaq; tum communia, tum peculiariora. Composita autem de industria præteribimus. Sunt enim, qui uariorū lethalium medicamentorū compositiones cōfecerint, quæ legēbus officere plus quàm prodesse possunt. Neq; enim indicia horū exacta in his qui assumpserunt deprehēduntur, ut quis ipsis conueniens applicet auxilium. Quum autem hæc uaria, ex ea quæ in ipsis præpollet facultate conspiciantur, id etiam quod administrabitur, quispiam uarium sedula propensione accommodans, modò ex æquo, modò ut præualeat, medendi obibit operā. Auspicandum igitur etiam hic de nudo à methodo præseruatiua.

De præseruatione uenenorum. Cap. 28.

Inter ea quæ de letalibus uenenis traduntur, id quod de præcautione agit, arduū magis ac difficillimum est, propterea quod qui uenenis homini insidiantur clanculū, tanto astu id machinantur, ut peritissimo cuiq; facile imponāt: quoniā uenena amaritudine, admixtis dulcibus spoliant, et odoris grauitatem

Cc 4 odora

odoramentorum mixtura adimunt. Non raro ceu ad leuandam ualitudinē, opīs q̄; ferendæ gratia in ægritudinibus hæc propinare crediti, puta, absinthium, abrotonum, opopanacē, castorium, quibus uenena permiscet, etiam in cibarijs, nempe solidioribus, uel obsoniorum uarietate adumbrantes ipsa exhibent. Quam ob causam qui in istiusmodi suspitione fuerit, condita elaborataq̄; cibaria omnia uitare debet, omnesq̄; intensas gustu qualitates, quæ ex dulcibus uidelicet salsisq̄; et acidis saporibus constant. Maximè uerò, aqua quantum satis est, præsumere cōuenit. Restinctio enim hoc appetitu, cæteræ postea qualitates à stomacho difficillimè corripuntur. Sed aliud adhuc est efficacior præcauēdi ab iniurijs uenenorum modus, ut uidelicet in suspitione ueneni semper præcomedatur aliquid quod uenenorū uires retūdat, inefficacesq̄; reddat: cuius farinae sunt, carica cum iuglandibus, ruta, grumo salis, et mala medica, quæ citria dicuntur, naporum item semen drachmæ pondere cum uino potum, uel nepitæ foliorū, uel sigilli lemnij par modus, aut rutæ folia uiginti, et nullo sic ueneni genere lædentur. Iā uerò antidoti cū uino sumptæ quotidie Aegyptiæ fabæ instar, tutissimè præseruant: è quorū grege cēsetur, quæ scinco, id est terrestri crocodilo et animantium sanguinibus temperaturi; et Mithridatis antidotus, qua olim rex ipse Mithridates quotidie usus est, quo se à letali ueneno assereret, ac tueretur. Quocirca à Romanis captus, quum iterum atq̄; iterū letale uenenū potasset, atq̄; mori nequiret, se ipsum ense cōfodere aggressus est. Verū quoniā fortunæ temeritas sæpenumero in itinere locisq̄; desertis, periculo expositis, similia sine insidijs hominū discrimina adfert, si forte fortuna sub aliqua arbore, uerbi causa, pinu uel picea cibus sit capiendus, animaduertenda sunt quæ ex his, uel laquearijs letifera delabuntur interdū animalia. Vasa itē uinaria, et aqualia. Ollæ adhuc in quibus decoquuntur edulia, suo accuratè cooperiantur operculo, quæadmodū in præcautione animalium uirulentorū traditū est.

Commune

Communis quocunq; modo sumptorum ueneno-
rum curatio. Cap. 29.

SI qui lethale medicamentū ultro, ut sibi lethum consciscāt, assumpserint, qualia multa in hominum uita solent accide-
re, uel quorundam etiam insidijs: siquidem nobis sumptum ue-
nenum, liquidò quale fuerit constet, quamprimum ad idoneum
ac peculiare descendamus remediū, ueluti in horum enumera-
tione memorabitur. Verū si nulla nobis pharmaci exhibi-
ti cognitio præbeat, protinus ad ea properandum, quæ com-
muniter in cuiuslibet ueneni haustu opitulari consueuerunt. nā
quæ comitantur indicia expectare, curationē nō recipit, a grīs
iam propter moram conclamatis. Proinde sine mora calidum
oleum priuatim, uel cum aqua propinantes, uomere cogamus.
Si id desideretur, butyrum olei loco cum calida aqua ingeren-
dum, aut maluæ, aut seminis lini, uel tragi herbæ, uel fœno-
græci, uel urticæ seminis decoctum. Hæc quippe non modò uo-
mitione euacuabunt, sed aluum quoq; subducent, & malignis-
tati uirus aduersabuntur, accrementum eius hebetantia: præ-
sertim oleum, quod euidenter ex eo datur argumento depre-
bendere. Si quispiam cantharide, aut calce aqua non extincta,
aut quauis acriore alia re cutem exbulcerare statuerit, is si
prius oleo præunxerit corpus, non exbulcerabitur: imò neque
spissare, si antea oleo oblitum fuerit, corpus poteris. Vomitus
præterea non ob id modò quod uacuet, & noxium humorem
educat, salutaris est, sed quod assumptum interim ueneni, odo-
re, coagulatis grumis, colore arguit. Odore quippe & amari-
tudine cicutam, colore cerussam & gypsum, globulis cōcretis
lac, uel nuper iugulati animalis sanguinē: uiroso halitu, mate-
riæ qualitate, et odore, leporē marinū et rubetā ranā prodit,
ita ut per hæc facile ad accommodata singulis remedia iter pa-
teat. Oleo autē maluæ decoctū admisceatur, uel adeps anseri-
na, uel pinguiū carniū ius, uel gallinaceorum, uel lixiuiū ex
lignorum cinere factum. Facit item ad hoc, nitrum cum hy-

Cc 5

dromelite

dromelite tritum et haustum, et uinum uetus copiose potum, & quae ex adipe et butyro constant. Deiectione uero per uomitum quod haferat in uentriculo, acerrimo clystere reliquias in intestino delapsas educemus. Post haec uero propinandum est lac. nam quod molestum est et uirulentum, facile ab illo permutabitur. Dantur in super quae communi dote cum his uenenis accommodata sunt remedia: cuius generis habetur, rubrica lenia, abrotonum, agaricum, irion, radix eryngii, pastinaca erraticae semine, aut nepitae, nardum Celticum, castorium, uiridis ferulae medulla, nerium, quod rhododendron appellant, flores, uel rhododaphnes, marrubium cremor, silphium, eiusque liquor, sagapenum, panacis, aut peucedani succus & radix, aristolochia longa, ruta syluestris semine, betonica (quam cestron dicunt) folia singula cum uino drachmae unius pondere. Confert insuper et polyelixatio, et pix liquida in ecligmatum sumpta. Egregie uero praeter caetera opitulatur antidota praedicta, & magis adhuc ex uiperis concinnata theriaca, uerum ne utique eandem potestatem habet, quam letalibus uenenis succedunt, & quam eadem anteuertunt. Quae enim antidoti quantitas praesumpta sufficeret contra afflictionem et calamitatem, quae uirus comites habet, cauendum, idem antipharmacum post ueneni haustum adauctum in quadruplum aut quintuplum exhibitum iuuat: neque id semel modo per diem, sed bis. ita enim ad miraculum usque in arte praclaro uidetur ipsi quoque Galeno.

Enumeratio simplicium uenenorum. Cap. 30.

Ex uenenorum catalogo, animalia mortifera haec sunt: Catharis, buprestis, salamandra, picearum eruca, lepus marinus, ranarubeta, et muta palustris rana, haustae hirudines. Ex seminibus: Apollinaris herba, coriandrum, psyllium, cicuta, nigella. Ex liquamentis aut meconium, quod opium dicunt, carpasi liquor, thapsiae succus, elaterium, et mandragora. Ex radicibus: Chamaeleon, aconitum, thapsia, ixia, helleborus, agaricum atrium, et ephemeron, quod colchicum nonnulli à Colchide ubi nascitur appellant. Ex ramosis & holeribus: Smilax, quam aliqui thymion,

thymion, Romani uerò taxum appellant, solanum furiosum, quod & dorycnion dicitur, sardonias herba, quæ ranunculispæcies est, corniculatum papauer, pharicū, toxicum, rut a syluestris, & fungi. Ex animalium uerò partibus: Recens taurinus sanguis, coagulatum lac, melq; in Heraclea Ponti genitum. Ex metallicis: Gypsum, cerussa, calx, auripigmentum, sandaracha, spuma argenti, adarce, plumbum, et quod nomen obtinuit argentum uiuū. Ex ijs quæ in usu quotidiano habentur, uinum liberalius à balneo sine interpiratione potū, aut passum, uel aqua gelida consimiliter.

De cantharide. Cap. 31.

His qui cantharides hauserint, notæ accidunt omnium grauissimæ. nā ab ore ferme ad uesicā usq; cuncta morderi sentiuntur, gustu picæ aut simile quiddam cedrio liquori resipit, inflammantur in dextra parte præcordia, urinam ægerrimè emittūt, sæpiusq; per eā sanguis fertur. Quinetiā excernūtur per aliu strigmenta haud aliter atq; dysentericis, animæ deliquis, satietate et stomachi fastidio laborāt, et uertiginibus cōcidunt, postremò ab alienantur mente. Succurrit ipsis uomitus citatus cū hydrelæo, et lactis potus, cretæ cimolix drach. quatuor, cum mulsa: nuclei pinei, cucumeris semen, ius bubulum pingue, uel anserinum, & ouinū. Carnes præbeantur gallina ceorum, aut agnæ, uel ouillæ, uel porcellorum, omnesq; flaccescentes longiore coctura, et pingues cum lini semine clixæ. Vinum largum et dulce, thuris corticis drach, quatuor. A cibo ducenda alius est, iniecto clystere ex succo oryzæ, uel chondri, uel tragi, uel ptisanæ, uel maluæ, uel seminis lini, uel altheæ, uel scæno-græci. Quandoq; mulsa cum nitro absterfo intestino, oportet hæc rursus infundere: Postea uerò inflammationem experta, præsidio ex semine lini, ac bordeo mitigare, intra initia namq; statim offendunt. Deinde dulcium aquarum balneis utendum. Vtile fuerit ipsos ungento cū irino, tum rosacco potionari.

De

De bupreste. Cap. 32.

Qui buprestidem potauerunt, uiroso nitro simile quiddam in sapore sentire uidentur: urget stomachi et alui grauis-
simus dolor, inturgescunt eadem partes difflatæ, ut in cutem
subeuntibus aquis: totoq; corpore cutis extima intenditur, lo-
tiumq; supprimitur. Opitulatur aut his eadē quæ haustis can-
tharidibus opẽ ferunt, priuatim post purgationes, quas uomi-
tu clysteribus molimur, caricæ in cibo remedioq; sunt, & cum
uino pota earum decoctio, uel cū lacte hausta, uel ænomelite,
pirorum omne genus esse, & lac muliebri potare expedit.

De salamandra. Cap. 33.

Salamandram qui hauserunt, lingue inflammationem, &
loquellæ impedimentum subeunt, & cum torpore quodā re-
solutioneq; aliqua tremorem, liuor corporis partes aliquas
per ambitum inficit, percennanteq; ueneno diutius, sa penume-
ro putrefactæ defluunt. Quibus præstabis cuncta quæ con-
tra cantharidas instituta sunt: priuatim uerò resinam picæ,
uel pinus, aut galbanum cum melle, uel nucleos pineos cum
chamæpityos decoctio, uel urticæ folia cum lilij in oleo deco-
cta. Conducunt etiam oua testudinis marinæ aut terrestris ea-
lixa: ranunculorum item esculentum ius, quo cum eryngij ra-
dix pariter decocta sit,

De picearum eruca. Cap. 34.

Picearum erucam haustā comitatur illico oris et palati do-
lor, lingueq; inflammatio uehemens, stomachi & intesti-
norum dolor, cū pruriginoso tẽsionis sensu: corpus uniuersum
a Stuart, ciborum fastidium urget. Quibus haud aliter, quàm ijs
qui cantharidas deuorauerunt, succurritur. peculiariter ta-
men simplicis olei loco Melinum exhibebimus.

De lepore marino. Cap. 35.

Qui leporem marinum potu ingesserunt, corruptis pisci-
bus similem in gustu uirosum saporem sentiunt: progressu
deinde temporis alius intenso dolore afficitur, lotium suppri-
mitur:

mitur: etsi quando eruperit, purpureū colorem refert. Omne piscium genus auersantur, & odio habent. Sudor comitatur graueolēs, uomitus biliosus, et quandoq; cruētus. Quibus opis ferendæ gratia lac asininū, passum uē continuē exhibendum est, uel radicis maluæ foliorūq; decoctū, uel peucedani (aliās ciclamini) radix cōtusa cum uino, uel ueratri nigri, aut scammonia succi drachma in aqua mulsā, suoq; calore adhuc tepens anserinus sanguis. Solos fluuiatiles cancros, si sustinere queant, offerre conuenit. Indicium autem salutis est, quum piscibus quoq; uesci poterint.

De rana rubeta, siue palustri. Cap. 36.

Rubeta, seu palustris rana deuorata, tumores corporis cum pallore buxio intenso cōcitāt. Superaccedūt spiritus difficultas, grauis animæ orisq; fœtor, & singultus, quandoque inuoluntarium seminis profluuium. Restituuntur autem facili post uomitum largo meraci uini potu, radicū harundinis bēnis drachmīs, uel cyperi totidem. cogendi, in eo discrimine cōstituti, sunt, multa celeritate deambulare, & cursui operā dare, ob stuporem qui in hoc malo contrahitur. Quinetiam lauare quotidie expedit.

De hirudinibus. Cap. 37.

Hirudines simul cum aqua haustas, & faucibus inhaerentes, hinc adeo deprehendes, quod os uentriculi quasi exustionis sensum morsumq; percipit. nam hoc deglutitæ hirudinis argumentum est. Interdum etiam sanguinem floridum foras expuunt, gutturi affixis hirudinibus. Quas muria paulatim absorpta excutit, uel laserpitiū aut betæ folia cum aceto, uel cum posca niuis glebula hausta. Gargarizetur præterea nitrum cum aqua, & atramentum sutorium cum aceto. At si gutturi adhæserint, ubi in calidam aquam descenderint, lupinorum farinam, & aquam frigidam in ore retinendam exhibeto, eaq; ratione expelluntur: proficient enim ad gelidam promptissime. Sunt qui cimices his qui hirudines biberunt, uti
liter

liter exhibuere. Ipse, inquit Galenus, alijs in hirudinis haustu
usus, cimicibus non indigui.

De chamæleonte. Cap. 38.

Sequitur chamæleontis nigri haustu, cum morsus uehementis,
tum dolor etiã ingens, cū uniuerſi corporis subuerſione, tre-
mor: mox ingruit etiã cōuulſio, et uomitiones pituitosæ et spu-
mosæ, et perdita uoce ſingultus cū peruerſitate et contorſione
uultus. Subuenit his triticeus cremor pinguis, calidus in potu
ſumptus, & dulce uinum aquoſum calidum, uomitus, lacti po-
tatio, mollis clyſter, fotusq; ex cataplaſmatis. Aduerſus autē
eum qui ſuffocationem ſpiritusq; anguſtiam inducit, & luridi-
tatem, abſinthium uel nitrū cum oxymelite, uel raphanū pro-
pinare cōuenit. Prod. ſt inſuper et præcordiorū fomentatio.

De alterco. Cap. 39.

Apollinaris herba, pota manſæue, ebrietati ſimilem inducit
amentis alienationem: citra tamē difficultatem curatur qui
eam hauſerint, ſi liberali mulſæ potu, et lacte, præſertim aſini
no: ſi id deſideretur, caprillo, ſeu bubulo, caricarumq; decocto
uière. Efficaces præterea ſunt nuclei pinei, cucumeris ſemen
haſtū cum paſſo, uinumq; ſalſum, cū adipe ſuillo recenti &
paſſo, urticæ ſemē ſimiliter: uel nitrū cū aqua accommodatū
eſt, et intybi erraticus, quod cichoriū uocant: ſinapi, naſtura-
tium, raphanus, cæpe, et allia, ſingula cum uino ſumpta con-
ferunt. Quies porro imperanda his eſt, ut, uelut ebrij uillum
edormiunt, ſomno concoquant.

De coriandro. Cap. 40.

Nequit ob odoris uehementiam latere coriandrum, uocem
autē haſtum denſiore raucamie reddit, furorē inducit,
ebrietati non abſimile. turpia dictu qui hauſerūt, blaterant, to-
toq; corpore odorē coriandri ſpirant. Succurritur, ſi antea, ut
præmonſtratū eſt, uomitione oleo aut irino citata uirus eduxe-
ris, merū unā cum abſinthio & per ſe potum, ouaq; euacuas-
ta, in ſeipſa detrita cum muria abſorpta: quin ipſa ſeorſim
quoq;

quoq; muria in eundem usum potatur. Prodest etiam salsum
ins, quum gallinaceum, tum anserinum, atque passum denique
cum lixiuio sumptum.

De pulicaria herba. Cap. 41.

PSyllium potatum, toti corpori algorem & torporem, cum
resolutione animiq; tristitia infert. Cui omnia conueniunt,
quæ contra coriandri haustum remedio sunt.

De cicuta. Cap. 42.

Cicuta potus tantâ oculis caliginē offundit, uertiginēq; ex
citât, ut ne minimū quidē eminus possint cernere, singulū
cit, amentia inuehit, et extremarū frigiditatem: suppresso de
niq; à motu omni in arteria spiritu, conuulsione suffocantur.
Quam ob causam inter initia statim, ueluti in alijs decretū est,
uomitui operâ dâtes, cicutâ excutiemus. Postmodū euacuatōe
facta, quod ad intestina prolapsum est excernamus: tū deniq;
ad id quod primas in hac prouincia tenet adminiculum deue
niemus, merum per interualla propinantes: in quibus profue
rit lac bubulum uel asininum potui datum, uel absinthiū cum
pipere, et uino uulgarī & castorio, rutā itidem et mentā cum
uino: et cardamomi, uel styracis drachmam, uel piper cum ur
tica semine ex uino, uel lauri tenuiora folia: silphium itidem
& laser cum uino & passo exhibebimus. Vinum etiam dulcē
seorsim potatum abundē proficit.

De papaueris succo: Cap. 43.

Papaueris succi potū, sequitur sopor ueternosus, cum tā ue
hemēti algore et pruritu, ut sæpenumero inualescēte uene
no tanta erūpat prurigo, ut ab ea qui id potarunt excitentur.
Odorq; opij per totū corpus exhalat. Proficit, post citatū oleo
uomitū acrioris clysteris usus, et acetum mulsum cū sale potū,
uel mel cū rosaceo calido, et meri multū cū absinthio, et cinna
momo, et acetū calidū per se, nitrū itidem cū aqua, cū lixiuia,
passōue, rutāq; semen cū pipere, piperq; ipsum cū castorio &
oxymelite; uel satyria, uel origani decoctio, cū uino. Oportet
etiam

etiam eos qui papaueris liquorem potarint, naribus odoramentis adhibitis excitare, & in calidum soliam deducere, fomentisq; ob enatam pruriginem fouere. A lauacro confert iuriū esculentorum pinguium usus, cum uino aut passo. Proderit etiam medulla cum oleo pota.

De carpesiæ succo. Cap. 44.

ET carpesiæ succus in potione haustus, soporē grauiorem, præcipitemq; strangulationem inducit. Opem his sentiunt, quibus, qui cicutam biberunt, succurritur.

De mandragora. Cap. 45.

Sopit etiam protinus graui somno, pota mandragora: comitaturq; exolutio, inexpugnabilisq; somni necessitas, nihil à morbo quem leibargum nominant, dissidens. Proficit, priusquam aliquid eorum accidat, uomitus, à uomitu mulsa, & nitrum, & absinthij decoctum cum passo aut uino dulci sumptū. Caput rosaceo & aceto irrigandum. Corpus excitandum, & commouendum. Iuuat olfactus piperis, sinapis, castorij, rutæ tritæ in aceto, liquidæ picis, combusti & extincti lucernarū funiculi odor. Quod si difficulter excitabuntur, quæ sternuta menta eliciunt, ad mouere, alijsq; communibus auxilijs aduersus mandragoræ haustum uti conuenit.

De aconito. Cap. 46.

Aconitum repente inter bibendum cum adstrictione quædam linguam edulcorat, uertigines, præcipue in assurgendo offundit, humiditatē oculorum cit, grauitatem pectoris & præcordiorū inducit, sic ut plurimi flatus edantur. Quocirca ueneni educendi gratia ciendus est uomitus, & ducenda clystere aluus. Vtemur etiam ad expellendum uirus aconiti, potionibus origani & rutæ, uel marrubij cum uino, uel absinthij, uel erucæ, uel abrotoni, uel chamæleæ, aut chamæpithæos. Expedit præterea, liquoris balsami drachma cum uino, coagulū itidem hœdi, uel leporis, uel hinnuli cū aceto. Ferri etiam recrementum, aut uinum in quo ferrum uel aurum uel argentum candens extinctum sit. Lixiua insuper cum
uino

uino confert. Blixæ item gallinæ, uel carniū pinguiū ius cum uino epotum. Chamæpitys priuatim aduersus aconitum succurrit: quæ in Heraclea quidē Ponti, ubi aconitū prouenit, holocleros nuncupatur: Athenis, didonia: in Eubœa, sideritis.

Deixia. Cap. 47.

IXis, quæ ulophonon quoq; uocatur, quum bibitur, ocymo quiddam simile gustu & odore præfert, uehementem linguæ inflammationem & amentiam excitat, omnes retrimentorū uias obstruit, & cum animi deliquio strepitum latratumq; intestinorum suscitatur, neq; tamen uel tantillum excernitur. Opē his præsentaneam adfert post uomitionē, aluiq; deiectionem, potum cum largiore uino, aut aceto, uel oxyme lite, absinthij dilutum: rutæ syluestris semen, uel laseris radix, necnon hirciæ origani decoctum, cum aliquo supradictorum, aut lacte, aut resina terebinthina, aut nardo, uel castorio, uel laserpitio, quorum singuli oboli cum uino expediunt. Et iuglandis nucis nuclei cum uino lauigati, aut resina, rutaq; ita ut singula pondus drachmam æquent. Conferunt itidem oleastelli herbæ drach. duæ, uel bini succi thapsiæ denarij, cum mulsa, & acetum deniq; calidum per se potum.

De ephemero. Cap. 48.

SI quis ephemerum, quod colchicum aliqui, quia in Colchiæ nascitur, aut syluestre bulbum appellant, acceperit, pruriginem uniuerso statim corpore sentit, non secus quàm ij qui urticæ aut scillæ irritamentis laceffuntur. Mordetur interea, & cum ponderosa grauitate stomachus æstuat. Incrudescente autem malo, cruenta strigmentis mixta per aluum secedūt. Quibus sanè non aliter atque ijs qui salamandrum hauserunt, uomitionibus & clysteribus succurrendum est, priusquam uenē inualescat. Exhibenda est potui foliorū quercus, aut glandiū, aut maliciorū, aut sirpylli decoctum cū lacte, aut sanguinalis herbæ succus, aut palmitum uitis, rubi uel teneræ

De runs

rum ferularum medullæ, myrtiue cū uino. Quin baccæ etiam myrti tusæ, friatæ, & in aqua maceratæ, earum diluto epoto, præsentī remedio sunt. Efficax pariter est medius castanearū (quas glandes Sardoniæ dicunt) liber, cū aliquo prædictorū succorū haustus. Vtilis quoq; est origanus, si cū lixiuio in potu sumptitetur. Salutem consequuntur, asininū, bubulū lac bibentes, aut si in ore modò contineat atq; uoluerit: aded ut si huius lactis adsit copia, nullum aliud desideretur remedium.

De simlax. Cap. 49.

Arbor quæ smilax, & à quibusdam thymion, à Romanis uerò taxus appellatur, pota, algorem uniuerso corpori inducit, strangulationes & cecorem interitum infert. His qui eam hauserunt, eadem remedia, quæ cicutæ in potu sumptæ, auxiliantur.

De solano furioso, quod dorycnien quidam uocant. Cap. 50.

Dorycnium, quod aliqui furiosum solanum nuncupauere potum, comitatur in gustu ueluti lactis qualitas, continuus singultus, linguæ ariditas, & conferta sanguinis excreatio. Per alium mucosa quædam, perinde atq; in intestinorū torminibus efferuntur. Quibus antequam aliquid horum consequatur, remedio sunt quæ in Bphemero comprehensa sunt, uomitus inquam, & clyster, simmatimq; omnia quæ potum uenenum possunt elidere. Propriè uerò subueniunt ipsi, mulsæ, lac asininum, aut caprillum, & passum tepidum cum anisi momento potum. Itidem amygdala, & gallinaceorum elixæ pectuscula, & omnes marinæ conchulæ cū crudæ, tum tostæ in cibo assumptæ. Item locustæ marinæ, & gammari, & haustum ex ipsis esculentum insculum.

De sardoniam herba. Cap. 51.

Herba quæ Sardoniam nomen habet, et ranunculi herba generi ascribitur, dum estur, aut potatur, dementiam infert,

fert, & neruorum conuulsiones, cum labrorum in ridum contractione, ut risus imaginem præferat: à qua quidem affectione Sardonijs risus, nefasti ominis praua q̃; famæ adagio omnium ore iactatur. Cui quidem malo obnoxys, post uomitum propriè malsa prolixius exhibita confert: pariter etiam lac, uniuersiq̃; corporis irrigatio, & illinito cum calfaciendi uina habentibus unguentis. Conducit præterea in hydrelæum calidum descendere, post egressum ex folio, infecti ualide unguendi, frictioneq̃; plurima perfricandi sunt. Atq̃; ut uno uerbo perstringam, curationem omnem perinde atq̃; in neruorum conuulsione, exequere.

De papauere corniculari. Cap. 52.

Papauer, quod cornutum appellationē obtinuit, siue esum, siue potum, eadē quæ papaueris succus infert symptomatica, & proinde iisdem etiam expugnatur præsidys.

De pharico. Cap. 53.

Nardum per omnia sapore & gustu æmulatur, quod pharicum uocant. Id in potu sumptum, cum mentis alienatione, & neruorum conuulsione, paralytim adfert. Educto per uomitiones ueneno, uinum absinthite, cū cinnamomo, aut myrrha, aut nardo Cilissa, quam Isatim aliqui nuncupauerunt, potui dato. Aut spicæ nardi obolos duos cum passo commixtos, aut iridem cum croci flosculo ex uino. Derasum præterea caput, hordeacea farina cum ruta trita, & aceto delibutum, redere confert.

De toxico. Cap. 54.

Videtur toxicum inde nomenclaturam mutuassee, quod barbari sagittas, uæ toxemata appellantur, eo inficerent. Consequuntur eos qui ipsum biberint, labiorum & lingue inflammationes, incerta insania, uarijs mentem perturbans

D d 2 im aginis.

imaginibus obuersantibus. Quocirca difficilis eorum est curatio, raroq; ad pristinam incolumitatem perducuntur, qui toxicum hauserunt. Vinculis ergo cobibendi, ut curae subijciantur: & uiolentia quadam cogendi, ut uinum dulce cum rosa ceo potent, & uomitionibus reddant. Raporum semen itidem cum uino bibitum. Peculiariter ualet quinquefolij radix, & sanguis hircinus, atq; caprillus compari modo epotus. Adhuc cortex quercinus, aut fagi, & ilicis cum lacte tritus. Mala etiam cotonea comesta, uel cum pulegio concisa, & aqua bibita: praeterea amomum, & balsami cum uino semen. Longo tandem temporis spacio conualescunt, ita tamen, ut qui iam periculis defuncti sint, lectulo diu decumbant: & ubi surrexerint, stupore consternati, nec mente satis constantes reliquo uitae curriculo degunt.

De fungis. Cap. 55.

Fungorum alij genere, alij nimietate efficiunt: omnes tamen sumpti, praefocationes strangulationibus ei suspendio similes concitant. Quibus absq; dilatione quamprimum suppetias ferre communi subsidio conuenit. Oleo igitur ad uomendum, qui fungos hauserunt, cogantur. Mirabiliter autem iuuantur: lixiuium ex uitium sarmentis, & pyrastris ligni cinere percolatum, cum posca, saleq; aut nitro potantes. Prosunt & pyra ipsa syluestria, aut folia una cum fungis elixa. siquidem quam habent fungi strangulandi uim, auferunt, eademq; in cibo auxiliantur. Conferunt praeterea gallinarum fimus decoctus, et in posca sumptus, addita mali terrae drachma, uel absinthij cum uino. Prodest mel linctum, & cum aqua potum: apiastrum itidem cum nitro, uel panacis radix, semenq; ex uino: fex item uini deusta cum aqua, & atramentum sutorium cum aceto: raphanus quoq; aut sinapi, aut nasturtium, esu proficiunt. Sed quoniam fungis quidam a uenenatis bestiis corrosi non tantum strangulant.

gulant, sed etiam intestina exulcerant, exhibendum in eo di-
scrimine largius absinthium, & ficuum origaniq; decoctum.
Aqua porro mulsa & uomitus inde petitus, descensus item in
calida aqua solum, hordeacea deniq; polenta præcordijs im-
posita confert.

De sanguine taurino. Cap. 56.

Sanguis tauri recens mactati potus, spiritus angustiam &
strangulationem ingerit, tonsillarum gutturis & ingluuici
meatus non sine ualida conuulsione obturans. Inuenitur au-
tem horum lingua rubra, dentes eodem colore infecti, & in-
ter eorum commissuras coagulati sanguinis globuli. Non ten-
tandæ in hoc periculo uomitiones sunt, densantibus magis in
stomacho grumis, quoniam uomitus attractione in sublimia
trahuntur, eleuanturq;. Exhibenda uerò sunt, quæ coaduna-
ti sanguinis concretionem discutiendi, aluum deiciendi natu-
ram obtinent. Grossi itaq; succo turgentes cum posca & nitro
præbentur. Conducit huc etiam omne coagulum cum aceto,
pariter & laseris radix cum suo liquore, itidem & brassicæ
semen, & ex ficulneo cinere lixiuium, conyzæq; folia cum
pipere, & ruborum succus cum aceto. Alius præter hæc sub-
ducetur. Solenne est his qui periculo defuncti reduces sunt, per
inferna teterrimi odoris excrementa reddi. Stomachum ala-
uumq; hordeacea farina et mulsa delibutam reddere expedit.

De lacte intus coagulato. Cap. 57.

Lac intus derepentè congelatū, magnum strangulatum pro-
creat, eo quòd in grumos quosdam coalescit. Quibus iuuau-
dis antidoti loco, coagulum cum aceto exhibeas, & sæpius id
sumere compellas. Succurrunt etiam nepitæ folia arida, item
eorundem succus, aut laserpitij radix liquor' ue cum posca.
Thymus itidem cum uino, & lixiuium quo pilearii utuntur,
salsilago nulla admittetur, ne magis lac coeat, & in caseum
densetur. Vitari debet in hoc malo uomitus: siquidem hæ-

De 3 rens

rens in uentriculo conglobatum in grumulos lac, ad exitum eludendo suffocat.

De melle, quod in Heraclia nascitur: Cap. 58.

Qui mel in Heraclia Pontica natum comederint, aut biberint, eisdem plane incommodis obruuntur, quibus qui aconitum hauserunt, quare eadem quae relata in aconito, conueniunt. Saluberrimo autem remedio existit, qui id deuorauerunt, aquae mulsae, admixtis rutae folijs, continuus potus.

De gypso. Cap. 59.

Gypsus hausta in lapidem durefcens, strangulationem procreat. proinde eadem auxilia quae contra fungos competunt, huc transferre conuenit. Inter quae maluae decoctum olei uice praebetur. Pingue enim quum sit, lubricumque, uomitum inducens, interiora non patitur deradi corpuscula, quod lapidescens gypsus efficit. Expedit oleum cum aqua mulsae et ficuum decoctum; uel ex ficulneo cinere, aut sarmentitio factum, cum largiore uino lixiuium. Quin etiam origanum, aut thymum cum lixiuium, siue aceto; passum denique et maluae decoctum, hoc modo affectis per clysteres infundenda sunt.

De cerussa. Cap. 60.

Cerussa suo se prodit indicio, utpote cuius color celari non potest. nam uoluntarie sumpta, palatum, linguam, interstitium qua se dentes contingunt, niueo candore inficit. Singultus praeterea cit, tußim, linguae ariditatem, artuum frigiditatem cum delirio et mentis percussione, corporisque torporem, motumque difficilem ingerit. Quo in periculo constitutis aqua mulsae utiliter exhibetur, aut ficuum, aut maluae decoctum, aut lac calidum, aut sesamum in uino solutum, aut ex uitium sarmentis lixiuium, aut amaracinum oleum, aut irinum. Et persicorum ossa cum hordei decocto, uel thus, uel prunorum gummi, uel qui in ulmorum folliculis continetur liquor, cum tepida aqua: sed ab unoquoque euomant. Confert etiam

etiam thapsiæ succus, uel scammonij cremoris triobolus cum aqua mulsa potatus.

De calce, sandaracha, & auripigmento. Cap. 61.

Differuntur alui & interaneorum cum grauißima mordicatione doloribus, qui calcem, sandaracham, & auripigmentum hauserint. Præbentur igitur omnia, quæ ea temperare & soluere possint, quæq; uomitiones faciles, aluumq; lubricam reddant: cuius farinae, hibisci, & maluæ succus, seminis q; lini decoctum existit. Aut tragi, aut oryzae. Lac etiã cum mulsa liberalius sumptum, iuraq; esculenta pingua, quæ inculpatum succum generent.

De spuma argenti. Cap. 62.

Stomacho, aluo, & intestinis ingentem grauitatẽ, cum grauißimis circa umbilicum torsionibus, ingerit spuma argenti potata: præterea pondere nouunquã suo intestina sauciat, suppressit lotium, intumescit sumentibus eam corpus, & plumbeo colore inficitur, deformitatemq; concipit. Confert igitur, à uomitione statim syluestris hominij semẽ cum uino potui dare, myrrhæ itidem drach. octo, absinthij, hyssopi, aut apij semen. Prodest etiam piper, uel cyperi flores ex uino: columbarumq; agrestium finum siccatum, cum nardo, uinoq;.

De plumbo. Cap. 63.

Comparia planè his qui plumbi ramentum, uel loturam hauserunt, accidunt: iisdem itaque remedijs, quibus spumæ argenti, succurritur.

De argento uiuo. Cap. 64.

Argentum uiuum non secus quàm spuma argenti, potatum afficit. Similibus igitur auxilijs utriq; subueniendum. lac tamen liberaliter haustum, peculiarius ipsis uidetur succurrere. Sed euoment etiam illi.

De ueratro candido, thapsia, elaterio, agarico nigro, ruta syluestri, nigella, pappis. Cap. 65.

Pari industria prospiciendum etiam ijs, quæ homini salubritatis gratia exhibentur, sæpe tamen numero calamitates

De 4 nibilo

nibilo minores alijs inuebunt: cuiusmodi sunt quorū iam memi-
nimus, helleborus inquam albus, thapsia, elaterium, agaricum
nigrum. Strangulatus etenim hæc inferunt, uel purgando ius-
tum modum excedunt: quocirca strangulationib. illis, non se-
cus quā de fungis & similibus demonstratū est, medebimur.
Purgationes uerò æquo copiosiores, his quæ excretiones com-
pescere nata sunt, supprimemus. Neque socorditer tractanda
sunt, quæ minus quidem offendere uidentur, uitæ tamen disci-
men nonnunquā afferunt: e quorum genere censentur, ruta syl-
uestris, nigella, atq; recētes pappi, qui flores sunt spinæ, quam
cactum nominant. Solus uomitus reficit, qui ea sumpserunt.

De his quæ contubernalia, & in quotidiano usu habentur, uino & aqua frigida. Cap. 66.

Strangulatus & dolores inducit, aqua gelida confertim
shauſta, uel meracius uinum largius potum, aut dulce libera-
lius sumptum, præcipuè à balneo, aut cursu, aut concitatiore
exercitio. Vbi sanguinis detractio maturè facta, atq; inanitio,
ingruentia iam pericula auertunt.

LIBRI QVINTI FINIS.

HYPOTHESIS LIBRI SEXTI.

In hoc uolumine totius operis sexto, omnis Chirurgia expo-
nitur, quæ tam carnis, quam ossis uitia considerat, inque fractura-
rum & luxationum explicatione concluditur.

CAPITA LIBRI SEXTI.

Proœmium in artem medendi, quæ administratione manuum absoluitur Cap. 1	De syncipitis quadam incisio- ne, quem periscyphismum ap- pellant 7
De combustione, quæ capiti in- lipientibus, ægre spirantib. & elephantiscis adhibetur. 2	De consutione superioris pal- pebræ, aliisque modis 8
De affectione Hydrocephala 3	De uestione palpebrarum medi- camentis facta 9
De arteriarum incisione 4	De leporario oculorum affectu 10
De uasorum dissectione & adu- sione 5	De sutura & adustione per me- dicamenta 11
De frontis incisione, qui hypo- spasmus dicitur 6	De cætropio 12
	De

LIBER SEXTVS.

413

De euulsione pilorū palpebram irritantium, & adustione per ferrum	13	De cancro	45
De uesiculis palpebræ	14	De maribus quibus perinde ac foeminis mammae turgescunt	46
De palpebris coalescentib.	15	De iecoris adustione	47
De grandinibus, palpebræ tuberculis	16	De lienis adustione	48
De uerrucis & in angularib. tuberculis	17	De stomachi adustione.	49
De oculorum Pterygiis	18	Aqua intercutē qua ratione educatur	50
De uuationibus oculi, seu staphylomatis	19	De iis quibus prominet umbilicus	51
De oculo suppurato	20	De abdominis membranæ uulneribus, deque intestini, uel omenti prolapsu. Inibique uentris resarciendi ratio ex Galeni commentariis, traditur	52
De suffusionibus	21	De recutitis	53
De egilope abscessu oculi	22	De Hypospadiæ	54
De auditoriis meatibus nō per uis	23	De phimo	55
De iis quæ in auditorium meatum inciderunt	24	De præputio glandi adhærescente	56
De polypis	25	De circumcidendis	57
De curtis, quæ colobomata dicuntur	26	De thymis naturalium	58
De epulidibus & parulidibus, gingivarum abscessulis	27	De syphone & clystere uesicæ immittendis	59
De dentium euulsione	28	De calculo	60
De ancylis	29	De partib. circa testiculos	61
De tonsillis	30	De hydrocele	62
De uua	31	De carnosio tophaceo ramice	63
De spinis guttæ infixis, eximendis	32	De uaricoso ramice & flatuoso	64
De gutturis incisione	33	De hernia intestinorum	65
De abscessu	34	De bubonocoele	66
De strumis	35	De scroti laxatione	67
De seuarionibus, pultationibus & mellis fauis	36	De ratione faciendi eunuchum	68
De aneurysmate	37	De hermaphroditis	69
De hernia gutturis, quam bronchocele appellat	38	De nymphe amputanda & caudatione	70
De ganglio	39	De muliebrium locellorum thymis condilomatis, & hæmorrhoidibus	71
De uenarum sectione	40	De muliebrib. genitalibus non perforatis, & phimo	72
De cucurbitularum impositu	41	De uteri abscessu	73
De adustione axillæ	42	De foetuum extractione, & excisione	74
De adnatis digitis & sedigitis	43		
De suppuratorum adustione faciendâ	44		

cisione	74	De brachio	100
De secundis relictis	75	De cubito & radio	101
De coxarum adustione	76	De summa manu, ipsiusq; digi-	101
De fistulis & fauis	77	tis	102
De ani fistulis	78	De femore	103
De hæmorrhoidibus	79	De genuum patella	104
De condylomatis, seu tubercu-		De tibia	105
lis & rimis	80	De pede summo	106
De ano non perforato	81	De instauratione carnis	107
De varicum excisione	82	De fracturis, quæ cum uulnere	
De dracunculo	83	accidunt.	108
De extremarum partium am-		De immodici fracturarum cal-	
putatione	84	li superexcrecentia	109
De unguium pinnulis	85	De distortorum membrorum cō-	
De ungue colliso	86	cretionē	110
De clavis, fœrmicis, & uerrucis		De fracturis quæ non occalle-	
De telis extrahendis	88	scunt	111
De fracturis, & quæ sint ipsorū		De luxatis	112
differentiæ	89	De inferiore maxilla	113 (114)
De fracturis in capite	90	De iugulo & summo humero	
De cerebri membranæ inflam-		De humero luxato	115
matione	91	De cubito	116
De narib. fractis ei contusis	92	De brachialis & digitorum lu-	
De inferiore maxilla cōfracta		xationibus	117
& aure collisa	93	De spinæ uertebris	118
De fracta clavicula	94	De coxæ luxatione	119
De scapula	95	De genu luxatione	120
De pectore	96	De malleoli luxatione, inibiq;	
De costis	97	etiā de pedum digitis	121
De coxendicib. & pubis ossib.		De luxationib. cū hūlcere	122
De uertebris, spina dorſi, & of-		De luxatione cum fractura	123
se sacro	99		

FINIS.

PAVLI AEGINETAE

LIBER SEXTVS, ALBANO

Torino interprete.

Proœmium in artem medendi, quæ administratione manuum
absoluitur. Cap. 1.

SERMO NEM super arte quæ manuum
opera exercetur, bifariā dispescimus: in ea
quæ in carne, et ea quæ in ossiū quum fractu-
ris, tū luxationib. contēplantur. Sūptōq; in
præsentiariū ab ijs quæ carnē infestare solēt.
exordio, de more hic quoq; nostro, rē cōpēdio perstringemus.
Rursus

Rursum itaq; à supernis partib. inchoantes, aduersione quæ capiti ac uertici eius potissimū admoueri cōsuevit, explicabimus.

De combustione quæ capiti in lippientibus, ægre spirantibus, & elephantice adhibetur. Cap. 2.

Humore desuper in oculos fluente, & graui spiratione, ob excremētū humoris abundantia urgente, qui e capite ad throace descendēs, partes eius cōtinuo fluxu affligit, mediū capitis hac quodāmodo ratione perurūt. Detōso prius ad cutē uertici ferramēta instar specilli mucronata inijciunt, & offsetenus cutē adurūt; quod deinde, ubi crusta exciderit, radunt. Quidā uerò ubi os ipsum adusserint, ut squama inde tenuis resoluatur efficiūt, quo facilius humores in capite detēti illinc euaporatu diffluētur, et exinaniātur. Seruato tamē aliquādiu hulcere, postea ita ad cicatricē perducūt. In elephātiāsi autē medēda, quin que nōnulli aduersiones capiti infligūt. Vnā in anteriore parte supra id quod sinciput nūcupatur. Alterā paulo hac inferius, supra frontem tamē ubi capilli finiūt. Tertiā ad occipitiū. Binās reliquas iuxta ossa quæ squamata adglutinamēta uocātur, paululū supra aures. Vnam ex his latere dextro, alterā lauo. Vt plurib. squamis detractis, humorum copia crassitudoq; per spiratu ab imis partib. capitis deriuata extrabatur, atq; ita luminibus nihil detrimenti inferat. Lienī quoq; aliud ferramentum inustorium adhibetur, quo principi melancholici recreamenti membro per cuti inductam crustulam succurratur.

De affectione hydrocephala, hoc est aqueo humore in capite concepto. Cap. 3.

Qum humor qui essentia aquosus est, capitis cutem inflat, morbus peculiariter hydrocephalus nuncupatur. Accidit autem infantibus secundum illico partum, capite ab obstetricibus inscitē compresso, uel ex abdita causa, uel ex uasis, uasorum ue ruptura, & sanguine qui effusus est in ociosam & crudam substantiam conuerso, uel cum materia ob meatulorum raritatem resudante, seque inter cutem & caluariæ membranam recipit. Aut enim hanc caluariæ pelliculam

pelliculam & cutem, uel membranam caluariæ et os, uel
 & membranam cerebri humor intercedit. Quibus igitur in-
 ter cutem & membranam quæ caluariam uelat, humor con-
 gigitur, tumor tractabilis comitatur, concolor, doloris exper-
 in sublime incuruatus, & ad digitorum contrectationem facili-
 cedit, quoniam in proximo est, rursumq; leuatur. Quibus uero
 inter caluariæ membranam & os humor confedit, cætera quo-
 dem respondent, tumor uero durior multo existit, ac tardius
 cedens, utpote pluribus etiam succumbens partibus, maiorem
 cruciatu afficit. Quibus uero humor cerebri membranam &
 os interiacet, tumor quidem existit, sed non adeo mollis, neque
 nisi uiolenter comprimatur, cedens. Siquidem infantium
 recens adhuc compactum quum sit, facile cedit, ac potissimum
 ubi rarefactis suturis humori exitus datur. Id quod uel inde
 facili cognoscitur, quod cum ex aduerso locus impellitur, hu-
 mor ex constrictione in altum refugit. Dolorem hi maiorem
 sentiunt, caput uniuersum distrahitur, frons ipsis foras promi-
 net, fixis luminibus intuentur, perpetuoq; illachrymant. Qui-
 bus sanè tanquam conclamatis manus curatio deneganda est.
 Tamen si chirurgicorum nonnulli terebratione undiq; adactos
 exemerint, ueluti in capite de fracturis capitis referemus. Cū
 uero cuti & membranæ caluam tegenti humor interiacet,
 cum pusillo tumore, una incisione per medium transversim ca-
 put secandum est. Si inter pericranium & os humor cum gran-
 diore tumore constitit, duas per medium se mutuo secantes
 incisiones molimur. Si grandior adhuc tumor emergit, ter-
 nas, uel quatuor figuram æmulantes. Post manus curationem, ex-
 ampta humoris colluie, conceptis linteolis insertis scitè deli-
 gabimus, & in tertium usq; diem ceneleum inspargemus. Post
 hæc fasciis resolutis emmoto mederi studebimus. Si os
 longiore temporis spacio carnem contrahere cū
 æstur, parcente manu radetur.

De

De arteriarum incisione. Cap. 4.

IN diuturnis oculorum defluxionibus, et uitio uertiginoso arterias post aures secare solemus. Tondenda igitur prius posterior capitis pars, & notanda digitis. Ex loci etenim pulsus arteriae suus ex facili deprehendetur. Mox ipsam ad os usque diuisione duos digitos longa incidere conuenit, quae scriptio tamen atramento antea fuerit insignita. Si uero arteria ictus percipi nequeat, interuallum trium circiter digitorum, ab auribus metiendum est: atque ita manu iniecta, arteriae per transversum incidantur, tantisper dum pulsatorius sanguinis fluor abunde fluxerit, diuisa calvariae membrana, ne extensione inflammetur, rasoque osse cuneolum ex panniculo uulnere inferemus. Deinde modo per linamenta medicamine imbuta curandi utemur. Si etiam hic os carne non recepta nudum manserit, similiter rasura adhibenda est.

De uasorum dissectione, quae angiologia uocatur, eorumque adustione. Cap. 5.

IN doloribus qui alteram modo capitis partem exercent, tam diuturnis quam breuibus et acutis, cum calido et acri in oculos fluxu, ita ut temporum etiam musculi cum tumore incalescant, uasorum capitis diuisionem omnes approbarunt. Detonsis igitur primum temporum capillis, locoque calfacto, uel collo constricto, uasa digitis notabuntur. Si hoc modo eadem in conspectum uenerint, atramento signabimus. Cutem à lateribus laeuae manus nostrae digitis, famuli que leuabimus, ipsiusque uenam linea leuiter incidemus. Mox ubi totam penetrauerimus, hamulis oras excipiemus, instrumentisque ad id factis, hanc denudatam undique absolutam suspendemus. Et si tenuis fuerit, retuso hamulo, subiecto & circumtorto uno in loco praecidemus, ita ut partem ipsius quandam apprehendamus. Si uas amplum fuerit, acus cui duplex filum subiectum fuerit: uel linum crudum, uel tale quippiam haud imbecille, transmittenda est. uenaeque primum in rectum scalpello dissecata, sanguineque quan-

tuma

tum opus est, fuso, in utraq; extremitate quod denudatum est lino uincire, & partē quā intercepta est, uel illico ubi soluetur, abscindere ac tollere conuenit. Sunt qui cauterijs mucronatis uasa absq; incisione ad multā profunditatē adurāt. Post quā manū opera absoluta est, discerptis filatim linamētis aridis uulnere oppleto, splenioq; superaccomodato deligandum est. Post solutionē uerò, quā uidelicet uincula deligaturae com-
putruerint, atq; exciderint, medicamentis carnem generantibus aridis, & linteolo concepto exceptis, cicatriciq; inducenda idoneis, curationem quae restat absoluemus.

De frontis incisione qui hypospatismus dicitur. Cap. 6:

AB instrumenti specie nomen Chirurgiae inditum est. Vtendum aut hypospatismo in ijs, in quorū oculos defluxio multa et calida descendit, et uultus ruber apparet, et in fronte sensus quidam ac discursio uermium modo aut formicarū percipitur. Detonsis itaq; primum iuxta frontē capillis, mandabimus aegro, ut inferiorē mandibulā commoueat. Musculorumq; ad tempora motū uitantes, treis lineas in frōte rectas paribus inter se spacijs distantes secabimus, quarū singulae longitudinem binorū digitorū aequent, altitudine usq; ad os tendāt, trium in uicē digitorū interuallo diductas. A sectione hypospathisterē spatham ue subter injicientes, à sinistri temporis linea ad mediam usq; incipiemus: totum illud spacium quod interiacet, unā cum caluariae membrana excoriantes. Deinde rursum spathulam à media incisione ad reliquam adigemus. Mox scolopomachærii aculeati cultelli aciem in primam sectionem conijcientes, ut acies eius interiori cutis carni, retusa pars ossi accommodetur, usq; ad mediam lineā adigemus, ut omnia à capite ad oculos descendētia uasa, non tamen usq; ad summam cutem secemus: rursumq; à media ad extremam ipsum demitemus, simili modo uasa amputantes. Post uerò mediocrē sanguinis inanitionem, expressis accuratē grumis, tria linamenta contorta singulis lineis singula insinuabimus, linteoloq; cōplicato.

cato, aqua imbuto, superaccommadato deligabimus. Postero die cenele o non hulcera modò, sed temporum etiam musculi, auresq; inflammationis ergò inspergantur: tertio die resolueres plurimo fotu utemur, & basilico rosaceo diluto linamentis madentibus insertis, reliquam curationem prosequemur.

De syncipitis quadam incisione, quem periscyphismum appellant. Cap. 7.

Quibus complures aliaq; uenæ copiosum ad oculos fluxum demittunt, his periscyphismus adhibendus est: quod maximum indicia comitantur huiusmodi. Primum quidem offendentes, lumina hoc morbo laborantium alimentum non sentire, parua, & ad intuitum impotentia, hircus ipsorum corrosis, palpebris exulceratis, pilis defluis, lachrymæ adhæc tenues admodum, & cum caliditate acres, tormentum in capitis profunditate acutum & infestum, sternutatio continua. Quos circa capite prius detonso, & musculis qui in temporibus mouentur, ut dictum est, euitatis, transuersa plaga, à læuo tempore in dexterum usque perducetur: quæ, ubi motus nullus existit, fines habeat, paululum supra frontem impacta, sicut coronaria caluæ commissura non offendatur. Licet Leonides per mediam frontem lineam deducendam censeat. Denudato uerò osse, cuneolis aut linamentis filatim concerptis, pluribus incisioni iniectis, oras eius à se inuicem diducemus: finesq; linea deligabimus, cum cenelei, ut prædictum est, adspersione. Post solutionem uerò ubi declinauerit iam inflammatio, os, quoad caro suppullulare incipiat, radendum est: ratio neq; carnis producendæ curabimus, medicamentis aridis in id efficacibus usi. Cuius notæ est, quod constat farinæ triticeæ partibus duabus, colophonice una, & cognomento Cephalicum, & carnem generantia, in quibus pumex adhibetur. Crassiuscula etenim cicatrice cute astricta, & orificijs uasorum occlusis, solitus pituitæ impetus in oculos descendere prohibetur.

De

De consutione superioris palpebrae, aliisque modis. Cap. 8.

Distichiasis nuncupata pilorum succretio præter naturam est, sub ordine naturali pilorum palpebrae exorta, rheumatici affectus soboles: quum copiosus quidem, sed minimè rodens et acrimoniae expers destillans humor existit. Nam si acrior, magisque salsus, aut alio quodam modo mordicans fuerit, diutino fluxu etiam naturales palpebrarum pilos corrumpit. In hac igitur dispositione, interim consutione utimur, interim in phalangosi, quum tarsus seu ciliū introrsum spectans, secum pilorum phalangē inuertit. aliàs aut et in palpebris relaxatis, quū naturales pili bulbū irritant. In sella itaque laborās, uel aduersus uel à latere sinistro collocabitur, superiorque illi palpebra inuertetur. Siquidē demissos habeat pilos, illos ipsos digitis indice et pollice sinistrae manus adprehēdimus. Sin admodū breueis, acu filū trabente mediū tarsum ab interiore parte extrorsum trāsuimus, deinde filo laeua apprehenso palpebrā attollimus. Dextra specilli mucrone foris impresso sinuantem ipsam inuertimus. Postea interius quā pili pungentes habeantur, subtus à maiore hirquo ad minorem usque pertinens, per cilium incidenda linea est: mox filum post incisionem inferiorem subicientes, pollice sinistrae manus duplici quodā lineae teolo obiecto, supercilium sursum extendimus, aliaque exigua lineamenta complicata extremis hircis immittentes, ministro à tergo stanti præcipimus, ut palpebras per ea distendat. Atque tūc scalpello fibulis aptato, paululum supra naturales pilos incisuram, uerū figura ab hirquo ad hircum tendentem perducimus, solius cutis altitudine: post eam aliam lunarem adhibemus, initio ibidem accepto, ubi prior obelo similis linea coeperat, adeo sursum tendentes, ut omnem superuacuam cutē circumscribamus, desinentesque similiter ibidem ubi commemorata linea. Deinde cum cutis duabus lineis circumscripta myrtaceum folium imitetur, in angulum qui ad dextram nostram spectat humulo infixo, cuticula haec uniuersa excorianda est.

Mox

Mox uibicibus spōgia deterfis, tribus aut quatuor futuris uul-
neris oras committemus, à media incisione auspicientes, sic ut
acus in interiore illa sectione defigatur, filum autem ex lana
sit. Superfluum eius amputantes, non prope futuras, sed ut trē-
um circiter digitorum lōgitudo ociosa supersit, quam ad fron-
tem retractam aliquo emplastro gluten habente adglutinabi-
mus, palpebræ pilos mucrone acis à suturarum nexu libera-
bimus. Modus hic quidem curationis, quæ manuum opera ad-
ministratur, communis & tutior est. Sunt qui excoriationem
planè deuitent, eoque post illam subtus factam lineam palpe-
bria uulsellæ, hoc est, specillo ad palpebræ rotunditatem fige-
rato, superfluam cutem scalpro eleuatam excidunt, fibulasq;
ut dictum est, inijciunt. At si in parte modo aliqua palpebræ ex
pilis oriatur stimulatio, illi etiam soli manus opera adhibenda
est. Post hæc panniculis implicitis, posca irrigatis ac superaco-
mōdati, deligabimus, ad tertium usq; diem dilutiore posca
ipsam imbuentes particulam: tertioq; die ligaturam soluemus,
ac superfluis filorum partibus amputatis palpebris, uel cro-
co, uel glaucio, uel aliquo prohibente inflammationem colly-
rio oblinemus: uerbi causa, ex croco rosissq; composito. At si in-
flammetur fibulæ, emplastrum etiam aliquod lene superimpo-
nendum, & ueluti lacte instillato oculum leniemus, relaxatas
postmodum fibulas præcidendo extrahemus. Nouimus ipsi
quendā, qui palpebra, ut cōprehensum est, excoriata, futuras
minimè adhibebat, sed cicatricem inducente medicamento cus-
rationem prosequabatur. Plaga enim ad cicatricem perducta,
palpebra particulatim sublata pilos in exteriorem partem in-
clinare cogebat. Non secus etiā alius quidā, neq; excoriatione
palpebræ, neq; externis duabus ipsius incisionibus utebatur,
sed interiore tamē ducta linea uel digitis uel hamo rugas pala-
pebræ subleuabat, duabus itē harundinulis uel recisamētis bra-
cheis quibusdā, palpebrā longitudine, scalpellū uerò angustum
latitudine æquantibus, totam superuacaneā cutem mediam in

B c

terceptā

terceptam extremis utrinq; reuinctis oris ipsius, constringebat. Atq; ita tota posterior cutis alimentum non sentiens, eoq; emoriens, intra decem aut quindecim ad summum dies unâ cû arundinulis aut lamellis illis bracteis, absque ullo ferè cicatricis uestigio excidebat.

De uisione palpebrarum medicamentis facta. Cap. 9.

Visionem palpebrarû cum medicamentis adurentibus, prisci omnes, ut paucis expediam, respuerunt, quum ob medicamenti acrimoniam oculis infestam, tum quod ex immodica adustione lagophthalmica nascitur affectio: qua quum hient palpebræ, qualicunq; ex occasione oculorum acies offenditur. Quandoquidem uerò multi pilorum punitionem usq; experientes, ne uocabulum quidem consutionis crebro audire sustinent, nosq; inuitos detinent, tanquã deploratis hanc ex medicamento adustionem molimur. Compositio quidem medicamenti huiusmodi est. Calcis uiuæ partes duæ, saponis Gallici uel communis tantundẽ. Sunt qui spumæ nitri parteis quatuor adiiciunt. Hæc omnia percolata lixiuio, uel saponario, uel alio, ficulneo, uel querceo læuigata, urina incorrupti pueri excipientes mucrone specilli myrtacei folij figura, palpebræ injiciemus, tantum spacij deurentes, quantum etiam in futura fuisset à nobis comprehensum. Quum prima iniectione cutis fuerit adusta, medicamẽto spongiola detracta, rursusq; aliud impositum tamdiu cuti inhaerere sinimus, donec nigrorem contrahat. Sin autem minimè nigrescat, etiã tertium injiciemus. Nigresacta iam cute, & crusta oborta, reliquum medicamentum detergendum est. Balineis deinde & perfusionibus, quousq; crusta deciderit, utendum: à cuius casu, rasilibus linamentis, et collyrijs leuibus plagæ cicatrix molienda est.

De leporario oculorum affectu, qui lagophthalmos dicitur. Cap. 10.

Lagophthalmi dicuntur, qui superiorem palpebram sursum retractam habent. Quod uitium uel è natura, uel ex cicatrice uul-

ce uulneris, eiusq; uel sua sponte facti, uel ex cōsutione, uel adu-
sione, ut modò dicebamus, inartificiosa prouenit. In qua uel
mediocri tantum adhiberi potest correctio, si idoneam crassi-
tiem palpebra nacta sit. haud enim conuenit, ipsa cicatrice di-
uisa, & oris cū linteolis diductis, deligatione etiam usq; ad ultē-
mam prorsus curationem uti: neq; nimium exiccantia, sed re-
laxantia magis unguenta adhibere. Cuiusmodi est scēnogræcī
cremor superfus, et basilicum tetrapharmacum resolutum,
& linteolo illitum.

De futura & aduisione per medicamenta. Cap. 11.

Quot pilorū affectibus superior palpebra, totidē etiam infe-
rior obnoxia est. Nā naturæ suæ modo amplior effecta,
inuertitur, & phalāgosin et geminatum pilorū succrescentiū
ordinē, Græci distibidā uocāt, sustinēt. Eodē igitur futura mo-
dulo hic quoq; inuerso tantum linearū ordine, utendū est. prius
enim, lunaris, ne sanguinis fluxu opus impediatur, mox obeli
figura, linea incidi debet. Sub pilis prorsus repudianda est se-
ctio, quoniā inferior palpebræ genuina sua grauitate prōptē
innectitur. Reliqua curadi ratio perinde atq; in cōsutione tra-
ctata est, hic quoq; competit: nisi quod restantia filcrū capita,
frōti minimē sunt adglutināda. At si in hoc etiā casu, manuum
administratione repudiata, uisionem potius per medicamenta
deligere malis, hanc quoq; à nobis iam traditam habes.

De ectropio. Cap. 12.

Vt in palpebra superiore uitium lagophthalmū uocatū, sic
in inferiore ectropiū accidit. Nisi quod hoc naturaliter nō
euenit, sed interdū ex relaxatione. medicamētis in id effica-
cib. illatis, præcedente inflāmate: interdū ex futura uel adu-
sione parū dextrē administrata, palpebra inuertitur. Acum
igitur quæ duplex linum habeat, in carunculam à sinisterio-
re hirquo ad dextram usq; trañcimus, postea extremis utrisq;
que acus lino adplicato, carunculam attollimus, & scalpelo
succidimus, simul cum caruncula acu sequente. Si palpebra

Bc 2

sic for

sic formā suam receperit, & aequaliter fuerit restituta, de ma-
nus opera erimus contenti. Sin carne ablata adhuc inuertas
tur, cyathiscum scalpelli iuxta mucronē sedae palpebrae sub-
ijciemus, internaq; parte palpebrā binis lineis secabimus, quā
à duobus factae incisionis angulis auspiciantibus in fastigiū mu-
cronatum ad A literae Graecae instar coeant, carunculam de
trahemus, ut uertex ipsius deorsum ad oculum, basis sursum ad
cilium adpellatum respiciat. Deinde hiantes plagae oras, acu
laneum filum trahente coniungemus, geminis consutionibus
contenti. Caeterum si ex sutura uel uestione acciderit inuer-
sio, sub inferioribus etiam palpebrae pilis iuxta priorem cicatricem
simplex linea incidenda est, labrisq; diductis linamen-
ta insinuanda, & reliquis deinceps praesidijs, ueluti in lepori-
na adfectione docuimus, utendum est, exceptis fotibus, donec
sutura conglutinetur.

De evulsione pilorum palpebram irritantium, quam ana-
brochismus uocant, & adustione per ferrum. Cap. 13.

IN quorum palpebra pili, qui oculum pungunt, multi non
sunt, sed unus modo, aut duo, uel ad summū tres mutuo inter
se propinqui, anabrochismus, id est illaqueationē probamus.
Quae fit hoc modo: Acu tenuissima accepta, per auriculā eius
capillum muliebrem, aut simplicissimum byssinū filum trans-
mittimus, duobus simul capitibus commissis, sic, ut filum dupli-
cem habeat ansulam instar sinus, alterumq; filum huiusmodi
uel capillum in ansulam conyicimus, transmissaq; acu per ci-
lium ubi pili agnati cernuntur, pilum seu pilos in sinum ansu-
lae iniectos specillo detrahemus. etsi quidē palpebrae pilus pra-
bensus fuerit, fili ansulam attrahimus. sin autem unus plures
sic exciderint, per initium iniectum, rursus ansulam deorsum
trahemus, iterumq; pilo seu pilis immisiss attrahemus. Quod
si unus duntaxat fuerit pilus, & idem gracilis qui oculum stia-
mulet, eum unā cum alio ex naturalibus pilis euellemus, illi
tum antea gummi aut alio quodam glutinoso, atque ita donec
piliq

pili in unū coalescant deligabimus. Nō desunt tamen qui huic laqueationi uisionē praeferentes, palpebram inuertūt, uulsel laq; pilis irritantibus, siue uno siue duo, seu tres sint, candente scalpelli mucrone oliuari forma, aut specillo auriculari, aut eiusmodi aliquo tenui instrumēto locū adurūt, unde pilus pilisue sint euulsi. sic cute densata, nullus pilus amplius renascitur.

De uesiculis palpebrae, quae Graece hydatides dicuntur. Cap. 14.

HYDATIS pinguis quaedā est essentia, sub cute palpebrae praeter naturam conflatā. In nonnullis uerō, & praesertim pueris, utpote natura humidioribus, increscens grauiorum causa suum causa euadit, dum oculū aggrauat, eoq; fluxionibus exercet. palpebrae itaque his aquosae infra supercilia apparent, neq; ut decorum est sursum queunt attolli. Si eas digitis inter se distantibus deprimamus, quod medium inter digitos existit, inflari cernitur. Matutino autem diluculo defluxione potissimum infestantur. Neq; ad solis splendores nisi lachrymantes lumina conuertere possunt, & continuis lippitudinibus tēantur. Aegro igitur adpositē collocato, binis digitis, indice & medico paululum diductis, palpebram comprimemus, collectionem quandam uesiculae inter digitos molientes. Deinde famulo posterius stanti, & caput sustinenti, ad medium supercilium palpebram paululum attollat iubebimus. Nos sumpto scalpello eam lineā transversa per medium secabimus, plaga tamen non maiore quā in sectione uenarū fieri solitū est, nec altiore quā ut uel totam cutem secet, uel hydatidem ipsam attingat; animum ad hoc sollicitius aduertentes. multi enim aliter per incuriam demisso scalpello, uel corneam membrā fauciauerunt, uel certe palpebrae musculum. Et si uesicula oculis protinus sese obiecerit, ipsam illico euellemus: sin minus, rursum suspensa leuiter manu lineā moliemur, ipsamq; si pruruerit digitis molli linteolo adprehensam huc illuc agitan- tes, & in orbem nonnunquam circumagentes extrahemus.

Be 3 A' detra-

A' detractione duplicato linteolo posca imbuto & superimposito deligabimus. Nonnulli salem contritum mucrone specillo nucleum inuitante incisura inijciunt, quo hydatidis reliquiae si quae fuerint, consumantur. Post solutionem, si non urgeat inflammatio, illitis collyrijs, uel lycio, uel glaucio, uel croceo medebimur. Si inflammatione confluentur, cataplasmatibus hoc comparatis, alijsq; praesidijs curabimus.

De palpebris coalescentibus. Cap. 15.

Committitur interdum superior palpebra cum cilio inferiore, interdum cum tunica adnata, nonnunquam cum ipsa quoque oculi cornea coalescit. Vitium hoc oculum ad munia sua ignauum ac difficilem reddit, proinde uel specillo patenti palpebra loco inserto, uel hamulo subiecto eleuabis, & scalpello pterygijs secandis idoneo cohaerentiam dissoluito, circumspice ne cornea membrana saucietur deuitans, ne procidentia ex hoc detur occasio. Post abscissionem oculo liquorem instillabis: palpebris cum linamentis, ne rursus cohaerescant, diducis, lanam oui albore imbutam inserto. A' tertio dein die attenuantibus, & cicatricem inducentibus collyrijs utendum.

De grandinib. palpebrae tuberculis, quae chalazia dicuntur. Cap. 16.

Chalazium est crudi cuiusdam humoris in palpebra coactio. Quod si exteriori palpebrae subsidet, incisione transversa forinsecus scalpello facta, specillo deinde uel aliquo id genus instrumento tolletur. Si spaciola et hians est diuisio, sutura orae commitemus, et emplastrum inducemus. Si exilis plaga est, simili modo curabimus. Si ab interiori parte sub cartilagine pelucet, inuersam palpebram linea transversa interius incidentes, chalazium extrahetur: quo facto, murice instillatione utimur.

De uerrucis & inangularibus tuberculis, quae Graece acrochordones et encanthides dicuntur. Cap. 17.

Palpebrarum uerrucas & inangularia, quia in maiore canatho oriuntur, adpellata tubercula, (Graece encanthides) uulsella comprehensas, scalpello amputamus, friatam deinde in pollinem chalcitidem superaccommodamus.

De

De pterygiis, hoc est oculorum unguibus. Cap. 18.

Hoc uitium accidit, quum membrana quædā neruosa à maiore angulo ut plurimū orta, paulatim ulterius ad interiora procedit, oculūq; offendit: tum quia contrahendo bulbū moueri non sinit, tū quia procedendo uniuersam pupillā operit. Tenuibus sanè et albicantibus, quoniam facilius curantur, hūc ad modum manuum curatio adhibenda est: diductis palpebris, unguem hamulo paululum mucrone intus recuruato excipimus, sublaturūq; acu pilum equinum & linum ualidum ducen-
 te, paululum in summitate inflexa, per medium traicimus, li-
 noq; uinctum sublimem suspendimus, seta equina partem pupil-
 læ uicinam quasi ferrando defecantes, ad finem usq; excoria-
 mus. Totum uerò ipsius reliquum, quod angulo maiori inhæ-
 ret, radicitus excidimus, ita ut naturalis anguli caruncula re-
 linquatur, ne ea ablata rhyas sequatur, hoc est perpetuus bu-
 moris descensus. Sunt qui uinguē sublaturū, ut diximus, scalpel-
 lo huic muneri dicato totam succidunt, excoriant, summa ta-
 men cura adhibita, ne cornea membrana attingatur. Post ma-
 nuum operam laeuigati salis momentum loco inuicimus, lanam
 etque candido oui liquore irriguam deuincimus. Facta aliquan-
 diu post solutione, muriam instillabimus. Si inflammatio subs-
 equitur, dedicatis huic malo auxilijs utemur.

De uuationibus oculi, seu staphylomatis. Cap. 19.

Vuatio siue staphyloma est, mēorane quæ cornus speciē habet, unā cū acinali, quæ ragoëidis nuncupatur, debilitatæ incuruatio, modò ex defluxione, modò ex ulceratione originē trahens. Huic autem uitio manum administramus, non ut luminis speciē iam abolitā restituamus (hoc enim nequit fieri) sed ut laboranti mediocrem uenustatis gratiam conciliemus. Oportet igitur acum ab inferiore parte sursum per radices staphylomatis traicere, deinde alteram acum duplex filum trahentē, ab angulo qui ad manum spectat, ad alterū per radices uuationis transmittere, tū manēte priori acu lini sinus am-

Be 4

putari,

putari, atq; ita uuae superiora, inferioraq; filis deligare, mox acu extracta lanam albumine oui insuccatam superaccommodare. Ab huius inde solutione blandis infusionibus oculus fovendus est, quoad unà cum staphylomate fila excidant.

De oculo suppurato, quod hypopyon dicunt. Cap. 20.

DE purulentis oculis abunde erit, Galeni orationem apposuisse, quæ ad hunc modum se habet. Ocularius quidam nostræ ætatis medicus, Iustus nomine, ex capitis concussionē pleurosq; suppuratione oculorum uindicauit. In sella quippe repositos collocabat, mox capita ipsorum utring; à lateribus comprehendens, ita quatiebat, ut prius ipsis descendere euidenter conspiceremus, quod deorsum propter substantiæ gravitatem manavit, tametsi suffusiones nequaquam permanere, nisi accuratè admodum constringantur, ualeant. Progrediens rursus idē Galenus, inquit: Sæpe autem puris multum simul eduximus, cornea tunica paululum supra locum illum, qui iris à quibusdam, ab alijs corona appellatur, ubi omnes tuniciæ inter sese committuntur, incisa: id quod Galenus in libro Curatoriæ artis prodidit. A puris excretionē, uel ex aqua mulsa: uel succo foenograci melle temperato instillationibus expurgantes, deinceps reliquam curationem accommodabimus.

De suffusionibus. Cap. 21.

SUFFUSIO est crudi cuiusdam humoris in membrana quæ cornus speciem refert, iuxta pupillam colluuiēs, quæ uel uidere, uel lucidè uidere impedit. Ex frigidityte potissimum et imbecillitate spiritus uisorij prouenit, eamq; ob causam senibus magis et longo morbo confectis accidit: ex uiolento item uomitū et plaga, alijsq; plurib. de causis euenit. Atqui de suffusionibus, quæ adhuc efficiuntur, nullam manus administrationē requirentibus, in tertio uolumine facta est mentio. nūc eas quæ consummatam concretionem et firmam constitutionem acciperunt, indicijis suis denotabimus. Cuncti igitur suffusi fulgorem uel multum, uel paucum intuentur. eoq; discrimine ab hebetudine

hebetudine & glaucedine distat suffusio, quod hebetudine & glaucedine affecti, ne fulgorem quidem penitus cernunt. Rursum itaq; suffusionum & concretionem, & differentiam, & quomodo his manuum administratio sit adhibenda, Galenus te docebit. Oculum, inquit, suffusione laborantem concludimus, polliceq; compressam palpebram ad oculum hac illac impellimus. Postea oculo recluso, animaduertentes suffusionem intuemur. In quibus humor nondum exacte concreuit, fusio quaedam ex digiti impressura obuenit, quae primo latior comparet: deinde rursus in suam figuram & magnitudinem redit. Sed in quibus humor ad perfectam duriciem coaluit, nulla neq; latitudinis, neq; figurae ex compressione immutatio obuiat. Quoniam uero haec earum & quae modice, & quae supra quam par est induruerunt, nota communis est, colore ipsas discernemus. Nam quae ferri colorem uel caeruleum, uel plumbi referunt, mediocriter coaluerunt, & ad deductionem accommodatae sunt. Quae uero gypso aut grandini simile colorem habent, ultra modum compactae & induratae sunt. Haec ubi ex Galeno didicimus, collocato in sedili homine in lucido citra solem loco, sanum oculum summa diligentia colligabimus: tum apertis alterius palpebris, ab iride appellata, cum ad minorem huiusmodi, aliquantulum ad specilli mucronis instar deducemus, & retuso punctorij stili capitulo, locum ubi pungendum est notis designamus, in laevo quidem lumine dextra, in dextro laeva manu operantes. Mox teretem specilli mucronem inuersum acriter notae designatae impingimus, usq; dum inani loco incidimus. Ba nobis erit mensura, ut tam alte penetremus, quantum a pupilla ad iridem interest spacij. Ex superiori igitur suffusionis parte acu adacta (euidenter enim ferrum, propter corneae membranae pelluciditatem, conspicitur) humoris concretionem per ipsam ad inferiorem regionem deducimus. Et si statim deducta fuerit, persistemus, quiescentes aliquantulum. Sin reuersa fuerit, iterum deriuanda est. Post autem humoris colluui-

E c s deduc

deductionem, sensim circūuertendo stilus extrahendus est, tū alis capadocis momentū aqua dilutū oculo eloto instillandum est, lanamq; luteo oui liquore imbutā cum rosaceo foris impositā deuinciemus, ita ut oculus sanus, ne unā cū altero moueatur, simul deligetur. Deinde in domuncula subterranea laborantē prorsum quiescere, et tenui uictu uti præcipimus, oculis ita ad septimū usq; diē, nisi quid prohibeat, deligatis: à quo res soluemus, et ex rebus quibusdā uisibilibus obiectis uisionis periculum faciemus. Quod inter manus curationē et ab hoc protinus fieri non debet, quoniā ex nimia intuitus intentione facillē rursus redire suffusio solet. Si qua inflammatio urgebit, etiam ante septimum diem facta solutione certatim occurrendū est.

De ægilope abcessu oculi. Cap. 22.

A Egilops tumēs abcessus est, inter maiore hircū & nares medius. Quod uitii remedijs difficulter eliditur, tū ob partium tenuitatē, tum ob periculū, quod ex cōsensu oculo immineat. Quare si ad summam cutim eruperit abcessus, omne id quod extuberat, offetenus circumcidendū est. Si ad malā hircus debiscēs ceu fistula subierit, totum ipsum aperiemus, & os etiamdū incorruptū rademus. Sin iam carie uexetur, cādenti bus ac retusis ferramentis aduremus, spongia frigida aqua irrigua oculo imposita. Quidam post caruncula excisionem terebra usq; humorem uel pus in nares traducūt. nos sola adustione contenti sumus, eo usq; ferramentis ægilopi dicatis adurentes, ut squama abscederet. Post ustionem medicamentis ex lētis cula et melle, uel malicorio, sidiotōue, & reliquis exiccantibus præsidijs utimur. Quod si ægilops non ad summā cutem, sed ad hircum tendat, scalpello uel ad pterygia secanda, uel ad uenam aperiendam idoneo, totam eam quæ inter hircum existit particulam, ad abcessum resoluentes, carnes ex imo euellimus, et moderatē exiccabimus. Vitri aut puluisculus inspersus mirificē deficcat. Idem aloē cum manna præstat. Reliquam ægilopum curationem tertio libro tractauimus.

De au

De auditoriis meatibus non peruiis. Cap. 23.

Hoc uitium à primo natali die accidit, membrana quadam auditorium meatum obstruente, nūc in summo tantū, nunc in alto: postea facta prius secundum meatum exulceratione, caro enim superexcrefcens ipsum cicatrice obturat. Si igitur in alto fuerit membrana auditum impediens, difficilis erit omnis conatus, diffecare tamē ipsam tenui aliquo instrumēto tentandum est. Si in summo, aculeato cultello, quod Græci scolopomacherium uocant, hanc diuisam, si opus est, etiam detrabemus. Si carnis incrementum fuerit, id scalpello ad ungues accommodato, uel spathula polytica auferemus. Deinde linteolum ex lacinijs adpositū ad meaculi mensuram contortum, aqua imbutum, in lauoremq; detrita chalcitide, uel tali aliquo arido aspersum, inuolutumq; ne caro rursus increfcatur, in meatum demitemus: quod tamen si inflammatio infestat, protinus tollendum est. Si meatus sanguine manat, spongia aqua frigida madens imponenda est: aliaq; ad hoc consecrata remedia conuenienter adhibebimus.

De iis quæ in auditorium meatū inciderunt. Cap. 24.

Incidunt in aures nō solū calculi, sed etiā uitrum, fabæ, et siliquarū osicula. Vitrum utiq; et calculi propriā magnitudinem seruant: fabæ et siliquarū osicula, et id genus reliqua naturali corporis humiditate inflata, extremos cruciatus inducunt. Oportet itaq; specillo auriculario, uel hamulo, uel uulsel la hæc eycere: uel uiolēta capitis concussione, aure supra circumculum aliquem posita. Sæpe etiam numero hæc per calamum sugendo extrahimus, exuentes quemadmodum aquam quæ auribus inciderit, cera circumquaque calamum quæ auri inycitur obturantes, ne uspiā spiritui exitus pateat. Lapillos et reliqua huiusmodi corpuscula, specillo lana inuoluto, resinaq; terebinthina imbuta, uel glutinosa quodam oblito, leniter in aurem demisso, extrahimus. Si uerò nō successerit, sterutamentum proliciente remedio naribus indito, os simul

et

et nasi foramina obturato. Si ne horum quidem ulli obtemperauerit, antequam inflammatio et conuulsio, uel periculum demum aliquod fuerit subsequutum, manuum scalpelliq; opera auferemus. Collocabitur itaq; laborans, ut auris eius auersa sit: retro eam quæ fibra dicitur, ad basim ipsius et lunata figura, linea exilis inciditur, latiusculaq; specilli parte corpusculum quod inhaeret, extrahemus. Deinde ablato illo, plasmam consuetam haud aliter atq; cruenta medemur.

De polypis. Cap. 25.

POLYPUS tumor est, qui præter naturam intra nasi foramina concreuit, à marini animalis polypi similitudine nomen sortitus, tum quia carni eius simile est uitium: tum quia quemadmodum ille suis cirrhis piscantes ulciscitur, manus ipsorum suis flagellis implicans, ita et hoc uitium nares laborantium obstruit, difficultatem quum respirandi tum loquendi exhibens. Duri itaq; et tactui resistentes polypi, subliuidi et malefici, utpote cæci naturam respicientes, non sunt attingendi: fragiles autem magis, laxiores, torpentesq; neq; maligni, manus opera curandi sunt. In sella igitur aduersus solarem radium hominem figurabimus, læuamq; manu narium eius meatum dilatatum tenentes, dextera spatula huic rei dedicata, polypicam me ad myrtacei folij formam robusta polypum, uel excrementum carnis in orbem circumcidemus, eam in partem ferramenti acie imposita, ubi naribus adhærescit: deinde auersa manubrioli parte, excisam carnem eximemus. Et si nasi meatum purum effectum uiderimus, ad remediorum auxilia deueniendum est: si qua polypi particula superfuerit, alterius ferramenti, ad polypum eradendum facti, acie immissa, relictum corpus cum tensione, torsione et rasura strenue educemus. Maleficos autem polypos gracilibus et oliuaribus ferramenti candentibus adurere conuenit. Post adustionem, praesidia uestioni dicata adhibenda sunt. A scalpelli uero usu, manuumq; opera, spongia oco exacte deterso, poscam uel uinum in nares infundimus.

Et si

Et si liquor per palatum ad fauces transierit, bene se habebit functiones manuum. Sin minus, indicat polypi carunculam circa ossa, quæ à colando ethmoides dicuntur, hære: uel superius, quæ instrumenta polypica nondum comprehēderūt. Linum ergo mediocri crassitudine funiculi aut fasciæ instar, ueluti per duorum, aut trium digitorum spacium nodis innoxum, in foramen specilli inserimus: deinde alterū extremum sursum ad colatorios usq; meatus propellimus, idem per palatum ad os usque eijcientes, utraq; manu apprehendentes ultro citroq; trahimus, tanquam nodis seu serra superfluam carnē perforantes. Post hæc meatus funiculari linamento apertus seruāndus est. A tertio dein die pastillo Musæ, et id genus alijs reliquias uitij absumemus, unaq; locum exiccabimus. Pastilli postremo quæ cicatricē faciūt, adhibendi sunt: plūbeis fistulis scitē, si res exigat toto curationis tempore naribus iniectis.

De curtis quæ colobomata dicuntur. Cap. 26.

Curta uerò in auribus aut labris hoc compendio sanantur. Principiò sanè cutem ab inferiore parte excoriamus, ac leuiter detrahimus: postea commissis inuicem uulnere oris, et eo quo in callum induruit ablato, mox fibulis consarcinamus, et conglutinamus.

De epulidibus & parulidibus, gingiuarum abstessibus. Cap. 27.

Epulis caro quædam est superflua, iuxta dentium aliquem in gingiuis exorta. Parulis uerò, pusillus circa gingiuas abscessulus est. Epulidem ergo uulsella aut hamulo sublata excidimus. Parulidem orbiculatim excisam, linamentis impositis curamus. Scio ego parulidē sæpenumero phlebotomo solū punctam, pure euacuato desisse. Post scalpelli usum uino protinus, sequenti die mulsæ collui mandamus. Tertio die puluerē antherum appellatum uulnere, donec absoluator curatio, inducemus. Si putrilago gingiuas infestat, et conuenientia huic remedia nihil subueniant, tenuibus, retusis, candentib. q; ferramentis aduretur.

De

Dentem qui eximendus est, usq; ad radices circumscarificatum, forcipe paululū concutiētes, euellimus. Si dens erosus est, id foramē tenui linamento replendū est, ne strictus sub forcipe cōfringatur. Buulso dente, restantes carunculæ sale tenuissimo infriatæ cōsumentur. Mox uino uel posca, quoad sanatio finiatur, collui debet. Quoniam aut̃ superflui quidam dentes agnascūtur, eos qui radici inserti concauitatib. hærent, scalpro excisorio excindemus: qui non ita inseruntur, forcipe educendi sunt. At si dentium aliquis supra quā par excreuerit, uel cōfractus fuerit, quod prominet et superuacaneū est, lima, rhinariō ue atterendum est: adhærescentesq; ipsis, ceu assolet, squamulæ, uel specilli latiuscula extremitate, uel rasorio cullatello, uel limula deniq; expurgandæ sunt.

De ancylīo, id est incuruatione, aut retractione linguę, qua laborantes ægre sermonem faciunt. Cap. 29.

Ancyloglossū uitiū est linguę, quod aliās ex natiuitate enit, quā membranæ quę linguam continent, duriusculæ ac breuiiores à natura productæ sunt. Aliās ex causa accidentaria, quum sub lingua ex hulcere aliquo durior cicatrix relicta est. Quibus natura hoc uitiū cognatū est, ex eo quod tardè in sermonē prorūpunt, et nulla præcedente exulceratione uinculū iusto maius cōspicitur, cognosci possunt. Qui ex aduentitia occasione hoc patiuntur, cicatricē euidenter conspicuā præferunt. Desidere itaq; in sedili ægrū oportet, ita figuratū, ut lingua eius sursum ad palatum attollatur, & nerueum illud pertransuersum succidetur. Quod si ex cicatrice aliqua curuitas linguę prouenerit, uncino callus apprehensus extrahendus est, & laterali linea incidendus, sic ut incuruatio illa dissoluatur. Animaduersione simul habita, ne altè fiat incisio, & subiacentes uenę dissecentur. Profluuium enim sanguinis incompefcibile frequenter inde fieri consueuit. Ab opere autem patrato, ex aqua frigida uel posca uulnus eluendum est, deina
de

de ea curandi ratione quæ relaxet, et carne repleat, utendum.

De tonsillis. Cap. 30.

PBrinde atq; in collo glândulæ induratæ, strumæ nūcupantur: ita etiam paristhmia inflammatione tentata, uel supra quàm par est aucta, et quasi exiccata, difficultatēq; transglutitioni et spiritui exhibētia, è regione utrinq; sibi inuicē opposita, Græcè Antiades, hoc est tonsillæ appellantur. In quibus quā adest inflammatio, ab opere abstinendū est: quū illa uerò aliquantulū finita fuerit, manus admouenda, præcipuè candidis in arctū coactis, et ad radices angustis. Nam quæ madore flaccescunt, rubentq; et latā basim habēt, facillimè sanguinis eruptione periclitantur. Collocato igitur aduersus solis fulgore homini hiare præcipimus, famulo caput posterius continente, et lingua eius ab altero spatula ad id facta ad inferiorem maxillam depressa, nos uncino tonsillæ iniecto, ipsam pro uirili mēbris intactis, attrahimus. Post hæc totā ipsam à radice amputamus, scalpello incuruationi linguæ dicato. Bina enim habētur id genus instrumēta, aduersa inter se acie recuruata. Post excisionem unius, alteram eodē modo, uice conuersa aggredimur. Postquam munia ferro sunt obita, laborans ex aqua gelida, aut posca gargarizabit. Si sanguinis profusio superueniat, rubi etiā, rosarūq; et myrti decocto tepido utendum est. Si copia sanguinis feratur, plantaginis et solidaginis succo, et ex succino pastillo, et lemnio sigillo posca diluto collui debent. Eruptione autem sanguinis finita, sequenti die, rosarū flore, croco et amylo, cum lacte uel aqua, uel oui albore, uel aqua muisa rosacea perungentur. Si sordes hucera contraxerint, ex melle collutiones, illitusq; salubriter adhibentur.

De uua. Cap. 31.

Vrgulio quū uocis plectrum quoddā existat, identidem à capite fluxionē excipit. Idēq; præter naturā auctus, si oblongior et tenuis euadit, columella: si inferiore eius parte crassior et orbicularis fiat, uua adpellatur: utrunque à similitudine nomen inditū. Huic affectui, si neque uniuersalibus præsi-

dijs,

dijs, puta sanguinis detractioni, & pharmaco concitatis euacuationibus, neq; ijs quæ exterius loco injiciuntur, astringentibus inquam, uel repellentibus, uel discutientibus remedijs succurri potest, ad Chirurgiam deueniendum est, ne assiduo irritatu tussim et uigilias, & strangulatum etiam aliquando inferat. Contractas igitur uuas, orbiculares, non oblongas, cruentas uel liuidas, manu non attingamus. Tenuēs autem, oblongas, in summo muris caudæ modo attenuatas, resolutas, non aded sanguinolentas, sed albicantes e manu curabimus. Statim enim ab inflammatione uindicantur. Idq; tantum præcidendum est, quo longior uua quàm secundū naturam existit. Nā si prorsus tota præcidatur, ut summum thoracis regionibus adfert nocumentum, ita multos interdū efficit. Collocato itaq; ad solis radios laborante, os quantum potest diducere iuebimus: deinde uaria forcipe aut uulsella, quod superuacuum est præbensum, & ad inferiorem partem tractum, ferramento ad id facto, uel scalpello sutorio, præcidimus. Ab opere autem patrato, agenda eadem sunt, quæ in uenarum sectione comprehensa sunt. Non raro autem propter ægrotantis pauorē, uel ob sanguinis profluuij metum, uel ob medicamentū siccitatem ferum deuitemus, et adurēte potius medicamentō eā consumimus. Vbi illud quod in palpebrarū adustione dictū est medicamentū, uel id genus aliud adhibere cōuenit, eoq; instrumēto quo uua aduritur sinus implere, et homini os quāmaximē potest diducere iusso, lingua per ministrū forcipe ad id accommodato depressa, tantā uua partē instrumēto dilatato apprehēdimus, quantā amputari cōpetit. Medicamentū autem substantiam habeat neq; nimis liquidam, ne diffuens ab uua deerret, inferiora autem membra adurat: ob hoc etiam homini præcipimus, ne per uniuersum adustionis tempus deglutiat: neq; nimis durum, quo facilius uua infadat. Si uno iniectu summa uua nigritiem contraxerit, contenti simus, si minus, bis utemur, toto administrationis tempore ægro os apertum deorsum inclinante, ut

te, ut sputum eliquatum, & medicamento portuunculae ex ore effluant. Horae enim unius spacio uua emoritur, tertio quarto uel die excidit. Post unctionem indice molli lana aut stippa inuoluto, gurgulionem undique extergimus, uel aqua os collui iubebimus. Colli autem regionem ex chamamelino fouebimus: quemadmodum in illis quibus tonsillae fuerunt ablatae, ob communem quam cum his habet affectionem. Gargarizationes in super & illitus pari modo adhibenda sunt.

De spinis gulae infixis eximendis. Cap. 32.

Dum estur, saepe numero spinae tum piscium, tum aliorum quorundam diuersis gulae partibus deuorantur. Quae igitur oculis subiacent, uulsellis ad spinas eximendis factis, quae priuatim acanthobola dicuntur, extrahendae sunt. Si uero in inferioribus gulae locis ad glutiendi orificium haeserint, alio modo educentur. Nonnulli maiora corpuscula, ueluti caulem laetucarum, aut panis buccas deglutiendas exhibent. Alii spongiolam puram ac mollem cum filo ipsi alligato deuorari iubent, & mox apprehenso filo, rursus extrahi, idque saepius, ut spina spongiae infixa simul educatur. Leonides autem cataplasmata quae concoquant exterius imponere praecipit, cuius modi ex cruda polenta oleo & aqua subacta conficiuntur, ut spina suppurata ultro excidat. Si eadem hora qua spina infigitur, uel priusquam in uentriculo fiat concoctio in laborante inciderimus, eo quod infixum est in conspectum non ueniens, digito uel pinna in os demissa euomere mādabimus. Sic enim interdum accidit, ut una cum uomitu quicquid infixum est, eiciatur.

De gutturis incisione. Cap. 33.

Chirurgicorum optimi hanc quoque manuum curationem descripserunt. Antillus igitur ita tradit: In his qui angina laborant, ut de ratione uictus docebitur, manuum administratio nem repudiamus, quum inutilis futura sit incisio, ubi arteriae omnes & pulmo affectus est. In ijs autem, qui circa os et mentum inflammationem experiuntur, aut etiam tonsillis, quae fau-

Es

ciunt

cium os operiunt, nulla laborante arteria, non alienū est, quo strangulationis periculū euitetur, gutturis incisione uti. Mox quū in opere sumus, infra gutturis caput spacio triū ipsius aut quatuor orbiū partē quandā asperā arteriā (tota enim diuidi sine periculo nequit) amputabimus. Nam hic locus est accom-
modus, tum quod ex carnis sit, tum quod uasa procul à parte diuisa sint diſſita. Reflexo itaq; in posteriorē partem ægrotantis capite, ut guttur manifestius in conspectum ueniat, transuersa linea inter duos circulos ipsum incidemus, ut cartilagine intacta, membrana tantū cartilagine inuoluēs, discindatur. Quod si quis meticulosior in hoc opere fuerit, uncino is cutem eleuatā prius diuidet. Postea sic guttur ipsum aggressus, uasis omnibus, si fortē occurrāt, præteritis, sectionem faciat. Hactenus Antyllus. Conieciabat autem is gutturis incisionem, tum ex spiritus quodam cum murmure eruptione, tum ex uocis interruptione. Quum autem strangulatus periculum præteryt, oras plagæ renouatas suturis commitemus, ita ut cutis sola absq; cartilagine cōsuatur. Et quod cruentis facit medicamentum adhibebimus, si nō glutinetur, carnem inducente remedio utemur. Eadem curatio erit adhibenda, si quis nobis obtigerit, qui finiendæ uitæ desiderio iugulum sibi sauciauerit.

De abscessu. Cap. 34.

Quod abscessus, carniū, seu carnearū partiū corruptio & mutatio sit, et quæ nā origo eiusmodi, quotq; eius sint discrimina, quarto libro satis superq; dissertatū est. Nūc eos tantū quibus citra manū scalpelliq; operā mederi nō datur, persequemur, quū exacta in pus facta fuerit mutatio. Quam ex his facile cognouerimus, q̄ dolores, febris si præcesserit, robur, pulsus, et reliqua inflammationis signa diminuitur, & in mucronē tumor acuminatur, & ad digitorū cōpressurā pus sublabitur, potissimè in abscessib. qui summa occupāt, tūc ad manū ministrationē ueniendū est. Si uerò neq; tactu sentietur, neq; fastigietur tumor, eo quod in alto deliteſcat, alias mutationis in pus

in pus notis animo reputantes, scalpellum adhibebimus. Sciendum aut, quod abscessus ante absolutam interdum in pus mutationem, incidi uel crudos conuenit, si uel prope articulos, uel principem aliquam partem consistant, ne immorante putredine uel ligamentum, uel membrum aliquod necessarium pariter corrumpatur. Abscessus porro sedi uicinos ante perfectam maturationem, uel crudos aperire, praecipit Hippocrates, uertus ne in perforationem procedant. Incisiones itaque non parili linea sunt omnes faciendae. Nam in fronte naturales, in capite capillorum exortus sequemur, cura decoris, quatenus fieri potest, habita. Recta uero linea brachia secamus, & crura secundum musculos & tendones: neruis & arterijs principibusque corporis partibus magno studio euitatis: nunc in rectum, nunc transuersum, prout res exiget, abscessum diuidentes. Minores quidem abscessus una, maiores pluribus, iuxta magnitudinis rationem, tenuioribus tamen, et effluctioni idoneis lineis incidimus. Plurimum fastigiati, crudi, tenues, et emortui latius sunt excidendi, ut plaga in trianguli, aut myrtacei folij, aut alterius anguli figuram euadat. nam orbicularis ad cicatricem difficilius perducitur. Qui uero non sunt fastigiati, simplici duntaxat linea sunt aperiendi. Sed quum ingentem sinum inuenimus, si carnosae cute & ad glutinandum sufficiente operiuntur, sat est, si idoneis ad puris exitum sectionibus utemur. Si tenuis et excarnis admodum cutis superiacet, in longitudinem diffecetur. Deinde facta simplici diuisione, si corpuscula utrinque sita gracilia ualde et macilentia uidebuntur, excidenda sunt. Functione manuum iam obita, spongia locus abstergendus est. Si exiguus est abscessus, et unica facta linea, simplici linamentorum iniectione utendum. Si amplius et multotiens ferrum expertus, lemniscum, hoc est linamentum aliquod in longitudinem implicitum, per foramen est traieciendum, simili modo plagae linamentis implendae sunt. Si sanguis eruptio comitetur, aqua frigida, uel posca utendum. Si ita non sistatur, scobs chalcitidis est insper-

Ff 2 genda

enda, quæ sæpe ob flaccidā putredinem admouetur. Splenia hyeme, & neruosis in partibus uino, cui oleū adiectum sit, ma defacta imponamus. Æstate & carnosus partibus aqua oleo admixto, uel etiam ipso quoq; uino cum oleo, sed frigido tincta deligabimus. Postero die iisdem his liquoribus irrigabimus. Tertio post die soluentes, & spongia detergentes, linamentis tetrabarmaco illitis utemur. Si inflammatio desit, eundem fo tum asperginemq; ramentorū custodiam superaccommodabi mus. Sin adsit inflammatio, aspersioibus congruis prius usi, cataplasma ad concoquendum idoneum, inijciemus. Finita ue rō inflammatione maturantibus, et carnem inducentibus præ fidijs medebimur. Sinus quoq; glutinantibus medicamentis, ue luti in quarto memoratum est libro, sanabimus.

De strumis. Cap. 35.

Strumæ sunt adenes indurati, quæ in collo axillis & ingui nibus præcipuè consistunt. Choerades Græcè appellati, mu tato à choeradibus scopulis nomine, uel à suis multiparis a nimalibus, uel quod eiusmodi collum choeri, hoc est porci ha beant. Generantur autem strumæ in anteriore ceruicis parte, uel in altera tantum, uel utrinque una, uel binæ, aut plures, inq; suis membranis singula perinde ac steatomata, atheroma ta, & melicerides complectuntur. Quæ dolore afficiunt, attre ctuq; manuum, & medicamentis efferuntur, ac deteriores fiunt. Maleficæ sunt, quas etiam carcinodas quidam dixerūt. Patetq; omnibus has neq; manu, neq; ferro cedere. Illis igitur tantum quæ attactu, & opportunis medicamentis morigeræ ac benignæ, hoc modo manus adhibendæ sunt. Superficiarias & in cute serpentes, simplici diuisione facta, ab incumbenti bus particulis absoluemus, orasq; hamis cute distenta membranis excoriamus, sicut in uasorum dissectione docuimus: ac paula tim euellemus. Maiores autem strumas hamo infixo suspende mus, & simili modo excoriatæ à coherentibus partibus undi quaq; liberabūtur: cura adhibita, ne soporaria arteria, quas caroti

carotidas dicunt, uel nervi recurrentes attingantur. Si uerò uena aliqua incisa cruore opus adumbret, laqueo adstringatur. uel nisi amplior fuerit plane etiam abscindatur. Atque quum ita strumæ radix in arctum uenerit, scitè admodum amputabitur. Demissoque indice diligenter perscrutabimur, nisi aliæ strumæ adiaceant, quæ similiter tollantur. Quod si, num in strumæ fundo uas aliquod ingens, uel plura etiam subsint dubitemus, ferro abstinere, laqueoque excipere conuenit, ut particula tum tutò sponte sua excidat. Tunc linamentis medicamento illitis, curatio tentabitur: nam si excendantur, ora committuntur. Incisiones autem rectis lineis sunt faciendæ: et si nihil superfluum habuerint, illico cõsuendæ. Si ex tumoris cute quid reddat, parte ea myrtacei folij instar exempta, suturis utemur, medicamentumque ad cruenta idoneum superaccommodemus.

De seuationibus, pultationibus, & mellifauis, quæ Græci steatomata, atheromata, & melicerides uocant. Cap. 36.

HAec quoque in abscessuum genere quum sint, eo tamè discrimine disident, quod qui propriè abscessus dicuntur, inflammationem experiuntur, & dolore afficiunt, acremque humorem et corrodentem continent, neque peculiari aliqua membrana seu tunica amiciuntur. Quin & hæc quoque inter se differunt. In adipinis enim nodis, steatomatisue contentus humor adipi sit, ut præ se fert appellatio similis: qui in pultaceis nodis seu atheromatis, atheræ, id est frumentacæ pulti: qui in mellis, siue meliceridibus humor, mellis specie refert. Discernes autem hoc modo: nodus adipinus seuatiõe durior est alijs, tactui renitens, basimque firmiter habens. Mellis uerò nodus, tangentibus quasi laxum quoddam corpus subsidet, & lentè quidem locum mutat, ceditque: celeriter autem succrescens, ad situm pristinum reuertitur. In manuum functione haud aliter ac strumæ curantur, incisione, excoriatio, suturis, & reliqua medendi ratione. Solum, ne membrana uioletur, cautio est, ne humor qui continebatur, effusus manuum actioni impedimento

F f 3 sit,

sit, et partem aliquam relinquat. Vnde occasio fit, ut plerumque circa brachialia, & malleolos, et articulamenta ad mouendum facta, denuo uitiū tale renascatur: sicuti et struma, si uel tota uel portio ipsius relicta. Si huiusmodi quid inciderit, præstat non suere, sed exedentibus medicamentis reliquias consumere.

De aneurysmate, id est dilatatione. Cap. 37.

Aneurysma tumor est mollis, digitisque cedens, cuius origo ex sanguine & spiritu est, de quo Galenus sic tradit: A per to arteriæ orificio, affectus aneurysma appellatur. Accidit interdum ex uulnere, quotiens cutis exterior ad cicatricem perducitur, permanente absque cicatrice arteria, nec coalescente, nec carne obstructa. Deprehenduntur his notis affectiones huiusmodi arteriarum pulsū: imò si manu comprimamus, tumor quodammodo euanesceat, recurrēte quæ ipsum efficiebat in arterias, substantia. hæc Galenus. Nos uerò ipsas inter se hunc in modum discernimus. quæ apertione uenarum obueniunt, proceriores sunt, & in alto consistunt, & ad compressuram digitorum sonitus quidam exauditur, quum nullū huiusmodi sonitum, quæ ex ruptura eueniunt, efficiant, & circulares magis sunt, et in summo subsident. His itaque quæ in axillis, inguinibus, & ceruice existunt, quaque alia loca infestant, & præ grandi magnitudine sunt aneurysmatis, propter uasorum amplitudinem manus adhibenda non est. Quæ extremis partibus, brachijs, cruribus, & capiti obueniunt, ferro aggredi hoc pacto conuenit: si per nerui arteriæ uel dilatationem tumor emergerit, cutem recta linea per longitudinem incidemus. Deinde arteriarum labia uncinis distracta, quemadmodum in uasorum dissectione comprehensum est, excoriantur, & instrumentis huic rei dicatis circumpurgata arteria denudabitur, traiectione acus duobus funiculis & lino utrinque facta deligatione utendum, secta arteriæ parte scalpello per medium, & cum ambiente membrana unita, quæ pus maturant, usque dum funiculi excidant, medicamenta sunt inducenda. Si rupturæ fertur.

fertur acceptum, aneurysmo totum id, quatenus fieri potest, unà cum cute digitis prehendendum est, postea acu duplex filum ducente inferius transmissa, et fili ansula forcipe præcisa, sic binis utrinque filis, ueluti de staphylomate diximus, tumor est deligandus. Si metus est ne fila hæc corrupta dilabantur, altera duplici similiter filo inserto trañcienda est acus per totum quæ priorem premat. atque pari modo ansula præsecta, quatuor filis tumor est uinciendus: uel tumore per medium ad aperto atque exinanitio, cutis circumcidenda est, ea quæ ligata est relicta. Splenioque ex ænclæo superaccommodato, linamentis medicamento imbutis medebimur.

De hernia gutturis, quæ bronchocelen appellant. Cap. 38.

Bronchocèle ingens et rotundus in ceruice tumor est, mutuo ab interioribus colli partibus nomine. cuius differentiæ sunt duæ. Siquidem aliæ adipationes, aliæ partium dilatationes præsentant. Quas ex iisdem quibus aneurysmata notis cognoscemus, & ceu uitium conclamatum deuitemus, quum omnia similiter aneurysmata, maximè quæ in collo oboriuntur, cum periculo propter arteriarum amplitudinem manuum operationem admittant. Seuationes autem referentes, perinde atque adipationes curentur, separatis, intactisque uasis: quemadmodum in scrofularum curatione explicuimus.

De ganglio. Cap. 39.

Ganglium est nerui in nodum coitio, ex ictu uel defatigatione magna quidem ex parte, in brachiali et malleolo, et locis quæ articulis mouentur, alijs uero corporis partibus, proueniens. Comitatur hoc malum tumor concolor, renitens et dolore uacans. Quem si uiolenter quis premat, torporis quendam sensum exhibet, non aliè, sed sub ipsa cute oriens, ad latera tantum nutans prorsum aut retrorsum, nequaquam etià si uiolenter adigatur. Ab his quæ crura, aut brachia, aut extimas partes occupant, scalpelli operam arcemus. periculum enim, ne si quid illic excidatur, membrum illud mutilum reddatur. Quæ in capite

Et fronte eueniunt, opere chirurgico ita curamus. Cutis scalpello diuiditur: Et siquidem parua sunt uulsella, comprehensa ex radice præciduntur. Si grãdia, uncinis transfixa excoriantur: atque auferuntur, futuris orae committuntur, medicamentumque cruentis uulneribus dicatum inicitur.

De uenarum sectione. Cap. 40.

Quamquam sanguinis detrahendi ratio per uenas neminem fugiat, tamen ut ea medicinae portio, quæ manus opera ad ministratur, numeris omnibus consummata sit, et ob artificiosas eius distinctiones, non erit etiam hic nobis silentio tanquam despicabilis prætereunda. Prima igitur incisionis uenarum intentio est, ut sanguinem superfluum euacuetur. Sanguinis uero redundatio duplex indicata est. una quidem ad uires, etiam si uenæ fartæ non uideantur: quo in statu homines illico imbecilles infirmi que redduntur, quum natura onus ueluti sarcinam quandam sustinere non queat. Altera uero ad ipsa, quæ sanguinem continent, receptacula, ipsa sanguinis transfusione speculata, etsi uirtus citra molestiam id perferat. Vnde ruptis interdum uenis, sputum cruentum, uel aliæ sanguinis fluxiones accidunt. Redundantiam ergo sanguinis, quæ ex uirtute spectatur, corporis grauatio arguit: uenarum copiam, distentio, et quod illæ fartæ inturgescent. Vtraque autem exinanitionem necessariam esse significat. Quocirca in primo ægritudinis die, si necessitas urgeat, sanguinem per uenas detrahas, sola prius ciborum in uentriculo concoctione, aut etiã iusta sanguinis in iocinore elaboratione cõsiderata. Quod si per initia alicuius ergo uenæ sectio prætermissa fuerit, ultra etiam septimum diem eam incidere haud erit absurdum, si id usus et necessitas exoptulet, et ægri uires non renuant. Oportet autem eum qui sanguinem detrahare uult, diligenter dispicere, num multa recrementorum in intestinis retentio sit, et deprehensam leni prius clystere euacuare, ne uenæ ab intestinis putridam aliquam retrimentorum essentiam attrahant. Atque ijs quidem.

qui

qui propter urgentem affectum sanguinis detractionem postulant, quouis tempore, accessionum duntaxat particularium febrium uigore euitato, uenam incidemus. Si continua fuerit febris, matutinum tempus omnino magis erit opportunum. Qui uerò nullo infestante morbo, sed tutelæ potius, aut præcautionis gratia sanguinis euacuationem exigunt, his uer competit. In ætatibus porrò cautio est, ne ad quartum & decimum usque annum: item post sexagesimum annum unquam sanguis per uenas detrahatur, nisi irrecusabilis aliqua necessitas huc nos compellat. Et in uniuersum, qui imbecillioribus uiribus præditi sunt, ab eiusmodi exinanitione arcendi sunt. Iam in membris recens inflammatione correptis, ex aduersa parte, in diuturnioribus ex propinqua facienda est euacuatio. Ex qualibet sanè corporis particula, sed plerumque ex interiori cubiti uena sanguis mittendus est. Vbi studiose animaduertendum, quod in teriore & alari adpellatæ uenæ, arteria, mediæ, neruus perpetud subiicitur. Superior, quæ et humeralis uocatur, omni periculo uacat: quam in capitis quidem affectibus secare nihil ambigimus. In his qui infra collum afficiunt, alarem, in utrisque mediam. Fascia igitur arcta partem brachij aliquam circa musculos deuincire conuenit: mox frictione manuum inter se mutua repletam uenam usui idoneam, transuersim per totam ipsius latitudinem tantum diuidere. Ampliores namque hac plaga, difficulter ad cicatricem perducuntur. Nimis angustæ, præterquam quòd crassioris succi transitum impediunt, etiam inflammationibus tentantur. In quibus autem secundo aut tertio, interim uerò etiam quarto die sanguinem adhuc detrahendum esse speramus, obliquiori linea uenam secare cõuenit, quo in manus inflexione debiscens, cicatricem non facile admittat. Ita quidem placuit Antillo. Quantum autem humoris euacuandum sit, ex uirium robore, et morbi magnitudine erit metiendum. Si ergo humoris, feruentisq; materiæ copia suberit, semel uel ad animi usque deliquium erit detrahendum, quum uis

delicet æger ualida adhuc uirtute, animo destituitur, nō ex humoris alicuius in uentriculū colluuiē, cuius ergō, multi per inopia statim ante iustam detractionem anima deficiunt, uerū ex inanitionis ratione illud animi deliquium usuueniat, opus est. Si enim multa euacuatio desideratur, & uires sunt eneruatæ, distribuenda erit uacuatio, ac primū parcius quā debeat, secundo rursum, & item tertio, si res postulat, detractio sanguine. Neque si humoribus tantum æquabiliter redundat corpus, uniuersum simul exinanire solemus, ut Galenus docuit. Verū propter affectus etiam alicuius uehementiam, & si totum corpus in humorum iusta commoderatione constitutum uideas: uerbi gratia, si ex naribus, uel alio ex loco sanguinis profluium concitatur, non abundantiore copia. Ex opposita etiam parte auertendæ materiæ gratia, uena incidenda est, imō etiā in his qui uehementē inflammationem experiuntur. Veluti in colicis, renibus calculosis, lippitudinibus, ac cæteris quæ tā acriter urgent. Dolor siquidē et partis inflammationis calor causam defluxioni præbent: & si totum corpus excrementis uacet, parcius id igitur tunc faciendum est, ea euacuatione adhibita, quæ maximè & ætati, & naturæ egrotantis conueniat. Considerato etiam anni tempore, regione, & laborantis consuetudine. Quibus uerō iuxta uenam quæ aperitur grandis inflammatio extiterit, ueluti in pleuriticis & hepaticis, commodissimum est expectare dum sanguinis tum color, tum essentia seu habitus conuertetur. Alius nanque in inflammatione sanguis, quā secundum naturam existit: quoniam supra modum incalescens, siquidem prius erat crudior, rubicundior et flauior euadit. Sin prius eiusmodi extiterit, in atrum ex adustione permutatur. Non perpetuò tamen hæc expectanda mutatio est, sed non rarò priusquam hæc fiat, desistere cōgruit, idq; duplici nomine, uel ob uiriū imbecillitatē, quæ ex pulsum attrectatione cognoscēs: nam tum uehementia & magnitudine inæquales sunt, uel etiam obscuri: quin & te

mor

por fluxionem frangens, exhaustas iam vires portendit: uel ob inflammationis malignitatem, quæ interim nihil remittit, sed uehementius impacta est. At si nihil horum obstiterit, laboransq; uigenti ætate sit, expectanda erit sanguinis mutatio, eoq; magis, si ambiens aer temperatus fuerit. Quod si sanguis ante conuenientem euacuationem sistetur, id quod uel propter timiditatem & animi deliquium, uel propter grumum, uel ob uiolentam constrictionem, aduersus singula certabimus. Animi defectum, odoratis naribus adhibitis, reficientes: constrictioni relaxato uinculo subuenientes: grumum sanguinis, uel olei infusione, uel digitorum fotu dissoluentes. Reliquus mittendi sanguinis apparatus nulli non cognitus est, sed ita incubiti uenis agitur. In fronte autem sanguinis detractio, ut in capitis doloribus, hoc modo fieri debet. Fronte prius ablutio ne fota, ceruicem habenula excipimus, inserto tamen iuxta guttur digito, ne afflictus præfocetur, turgentem iam in fronte uenam acie phlebotomi aut scalpelli diuidemus. Ad eundem quoq; modum iugulares uenas extantes, ob inueteratam lippitudinem acuto specilli capitulo secamus, sanguinis eruptionem promouentes. Venas insuper linguæ subditas, in anginarum affectu, uitata constrictione, linea transversa incidimus. Quidam eas quæ in magnis birquis conspiciuntur uenas, in capitis uel oculorum diutinis afflictionibus pari modo feriunt. In quibus etiam internas narium uenas uel mucronato specilli nucleo contundunt, uel asperatis quibusdam instrumentis irritantes disrumpunt. In capitis itidem morbis post aures sitas diuidunt. Sicuti quæ poplites perreptant, in renum cruciatibus. At quæ in extremis corporis partibus propagantur, superiacentibus membris uinculo exceptis, et manuum frictione et pedum incessu plenitate sanguinis turgescerent aperient. In liene laborantibus læua manu, eā potissimum uenam quæ minimum digitum & proximū intercurrit. Si iecur male habet, in dextra. Extremarum namq; partium inanitio, quo

ex

ex longinquiore loco fit, eo efficaciorē auersionem efficit. Sed in pede, sicuti in coxendici & locellorum affectionibus, ea quæ supra interiorem malleolum extat, aperienda est.

De cucurbitularum impositu. Cap. 41.

Cucurbitula neq; inter morborum initia, neq; corpori plethorico sunt applicandæ, sed toto prius exinanito corpore, cumq; nihil amplius particula influit, & mouere quippiã, agitare item & ad exteriora trahere opus est. Leuis igitur cucurbitula inflationes dissipat, stomachi fluxiones cohibet, sanguinem attrahit, & profluentem compescit aduersæ parti adglutinata, & ex alto in summa traducit: uno uerbo, humorum traductionem, spirituum extraductionem molitur. Sed quæ cum scarificatione adhibetur, efficaciorē causis difflationē præbet, ita ut sensibilibus ex alto noxias materies euocet: neque enim sanguinem solum, sed alios quoq; humores elicit, præcipuè cum flamma maiore accommodata. At si à corpulentioribus particulis, multaq; carne præditis, sanguinem detrahendum molimur, concisa prius scalpello cuticula, cucurbitulam defigimus. Sin à gracilioribus & excarnibus magis, leuem prius cucurbitulam adglutinabimus. Vbi uerò intumuerit eadem in parte membrum, cute scalpello exasperata, ipsam denudè applicabimus. Et si paululum detrahendum statuimus, unica: si amplius, pluribus incisionibus utemur: si sanguis qui continetur, tenuior appareat, summa leuiter: si crassior, scalpello altius adactò, ima scarificabimus, & quum ex ictu in grumum coactus sanguis erit euacuandus. Terminum autem moderatæ incisionum altitudinis, sola cutis crassitudo præscribet. Quidam ut uno ictu tres plagas inijcerent, instrumentum in hoc excogitarunt, tribus scalpellis æqualibus simul iunctis. hoc nos inuile existimantes, simplici scalpello utimur. Alij uitreis cucurbitulis usi sunt, ut per eas sanguinis, qui exinanitur, mensura in extraductione perlucesceret: sed in attrahendo æneæ cum maiorem sustineant flammam, longè efficaciores sunt uitreis, quæ

quæ facile franguntur. Quin etiam qui cornibus corpori adallicatis, ore sugentes trahunt, inaniunt quidem minus, sed nihil exiccant: sicuti quæ cum flamma, quum res exigit, adhiæntur. Applicaturi autem cucurbitulam, particulam prius ream constituamus, dehinc ei ex latere hanc imponamus. Nam iacentibus ipsis desuper ardens linamentum ex lucerna inuacamus, miserè adurit, nullo id usu exigente. Cucurbitulæ mplitudo nonnunquã particulæ subiectæ accommodabitur. Quæ de causa complures sunt cucurbitulauum in paruitate et mplitudine differentia. Quemadmodum etiam proceriore collo, & inferiore spacio seu uentre latiore, ad extrahendum fficaciores formamus. Cauendum uerò est, ne mamillis cucurbitulæ adglutinentur. in ipsas enim cum inciderint, & in imium tumorem excreuerint mammae, non facile auelli possunt: quod si acciderit, spongij aqua calente imbutis, cucurbitulas circumfoueto. ita enim remittuntur. Sin ne sic quidem successerit, cucurbitulas perforabis.

De adustione axillæ. Cap. 42.

Vxato in humeri membratura articulo, in quibusdam brachij caput subinde & frequenter excidit, uel propter humilitatem immodicè superantem, uel quod continuò prolapsu locus luxationi obnoxius euaserit, quo in casu ad uisionem deueniendum est. Oportet igitur ægro uel supino, uel in sanumatus inclinato, interiorè alæ cutē quā potissimū articulus excidit, duobus leuæ manus digitis, uel uncinis eleuatā, tenuibus et oblongis ferramentis cādentibus adurere, quoad cauteriū contraflexum, duas una impressione crustas excitauerit: etsi magnum inter has fuerit interuallū, mucrone specilli per utraque foramina traiedo, aliam in medio crustam faciemus, tanisper dum ferramentum specillo inciderit, adurentes. Et Hippocrates, binas alias inuisiones faciendas censet, iuxta utriusque præfatæ mediam, æquali illis spacio distantes, quadratæ figuræ instar. Alius tamen cute non aduremus, quoniam uer

ui, glandulae, & alia subiecta sunt: quae inflammationem creare possunt, & difficultatem officiorum adferre possunt. Curantur autem iuxta autem porri cum sale trito impositione, et alijs crustis in adducendis opibus. post haec manus cautè exerceatur.

De adnatis digitis & sedigitis. Cap. 43.

Gnascuntur digiti in manu, modò quidem ad pollicem, modo ad uerò ad minimum digitum, iuxta autem alium quemquam rariò uisum est. Horum itaque agnatorum alij sola carne constant, alij ossa etiam & ungues quandoque in se continent. Ossa habentium, alij ab articulo communi cum altero digito commissura innixi, alij ab internodio & digitorum fissura procedunt. Atque ij qui inde exoriuntur, perpetuò sunt immutabiles, reliqui interdum motu agitantur. Carneorum uerò digitorum expedita est praecisio. Nam totum quod superuacaneum est, semel scalpello tollitur. Qui uerò ab articulo emergunt, hoc curare difficilior est tractatio. Ab internodiis exorsi ita curantur. primo caro undique usque ad os exciditur, deinde os ipsum uel scalpro, uel ferra comminuitur. Reliquam uerò curationem radendo, & cicatricem inducendo, sicuti in ossium uulneribus comprehensum est, absoluiamus.

De suppuratorum adustione facienda. Cap. 44.

Vulsionem suppuratis efficacissimas ferre suppetias cõperitum est. Oportet igitur radice longae aristolochiae oleo imbuta, ipsis imposita, candenti ferro crustas excitare. Vnam inter iugulorum compagem cute sursum reducta, duas non altas iuxta mentum seorsim ab arterijs soporarijs, quas carotides uocant. Sub mammillis item, inter tertiam quartamque costam, duas altiores grandioresque. Binas alias inter quintam et quartam, paululum uersus dorsum spectantes: aliam in medio pectoris, rursus aliam supra uentriculi os. à tergo uerò tres, per medium dorsum unam, utroque spinæ latere geminos, quae in dorso factae crustae excedant altius impressas. Alij uerò, quemadmodum etiam Leonides asserit, ferro nuclei oliuae simili candenti inter costas

ostas, ea in parte quā abscessus est, usq; ad pus adurunt. Quis-
lam scalpellum quoq; confidenter adhibent inter quintam et
extam costam transuersa incisione, paululum tamen infra cu-
im incidunt. Deinde acuminato scalpello membrana quæ co-
tas succingit perforata, pus excernunt. Verum isti quoque,
t qui ferramento ad imum usq; adustionem moliuntur, uel il-
ico mortem inferunt, unā cum pure, uitali etiam spiritu con-
ertim ex inanito, uel fistulas irremediabiles efficiunt.

De cancro. Cap. 45.

Cancer tumor est inæqualis, crepidinosus, deformis, subli-
uidus, et molestus, modò citra hunc, quē latentē appella-
it Hippocrates. is admota manuū opera, magis irritatur, mo-
dò cū hunc proueniens: ex atra enim bile originē trahens,
it plurimū eroditur ac serpit. Plurimas quidem corporis par-
es, præcipuè uerò mulierum locellos ac mammas occupat,
abetq; uenas undiquaq; intentas atque turgidas, haud aliter
itq; animal cancer pedes: unde ei nomen est inditum. Curatio
gitur, quæ per medicamenta adhibetur, in quarto: et eius qui
circa locellos exoritur, in tertio uolumine satis disputata est.
Quandoquidē partes putrefactæ, uel quæ ex toto præter na-
uram sunt, amputationem sui desiderant: uteri cancris ma-
nus et scalpelli opera non potest, neque utile est admo-
uere. Forū qui foris et circa mammas potissimum eueniunt, admini-
strationē curationis in præsentia tractabimus. Sunt qui totam
partem uitiatam cauterijs absumunt, alij totam mammas
excisam adurunt. Galenus autem sectionis tantum chirurgi-
am admittens, in hunc modum tradit. Si quando cancrum ma-
nuum et scalpelli opera curare ausus fueris, uacuationem ab-
atræ bilis purgatiōe auspiceris. Dein uniuersa penitus affecta
parte, sic ut nulla radix supersit, exactè præcisa sanguinē ef-
fluere permittas: nec prius cohibebis, quā uenas quæ circū
sunt cōprimendo, crassiorē ex ipsis sanguinē expresseris. Tum
nō absimili aliorū hūlcernū ratione curationē obibis, hæc qui-
dena

dem Galenus. Cætera autem maligna & putrescentia huiusmodi, uerbi gratia, phagedenæ, gangrenæ, et consimilia, parimodo curanda sunt.

De maribus, quibus perinde ac foeminis mammae turgescunt. Cap. 46.

Quemadmodum mulierculis, ita & masculis etiam sub puerbertatis tempus mammae aliquatenus turgescunt, sed plerisque rursum subsidunt, nonnullis uero ut semel orsa sunt, pinguedine subalescente crescere pergunt. Quæ res quum indecora corporis figura effoeminatae naturæ probrium adferat, digna est cui scalpelli curatio admoueat. Lunata igitur per imam mammillæ partem incisione facta, cuteq; excoriata, ad partemq; è medio sublata, ora futuris committitur. Si fortè ob magnitudinem, partibus suis sicut in foeminis ad ima inclinauerit mammilla, duabus lunari figura plagis in extremis inuicem coeuntibus, sic ut minor à maiore comprehendatur, secandum est. Cuteq; quæ inter duas lineas existit, à carne diducta, exemptaq; pinguedine, simili modo fibulis est utendum. Quod si aberrantes minus quàm conueniat exciderimus, tunc habenula quæ superest rursum adempta, suemus, medicamentumq; cruentis uulneribus dicatum inducemus.

De iecoris adustione. Cap. 47.

In quibus in iocinore abscessus est, cruciatus cum grauitate sobuenit, carnositas ipsius uisceris substantia afflicta portenditur. Si acutior dolor magis infestarit, pus in tunica potius collectum indicatur, adustioq; in hunc modum est facienda. Feramentum candens oliuari figura mucronatum, paulo supra inguen ad terminum iocinoris adurendo inijcimus, quò crusta excitet: uniuersaq; cute exusta, & ad tunicam usque adustione adacta, pus excernetur. Post euacuationem phacomelite, & his quæ aqua mulsa constituuntur, & speciebus carne replentibus, postea uero cicatricem inducentibus utemur.

De lienis adustione. Cap. 48.

Utem lien circumfusam, hamulis subleuamus, lōgoq; fer-
ramento candenti penitus adustionem traicimus, ut unico
adactu geminae crustae inducantur. Hoc ter facimus, quo om-
nes numero sex crustae confiant. Marcellus tamen tridente fus-
scinula, uel tridenti simili ferramento usus, treis unica impres-
sione crustas excitauit.

De stomachi adustione. Cap. 49.

N diutinis stomachi fluxionibus recentiores adustione adbi-
buerunt. Alij cauterijs mucronatis treis crustas excitauerunt,
unā iuxta gladiālē cartilaginē, alias duas inferius triāgulārē
figura totius cutis altitudine. Alij solam unam ad uentriculi
orificium, sed ampliorem moliuntur crustam. Non desunt qui
ne ferro quidem, sed ijs quae iscae adpellantur, adurunt. Sunt
autem iscae spongiosa quaedam corpuscula, quae in quercubus
ac nucibus proueniunt, barbaris frequentiore in usu. Sinunt
autem hucera aliquandiu absq; cicatrice aperta manere; quin
etiam prius lacerant, quo plurima per ipsa euaporatione ho-
stium uentriculi ab influxionibus illasum permaneat.

Aqua inter cutem qua ratione educatur. Cap. 59.

Quae intercutis constitutionē, quotq; eius differentiae, quae
causae, quibus notis deprehendi, quibusq; medicamentis cu-
rari possit, tertio uolumine tradidimus: ibi demq; demonstraui-
mus, solum Asciten manuum & scalpelli operam postulare,
quam in praesentiarum explicabimus. Rectum igitur hominē
constituamus: sin minus, in sedili collocabimus. Si ne hoc qui-
dem ob imbecillitatem tolerare potest, huic curationi minimē
idoneus est. Recto itaq; homine constituto, famulis à tergo stā-
tibus mandabimus, uētremanibus comprimere, tum oremq;
deorsum ad pubem usq; depellere. Nos scalpello sumpto acu-
leato, seu quo uena secatur pblebotomo adpellato, si intercus
ex partibus iuxta intestina originem habuerit, sub umbilico
ad perpendiculum tribus digitis interpositis abdomen usq; ad
peritonaeum membranam incidemus. Si à primario iocineris
Gg affectus

affedu uitium hoc ortum contraxerit, à læua umbilici parter
 si à liene cœperit, à latere dextro sectionem moliemur. Nec e-
 nim ea in parte cui incumbent incidamus, cautio est. Cuteq; su-
 periacente instrumenti acie excoriata, paulo superius quàm
 prima linea incisa sit, membranam peritonæum uocatâ, quo-
 ad inani loco scalpellus excipiat, perforabimus. Mox æ-
 neam fistulam ad scriptorij calami instar iēperatam, per peri-
 tonæi foramen conijciemus, per quam humor pro cuiusq; uiri-
 um ratione effundendus est, quas ex obseruatione pulsus de-
 prehendemus. Quare peracta, recipienda fistula est, & humo-
 ris sistenda effusio, linea quippe hoc alternata continuò siste-
 tur fluxio. Nos tamen securitatis gratia linamentū intortum
 in solam abdominis plagam conijcimus, afflictoq; lecto recum-
 bente, & refocilla, sequenti die rursus humoris momentum
 pro uirium ratione per fistulam euacuabimus. atq; ita postea
 prioribus etiam diebus faciundum est, donec quamminimū hu-
 moris relinquatur: summa ubiq; cura habita, ne uniuersim eu-
 cuemus. Complures etenim imperitè admodū manum admo-
 ti, unâ cum humore uniuerso, uitali etiâ spiritu euacuato, homi-
 nem subindè interfecerūt. Qui uerò securitati magis cōsulant,
 tantum humoris per hanc chirurgiam educunt, quantum labo-
 rantis uirtutem ingenti pondere subleuare posse uideatur.
 Reliquū medicamētis aqua grys, sabulo, sole, siti, exiccātibus
 cibarijs consumunt. Vtione uerò utuntur in stomacho, iocin-
 dre, liene, abdomine, umbilico, quinq; crustas adhibentes. Alii
 ferramentis tenuibus et candentibus, alijs iscis adpellatis, uel a-
 lia id genus materia inducentes. Maximaq; pars hac potius
 methodo nullam prorsus perforationem (quam paracentesis
 nuncupant) experta, sanitati restituta est.

De iis quibus prominet umbilicus. Cap. 51.

Vmbilici prominentis uitium nunc abdominis membranarum
 ea in parte rupta, uel omento, uel intestino prolapsa pro-
 uenit: nunc segni humore sub umbilico collecto, carne interdum
 succrescente

succrescente. Interim sanguine ex uena & arteria ruptura
 profuso, ceu in delatationibus (quæ Græci aneurysmata di-
 cunt) quandoque non sanguine, sed spiritu solum irrumpente.
 Si omentum prolapsum fuerit, circa umbilicum concolor tu-
 mor, mollis, dolore uacans, & inæqualis conspicitur. Si in-
 testinum, præter enumerata tumor in æqualior est, & digitis
 impressis aboletur, crepitans aliquando, balneis & distentio-
 nibus magis augmentatur. Si humoris colluies subest, mollis
 imiliter attactu apparet tumor, ad digitorum uerò compres-
 sionem non cedit, neq; minuitur, neq; increscit. Si præter reli-
 qua indicia tumor liuidior sit, carnisq; subcrescientia durior,
 etiam tactui resistit, semperq; in eadem amplitudine manet. Si
 ex flatu prominet umbilicus, tumor tangentibus mollis comi-
 atur, qui impulsus quendam sonitum edit, & digitorum com-
 pressu euanesceat. Manus itaq; opella hunc in modum adhiben-
 da est: erecto homini locato, spiritum continere ut uenter disten-
 datur præcipimus. Deinde tota umbilici excrecentia atramē-
 to scriptorio circulatim notata, resupinatoq; homine, scalpel-
 lo tumorem quæ nota atramenti fuerit, undiquaq; scarificabi-
 mus. Post hæc media parte hamulo eleuata, lino uel neruo
 quæ scarificatio est uinciemus (sic enim fortius, ne delabi pos-
 sit, continebitur) ansulâ nexui superaccommodantes, mox tu-
 more qui constrictus est in uertice inciso indicem demitemus,
 scrutabimurq; adamsim nūquid intestini aliquod inuolucrū,
 et omēti particula simul uincta sit. Si intestinū fuerit reliquū,
 exato funiculi sinu, ansula ue introrsum depellemus. Sin o-
 mentum, eo retracto, superuacaneam eius partem, deligato
 rursus quodcunque, ut solet, occurrit conceptaculo, amputabi-
 mus: duplicem inde acum simplex filum trahentē per scarifica-
 tionē factā trañciemus, linorūq; ansulis præcisis, ueluti in a-
 neurysmate cōprehēsum est, quatuor capitibus cōstringemus,
 itaq; ubi corpora supra uincula cōputruerint, exciderintq; li-
 amētis curationē reliquā consumabimus, operam dantes, ut
 cicatrix

cicatrix caua magis subinde reddatur. Hæc quippe, si uel omento, uel intestino malum fertur acceptum, moliemur. Si uero caro, aut humor, aut sanguis uitium causarit, media tumoris parte orbiculatim præcisa, quicquid extra ab dominis membranam peritonæum nuncupatum incidit, detrahemus, iuxtaque umbilicum medelam carni creandæ factam adhibebimus. Si uero ex uasis dilatatione, aut spiritus euaporatu umbilicus emineat, his curationem omnino perinde atque aneurysmatis renuere expedit.

De abdominis membranz uulneribus, deque intestini, uel omenti prolapsu, inibi que uentris refarciendi ratio ex Galeni commentariis traditur. Cap. 52.

Quo nam pacto uulnerata abdominis membrana appositæ queat manu curari, deinceps considerandum est. Si uulnus adeo exiguum sit, ut quod inflatum est, prolapsum intestinum nullo latenus reprimi liceat, aut flatum exinanire, aut uulnus ampliare necessum est. Præstat mea quidem sententia primū, si modo id assequi concedatur: cæterū qua potius ratione assequi datur, quam si causa, qua inflatur intestinum, tollatur e medio. Quæ igitur hæc est? ambientis nos aeris frigus, unde ex calore re petendum est præsidium. Molli itaque spongia aqua calente imbuta, recens expressa fouendum erit intestinum. Præparetur autem interim ad hoc uinum austerum calidum, quod sanum magis quam aqua excalfacit, uiresque intestinis adijcit. Si uero in his adeo nihil est auxilij, ut nihilominus intestini perseuerent inflatio, abdominis membrana in tantum incidenda est, quantum ad prolapsum intestinum sufficit. Cui incisioni moliendæ, resectæ fistulamina, syringotomata appellata, sunt apposita. Situ ægrotanti idoneus fuerit, si inferioribus in partibus uulnus sit, ut ex aduerso sursum uergat: et si plaga in dextra fuerit, in laeuam partem corpus propendeat. Si in laeuam, in dextram inclinet. Hoc quippe tam amplis quam exiguis uulneribus commune est. Restitutio repositioque intestinorum in sedem propriam in amplis uulneribus prudentem, idoneumque desiderat. Debet enim

enim

enim is, ubi manibus suis uulneris oras foris apprehenderit, in
tro conuertere & astringere, suentiq; ipsas paululum denuda
re, quodq; consutum est deprimere, quoad totum sutura fuerit
coniunctum. Iam uero quis abdominis consuendi modus dexter
& commodus sit, memorabimus. Quandoquidem abdomen in
teriori membranae adglutinare conuenit, ordiendum quidem
a cute est, acusque ab exteriori parte introrsus demittenda
est: quae ubi cutem rectum musculum totum traiecerit, praeter
ea quae ei subiacet membrana, nempe peritonæo, altera par
te ab interno extrorsum perforanda est. deinde abdominis mē
brana similiter traiecta, eademq; rursus ab exteriori parte ad
interiorem perforata, praeteritoq; simili modo subiacente pe
ritonæo, ad contrarium ueniendum est: id quoque ab interno
extrorsum una cum cohaerente toto abdomine transuendum
est: atq; ita quidem iterum atq; iterum, quoad uniuersum uul
nus pari modo consutum fuerit, faciundum. Interuallum uero
sutarum, quo plaga quae subest constringenda est, breuissi
mum esse debet: quo uero cutis integra, firmaq; permaneat,
non admodum breue inter suturas cutis, ne alibi rumpatur, u
tile est. proinde euitatis utrisque extremis, mediocritas prae
ferenda est. Eadem sanè & in sutura habenda est fili ratio. Duo
rius nanque cutem abrumpit, mollius breui rumpitur. Vlu
ti etiam si summis orarum finibus acus inicitur, reliquum cu
tis, quoniam tenuissimum est, si uim patitur, rumpi cogitur.
Sin plurimum a sutura comprehenditur, inconglutinatam re
linquetur. Haec quidem omnibus hulceribus quodammodo
communia sunt, maximè tamen in consucendo uentre seruanda.
Vel igitur, quemadmodum demonstratum est superius, no
bis agendum, hac diligentia adhibita, ut membrana, quae peri
tonæum dicitur, cum abdomine coalescat: id quod quia neruo
sa est, uix sperare audeas. uel ut alij faciliant, ea quae natura co
gnata sunt, peritonæū peritonæo, abdomē abdomini inuicem
committemus. Fiet autem hoc modo, abdomen solum ab exte
riore

riore parte introrsum acu est traiciendū, mox utrisq; peritonaei labris transmissis, rursus acu per utraque haec labra foris introrsum coniicienda, deinde ab interiore parte foras per alteram abdominis oram reducenda. Haec ratio à communi illa & expedita, qua uno adactu per quatuor oras simul acu traicitur, in eo differt, quod membranam abdominis totum intra abdomen occultat. Medicamenta ad haec eiusdem materiae, cum ijs quae cruentis injiciuntur, accommodata sunt. Ne autem aliqua principalior particula per consensum afficiatur, totum quod inter inguina & alas existit, lana molli oleo moderatè calido imbuta, fovere ac circumdare expedit. Satiusque fuerit, si idem per clysterem intestinis infundatur. Nam si quid in intestinis conuulneratum sit, uinum nigrum austerum & tepens injiciendum est, eoq; magis, si totum intestinum uulneratum sit. Crassa quippe intestina curationem promptius recipiunt, tenuia uero difficilius. Ieiunium uero, quod per uiam uasorum multitudinem, amplitudinemq; tenuem ac nequam uosam tunicam continet, & quod bilem meracam totam recipiat, & quod ex omnibus iocinori proximum existat, irremediabile est. Ulcera quae inferiores & carnosiores uentris partes infestant, curari sustinebimus. interdum enim bene succedit, non solum quod illae crassiores sunt, uerum quod aptus est per sedem injiciendis medicamentis hic locus. Quae uero in ore ipsius & stomachi sunt, solo transitu medicamentorum attingunt: quae autem hostium ipsius infestant, his acutus etiam sensus aduersatur. Cum autem membrana peritonaeum appellata rupta, omentum prolapsum est, liuidumque aut nigrum sit, laqueo priusquam nigrescat exceptum, ne sanguinis eruptione periclitetur, infra uinculum amputandum est, atque in imo consutionis fine uinculi capita depedant, quo facilius, cum ex uulnere suppurante eruantur, eximi possint.

De D

IN recutitis, hoc est ijs quibus glans penis præputij penuria non contegitur, quidam decoris gratia duplicem curationi modum excogitarunt. Interim quidem in superiore parte iuxta pubem colis tergis orbiculatim incidentes, ut facto diuortio continui deorsum trabatur, quoad glandem ipsa operiat. Interim uerò subtus glandis radice cutem scalpello ab interiore cole excoriantes, deinde inferius trahentes, mox linteolo quodam molli præputium undiquaq; deligantes sic utiq; ut linteolum aliquod inter cutem & colem, qua excoriata est, interponatur, ne glandi agglutinetur. Hic modus Antyllo magis arridet, fusius ipsum explicanti. Nobis summatim ea tantummodo recensere idcirco placuit, quoniam rarenter huiusmodi curationis opera exigitur, eo quod nullâ functionibus ob eundis difficultatem pariat hoc uitium: neq; aded indecorum est, ut eo magis glandem, cruciatu qui manuum administratio ne conciliatur, deligere malis.

Plerisque à natali die glans minimè perforata est, sed sub cane nuncupato, quâ glans suspensa est, foramen habent: unde neq; meiere antè, nisi membrum abdomen uersus admodum reflexerint, neq; liberos procreare possunt, quum semen ipsorum in uuluum rectè eiaculari nequeat. Accedit his, quod indecorum admodum hoc uitium existit. Omnium igitur ut simplicissimus, ita & tutissimus medendi his modus est, qui fit per amputationem. Resupinato itaq; homine, glans sinistrae manus digitis ualidè attollenda est, deinde scalpelli acie iuxta coronam amputanda, plaga non obliqua, sed concaua & rotunda instar sculpturæ, ut in medio quædam glandem representans eminentia relinquatur. Quoniam autè sanguinis profusio sæpius comitatur, sanguinem sistentibus medicamentis utendum: sin minus, tenuibus, ferramentis candentibus adurendum.

De phimo, hoc est glande præputio præclusa. Cap. 53.

Phimosis causa duplex est. interdum enim præputium glandem operiens retrahi rursus non potest. Interdum retractum reduci nequit, quæ species propriè periphimosis nuncupatur. Prior differentia uel ex cicatrice in præputio concreatâ, uel ex carnis incremento: secunda ex colis inflammatione prouenit, quum retracto præputio glans ita intumescit, ut id amplius non admittat. Si igitur prima species phimosis causa fuerit, curationem hunc in modum moliri expedit. Aegro accommodatè collocato, præputium anterius tractum, inieciis in summitatem ipsius tribus aut quatuor hamulis, ministris quantum fieri potest, distendendum atq; aperiendū exhibemus: post hæc si ex cicatrice foris contractio nata fuerit, ab interiore parte tribus quatuor uel locis scalpello seu aculeato cutello præputium lineis directis, æquali inter se spacio distantibus, incidimus. Est autem duplex circa glandem præputium. os itaque eius à parte interiore diuidendum est. dissoluta enim hoc pacto contractione, quæ ex cicatrice concreuerat, præputium facillè inducimus. Si uerò carnis eminentia ab interiore parte adnata phimosim creauerit, carnem omnē, præputio retracto, scarificabimus: carnis deinde excrescētias, quæ inter incisiones extāt, derademus: postea tabulum plumbeum papyro sicca inuolutum, glandi uniuersæ circumdabimus. Sit autem tabulum binis foraminibus, undiq; æqualibus præditū: sic enim huius circumpositu inducto præputio, rursus coalescere prohibebitur, distenta tū à plumbo, tū ab inuoluta papyro, quæ ex amento turgescēs, magis adhuc cutē à cole diducet. Ad hunc igitur modū, siue ex cicatrice, siue carnis eminentia phimus extiterit, faciundum est. Si autem periphimosis nuncupata infestauerit, siquidem in uetustatē inciderit, coalescit, & nullo remedio eliditur, nisi quis perinde ac recutitus tractari uoluerit. Sin autem nondum coaluerit, lacerationibus, bulcusculisq; in longitudinē ternis aut quaternis, aut pluribus orbiculatim

biculatim excitatis, oleo copiosiore tepido fouentes, ulterius protrahemus.

De præputio glandi adhærescente. Cap. 56.

GLANS & præputium inuicem cohærescunt exulceratione præcedente. Oportet itaque aduersa scalpelli acie, uel ferramento polypo accommodato spatulam retrahere quantum licet, ea quæ resistunt subsecare, summa adhibita cura, ut glâs ab adglutinato præputio purè separetur. Si uerò id difficile sit, glandis potius aliquid ad præputium, quàm econtra rio sumendum est. quum enim præputium tenue sit, facile perforatur. A dissolutione uerò cõmissuræ, linteolum tenue aqua gelida imbutum, inter glandem & præputium, ne rursus coalescant, inferendum est, uino adstringente cicatricem inducendo.

De circumcidendis. Cap. 57.

NON de his qui gentili quadam religione circumciduntur, sermo nobis impræsentiarum est, sed de ijs quibus affectu inuerendis creato præputium nigrescit. His sanè totum quod nigruerit, circulatim excidendum est: deinde squama cum melle, uel etiam malicorio & eruo instar linamenti, utendum. Si uerò sanguen interdum promanauerit, lunatis candentibus ferramentis utendum, quæ utrisque simul accommodentur, sanguinis inquam profluvio, & bulceri depascendo serpenti. Et si tota glâs fortè absumpta fuerit, solenulam plumbeam in meacum urinariū inferentes, per eam lotiū proycere mandabimus.

De thymis naturalium. Cap. 58.

THymi carnosæ quædam uerruculæ sunt, quæ modò in glande, modò in præputio obueniunt. Ex his aliqui maligni quidem, aliqui uerò benigni sunt. Benigni scalpelli acie deradentur, & chalcitide inspergantur. In malignis post excisionem, adustione utendū est: quod si oppositi in præputio thymi concreuerint, alij in interiore parte, alij in exteriori, non debemus simul omnibus manum admoliri, ne fortè præputium structura tenui, imprudenter à nobis pertundatur. Sed prius

Gg 5 interiores

interiores auferre, & ad cicatricē perducere, deinde exteriores aggredi. Sunt uerò ex recentioribus aliqui, qui forcice ipsos auellentes, seta equina deligatos curant, quemadmodum alij frigido cauterio eosdem adurunt.

De siphone & clystere uesticæ immittendis. Cap. 59.

Lotio in uestica suppressa, propter meatum grumo sanguinis aliquo, uel calculo, uel alia quadam occasione obstructum, recti siphonis demissione (quem modum catheterismum Græci nominant) excrementum eximemus: sumpto eiusmodi siphone, ætati atque sexui accommodato, quem ad hoc adaptamus. Fiet autem adaptatio in hunc modum: lanæ momentum lino in medio deligatum, filoq; ex acuto iunco per recti siphonis fistulam traiecto, lanam extremo siphonis mucroni inferimus, sic, ut si quid lanæ emineat, forcipe præcidatur, siphonemq; in oleum conijcimus. Post hæc laborante in subscloium aptè figurato, fotuq; prius nisi quid prohibeat asperso, siphonem in rectum usque ad colis finem demittimus, penè ad umbilicum reflexo. Nam ab hac parte obliquus uesticæ meatus est. mox siphonem ulterius adigemus, atque ubi ad taenurum iuxta sedem deuenit, reflexo iterum in naturalem figuram genitali membro cum imposito instrumento (quia à peritonæo uesticæ meatus sursum uergit) siphonem quoad uesticæ sinum penetrauerit, propellimus. Deinde filum siphoni iniectionē adducimus, quo unā cū lana urina etiā attracta subsequatur. quēadmodū in siphonibus euenire assolet. Eiusmodi quidē recti siphonis demittendi ratio est. Cæterū quoniā identidē incidit, ut exulcerata uestica collutionē necessariò postulet, ad hoc auricularibus clysteribus in præfatum modū inditis utemur, si modò illis in uesticam enema infundi poterit: sin minus, aluta uesticæ bubula siphoni adaptata, infusione colluemus.

De calculo. Cap. 60.

Quandoquidem aliàs de calculorū parente atq; rudimentis explicatum est, eosq; pueris in urinæ conceptaculo ma-

gis, prouectioribus in renibus creari, locus modum, quo excin-
di commodè possint, expetit: quem præscribemus, ubi notas
prius, quibus calculus in uesica deprehendi potest, exposueri-
mus. Lotium itaque quod emingunt, aqueum est, sabulosum
quod in eo subsidet, tentigine penis continenter pruriunt. Pro-
inde illis absque ratione, modò relaxatur, modò arrigitur:
quoniam irritati, præsertim pueri, frequenter illum demula-
cent & contrectant. Quum calculus in ceruicem uesicæ ina-
cidit, extemplò urinæ suppressio fit. Ex ijs porrò quibus cala-
culus exciditur, pueri quidem usque ad quatuordecim annos
propter corporis mollitudinem nullo negotio curantur. Se-
nes contrà, quoniam corpus ipforum rebelle, curationem nun-
quam fermè recipiunt. Mediæ horum ætates, etiam in hoc me-
dio quodam inter hæc modo se habent. Rursum qui grandiori-
bus calculis laborant, quia inflammationibus sustinendis assue-
ti sunt, facilius malo subtrahuntur. Qui exilioribus, difficilius
ad sanitatem perducuntur, contrarias ob causas. quum hæc i-
ta se habeant, ad scalpelli operam profecti, concussione prius
utemur, modò quidem per ministrum, modò ab ipso laboran-
te ex alto aliquo loco desiliente, quo calculus ad ceruicem ue-
sicæ decutiat: mox ægrotante, ceu recubito in sedili figurato,
manibusq; suis sub femora porrectis, ut in angustum uesica
compellatur. Si igitur attrectantibus nobis calculus in taurum
procidat, quassatu illuc deiectus, ad scalpelli operam accinge-
mur. Si non sublabatur, laeue manus digitum, si puer est la-
borans, indicem: si prouectioris ætatis, medium, oleo prius ile-
litum, in anum demittemus, resupinisq; digitis ipsum perquisi-
rentes, repertum paulatim traduentes ad ceruicem uesicæ
deducemus, digitoq; uno aut pluribus inibi constrictum, in ex-
teriora propellemus. Deinde alteri famulo, ut manibus uesti-
cam comprimat iubebimus: alteri, ut dextera manu testicu-
los sursum trahat, sinistra taurum extendat in alteram par-
tem, qua sectionem tentabimus. Nos sumpto ferramento quod
litho-

lithotomum appellant inter anum & testiculos, non tamen in
 tauri medio, sed uersus sinistriorem clunem obliqua linea su-
 per lapidem parti secandæ subiectum incisionē molimur, sic
 ut plaga foris latior sit: intus non amplius pateat, quā ut la-
 pillus per eam queat eijci. Interdum enim digitorū uel digiti
 in ano innixu, unā cum incisione citra euulsionē calculus com-
 modissimē exilit. Si non exilierit, unco huic functioni dicato (li-
 thuncum nuncupant) iniecto eximendus est. Calculo iam ex-
 empto, medicamentis sanguinem supprimentibus, ex manna
 thuris, aloë, solidagine, uel etiam misy, alijsq; id genus sangui-
 nis profluum coercentibus, sistemus, lanam atq; linteolū im-
 plicitum uino & oleo imbutum, uulneri superinducamus, &
 calcularijs deligationib; sexicrurijs utemur. Si metus eruptio-
 nis sanguinis sit, linamentū ex posca, uel oleo rosaceo, cui aq; a-
 sita mixta, injiciendum est, quod ægroto decubente crebrius
 madefaciendum est. Tertio pōst die soluentes, hydrelæoq; lar-
 giores fouentes, tetrapharmacum linteolis indudum adhibebi-
 mus, subinde propter urinæ acridinē soluentes atq; curantes.
 Quod si aliqua inflammatio superuenit, cataplasmatis & re-
 spersionibus in hoc consecratis utemur, & rosaceum uel cha-
 mæmelinum, uel butyrum in uesticam, nisi quāpiam inflamma-
 tio impediāt, injiciemus. Pari modo si uel depascendo serpens,
 uel quodam alio modo maleficum hunc efficiatur, singulis
 congruentia remedia accommodabimus. Si desit huceri infla-
 matio, lauacro illis adhibito, emplastrum diachylon, id est ex
 succis, super lumbos, & imum uentrem accommodabimus.
 Per uniuersum uerō curationis tempus, quo remedijs quiescen-
 di locus sit, femora quoq; deligare conuenit. At si lapillus par-
 uulus in ceruicem uesticæ colem uel inciderit, & mingendo
 excerni nequeat, præputium ualenter in anteriora retractum
 supra glandis summitatem uinciendum est. Mox pudendi eti-
 am coles, iuxta finem ad uesticam spectantem uinculo iniecto,
 deligandus est. Deinde ab inferiore parte calculi incidemus
 super la

per lapidem, qui parti secandæ supponitur, flexoq; in super co
le calculus eiciendus est, solutis postea uinculis huius à grumis
uacuabitur. Vinculum itaq; posterius iniectum est, ne calculus
retrorsum remeet. Anterius, ne post calculi exemptionē, præ
putij soluti tergus, in oppositū recurrens, incisionem operiat.

De partibus circa testiculos. Cap. 61.

Quandoquidem ad Herniarij medici disciplinam, partium
testiculorū finitiones conferunt, et prius à nobis sunt pro
ponendæ. Testiculus igitur substantia est glandulosa, fra
gilis, ad seminis uim genitalem comparata. Parastata, id est
assistentes, & cremasteres appellati, hoc est suspendicula, ner
ui sunt, à spinalis medullæ & cerebri membrana propagati,
qui cum arteriosis uenis ad testiculos pertingunt, per quos se
men in pudendum permeat. Seminaria conceptacula, uenæ
sunt à caua uena in testes, quibus etiam alimentum præstant,
sinuosis anfractibus pertinentes. Et tunica est natura nervosa,
in gibba quidem & anteriore parte à testiculo libera, à con
caua & posteriore ipsi inhaerescit, ex abdominis membrana
originem obtinens. Partem eam, qua testiculo adnata est, po
steriorem adnexam siue inhaerentiam, Græcè prosthysin co
gnominant. Darti sunt membranæ, quæ exteriorem pellem
erytroidi tunicæ adglutinant, quibus partibus & illa post tes
ticulos annexa est. Huic autem pelli exteriori rugosa testicu
lis circumdata, scrotum Latinis, Græcis oscheos nomen
est inditum.

De hydrocele, id est hernia aquosa. Cap. 62.

Humorem quendam otiosum atq; hebetem in partibus cor
porum quæ scrotum implicant, collectum, tumoremq; sen
su perceptibilem inducentem, aquosum ramicē indigitant. Fit
igitur humoris huius magna ex parte circa testiculos in tuni
ca erythroide, iuxta partem anteriore, qua à testiculo separa
tur, raro extra erythroidē colluuiet. Subinde peculiari etiam
tunica humor comprehenditur. Appellantq; hoc uitium chi
rurgici

rurgici herniā in tunica supergenita ortam. Si igitur ex præcedente causa, exempli gratia, partium harum imbecillitate hoc mali constiterit, sanguis alimenti ratione huc delatus, in aqueam, serosam, hebetemq; substantiam immutatur. Si autem ex plaga, cruenta, aut feculenta materia cōprehenditur, commune indicium est, tumor absq; dolore immobilis in scroto permanens, nulloq; casu evanescens: sed cum paucus sit tumor, cedens: si copiosus, nō cedens. et quibus in erythroide tunica humor existit, tumor rotundus paulo lōgior oui instar apparet, testiculusq; his planè inibi occultatur, ut qui undequaque sit circumdatus. Si extra erythroidem membranā sub tunicis que darti nuncupantur, extiterit, per pauca corpora sublabitur. At si humor in supergenita tunica coierit, propter undiquaq; compactū conglobatumq; tumore, alterius testiculi imaginem refert. Si aquosa sit materia, concolor tumor perlucet. Si feculenta, aut cruenta, rubicundus aut liuidus per tunicā apparet: nam quibus in utrisq; scroti partibus signa hæc inveniuntur, duplicem ibi herniam esse sciendum est. Curationem que maximum operam desiderat, administrabimus ad hunc modum. De rasa pube et scroto, nisi puer sit, resupinum ægrotātem super sedili collocabimus, multiplici aliquo panniculo natibus subiecto, spongia uerò ampliore scroto subdita, sedens à sinistra parte ægri medicus, ministro à dextra sedenti iubeat, ut pudendū in alteram partem reflectat, scrotiq; pellem abdomen uersus eleuet, sumpto. que scalpello scrotum à media parte orsus, iuxta longitudinem usque ad pubem ferè recta incisione secet, que à scrotum diuidente linea æqualiter distet, atque ad erythroidē usq; tunicam descendat. Sin in supergenita membrana humor hæreat, qua parte uertex super eiusdem tunica se ostenderit, ea in parte scalpellum erit admouendū, hamulo autem uulneris labia aperienda sunt, diductisq; herniario cultro scalpelloq; dartis, erythroides denudatur: mox phlebotomo eadē per mediū finditur, ea præcipuè parte, qua à testiculo recedit:

atq;

atq; humore iam toto, uel maiori ex parte in uasculū aliquod excreto, hamis erythroides membrana, qua tenuissima eius pars est, extrahatur. Anthyllus uerò postea futuris & medicina cruentis uulneribus accommodata, utitur. Recēiores, ea quæ carnē inducūt, adhibere assolent. At si testiculus putredine, uel alio quopiam uitio affectus deprehēdatur, uasa cū neruo cremasteri dicto annexa deligēda sunt, neruus ipse præcidendus, testiculus eximendus est. In duplici ramice laborantibus, bifariā similiter curatio adhibenda est, ab utraque parte scroto iuxta inguina inciso. Post hæc autem mucrone specilli inimum per incisionem demisso, scrotum ipsum sinuamus, ibiq; acuto scalpello paululū incidemus, quo sanguini cōcreto et puri exitus detur: ipso uerò scalpelli capitulo per exigū id foramen ad plagam usque superiorem implicito, in longitudinem linamentū traicimus, hulceribus in spongia deterfis, lana oleo imbuta, per inferiorem testiculum conijcienda est. foris aliam lanam uino, cui oleum admixtum sit, madentem scroto, abdomini, inguinibus, tauro lumbisq; superimponamus. linamentū triplex super hæc explicandum est, uinculo sexicurio alysq; deligationib. accommodatis utendū: decumbente postea homine, lanis scroto subiectis, quo requiescat, alutaq; super ipsas molli explicata, ad fots superfusionē excipiendā. Fouebimus usque ad tertium diem, calētis olei rore: à quo res soluentes, tetrapharmaco linamentis madefactis in uulnere utemur. Lemniscumq; ex polline farinaceo immutantes, extrinsecus fomenta rursum propter inflammationem, usque ad diem septimum iniiciemus, postea linamentorum custode medicamento utemur. Expurgato hulcere, & carne medio criter inducta, deinceps lauacris etiam adhibitis ager abludendus est, linamentum extrahendum, reliquaq; curatio, quæ admodum expositum est antea, adhibenda. Si qua inflamatio fuerit, aut sanguinis profusio, aut id genus quippiā superuenerit, unicuiq; suis remedijs, ne battologizemus, occurrendū est.

Ceterum

Ceterum si adustionem potius in aquosa hernia, sicuti recentioribus placet, probabimus, omnia nihilominus quæ uel ante uel post manuum administrationem dicta sunt, exequemur: quinetiam in ipsa chirurgia, excepta modo sectione quæ ferramento & incisione ad humoris emissarium, facienda sunt. decem itaq; aut duodecim ignitis ferramentis ad Γ Græcorū litteram formatis, & duobus culttris primum scrotum in medio ferramento Γ imitanti aduremus, cultello autem aut retuso hamulo membranulas excoriantes, ferro candenti gladio simili præcidimus. Denudata uerò erythroide tunica, quæ facile, quoniā alba & angusta tenuis uel existit, cognoscitur, acie ferramenti ad Γ figuram perurentes, humorem effundimus, deinde totum id quod ex ea detectum est, hamulis attrahentes, candenti cultroensem referenti, è medio tollemus.

De carnosio & tophaceo ramice. Cap. 63.

Caro in parte aliqua corporum inter scroti tunicas concreta, carnosam herniam ramicem uel excitat. Oritur autem ex cæca quadam causa, testiculo fluxionem experto & indurato, uel ex percussione, aut negligenti post ramicem secundum curationem. Comitatur autem hos una cum duritie, concolor tumor. Si tumor in scirrhum occalluerit, decolor & indolens: si malefici naturam respiscat, dolores pungentes consequuntur. Scalpillum itaque ita habenti admouentes, collocabimus ipsum sicut superius explicitum est, incidemusq; similiter. At si circa testiculum caro increuerit, utraq; membranam dactylon & erythroidem consimiliter secabimus: postea testiculo attrahito, atque ex erythroide exempto, uasa à neruo cremastere separata, uinculis excipienda, ipseq; neruus præcidendus est. Testiculus autem, qui cum carne coaluerit, tanquam alienus eiciendus est: si hæc concretio quadam in tunica aut uase extiterit, scroto diuiso, subiectisq; carni membranis, quicquid ab excrescētia carnis occupatum est, auferetur: quod si posterior commissura hoc uitium experitur, omnibus quæ ambiunt ipsam

am excisis, testiculus quoq; ipſus ſimul extrahatur: fieri quippe nequit, ut ſine hac teſticulus permaneat. Tophi autem, & in teſticulo & in erythroide membrana concreſcunt, multaq; renix duritia & inæqualitate à carnoſa hernia & aquoſa diſcernuntur. His itaque eadem manuum, quæ & carnoſo ramici, curatio adhibenda eſt.

De uaricoſo ramice, & flatuoſo. Cap. 64.

VENAS ſcroti, uel membranarum quæ darti nuncupantur, inturgeſcentes, uarices ſimpliciter appellant. Si uerò illis quæ teſticulum nutriunt, hoc acciderit, uaricoſum ramicem nominant. Notæ huius conſpicuæ ſunt, locus paulo tumidior, modicè obliquus, racematim conglomeratus, teſticuli relaxatio manifeſta, & aliæ functionum diſſicultates, in curſu præſertim, exercitationibus, & itinere. Curatione quæ manu fit, talè admoliermur: a gro appoſitè figurato, ſcrotum manu peromulcetur: neruus quo teſticulus dependet, ad inferiorem partem depellitur. Is autem inde facilius agnoſcitur, quod cū ualens ſit uenis tenuior, ſolidior, magisq; renitens ſentitur, maioremq; dolorem adfert ex compreſſu, iuxtaq; colem conſtitutus. quo depreſſo, uafa digitis noſtris famuliq; in ſcrote adprehenſa, ualideq; diſtenta, cutem cōtra ipſas uenas ſcalpelli acie obliquè ductas ſecabimus: hamulis inſuper infixis, ſubiectas cuti partes eleuatas excoriamus, uenasq; ipſas denudatas, ut in capite de Angiologia & aneurysmatis explicatū eſt, acu duplex filiū trahente traicimus, anſaq; fili incifa, et qua incipit et qua deſinit uaricatio fune deligabimus, facta prius in longitudinē incifione, ac ſanguine collecto illic euacuato, remedys pus mouētibus ipſos curare tentabimus, tantisper dum unà cū uenis uincula quoq; ſua ſpōte excidant. Leonides uerò tradit, ſi aliqua ex uasīs quæ teſticulo alimentum præbent, uaricata fuerint, ita eſſe faciundum. Si omnia affecta ſint, cum ipſis etiam teſticulus erit euellendus, ne alimento deſtitutus contabeſcat. Flatuoſo porrò ramici cum genere aneurysma exiſtat,

Hb

manuum

manuum administrationem non esse ad mouendam idem autumat, propter præsentaneum, quod in uaricibus à nimia sanguinis profusione euenit, periculum. Recentiores autē, cum ueritatis huius duplex sit generatio, alias ex quatuor uasis testicularum nutritiis, alias quæ in dartis tunicis & scroto cōtinentur arterijs, hunc ceu conclamatum repudiant, illū manuum opera curant. Discernimus autem ipsos, quod qui ab arterijs fit, facile ad digitorum compressionem euanescit: qui à uenis testiculum alentibus enascitur, uel neutiquam, uel cum multo metu, his eadem quæ uaricofo ramici curatio adhibetur, singulis uenis funiculo exceptis ac deligatis.

De hernia intestinorum. Cap. 65.

Enterocele, hoc est intestinorū hernia siue ramex, est in scrotum intestini deuolutio, quæ fit ex membranae abdominis ruptione circa ilia, uel laxatione: utraque igitur hæc, ruptura scilicet & laxatio, uolentia quadā præcedēte, nempe idu, saltu, aut clamore proueniunt. Laxatio autem propriè, ex resolutione alysq; corporis imbecillitatibus accidit. Nota utrisque communes sunt hæc: euadens in scroto tumor, qui in exercitijs, teporibus, spiritus retentione, alysq; huiusmodi occasionibus maior euadit, digitisq; compressus, lentius recurrit, celerius autem rursus relabitur. Intestinum insuper resupinatis, superna sua in sede permaneat, donec erecti steterint. Stercus autem in scroto interclusum, periculum sæpenumero ipsis intulit. dolor enim infestat, impressisq; interim etiam digitis crepitum edunt. Hædenus quidem communes: singulares uerò priuatim nota ramicis, quæ ex laxatione membrana oritur, sunt, quod non uniuersim, sed particulatim, & quibuslibet de causis interdum intestinum deuoluitur, tumorq; æqualis, & profundiore in loco apparet, utpote intestino, quod delapsus est, abdominis membrana constrictio. At quæ rupturæ euenit deuolutio, uniuersim ab initio, & uolētis de causis duntaxat, tumorem immensum, inæqualem, & in summa statim

cute præfert, eò quod extra peritonæum elabantur intestina.
 Si igitur rupta membrana peritonæo, omentum duntaxat in
 scrotum exciderit, epiplocele, hoc est omenti ramex: si omen-
 tum intestina secuta sint, epiploenterocele, hoc est omenti &
 intestini hernia appellatur. Si uerò cum his etiam aqua in tu-
 nica erythroide nuncupata contineatur, ex tribus composita
 appellatio inditur: hydrenterepilocelè, hoc est aquæ intesti-
 ni & omenti ramex. Porro neq; hos, neq; ex ruptura intesti-
 norum ramicem, manuum administrationi subijciemus: sed il-
 lum duntaxat, qui ex laxatione constiterit, ramicem hoc mo-
 do curamus. Laborante resupinato, inguinis cutem per famu-
 lum subleuatam, transuersa linea, sicut in angiologia exposi-
 tum est, incidimus: & si quidam non transuersa, sed recta li-
 nea utantur, iniectionq; hamulo diuisionem ita explicamus, ut
 per eam educi testiculus commodè possit: deinde rursus in inti-
 ma cute, nempe quarta, tot hamis infixis, quot ad uulneris ma-
 gnitudinem sufficiant, membranulas & adipem retuso hamo
 aut specillo excoriantes, scalpello excidimus, detectaq; undiq;
 & expedita abdominis mēbrana, indicē digitum in postero-
 rem scroti partē inter membranā hanc & dartū demittimus,
 eoq; posteriorem connexum soluimus. Post hæc dextera manus
 finem earum implicantes, sinistra abdominis membranā ad
 diuisionem attrahimus, & testiculum unā cum membrana ru-
 benti, eductum famulo attollendum tradimus: ipsi uerò postea-
 riorem inbærentiam penitus unā cum membrana rubenti dis-
 soluentes, digitis contrectando, num intestini aliquis anfractus
 in tunica erythroide relictus sit, explorabimus: qui si inuentus
 sit, deorsum hunc ad aluum propellemus: deinde acu magna,
 linum decies tortum duplex ducente, extremitate membra-
 næ abdominis qua diuisionē respicit, per medium traicimus:
 sinuq; succiso quatuor lini capita efficiamus, atq; his per uincu-
 lū rursus inter sese decussatim implicatis, ex utraq; parte pe-
 ritonæū uehementer destringemus: iterumq; ipsæ capitibus cir-
 cumuolutis,

Hb

2

cumuolutis,

cum uolutis, constrictionem repetemus, sic ut nullū ex uasis a-
lentibus queat amplius nutrimentum suppeditare: ne si id fiat,
inflammatio inde aliqua concitetur. Post hæc secundum uin-
culum minori quàm duorum digitorum interuallo à priori di-
stans, foris inijcimus. Unde uincula, mēbranæ abdominis par-
tem ad digiti amplitudinem relictam circulatim amputemus,
unā cum ipsa etiam testiculo ablato. Rursum scroto iuxta sa-
nici emissarium paululum inciso, lemniscoq; inserto, fomentis
oleo madefactis, deligationibusq; sicut in aquoso ramice adhi-
bitis, cætera quæ restant, perinde atq; illic explicitum est, fa-
ciemus. Noui nonnullos autem non imperitos chirurgos, qui
in membrana erythroide excisa, metu sanguinis profusionis,
ut uerisimile est, ferramentis candentibus extremum ipsius a-
durebant: ijdem post scalpelli administrationē ægrum statim
in solum ligneum oblongum aquæ calidæ, ad septimum diem
usq; demittebant, quinquies per diē noctemq; id facientes, præ-
cipuè in pueris: resq; ipsis mirificè succedebat. nam absq; in-
flammatione secabant, & uincula unā cum partibus constri-
ctis illico decidebant: interim uerò dum ægri lauabant, prædi-
ctis superfusionibus utebantur. Alius quidam præter comme-
morata omnia, per id tempus etiam pipere ex oleo trito spio
nam ipsorum dorsi perfricabat.

De hubonocelo, hoc est inguinis ramice. Cap. 66.

Inguinis ramex, intestini herniam ex laxatione natam præ-
cedere consuevit. exterso nanque primum peritonæo, laxas-
tum intestinum ad inguina delabatur, inibiq; inguinis ramicē
conficit, cui malo uetustiores eiusmodi scalpelli operam adhi-
bebāt, postea quàm inguina intumescencia transversa incisio-
ne trium digitorum longitudine aperuerant, membranulasq;
& pinguedinem exemerant, peritonæo dēnudato, ea in parte
qua fastigiatur, mucronem specilli imprimebant. is enim in-
testina sursum repellit, duasq; peritonæi partes, quæ utrinque
à specillo exurgebant, suturis inuicem committebāt: mox mu-
cra

crone extracto, neq; peritonæo præciso, neq; testiculo exempto, neq; alio quopiam facto, præsidio, cruentis uulneribus dissecto, curabant. Quoniam autem recentiores in huiusmodi uitijs adustionē anteponebant, hanc quoq; opportunè trademus. Homo igitur post moderatam motionem paulo uiolentius tussiat, ac spiritus retētionē intendatur. Vbi tumor in inguine apparuerit, locum qui aduri debet, atramentō scriptorio, uel collyrio triangula figura notabimus, transuersam lineā superius ad inguinis situm ducentes, puncto in medio triangulo signato: ægro deinde reclinato candens ferramentū medio illi puncto imprimemus, primū clauī, deinde lateribus triāguli ad Γ Græcæ literæ figurā. Postremo ad laterculi aut lēticulæ instar factis cauterijs, totū triangulū cōplanabimus, famulo per totam adustionem saniem panniculo extergente: tam altè adurētes, quoad in mediocris habitus corporibus adipē attingamus. Neque enim gracilibus propter siccitatem puncto illi ferrum imprimendum est, ne fortè imprudentes peritonæum aduramus: neq; etiam nimium obesis ac pinguioribus, in quibus etiam uel ante iustam adustionem pinguedo occurrit. Vbi sanè, ut medio crē adustionis habitum inueniamus, artificiosa cōiectura opus est. Secundum ustionē porrum cū sale tritū crustæ imponitur, et inguinale ad X literæ Græcæ figurā ligamēto utamur. Sequentib; diebus medicamētis quæ crustā adimunt, puta quæ ex lēticula et melle cōstāt, et id genus alijs curationē absoluemus.

De scroti laxatione, quam rhacosim dicunt. Cap. 67.

Quando scroti tergus sine interiorib; suis partib; laxatur, quitiū maximè indecorū, quod Græci rhacosim nuncupāt, euenit. Leonides itaq; resupinato homine, superuacanea scalpello super tabulam quandam, aut durū aliquod corium, excidebat, orasq; plagæ suturis cōmittebat. Sed Anthyllus ternis post aut quaternis suturis adhibitis, superflua cutē forfice acuta uel scalpello abscindebat, suturisq; conglutinatam perinde atq; cruenta curabat.

Hb 3 Deratione

Quoniam nostræ artis consilium atque unicus scopus sit, ut corpora ab affectione, quæ præter naturam est, in naturalem restituantur, contrariam eunuchos faciendi ratio professionem sortita est. Sed quoniam subinde præpotentes aliqui nos uel inuitos castrare homines cogunt, huius etiâ rei modus compendiosè referendus est. Duplex igitur est: unus collisione, alter excisione absoluitur. Collisione hoc modo, pueruli etiam dum infantes, in aquæ calidæ peluim collocantur, ut in ea desideant: deinde ubi partes illæ eadem pelui fuerint remollitæ et relaxatæ, digitis testiculi premuntur, quoad dissipati euanescant, neque sub tactum amplius dissoluti occurrant. Excisione uerò, in hunc modum homine in sedili resupinato, laua manus digitis scrotum unâ cum testibus comprimetur, scalpellôque admoto in rectum duas lineas, unam per alterum testiculum incidimus: ubi proruperint testiculi excoati, sola tenuissima illa naturali uasorum continuitate relicta, execabuntur. Atque hæc castrandi ratio collisioni in eo præstat, quod qui collisionem experti sunt, uenere nonnunquam appetere solent, parte testium aliqua, ut credibile est, in collidendo subterfugiente.

Hermaphroditum uitium ex hermes et aphrodites, hoc est Mercurij et Veneris compositione, appellatione sortitum est, ualde utrique sexui indecorum. Cum enim quatuor sint iuxta Leonidem ipsius differentie, tres quidem in maribus, una in mulieribus consistit. In maribus siquidem aliâ sub scroto iuxta interfœmineum, aliâ in medio scroto genitalis fœminei pilis obsiti forma conspicitur. Tertia uerò his accedit, in qua quibusdam per eiusdem scroti quasi muliebris pudendi rimam urina destillat. In fœminis uerò supra pudendum iuxta pubem mentule subinde species inuenitur, quæ tribus quibuscûq; eminentibus corporibus uno quasi cole, reliquis duabus

bus quasi testibus. Tertia illa, quæ uiris accidit deformitas, qua per scrotum urina excernitur, cōclamata & immedicabilis est. Tres reliquæ curationem recipiunt, partibus superuacuis è medio sublati, & aliorum hulcerum modo curatis.

De nymphe amputanda, & caudatione. Cap. 70.

Nympha quibusdam supra modum excrescit, & indecentem uerecundiam præ se fert: & quemadmodum nonnulli tradunt, aliquæ partes hac haud aliter atq; uiri arrigunt, & in uenerem ruunt. quocirca resupinata muliere uulsella nympha superfluum apprehensum, scalpello excindimus: cautio ne diligenter adhibita, ne nimis altè excindendo penetremus, ne rhyadica affectio inde excitetur. Caudatio porrò quam cercosim dicunt, caruncula à locellorum ore propago quædam est, quæ muliebri genitale replet, interdum etiam instar caudæ foras procidit, nymphae modo abscindenda est.

De muliebrium locellorum thymis, condylomatis, & hæmorrhoidibus. Cap. 71.

Thymus tuberculum quoddam est, modò rubens, modò candidum, plurima ex parte dolore uacans, thymi corymbis similis. Condylomata uerò rugosæ quædam extuberationes sunt, quemadmodum hæmorrhoides, yis quæ in sede eueniunt respondentes, interdum etiam sanguinem profundunt. Omnes igitur huiusmodi in mulieribus excrescētiæ, quæ sub aspectum ueniunt, inter detegendum specillo comprehensæ, semispathulae ferramenti acie exciduntur. Et g. lla læuigata, aut fissili lumine curantur: deligaturam quippe quæ lino fit, in his clariiores chirurgi non concedunt.

De muliebribus genitalibus imperforatis, & phimo. Cap. 72.

Genitalia mulierum compacta & imperforata, interim à natura, interim ex superueniente occasione, morbo aliquo præcedente, fiunt, quandoque in imo, quandoq; in ipsis alis, quæ Græcè pterygomata dicuntur, uel in medio etiam spacio, idq; uel ex natura, uel ex obstructione. Obstructio autem uel

Hb 4 carne,

carne, uel membrana fit. Hoc uitium in uenereo congressu, in conceptu, in partu, nonnunquam in expurgandis mensibus graue impedimentum adfert: si uidelicet membrana, uel caro totum obstruat. nam in quibusdam foramen in medio patescit. Causa itaque inuenta, uel ex promptu, uel etiam dioptra, hoc est exploratorio specillo ad uulua aperiendam demisso, si quidem conglutinatio solum fuerit, hanc recta linea scalpello ad fistularem incisionem facto dissoluemus. Si autem distentio, haemulicis iniectis medium corpus siue membrana, siue caro sit, eleuantes scalpello diuidemus: deinde sanguinis profluvio exiccantibus sine rosione medicamentis represso, cicatricem inducentibus utemur, priapisco, hoc est linamento priapi instar facto, supposito: atque hoc in his potissimum fit, in quibus non admodum alter scalpelli administratio est adhibita, ne particulae rursus coeant. Phimus, hoc est praecclusio, in uteri ostiolo succrescens, pari modo curandus est.

De uteri abscessu. Cap. 73.

Vbi circa os uulvae abscessus emerferit, qui manus administrationem queat admittere, non protinus ad incisionem festinare consilium est, sed propter uteri excellentiam quoad absoluta dispositio eius, audacius plurima parte inflammatio creuerit, superiecta quoque humoribus corpora attenuata fuerint, expectare, tunc denique ferrum tentare. Inter agendum igitur mulier in se dili resupinata ita collocanda est, ut crura ad abdomen femina inter se diuarcata contrahat, cubiti quoque eius poplitibus subiacentur, ac uinculis accommodatis ad ceruicem deligabuntur. Tunc medicus ex dextra sedens, dioptra ad aetatem accommodata explorabit. Conuenit autem specillo sinus muliebris profunditatem metiri, ne si longior dioptrae tibia fuerit, uulua comprimat. Quod si dioptrae tibia sinu amplior reperiatur, duplicia linamenta alis inferenda sunt, sic, ut super ipsa dioptra firmetur. Oportet autem dioptrae tibiam cochleam habentem in superiora demittere, & dioptra à medico contineri, cochleam uero

però à famulo intorqueri, quo tibiæ compaginibus diductis, sinus muliebris distendatur. Si autem abscessus occurrerit, si mollis ac tenuis sit, quod digitorum attrectatione subsidet, iuxta uerticem spatula, aut scalpello incidendus est: deinde pure euacuato, implicitum in longitudinem linamentum mollissimum oleo rosaceo imbutum imponetur, uel potius extra plagam sinui muliebri leniter absq; compulso inferetur. Foris autem supra alas & pubem lumbosq; lana succida uel pura, oleo irrigua imponatur. Tertio post die mulier in hydrelæum calidum, aut maluæ decoctum insidebit, abstersis inde sudoribus. lemniscum tetrabarmaco per se, uel cum melle discocto in unguento plagæ, leniter insinuabis: tetrabarmacum uerò butyro uel rosaceo solutum esto. Cataplasmata extrinsecus superaccommodata sunt, donec inflammatio cessauerit, & hylcus expurgetur. Si autem difficulter expurgetur, auriculario clystere, uel iridis, aut aristolochiæ decocto, uel melle elui conuenit. Cicatrix postremo linamentis medicamento ex Cadmia uino soluta, imbutis inducenda est. At si intra os uulvæ abscessus constiterit, manus admouenda non est.

De foetuum extractione & excisione. Cap. 74.

Vam accurata sit ægrè parturienti curatio adhibenda, Tertio uolumine tradidimus. Si autem ea ratione minus successerit, ad manuum & scalpelli operam meritò diuertendū, animaduerso prius mulieris affectu, num superstes futura sit, necne. Et si quidem salus speratur, manus præsidium aggrediendum: sin contrà, respuendum est. Quæ igitur exitium sui portendunt, ueternoso quodam torpore in somnum deferuntur, resolutæ sunt, & tanquam conclamatæ difficulter reuocantur. Siq; clamoribus reuocatæ oculos sustulerint, imbecilliter muscitantés rursus sopiuntur. Quibusdam etiam conuulsio et neruorum contractio superuenit, uel alimentum non sentiunt, pulsus admodum inturgescens, obscurus tamen & imbecillis deprehenditur. Quæ superstites futuræ sunt, nihil cuiusmodi patiuntur.

Hb 5 tiuntur.

tiuntur. Resupinanda igitur in lecto mulier est, sic ut figura
 ipsius declinior sit, & crura sublata à mulieribus utring; aut
 famulabus aliquibus contineantur. Quarum si copia non sit,
 mulieris thorax uinculis quibusdam lectulo deligandus est, ne
 ad foetus attractionem sequens corpus robur eius proterat, ac
 refringat. Postea uulua alis per ministrum diductis, medicum
 leuam manum inunctam ualentibus digitis constrictis atten-
 nuatam in ostium uuluae inserat, ipsumque dilatet, et oleo in-
 fuso relaxabit, demissa manu inquirens, ubi uncus ad foetum
 extrahendum commodè inijciendus sit. Idonei autem ad infia-
 gendum uncum loci, si in caput conuersi deferuntur, sunt occu-
 li, occipitium, os ad palatum, mentum, clauiculae, costarum ei-
 praecordiorum sedes. Si in pedes exeunt, ossa pubis, interco-
 stalia & iugula: rursum deinde medicus uncum dextera ma-
 nu continebit, flexura ipsius digiti occultata, sinistra manu
 paulatim intromittat, & alicui ex supradictis particulis, eum
 usque ad uacua infiget, tum alterum ex opposita parte inijciet,
 ne in alterum latus declinet, sed aequali libramento protraha-
 tur. Deinde aequabiliter attrahere oportet, non solum recta,
 sed in latera etiam, perinde atque in dentibus eximendis fieri
 consuevit, neque inter agendum tensionem iterum remittere
 conuenit. Postea uero indice digito peruncto, uel pluribus et-
 tiam demissis, inter os uuluae & corpus insertis, & orbiculae
 tim circumactis, quasi excoiando resolvere. Si autem pro at-
 tractionis ratione uncus sequatur, erit subinde in superiores
 partes transferendus, quoad foetus perfecta fiat extractio. Si
 autem manus infantis porrecta fuerit, neque propter angu-
 stiam repelliqueat, panniculo aliquo circumposito, ne dila-
 batur, modice protrahenda, prolapsa quoque, tota ab humero ab-
 scindenda est. Idem si utraque prociderint, faciundum: simi-
 li etiam modo pedes procidentes reliquo corpore non conse-
 quente, ab inguinibus amputari debent. Tum reliquum cor-
 pus dirigere tentabimus. Ac si caput iusto maius, angustiasque
 facit.

acit, & hydrocephalus est infans, spatha polypica, uel scal-
ello, uel aculeato cultello inter digitos occultato, caluariam
ius incidimus, ut tumore exinanito concidat. Quod si natu-
raliter caput tam amplum sit, caluariam similiter forcipe-
lentibus aut ossibus extrahendis dicata, confringimus. Si ossa
liqua immineant, hæc quoque eximuntur. At si caput ad tho-
racem protractum impediat, partes circa clauiculas eodem
instrumento usque ad interiora secantur, ut humore effuso tho-
rax extenuetur. Sin minus, clauiculæ etiam ipsæ præciden-
te atque extrahendæ sunt: tunc enim concidat necessum est.
Quod si abdomen è mortuo foetu, aut aquam subtercutem ex-
serto, inflatum deprehenditur, unà cum interaneis eadem
ratione ac uia euacuandum est. Si in pedes deferuntur, ad os
ulnæ inclinatio non difficulter dirigitur. at si thorax uel i-
nus uenter obstructionem præbeat, linamento circumposito
attractantur: atque eodem, quo dictum est, modo, ea quæ ambia-
nt, findemus. Si uerò reliquis omnibus partibus detractis, ca-
put solum reuersum altius inhæserit, & firmitus retineatur,
niectam manum sinistram ad os uteri, si pateat, deorsum in-
iundum transferemus, caput que inuestigatum ad ostium ip-
sum digitis deuoluemus: deinde uno aut altero unco infixio pro-
pter hostioli inflammationem nullam uim adhibebimus, sed in-
fusionibus pinguibus & copiosis, infusionibusque
utemur, sic, ut aperto uteri hostiolo aptè, quemadmodum
superius demonstratum est, queat extrahi. Cæterum trans-
uersus infans, siquidem dirigitur, præfatis rationibus eximen-
dus est. Sin minus, concidi intus & particulatim educi debet:
cura adhibita, ne qua particula ipsius nobis nesciis intus relin-
quatur. Post manus scalpelli que administrationem obitam,
præsidys inflammationibus uteri dicatis utendum est.

Si uerò sanguinis profusio euenerit, etiam

huius curandi rationem superius

traditam accepisti.

De secundis

Vbinde usuuenit, ut foetu extracto, inuolucrum ipsius (quod etiam secundas appellant) in utero firmiter retineatur. Ducto itaque uteri osculo, secundae inibi relictæ, aliquo in loco globatim conuolutæ, facile educuntur. Læua siquidem manus calefacta, unda quæ in imum uulvæ demissa, secundæ sublabantur et eijciuntur. Sed si in fundo uteri adnatæ hæreant, manus similiter demittenda est, et apprehensæ attrahendæ sunt, neque in rectum tamen, ne uterus procidat, neque uiolenter admodum, sed leniter prius in latus huc illuc agitandæ, tum aliquantulum ualentius excutiendæ. Hoc enim pacto à connexu absolutæ sequuntur. Quod si uteri orificium connueat, easdem medelâ quas ad hoc recensuimus, adhibere conuenit. Si uires infirmæ non fuerint, cientibus sternutamenta et aromatum suffitu efficiendi utendum. Et si os uteri hauerit, manu inserta, secundæ eodem modo educere conabimur. At si neque ita eximi queant, non opus est negotium ægrotanti ulterius facere. Nam secundæ dum paucos dies tabefactæ, et in saniem resolutæ, ultro excidunt. Quoniam uero odoris grauitate caput aggrauant, et stomachum euertunt, suffitus ad hoc facti adhibeantur: quo in aromato cardamomum et ficus aridæ maximè censentur.

De coxarum adustione. Cap. 76.

Vbinde atque humerus, sic etiam coxendix, madoris nimietate prolapsus, in quibusdam adustionem efflagitat. Id quoque Hippocrates hac sententia asserit. Quil us coxendix ex diuturno suo cruciatu excidit, crus tabescit, et claudicant, nisi iustionem experiantur. Oportet itaque eo potissimum in loco adustionem moliri, è quo articulus excidit. si enim redundans humilitas exiccabitur, et locus ex cicatrice inspissatus, os amplius minimè suscipiet, quocirca longè altius adurendum est. Recetiores uero treis adurendo crustas concitant, unâ retro ad cavitatem clunis, alteram supra genu paululum extrinsecus, tertiam supra anteriorem malleolum, quæ est carnosior.

De fistula

De fistulis & fauis. Cap. 77.

Voniam locus iam exigit, ut de ani fistulis differamus. Quid absurdum fuerit, si prius generatim de fistulis omnis explicemus. Est igitur fistula sinus callosus, dolore aliquando carens, qui plerisque in particulis, plurima uero parte ex abscessibus parui dextrae curatis, exoritur. Callus uero conacta quaedam caro est, candida, madore priuata, eoque indolens, neque uena neque neruo ad ipsam pertingente. Sinus modum uidetur siccus, modum uero humidus est. Humor interdum absque intermissione fertur, interdum certis quibusdam temporibus intermittit, ore ipsius obstructo, iterumque diducto. Fistulae nunc uidemur in os, nunc in neruum aut aliquam aliam principem arteriam terminantur, uel rectae, uel obliquae, uel uno ore, uel pluribus peruiuae. Quae igitur in grandes arterias, uel neruos, uel tendines, commutatione dignos, uel membranam costis inuoluentem, uel aliam eiusmodi principem particulam deueniunt, aut nequaquam omnino, aut summa artificiosaque cautione et diligentia pertractandae sunt. Reliquis uero hoc modo manu operam admouebimus. Explorabimus primum, si rectae sint, exploratio: si obliquae, specillo flexili: cuius generis stannica, atque ex aere tenuissima. Quae uero bina aut plura habent oscula, quae specillo tentari non possunt, sinu per unum ipsius os angusto, ex clysteris in reliqua ora transitu facile animaduertimus, fistulam ne pluribus orificiis dehiscens, an plures sint fistulae. Facta eiusmodi notatione, siquidem in summo fuerit sinus, angustusque, demisso specillo expandentes accommodata figura scalpello callum tollemus, uel unguibus, uel acie scalpelli deradentes. Sique partes superfluae latius diffundantur, circumadimi debent. Sin autem non per summa transversae feruntur, sed penitus recte tendunt, ubi quam profundissime potest sinus, fuerit diuisus orbiculatim, uniuersum callum excindemus. Si quid ex eo relictum fuerit, adurenti id medicamento consumeamus: si amplius cum sit, medicamento non obtemperet, ferramentis

mentis candentibus ei crustam inducemus. Quod si fistula
 os desinit, id quod integrum est, tantummodo derademus: si
 riam, aut aliam quandam corruptionem senserit, totum quod
 uitiatum est, excisorijs scalpris oppositis auferemus, prius
 opus sit, terebratione adhibita, siue ad perspiratum usque tan-
 tummodo, siue ad medullam usq; uitium penetrauerit. At si
 aliquod caulium modo transuersim fractum emineat, serra
 secandum est. Binis igitur sumptis habenis, unam medio si-
 ossi eminenti subijciemus, ministroq; intendendam porrigimus
 alteram quæ crassior est, uel è lana constat, simili modo caro
 ni, quæ ossi subiacet, medietate insertantes, & initia eius infirmis
 comprehendentes, carnem per habenam deorsum trahi iube-
 mus, sic, ut caro deorsum depressa, lacerari à serræ dentibus
 nequeat. & isto nos pacto excretionem molimur. Vbi uero
 præcipua aliqua pars subiecta est, ueluti membrana costas si-
 cingens, uel spinalis medulla, uel tale quippiam dum os exco-
 dimus aut ferramus, quæ pelliculam custodiat lamina subij-
 cienda est. Sin autem os uitiatum non sit, totum uerò circula-
 tim carne denudatum sit, nihilominus eodem modo deradetum
 seu amputetur. Fieri enim non potest, ut ossa orbiculatim caro
 ne spoliata, eadem amplius obducantur. Pari modo si ossis ex-
 tremas iuxta articulum corruptionem experiat, serra
 secanda est. Si totum sepe numero os, uerbi gratia, cubitus, uel
 dius, tibia, aut id genus aliquod uitiatum fuerit, totum ampu-
 tur: femoris autem capiti, aut coxæ, aut dorsi uertebrae, etiam
 si uitium acceperint, ob præsens tamen quod ex adiunctis artu-
 rjs accidit periculum, cuiusmodi manuum operam admoliri ri-
 cusabimus. Hac igitur ratione ac uia agendum est, ut in singulis
 lis ubiq; partium affectarum situs, uicinitatis et cognationis
 item morbi magnitudinis & uirium laborantis rationem ha-
 beamus. Iam uerò fauus cum sinus sit fistulosus, mellea diffu-
 ens humiditate, easdem quæ fistulae & alij sinus cum manu
 am, tum medicamentori in suppetias efflagitat.

De an

Edis fistulae ita sunt rimandae. caecis nullo ore apparente cruciatus accidit, et purulentus quidam humor ex ano proluit. Plerisque abscessus quoque notae praecesserunt. euidenter coparium specillum uel seta porcina demissa arguit: instrumentum quippe ad ima, donec inanem locum offendat, in eis penetrat, digitoque indici per anum transmissio occurrit, fistula nimirum interiore parte perforata. Nam si perforata non sint, instrumentum digito neutiquam citra medium occurrit, sed per medium imperforati corporis sentitur. Oblituae et labyrinthi modo tortuosae inde cognoscuntur. Quod instrumentum iniectum paululum procedat, pus tamen ad illarum portionem copiosum fertur. At quae prope intestinum endunt, inde deprehenduntur, quod interdum et lumbrici, et stercus per os erumpat, atque omnes ferè callum quendam in orificio praefertunt. Quae porro uesticae ceruicem perforauit fistula, uel ad femoris articulum, uel ad rectum intestinum endit, nulla medicina periculo subtrahit. Quae uerò orificio caret, et quae abdita est, et in os terminans, et multiphasiam fistula, aegre reliquae in uniuersum facile curationem recipiunt, manuum opera hunc in modum adhibita. Resupinato homine sic, ut cruribus sursum porrectis, femora ad uentrem inclinèt, perinde atque in ijs quibus infusum aluo immittitur, fieri consuevit. si fistulae extremum in summa cute terminabitur, specillo per os subiecto, simplici linea cutem excidimus. Si profundè in anum fistula tendat, demisso simili modo per orificium specillo, siquidem perforatam ab altero ipsam inuenimus, alterius manus, quae affecto annulo opposita est, indice per anum immisso, scalpelli initium apprehendentes, et paululum recuruantes, foras educimus: et quicquid specillo incumbit, simplici diuisione aperimus. At si perforata nondum fuerit, in aliu uerò ani dextra terminetur, et caput specilli, tetantibus nobis, sub squamea quadam, aut membrana cute digito indici sublabatur, specilli mucrone uolentius impulsio perforabimus, traie-

traiectoq; per sedem specillo, rursus scalpello corpora modo
 praedicto resolvimus. Si igitur terebrae aut falculae fistulis se-
 candis dicatae, mucrone sinus fundum in ano perforauerimus,
 eodemq; instrumento per anum traducto, totum id quod in me-
 dio est falculae mucrone defecabimus, & post excisionem uul-
 sella uel forcipe omnes quae ambiunt partes (sunt autem cal-
 li) ex toto adimendae sunt, ubiq; uitantes ne musculum constri-
 ctorium, qui sphincter appellatur, offendamus. Nonnulli enim
 dum imperitijs minus alte incidunt, ipsum uulnerauerunt, at-
 que ex eo inuoluntaria stercoris eiectione euenit. Vbi uero quis
 piam meticulosior ferrum recusauerit, Hippocratica deliga-
 tio adhibenda est. Praecipit enim Hippocrates, linum quintu-
 plex crudum, specillo perforato insertum, per fistulam demit-
 tere, innexisq; inter se inijs constringi, donec totum quod in-
 ter duo ora superiacet, dissectum, linum eructet. Quod si id de-
 signare detrectet, linum ipsum psara, uel eiusmodi quodam ari-
 do illinendum, & ultro citroq; extrahendum. Sunt qui fora-
 mini fistulariae falculae linum insertum eodem quo diximus mo-
 do propellunt, quod mea sententia non conuenit. Nam cum
 scalpelli operam fugere student, praeterquam quod id non as-
 sequuntur, curationem prolixiorem consequuntur. De abditis
 porro fistulis Leonides hunc in modum prodit: Cum autem pro-
 funda fuerit fistula, & sphincterem musculum forauerit, siue
 a sede incipiat, siue longius procedat, post notas indicatas, la-
 xatorio instrumento dioptrio paruo muliebris sinus modo, a-
 nus distendetur. Cumq; fistulae os apparuerit, specilli mucro-
 in ipsum demittetur, in anumq; impelletur, supraq; ipsum se-
 misspatula aut spatula fistulis dicata diuidetur. Ipsi uero cum in
 huiusmodi affectionem incidissemus, hac administrationis
 ratione uti minime potuimus, eo quod fistulae cuniculus sub as-
 spectum uenire nequiret, quum esset inter anum & eius fibu-
 lam sphincterem appellatum, a dextra parte constitutus, &
 diductorium instrumentum operationem potius adumbrabat.

Caterum

Ceterum distendentibus nobis cum digitis anum, rima quædam inter unam quandam rugam ani quasi fistulæ defluxio se obtulit, pus etiam per ipsam emanabat. Tentauimusq; per eandem specilli aciem in fistulam demittere, ceu ab ipsa manu ducti: deinde dextræ manus indice sphincteri immisso, medium quoddam tenue corpus inter digitum & instrumentum deprehendimus, quare cultello uiolentiùs digito adacto, fistulæ fundū sursum conuersum perforauimus, extractoq; specilli capite totum id quod inter duo fistulæ ora habebatur, sub aspectrum nostrum uenit: dico autem, ab eo quod à principio ad humoris emissarium situm erat, & eo quod à nobis factum fuit, scalpello incidentes, specillum liberauimus.

De hæmorrhoidibus. Cap. 79.

Vum hæmorrhoidum notio ex ipso qui uacuatur humore conspicua sit, priusquam aggrediamur, copiosissimo infuso utendum est, quo & intestini retrimenta exinaniantur, & anus simul ad diuortium & exitum promptior reddatur. Collocabimus igitur ægrotantē supinū aduersus lumen lucidum, siquidem deligatione uti animus est, linum quinquies tortum ferramento, quo ora uenarum in ani corona uel uuas adurere consueuimus, labris hæmorrhoidum circumponentes, singulas hoc fune astringimus, una duntaxat relicta, qua sanguis redundans effluere possit. Idem & Hippocrates præcipit. Secundum uerò astringionem lintcolum oleo madens, & ligamentum sedi accommodatum adhibendum est, ægroq; quiescendum, oleo tepido, aut aqua mulsa ad uentris curationem utendum: cataplasmate item post hæc ex micis panis & croco, ubi hæmorrhoides exciderint, uino cicatricem inducimus. Leonides uerò deligatione non utitur, sed uulsella uua dicta, hæmorrhoidas ampliter prebensas, scalpello excindit. Post manuum administrationem, manna & amylo cum chalcitide, uel medicamento excremata spongia & pice, adq; absolutam aduersionem Faustino pastillo, utitur. Alij uerò instru-

li menti,

menti, quo uia aduritur, utriculis medicamento quod adurat repletis, hemorrhoidas perinde atq; uiam ufferunt.

De condylomatis seu tuberculis. Cap. 80.

Sedis condyloma loco solum ab eo quæ in muliebribus naturalibus suboriuntur, dissidet. Rugosum etiam ipsum anituberculum uel ex inflammatione, uel rima præcedente prognatum. Primò igitur tuberculum mox ubi occalluit, condyloma appellatur. Oportet igitur huic haud aliter atq; illis uulsella apprehensis, excisione, & crustam inducentibus medicamentis mederi. Rimas autem quæ ex duricie stercoris potissimum eueniunt, & cicatrice temporis spacio occallescentes, uel ungibus, uel scalpello perradentes, recentes faciemus, & ad cicatricem conuenienter perducemus.

De ano perforato. Cap. 81.

Infantibus receter editis anus à natura imperuius interdum reperitur, eo quòd membranae obductione obstruitur. Hæc igitur digitis, si fieri potest, dirumpenda est: sin minus, scalpelli acie eam aperientes, uino curabimus. Quoniam autem adultis etiam subinde ex praua hulceris curatione anus conglutinetur, instrumento ad id factò coherentiam istam diruptam curabimus, fistula plumbea aut cuneolo quodam per totum curationis curriculum, ne rursus coeat, scite imposita. Debet autem cuniculus medicamento prius, quod cicatricem inducat, oblini.

De uaricum excisione. Cap. 82.

Dilatatio quædam uenæ uarix est, nunc in temporibus, nunc in ima uentris parte sub umbilico, non raro circa testes etiam, crebrius uero in cruribus eueniens: hic sanè magna ex parte è melancholica materia originem trahit. Borum igitur qui in testiculis insurgunt, administrationem, capite de uaricofo ramice explicauimus. Iis uero quæ in cruribus oboriuntur, pari modo manuum operam admoiemur, ab interiore scilicet femoris parte, ubi etiam ipsorum origo in plurimum cernitur, auspicantes inferius siquidem in plures differe si pre-

si propagines, impeditam tractationē exhibent. Homine ita
 quē prius loto, uinculum superiori femoris region inijcimus,
 & incedere præcipimus, uenam quē ita infartam attramen-
 to scriptorio, colliriōue iuxta uaricis situm, notabimus, di-
 gitis per longitudinem ternis, aut paulo amplius, interposi-
 tis. Reclinato postea homine cruribus extensis, altero supra
 genu uinculo deligamus. Turgescentem quē in fastigium ue-
 nam supra attramenti notationem scalpello scindamus, sic,
 ut cutem duntaxat scalpellum penetret, ne uenam incidamus.
 Deinde hamis plagæ oras diducentes, & membranas her-
 niarīs specillis flexilibus excoriantes, uena undiq; nudata ex-
 plicata quē femoris deligationibus solutis, uena quē ipsa per
 obtusum hamum suspensa, acum subter duplex linum tra-
 bentem transmittimus, lini quē sinum amputamus, & uenā
 scalpello per medium dissecta sanguinis quantum opus est de-
 trahemus. altero deinde lino superiorem uenæ partem con-
 stringimus, crurē quē recto eleuato, manuum expressione, san-
 guinem qui in crure est, euacuabimus: deinde infra rursum
 uenam deuincientes, partem illam uenæ quæ inter duo uincula
 existit adimemus: uel relinquimus, quoad sua sponte undā
 cum uinculis excidat, & plaga uulneris linteolis siccis opple-
 ta, splenium ceneleo madens superimpositum deligabimus, li-
 namento medicamine suppurationem inducente imbuto, cura-
 tionem prosequemur. Neque autem me fugit, ueteres non-
 nullos uinculis minimè esse usos, sed alios uenam carne indur-
 dem denudatum excindere: alios ab imo adhærentem uiden-
 tur extrahendo abrumpere. Atqui omnium tutior à me po-
 situs est manuum administrationis modus: uarices insuper qui
 imo in uentre suboriuntur, simili chirurgia tractantur. Illi
 itidem qui tempora infestant, ea ratione quam in capi-
 te super exemptione uenarum, angiolo-
 giam uocant, comprehendimus, eliduntur.

Vper dracunculis sanè, quomodo maximū per medicamēta
Spræsidii experiantur, quarto uolumine satis tractauimus.

Ex timæ interdum corporis partes, uerbi gratia, manus aut
 pes, eiusmodi putredinē experiūtur, ut ipsa etiā ossa corru-
 pta, siue ex foris inchoante causa, fracta sint, siue ex præce-
 dente putredinem experta, excisionem quæ serra fit deside-
 rent, ante quā corpora ossibus circumiecta, primū incide-
 re necessitas est. Quod dum primum fit, deinde longior in ser-
 rando mora protrahitur, periculum est, ne sanguinis profusa-
 uum sequatur. Meritō Leonides non omnia primum corpora-
 ra, nisi penitus putrefacta immortuaq; essent, excidebat. Sed
 eam modo partem, ubi non plures esse uenas aut arterias opi-
 nabatur, principaliter usq; ad os aperiebat: deinde os protinus
 ipsum serra excabat, panniculo lineo partib. præcisīs super-
 posito, ne serra per ipsas ultro citroq; tracta, dolores crearet:
 deinde reliquū exciso ferramenti candentibus uasa adurebat,
 & sanguinis fluore linamentis insertis represso, cōuenientem
 deligaturam adhibebat, præsidioq; pus commouente curabat.

Pterygium in unguibus excrementia carnis est, partem un-
 guis opperiens, tam in pedis quā in manus pollicibus po-
 tißimum eueniens. in pedibus quidem, ex offensione ut pluri-
 mum: in manibus autem, ex neglecta reduuia, cum inflamma-
 ta, tum in pus conuersa, creatur. Siquidem pus cum inuetera-
 uit, unguis radicem exedit, ipsumq; corrumpit, ac totum sub-
 inde abolet, magnaq; ex parte mediam eius portionem omni-
 no consumit. Iuxta unguis radicem particulam quandam pu-
 trefactam, quandoq; totam radicem à rofione immunem relin-
 quit: os etiam ipsum interim corrumpit, odor grauis sentitur,
 digitus summo expansus ac liuidus cernitur. His in hunc mo-
 dum manus admouenda est. Totam unguis partem reliquam
 scal-

scalpelli acie subsecantes auferemus, deinde cauterijs exbulce-
ratam aduremus. Pterygium enim ex genere depascentium est,
quod nisi aduisione cohibeatur, continenter serpit: si negligi-
tur, totum digitum corrumpit. At si osi et ungue integris, ex-
terior unguis angulus delitescens, carnem ipsi agnatam pun-
gat, inflammationemque excitet, oportet stimulantem unguis
particulam tenui specillo, aut tali aliquo instrumento subiecto
eleuatam, scalpelli acie præsecare, & quod eminet, aduren-
te, & crustas inducente medicamento consumere. Hac quippe
administrationis ratione plerique restituti sunt. Sin amplius fue-
rit quod eminet, primum id scalpello circumcidi, mox superin-
duci medicamentum debet.

De ungue colliso. Cap. 86.

Vando quidem sæpenumero unguibus ex contusione colli-
quis, cruciatus comitantur, qui ad chirurgiam nos compelle-
lunt, abunde erit Galeni uerba hic apposuisse. inquit enim: In
unguibus contusis ipsa experientia liquidò edocti sumus, san-
guinis detractionem sopire dolorem, cum pulsus & cruciatus
intensissimi oboriuntur. Debet unguis non recta à superiore
parte deorsum uersus ad imam, sed obliqua linea acutæ aciei
scalpello incidi, sic, ut sanie excreta, resecta eius pars quasi op-
perculum quoddam subiacentium corporum efficiatur. Nam
si in rectum seces à superiore parte deorsum, qua carnis excre-
scentia unguem occupat, fit, ut subiecta ungui caro per medi-
am diuisionem excrescat, atque ingentes rursus inde dolores
non aliter quàm in paronychys nominauimus, pariat. Qua in-
cisione omnem prorsus ægro dolorem adimi cernes. Sequenti-
bus uerò diebus licet nobis succisam illam unguis particulam
leuiter attollere, uel unguis saniem excernere, ac rursus quasi
operculum quoddam subiectæ carni, quemadmodum memo-
rauimus, unguem imponere. Reliqua totius digiti
curatio, cum ad mitigandum, tum ad
discutiendum tendat.

Clauus callus est rotundus, colore candido, clauī capitulum referens, in omni quidem corporis parte, sed in pedum plantis ac digitis præcipuè concreescens, dolorem functionisq; incedendi impedimentum adferens. Circumscarificatus igitur, uulsellaque apprehensus scalpello acutiore, aut phlebotomo, radicitus eximendus est. Nonnulli etiam, ne reuascatur, candenti ferramento adurunt. Formica uerò cutis extuberatio quædam est parua, callosa, in orbem rotunda & crassa, latiori basi inhaerens, & in perfrictionibus sensum punctorum quarundam formicarum morsibus similem exhibet. Hæc etsi reliquum etiam corpus, plerunque tamen manus affligit. Quidam igitur, inter quos et Galenus existit, fistula durioris pinnae, cuiusmodi sunt ueterum gallorum, anserum, & aquilarum, in inum fortiter undique impressa, & circumtorta scarificare formicam præcipiunt, atq; ita radicitus tollere. Alij ænea, aut ferrea fistula idem faciunt. Recentiores contenti sunt, formicas scarificatas, specilloq; apprehensas, scalpello perinde atq; clauos excindere. Verruca uerò excrescentia quædam exigua in summa cute est, indolens, callosa, in orbem magna ex parte circinata, basi angusta, ut suspensa uideatur. Nomen uerò huic inditum est acrochordon, quod chorda summitati respondeat. Extensam igitur excrescentiam amputamus: sin minus, lino aut capillo constringimus. Nec me latet plerosque esse, qui tam has, quam commemoratas omnes eminentias frigido, ut appellant, cauterio consumperunt.

De telis extrahendis. Cap. 88.

Quod ea operationis manuum pars, quæ de extractione iaculorum agit, perquam maximè necessaria sit, uates Homerus his uersibus testatur:

Vir medicus multis alijs æquandus honore est,
Seu iacula excindat, seu lenia pharmaca adaptet.

De tes

De telorum tamen differentia primum est dicendum. differunt inter se quippe tela, materia, forma, amplitudine, numero, habitudine, & potentia. Materia quidem, quod ea quæ bastilia uocantur, alia lignea sunt, alia harundinea: ipsa uero tela aut ferrea sunt, aut ænea, aut stannea, aut plumbea, aut cornea, aut uitrea, aut ossea, aut harundinea, aut etiam lignea deprehenduntur. Tanta quippe differentia potissimum apud Aegyptios inuenitur. Forma autem, quoniam alia teretia, alia angulata, qualia sunt triangula: alia cuspidata, quæ & Gonchota appellantur: quædam tricuspidata, quædam spiculata, quædam spiculis carent. atque spiculatorum, alia retro uergentibus spiculis munita sunt, ut dum extrahuntur, contra infigantur: alia antierius spectantibus, ut propulsata idem faciant. Quibusdam utroque uersum fulminis instar spicula extant, ut dum extrahuntur, dumque propelluntur, corpus lanient. Sunt quæ mota cardine cuspides habent, quæ in impulsione contractæ, in extractione explicentur, atque ita telum educi prohibent. Amplitudo etiam uaria est: quoniam alia trium digitorum longitudinem implent, alia parua, ut unum digitum non excedant, quæ myia in Aegypto appellantur: alia media inter hæc reperiuntur. Numerus consideratur, quatenus quædam simplicia, quædam composita, tenuia siquidem ferramenta ipsis innectuntur, quæ cum in extractione delitescunt, in imo relinquuntur. Habitus forma quæ ea est, quatenus alia ferrum caudatum hastilibus infixum, alia hastile in ferri tubulum habent: ac quædam firmiter, quædam negligentius inserta sunt, ut dum euelluntur, intus separata remaneant. Potentia differunt, quatenus alia ueneno oblita, alia minimè sunt. Atque hæc telorum discrimina sunt. Locus nunc sermonem de extractione ipsorum postulat, siue in bello, siue extra bellum, sponte & inuito, quacunque de causa, & qualibet ex materia factis telis, quis uulneratus fuerit. Duplex igitur extrahendorum

telorum à carne modus est: unus per euulsionem, alter per impulsione[m]. ubi enim in summo telum impactum est, per euulsionem eximendum est: pari modo si altius infixum sit, opposita uerò pars, si aperiatur ex sanguinis profusione, uel ex aliorum membrorum consortio periclitantur. Propulsatu uerò utimur, cum & altè inha[er]sit telum, & parum admodum carnis ex obiecta parte superest, neq[ue] præterea neruus, neque os, aut tale quippiam diuisionem impediatur. Osse autem uulnerato, telum euulsorio modo eximendum est. Si igitur telu[m] in conspectu fuerit, indidem statim extrahendum: si lateat, ita Hippocrate autore faciundu[m] est. uulneratus, si modò poterit, in e[un]dem statu figurandus est, in quo erat cum uulnus acciperet: si nequeat iacens, saltem quatenus licet ad eam figuram collocandus est, specilloq[ue] explorandum: et si carni inha[er]eat telum, manibus extrahemus, aut eius impositorio quod etiã attractio appellat[ur], nisi exciderit quod ligneum plerunq[ue] esse consuevit. nam si excidat, forcipe dentibus uel radicibus eorum euellendis dicato extrahuntur. uel telorum extractorio, quod belulcum uocant, & alio quopiam instrumento ad id idoneo extractio molienda est: nonnunquam etiam carnem prius incidentes si uulnus instrumentum non admiserit. Quod si etiam in opposita telum processerit, neq[ue] possit ab ea parte qua infixum est, eximi, scalpello ab aduersa parte diuisa educendum est, uel euellendo, ut dictum est, uel protrudendo: uel instrumento propulsorio, si exciderit, demisso, ita, ne uel neruus, uel uena, uel arteria, uel tale aliquid incidatur. Turpe siquidẽ est, in extrahendis telis maiorem noxam, quàm tela effecerint, inferre. Si telum sit caudatu[m], quod specillo deprehenditur, propulsorij instrumenti faciem, si tubulum habebit, marem demitemus: atq[ue] ita ferrum inserto instrumento propellemus, donec educi possit. Si telum exemptum crenas quasdam habere conspexerimus, in quibus alia tenuia ferramenta potuerint inferri, specillo rursus immisso, si quid fuerit inuentum, simili ratione auferre.

auferemus. Si autem telum spiculis in oppositum uergentibus munitum, ut solet, non sequatur, uicinus ei locus incidendus est, nisi necessaria aliqua contigua pars impediatur, denudatumque telum liberantes, absque uulsiōe tollemus. Nonnulli uero exigua arundine cuspidibus tectis, nequid lacerent, ita telum euellunt. Quod si uulnus inflammatione caruerit, suturis usque, medicamento cruentis dicato curandum est: infestante autem inflammatione, fotu, cataplasmatibus, et consimilibus ei medebimur. In quibus autem uenenato telo uulnus inflicturn est, totam si fieri potest, carnem a ueneno mutatam praecidemus. ea facile cognosci potest, quoniam a sana carne differt: perpallida enim ac subliuida, quasi que mortua conspiciuntur. Ferunt autem Dacos et Dalmatas cuspidibus elenium et ninum appellatum oblinire, quae cum sanguine in uulnere commixta, interimunt: gustata uero, nihil nocumenti ipsis adferunt. At si telum ossi infixum sit, specillo rursum tentabimus: et si caro impediatur, hanc adimemus, aut diducemus. Si altius defederit, quod cognoscimus, si infixum telum nulla ui commoueatur, labatque ossis partem circumiectam scalpris comminuemus, circumcirca loco terebrato, maxime si os crassum sit, telum dissoluemus. Si porro pars aliqua princeps icta sit, puta cerebrum, cor, guttur, pulmo, iecur, uenter, intestina, renes, uterus, aut uescica: sique letales notae extent, neque sine cruciatu et magna uulsiōe queat fieri extractio, manum admoliri recusabimus, ne praeterquam quod nihil sumus profecturi, maledicendi et uituperandi occasionem idiotis exhibeamus. Quod si exitus fuerit incertus, praefati periculum manum admovebimus. multis etenim accidit, ut abscessu quoque in aliqua uitae necessaria parte oborto, praeter opinionem salutem consecuti sint, cum et iocinoris fibra et omenti pars aliqua uel abdominis membranae, quinetiam tota uulua saepenumero adempta fuisse sine mortis periculo perhibetur. Guttur etiam subinde in anginis de industria inciditur, quemadmodum de gutturis sectione dicebamus. Si igitur in huiusmodi

telum relinquatur, in praesentaneam mortem praecipitat, praeter quod haec ars, ab omni humanitate aliena aestimabitur, mors etiam certa sequitur: si eximatur, fortasse salus quaeque comitetur. Principum membrorum uulnerationem agnoscere difficile non est, ut quae ex accidentium proprietate, retrimentis, & loci affecti positura, deprehendatur. Uulneratis enim cerebri membranis, dolor capitis ualidus, oculorum incensio cum rubore linguae, & mentis error comitatur: si cerebrum quoque ictum sit, homo subito concidit, obmutescit, faciem peruertit, bilis uomitus, & sanguinis per nares auresque eruptio sequitur, albus insuper humor, & pultaceus per aurem emanat, sanies per uulnus, si exitus detur, profluit. Si in uacuas thoracis partes telum defigatur, si spaciosum sit foramen, spiritus erumpit. Si cordi impadum sit telum prope sinistriorem mammillam, id ipsum non uacuo loco, sed quasi ab altero exceptum apparet. Ac pulsatilem interim motum edit, sanguis niger, si exitum habuerit, effertur, extrema frigescent, sudor promanat, animus deficit, & absque dilatione interitus subsequitur. Pulmone uulnerato, si latum intus spacium est, sanguis spumans per uulnus effluit: si non est, per os euomitur: uenae cervicis inturgescunt, lingua colorem mutat, aeger multum inspirat, frigidi appetens. Si septum transversum ictum sit, telum iuxta spurias costas infixum cernitur, inspiratio magna cum gemitu & dolore per totum humeri spacium oboritur. Si imus uenter uulnus accepit, ex ijs quae per plagam efferuntur innotescit: si spaciola laxitas est, uel telo exempto, uel impositorio intus fracto, succus ex uentre redditur, ex intestinis sterminus egreditur, quandoque etiam omentum uel intestinum procidit. Vbi autem uesica uulnerata est, urina ex plaga descendit. In cerebri igitur aut membranarum eius uulnere, caluaria undique terebrata, telum educitur: perinde atque in capitis fracturis propediem dicitur. Cum thorax percussus est, nisi telum per moderatam intercostalem

stadium

Italiū incisionem sequatur, uel etiam una excisa costa, subie-
cto membranæ custode lamina, telum extrahendum est. In
eundem etiam modum in uentre, uesica, et reliquis quæ in imo
sunt particulis, si telum sequitur, citra negotium educitur: sin-
minus, rursum plaga facta curationem quæ cruentis congruo
it, adhibebimus. In uentre si opus sit, etiam eius suendi ratio,
qua de suprâ comprehensum est, accommodabitur: sed quum
in grandiore aliquo uase, uerbi causa, in intimis iugularibus,
aut soporarijs, aut magnis arterijs quæ sub alis, aut inguinis-
bus telum defixum, periculum sanguinis profluuij, si extra-
batur, minetur, debent uasa prius ex utraque parte funibus
constringi, deinde teli extractionem moliri. Quod si membra
compluria connexa inter se telo traiecta fuerint, exempli gra-
tia, brachio cum thorace coniuncto, uel cubito alicui alteri
corporis parti, uel cruribus inter sese, siquidem non per to-
tum utrumque membrum telum penetrauerit, aut hasta, eam
ab exteriori parte apprehensam, non secus quàm in uno fice-
ri consuevit, euellemus. Si utraque totaliter penetrauerit, me-
dium lignum prius serra in duas partes refectum, eas quàm
facillimè sigillatim extrahimus. Quoniam uerò etiam lapi-
des sæpe & buccinæ, uel plumbeæ glandes, uel similia quæ
dam fundis eiacula, tum ui, tum angulis quibus prædita
sunt, corpori intruduntur: cognoscenda autem sunt ea, quod
moles aspera & inæqualis, si contrectemus, subesse sentitur:
quodq; plaga non omnino recta, sed amplior, caro item con-
tusa ac liuida apparet, dolorq; cum grauitate infestat: cuncta
hæc uncis, aut calyculis, aut uulnerario specillo agitata reci-
pienda sunt. Extrahi, si fieri potest, etiam forcipe dentaria,
aut radicibus dicata, debent. Multis autem infixæ tela intus
latent, quæ uulneribus cicatrice obductis, deinceps
de multo post tempore abscessu circum-
eā partem facta & dirupta,
exilerunt.

De fracto

De fracturis, & quæ sint ipsarum differentiarum. Cap. 89.

Postquam de uitijs quæ in carne manus ferriq; præsidium
efflagitant, abunde docuimus; consequens est, ut de ossium
etiam fracturis, & luxationibus inquam, uerba faciamus, si-
quidem & ipsæ ex eo genere sunt, quæ manuum operationi
subijciuntur. Et iam à fracturis sumamus principium, atq; ab
ijs præcipue quæ in capite fiunt, partim quod medium hæc in-
ter eam quæ in carnē, & eā quæ in ossibus fit chirurgiam lo-
cū obtinet; partim quod caluaria omnes alias partes præce-
lit. Fractura igitur, uno uerbo, ossis est diuisio, aut ruptura, aut
discissio, à uiolēta quadam extranea occasione inducta. Cuius
plures sunt differentie. alia siquidem raphanatim, alia scan-
dulatim, alia unguatim, alia farinatim, alia iuxta refractionē
& abscissionem quoq; fieri perhibetur. Raphanatim quidē ru-
ptura ossis est, transversim per crassitudinem facta, quæ etiam
cucumeratim & caulatim, à fractorū cucumerum et caulū si-
militudine quibusdam nuncupatur. Scandulatim uerò ossis as-
sulatim in longitudinē scissi ruptio est. Unguatim ruptura os-
sis quædā est, quæ parte aliqua recta, in fine lunata efficitur,
quam etiā hirundinatum nonnulli appellant. Farinatim ruptu-
ra ossis est, cū id in multas minutim partes finditur, quæ ipsa
nucatum appellatur ab aliquibus. Refractio autem abruptio
est, partis alicuius ossis per summitatis rupturā detractio, sic
ut ablatum supernatet, atq; hæ fracturarum sunt differentie.

De fracturis in capite. Cap. 90.

Fractura in capite priuatim caluariæ est diuisio, quandoq;
simplex, quandoq; multifida, ab exteriori quadam uiolētia
inducta. Quæ hisce cōstat differentijs, fissio, excisio, effractio,
siue expressio, desessio, quæ engisoma, quasi corporum appro-
pinqvationem, dicunt; cameratio, & in infantibus contusio.
Fissio igitur caluariæ per summa est diuisio, uel etiam altior,
in qua ad exteriorem partem ossis offensi nulla fit commotio.
Excisio, caluariæ cum refractione ossis uitiati diuisio est: quod
si offensa

offensa pars à reliquo osse discesserit, dedolationem, apocse
 rnismon Græci nuncupant. Expressio est in multas calua-
 e partes effractio, in qua fragmēta quædam osium profun-
 us delapsa, cerebri membranam premunt. Desessio, quæ ex
 soma uocatur, caluariæ idus est, in quo os offensum à natu-
 ali situ ad cerebri membranam desidit. Cameratio caluæ est
 uisio, in qua partes osis affecti camera modo eleuatæ incur-
 untur, autore Galeno, & ad interiora recedunt, & concaui-
 ites faciunt, ueluti in ecpiemate: sic enim ille autumat. Sunt
 ui his etiam capillationem adnumerat. Est autem capillatio
 reuissima fissura, sensum plerumq; fugiens, eoq; subinde latēs,
 certam significationem non exhibet, mortisq; causam adfert.
 Collisio uerò thlasis appellata, osis diuisio nō est, eoq; neq; fra-
 ctura rectè dici potest, sed osis caluæ ad interiorē partem im-
 pulsio & quasi inflexio, citra continuitatis diuortium conca-
 uitatem efficit: quemadmodum in æneis coriaceisq; uasculis,
 i foris percutiantur, licet cernere. Collisionis huius binæ ha-
 bentur differentie. uel enim os caluum per totam affectionem
 uam colliditur, sic, ut frequenter cerebri membrana recedat,
 ut comprimatur à caluaria ex toto penitus: uel non ex toto,
 sed extrinsecus dūtaxat in densa superficie ad duplicationem
 usque deprimitur. Quidam his speciebus resonationem, ape-
 chema, quasi ab echo responsione dicas, addunt: quæ est, ut ipsi
 aiunt, à contraria idus parte facta caluariæ ruptio, sed fallun-
 tur. neque enim perinde atque in uitreis uasculis, ita in capite,
 ceu illi docent, fieri solet: illa siquidem uacua sunt, id patiun-
 tur. Caluaria autem undique plena, & alioqui solida est, eue-
 nit in hoc idu ut multis alijs in partibus, non solum ubi plaga
 conspicitur, ut cadendo fit, in quo integra cutis cōtinuitate fa-
 cto abscessu, sed eoq; fissura in conspectum uenit, à contraria i-
 dus parte eam extitisse autumant. Ipsa tamen caluæ rimula,
 haud aliter atque superior curatur. Si igitur fractura capitis
 facta fuerit, cognosci poterit tum ex eius quod percussit cor-
 pore,

sio

PAULI AEGINETAE

pore, si acutum fuerit, aut graue, aut durum, & uiolento impetu impadum. Item ex ijs quae isto homini superueniunt, puta uertiginibus, uel obmutescencia, uel subito collapsu, praecipue in Engisomate, uel collisione, uel expressione, uel in interiorē partem facta cerebri cameratione. Ex notis item sensui expositis id licet percipere. nam si cutis latior fuerit discissio, per ipsam manifeste cognoscemus: si autem non per totum plaga ierit, uel angusta sit, fradum tamen os esse suspicemur, aperta cute, partim oculis, partim specillo depresso explorabimus. Si aliqua alia fradura fuerit, extempore deprehenditur: si autem fissio tenuis ac capillaris sensum fugiat, medicamento aliquo nigro, liquido, uel scriptorio etiam atramento superfuso, os rademus. ipsa nanque fissio nigra ostenditur: rasuraeque tantisper insistendum est, quousque ad uestigium fissurae euanescat. Si ad cerebri usque membranam plaga peruenerit, omissa rasura utrum membrana ab osse recesserit, an etiam dum affixa permaneat, considerandum est. Si enim manserit membrana, mediocris inflammatio uulnus affligit, aeger febris paulatim liberatur, & pus maturum apparet: si recesserit, cruciatus augentur, & febris similiter, os alio colore tingitur, pus tenue & incoctum fertur: & si negligat medicus, nec statim perforatione utatur, grauiora his accidentia superueniunt. uerbi gratia, bilis uomitus, conuulso, delirium, & acuta febris, quibus manuum administratio recusanda est. At si his absentibus membrana non recesserit, fissio autem sola sit, etiam solo rasorio scalapro, quanquam in altum usque penetret, curari potest. Si autem ad laminam usque secundam (quam diploen dicunt) fradura descenderit, eo usque etiam deradendum est, uel os fradum, ut postea docebitur, detrahendum. Si in minutas partes os comminutum sit, etiam has accuratè instrumento accommodato similiter auferemus, etiamsi membrana non abscesserit. Principio autem cum uulneratus in manus tuas uenerit,

LIBER SEXTVS.

311

hyems sit, ante decimumquartum diem: si æstas, ante septisimum, omnino os summo studio detrahito, priusquam præfatio accidentia eueniant. Manuum autem curationem admoliri oportet in hunc modum: detonsis prius super uulnus capitis, binas lineas ad rectos angulos se inuicem ad X literæ figuram transuersum secantes, incidemus. quarum tamen alteram se conuenit, quam pridem acceperis: deinde in uertice quas or angulos excoriantes, ut totum os quod terebratum est, nudum compareat. Si quidem sanguis fertur, linamentis posita madentibus, uulneri obiectis, comprimemus: sin minus, cecis. Post hæc linteolo plicato, ceneleo imbuto, superimposito, conuenienti deligatione utemur: postero die, nisi quid noui superueniet, quod præpediat, ossis uitiosi perterebratio agrediunda est. Collocato itaque homine in sedili, lecto ue, rorut uulnus desiderat, auribusque ipsius lana obturatis, e appulsus sonitu uexentur, uinculum aliquod uulneris sollemus, exemptis que linamentis omnibus, et spongia loco uniusque detererso, famulis mandabimus, binis ut fasciis quibusdam tenuibus circumpositis, quatuor cutis quæ fracturæ inuoluit angulos, attollant: et si quidem os ipsum uel natura, uel ex fracturæ uitio infirmum fuerit, diuersis inter se scalaris excidendum est: primum scalpris, quos Cycliscos dicunt, adhibitis, à latioribus auspicientes, ad angustiores subinle transientes: deinde specillis excisorijs sensim malleolo addatis, ne capitis concussione laborans molestetur. Si autem os ualidum sit, eo prius terebri genere quod mergi non potest, perforabis. (Eiusmodi uerò existunt, quæ paululum supra nuchæ eminentias quasdam habent, quibus demergi in cerebri membranam prohibentur.) Postea scalprorum circumscriptione adhibita, os uitiatum, non totum simul, sed particulatim digitis, si quidem fieri potest: sin minus, dentaria, aut ossaria forcipe, aut capillaria uulsella, aut eiusmodi quodam instrumento, auferemus. Tantam autem inter foramenta spaciunselinque

relinqui debet, quanta est mucronis specilli uel maximi longitudo: altitudo uero eò usque descendat, quo ad interiorē ossis superficiem accedat, diligenti cautione adhibita, ne terebra membranam attingat. Quam ob rem terebra quæ ad ossis crassitudinem accommodata fit, est sumenda, cum pluribus id genus ad hoc præparatis. Si autem caluariæ fractura dupliciter secundam uel laminam non excesserit, ad hanc etiam tantum terebra adigenda est. Osse iam exempto, asperitatem caluariæ quæ ab excisione prouenit, scalpro aliquo uel rasorio, uel excisorio laeuigabimus. Lamina tamen quæ membrana custodita est subiecta, & ossiculis, si quæ ut par est, remanserint, aut spiculis diligenter collectis linamenta inferemus. Hic communiter simul & expeditior, periculoq; uacans chirurgiæ modus est. Mirum etiam in modum à Galeno cōmendatur illa, quæ per lenticulatum excisoriū scalprum fit, curandi ratio, si absq; terebratione post insculptionē caliculatis scalpris factam, adhibeatur. Tradit enim ad hunc modum: Vbi autem unam semel partem denudaueris, scalpellus inijciendus est, qui in cuspide de lenticularem eminentiam retusam leuemq; habeat: aciem uero per lōgitudinē erectā, atq; ita lata lenticulæ parte supra membranam defixa malleolo adigendus est, caluariaq; ita diuidenda. hoc quippe modo agentibus, quæcunque desideramus eueniēt. nam et membrana etiam dormitante medico, uiolari non potest, cum sola lata lenticulæ parte attingatur. Quod si alicui ossi adhæreat, sine ulla molestia resoluitur rotunda lenticulæ extremitate, quæ ueluti præuid à tergo caluariam excidens scalper subsequitur. Proinde neq; tutiorē, neq; celeriorē perforandi modū hoc inuenias. Sed quæ ferris & modiolis instrumentis à recentiorib. perficitur, ceu noxia improbat ad ministratio: ad hæc, quam de fisione exposuimus, commendatur. idem uero modus ossa excidendi, reliquis etiam caluariæ fracturis conueniet. Quantum uero ossis excidendum sit, idem Galenus nos docebit, aperte ita perhibens: Quātum uero ossis

uitiati

lutiati excidere conueniet, deinceps explicabimus. Quod uehementer contritum est, id totum auferri debet: si uero ab ipso rimæ quædam ulterius excurrant, quemadmodum accidere nonnunquam assolet, non erunt ad extremum usq; persequenda: probe sciētes nullam, ex ijs noxam euenturam, si reliqua rite fuerint administrata. Secundum manuum operam linteolo simplici, uulneri æquali, rosaceo imbuto mēbranam cerebri operculabimus, exiguumq; supra id lanæ floccum rosaceo similiter irriguum imponemus, deinde duplex linamentum œnelæo aut ipso etiam rosaceo madens toti uulneri superaccommodabimus, studiosè obseruantes, ne cerebri membrana grauetur: postea latiore deligatura, neq; ea multum stricta, sed ut linamēta modò retineat, utemur. Viētus qui inflammationem sedat, & febrientibus peculiaris est, exhibetur, mēbrana cerebri subinde interim rosaceo madefacta. A tertio die, resolutis fascijs, sordibusq; spongia deterfis, medicamentis cruentis uulneribus dicatis, inflammationemq; rebellentibus utendum est, membranæq; aliquod ex cephalicis nūcupatis aridis, quoad carne oppleatur, superaccommodandum. Os quoq; interdum radendū est, si res id exigat, uel ob eminentes aliquas spinosas summitates, uel etiam propter celeriore carnis productionē. Reliqua insuper remediorum materies, perinde atq; in uulnerib. explicitū est, adhiberi debet.

De cerebri membranæ inflammatione. Cap. 91.

Vandoquidem autem sæpenumero post manuum & scalpelli operam cerebri membranam tanta perculit inflammatio, ut non modò caluariæ crassitudinem, sed cutem etiam ipsius cum renitentia quadam trāsgrediatur, & naturali ita eius pulsatili motu impedito, compulsio potissimū, aliq; grauius accidentia, uel ipsa etiam mors subsequitur. Experitur autem inflammatio uel ob obis spinosam quandam eminentiam pungentem, uel ob linamentorū grauitatem, uel propter perfrictionem, aut nimium cibi esum, uel uini potionem, aut alia

Kk quapiam

quapiam incerta occasione. Siquidem ex certa & euidēti occasione proueniat inflammatio, ea confestim amputanda est: sin ex abdita & incerta, maiore contentione incumbendum est, sanguinis uidelicet dimissione, si nihil præpediat, et uictu ad inflammationem congruo. Localia insuper remedia adhibenda sunt, calidi nempe rosacei fots, & ex altheæ, aut fœnogræci, seminis lini, chamæmeli, & similium decocto. Cataplasmata etiam ex cruda polenta, aut semine lini cum præfato decocto, & adipe gallinaceo accommodanda sunt, fomentumq; ex lanis insuccatis, capiti, ad hæc & occipitio meatui que auditorio oleum aliquod inflammationem arcens instillabitur. Viscerum quoq; cataplasmatibus admotis, totiusq; corporis habenda est ratio, aquæ calidæ balneis & unctionibus, ut par est, adhibitis. Si his inflammatio non sedatur, & nihil obstiterit, bilem educente medicamento purgare ipsos Hippocrates imperat.

De nigrefacta cerebri membrana.

Nigrefactæ porrò cerebri membrana, siquidē in summo ex medicamento aliquo in id efficaci nigruerit, tribus mellis partibus cum rosaceo miscentes, & linamēta superadaptantes medebimur, & reliqua etiam consentanea exhibentes. At si nigrities sponte inducta sit, & altius, præcipue cum alijs grauibus notis descendat, certè conclamatū est. insiti namq; caloris mortificationem insinuat. Notus autē mihi quispiam fuit, qui post annū quā affectus esset, caluaria exterebrata euasit. Erat enim fractura in syncipite ex sagitta illata, quæ emissarium habebat, per quod cerebri membrana inoffensa conseruata est.

De naribus fractis & contusis. Cap. 92.

Narium inferior pars, cū cartilaginosa sit, non frangitur, sed contunditur, sima redditur, et distorquetur. Superior uerò, cum oſea sit, frāgi quandoq; solet. In his deligaturam respuit Hippocrates, ut quæ resinum efficiat & distorqueat:

ni

nisi in medijs naribus ex appulsu quippiam emineat. tūc enim competentem deligaturam cum medicamēto imposito admittit, eo quod compressus ea parte nasus naturalem figuram recipiat. Collisis itaque inferiore parte naribus, indice aut minimo digito subiecto, extrinsecus in situm suum redigantur. In posteriore specilli nucleo oliuari idem faciundum est. Statim à primo die, uel non multo post. Quoniam decimum circa diem narium ossa indurescunt, forisq; indice ac pollice utrinq; conformare cōgruit. Vt autem formatio, quā instituis, figurā suam conseruet, duo intorti cuneoli ex molli panniculo naribus imponantur, unus singulis, etiā si altera tantum naris pars distorta sit: atq; n̄ tam diu permittēdi, donec os aut cartilago corroboretur. Nonnulli tamen pinnas anserinas panniculo cinctas naribus insinuāt, ut figura custodiatur, & respiratio minime impediatur: quod necessarium non est, cum spiritus per os trahi ualeat. At si nares inflammationē experiātur, emplastrum aliquod ex his quæ inflammationes arcēt, imponamus: uerbi gratia, quod ex succis constat, aut oxelæo, aut id genus quippiā. Vel cataplasmata ex triticea simila cum manna, aut gummi decocta superaccommodemus, quibus inflammatio arcetur, & nares continentur. Si in alteram partem nares distortæ sunt, Hippocrates post congruam conformationem oblongam habenulam digitali latitudine circūdari præcipit. alterum habenæ extremum taurino glutino aut gummi illitum, summitati narium ex latere quo inclinant adglutinari: quod ubi exaruerit, habena ultra oppositam aurem occiput uersus & frontem ducta, demum sub altero habenæ capite affirmatur, ut retractæ in latera naris mediam figuram dirigantur, quod non admodum recentioribus arrisit. Si porro narium ossa minutim fuerint confracta, diuisio uel ampliatio faciendā est, fragmentis que ossiculorum uulsella extractis futuris partes diductæ committentur, remediaq; conglutinantia cruentis dicata inijciuntur. Si autem inter

nares hunc excitatum fuerit, huic linamenta in longitudinem
implicata, medicamine delibuta medentur. Quidam etiam plumbis
beis canalibus quoad cicatrice obducta sanescat locus, uti con-
sueverunt, ne ex hunceribus caruncula aliqua superincrescat.

De inferiore maxilla confracta, & aure collisa. Cap. 93.

Super auris contusione, tanquam huiusmodi affectio inter
fracturarum numerum non sit, tertio volumine traditum est.
Maxilla autem inferior pluribus de causis rumpitur. Si igitur
tur extrinsecus solum oblata, non caulatim reuulsa fuerit sic,
ut introrsum cauetur, eius expedita quidem est cognitio, sed
alterius manu opus est. si quidem dextra maxilla fracta fuerit,
dextra: si sinisterior, laeva. Indice igitur, et medio digito in os
affecti coniectis, interiorum fracturam gibbum foras scite con-
pellere competit, altera manu extrinsecus id excipiente. Ma-
xillam uero in suam sedem restitutam, ex eiusdem dentium æ-
qualitate coniungere oportet. Quod si in transversum fracta ma-
xilla fuerit, primum quidem tensione, deinde retractione usus
famulo eam retro continente, quemadmodum relatum est, dirige-
to. Dentes qui in parte confracta diducti sunt mutuo, ut Hippo-
crates quidem tradit, auro, hoc est auro filato, seu aureo lino,
chrysolino uel chrysonemate nuncupato, deligandi sunt. Quan-
do quidem autem non cuius huius copia datur, lino aliquo ual-
lido, uel bysso, & seta equina, aut id genus aliquo inuicem com-
mittantur. Quod si fractura cum huncere contigerit, specillo
explorandum, num qua ossis fracta sit abruptio. Si qua exigua
sit plaga fragmentis ossis siue unum, siue plura remanserint,
idoneo instrumento exemptis, suturis plagæ oras committe-
mus, & medicamentum cruentis dicatum supra deligandum
est. Sin autem citra hunc fractura constiterit, simplici tan-
tummodo cerato maxillæ superaccommodato, conuenienti
deligatione deuinciemus ad hunc modum. Fasciæ medio in o-
cipite collocato, habenulæ utrinque ultra aures ad summum
mentum dispensantur, inde iterum ad occiput: mox inde sub-
mentum

mentum reuoluuntur, postea per genas ad sinciput, indeq; rursus infra occipitium distribuentur, ubi desinere deligationem oportet. Postquam alterum rursus uinculum fronti circumdatum, à posteriore capitis parte cōiungetur, ut omnes has prædictas deligationes cōstringat. Alij uerò leuem ferulā, quem admodum aliq; alutam paris longitudinis maxillæ imponentes, ut dictum est, deligant. Alij eo deligationis genere, quod phorbiam Græci, capistrum latini nuncupant, utuntur. At si utræq; maxillæ in summo mento ea in parte qua inter se coeunt, contractæ fuerint, manibus ambabus paululum inuicem diductis, prorsus ita inter se coaptentur, & dētes, ut diximus, aduniti deligentur, conuenientiꝫ deligatione adhibita, tenuibus cibis ac sorbitionibus ægrotantem uti præcipito, quoniam manducatio ipsi perniciosa est. Si quid loco suo motum esse uidebitur, tertio die resolues, ac iterum deligabis: atq; ita tam diu facies, quoad callus concreseat. Maxilla uerò quoniam laxa ac medullosa existit, intra treis potissimum septimanas callo glutinatur. Quod si inflammatio aliqua accesserit, nihil neque ex fomentis, neque ex cataplasmatibus aduersus hanc idoneis prætermittendum est. Id quod in omnibus ex æquo obseruandum esse ducito.

De fracta clauicula.

Cap. 94.

Clauicula quæ iugulū dicitur, naturali situ, interiore suo capite pectori cōmittitur, exteriori humeri articulo innectitur: eoꝫ si humerum uel etiam ipsum brachium sustineat, si fracturam qualibet in parte experiatur, qua humerum suum spectat, magna parte infra interius extremum, à brachio tractū, inclinatur. Satius autem est, caulatim potius quam scandulatim, seu harūdinatim clauiculam frangi, plurimorum opinione. Nam quod transversim fractum est, facile extensione & digitorum compressione in naturalem sedem reuertitur, reliqua semper quid eminentiæ habet, quod ægre coaptari potest. Si igitur per totam crassitudinem quocunq;

Kk 3 modo

modo fracta sit, duo famuli, alter ad humerū, qui fracta clavicula adiacet, utrisque manibus apprehensum, in anteriorem partem simul & superiorem partem attrahat: alter oppositum humerum, uel certe collum reducat, ut extensionem molietur: tunc medicus suis digitis fracturam componat, prominentiora propellendo, ima foras attrahendo. Quod si maiori opus retractatione fuerit, orbiculo prægrandi ex panniculo aut lana præparato, uel eiusmodi aliquam turgidam molem alij subiciens, ebitus aduerso lateri adigendus, reliquaque ueluti relatum esse exequenda. Si id fieri non possit, extremum iuguli iuxta humerum in imo situm ad summum, resupinato homine educemus dorso eius mediocri quodam puluillo subiecto, utrosque humeros deorsum ministro deprimente, quo in alto existens iugulum os sursum reuocetur: deinde digitis conformanda fractura est. Si partem iuguli aliquam abruptam, loco suo dimotam ac pungentem percipiamus, scalpello contra incidi debemus fragmenta que inde eximenda sunt, reliqua scalpri, si membrana custode lamina, aut alio scalpro quo firmari etus queat, ossi subiecto, complananda sunt. Si inflammatus defuerit, futuris: sin minus, linamentis utendum est. Et si diuersimode preparatis, maiora ex eis & crassiora a prominentis ossis inclinationem superaccommodabuntur. Si inflammatio urgeat, oleo madentia: sin aliter, sicca. Tum conueniente ex lana globo confecto propter alam subito congrua deligatio facienda est, fascia per axillas, affectum iugulum, scapulasque commodè circumducta. Si quidem paracavicula humero proxima, ad inferiora tetenderit, latior habenula media ex parte cubiti gibbero subiecta, totum brachium ex ceruice suspendendum est. Altero uinculi dimidio manu etiam suspensa, quemadmodum in his fieri consuevit quibus sanguis à summa cubito detrahatur. Si superius tetenderit, quod rarum est, omissa brachij suspensione, aeger supinus collocandus est, tenui que uictu nutriendus. Aliquando etiam

si opus sit

si opus est, asperginibus adiuuabitur, sed cum modo, usq; dum callum contrahat: uiginti namq; diebus ad summum clauicula ferruminatur.

De scapula.

Cap. 95.

Capula lata pars, qua mensæ figuram sortita est, minime sfragitur. Iuxta spinam uerò fracturam interdum admittit, nunc expressa, nunc simpliciter rupta, aliàs etiā abrupta. Expressionem igitur tactuprehendimus, cum sinus ea in parte occurrat, torporem uicino brachio & pūgentem dolorem inducit. Ruptio, ex loci asperitate si attrectetur, ex dolore cognoscitur. Vtrisq; autem curatione inflammationibus dicta subueniendū est: abruptio etiam ipsa tactu deprehenditur. Osse enim immoto suo loco quiescente, conueniēti fascia perse committitur: commoto autem eo, & carnem pūgente, per sectionem extrahitur: & sutura, ut dictum est prius, adhibetur. Vincula autem, hic etiam sicut in iugulo, inijcienda sunt, decubitus uerò in oppositum latus congruit.

De pectore.

Cap. 96.

Media pectoris pars diuiditur & exprimitur, summumque ipsius etiam refringitur. Ruptionē igitur distortam, dolor loci, inæqualitas & strepitus ad digitorum innixum, comitatur. Expressionem uerò arguunt, dolor uehemens, spirandi difficultas, tussis, membrana succingente disuncta, interdum etiam sanguinis eductio, fracti ossis cavitās & conuexitas. Hic quoque curationem eandem, quam in scapula fracta tradidimus, adhibere conuenit. In expressione tamen modus reponendi iuguli, quod foras processerit, in interiorem partem, ab Hippocrate proditus, adhibendus est: per decubitus resupinatum, dorsoq; cervicali subiecto, scapulisq; depressis, ita, ut costæ manibus utrinque compressæ simul cogantur. Iam uerò lana lateribus obiectis deligationem orbicularem adhibeto, subditis prius in rectum binis habenulis, quarum postea capita inuicem ad humeros fascijs excipiuntur.

Kk 4 tur,

tur, quæ ne circularis illa fasciatio delabi possit, prohibeant.

De costis. Cap. 97.

EX costis quæ spathæ etiam nuncupantur, ossæ quidem una
 ediquaq; fracturam sustinent. Nothæ uerò in ea solum quæ
 spinæ adiacet parte, quod ibi ossæ tantum: in exteriori parte
 qua in cartilaginem degenerant, colliduntur, nullam uerò ru-
 pturam experiuntur. Notio ipsarum admodum expedita est.
 inæqualitas etenim loci, strepitusq;, & ad partem fractam
 peruersio, digitis explorantibus succurrit. Quod si interius
 declinauerint, dolor acris pungitius urget, grauior sanè,
 quam qui in costis sentitur. quoniam hic aculei modò subcin-
 gens membrana conuulneratur, difficilisq; spiratio, tußis, sæ-
 pe eruptio etiam sanguinis comitatur. Reliquas igitur oma-
 nes costarum declinationes digitis componere licet, præter
 eam quæ interius spectauerit, cū nulla intendi detur facultas.
 Vnde uberioribus & flatulentis cibis quidam utendum præ-
 cipiunt, quo ex uentris inflatione ac tensione fractura foras
 propellatur, quod necessarium non est. Nihil enim commune
 est, quantum ad hoc attinet, thoraci cum uisceribus nutritato-
 rijs: ut taceam interim, quod inflatio ex repletionem augetur.
 Sunt qui cucurbitulam applicant: quod à ratione alienū non
 esset, nisi corpora ex contractione humorū collecta, fractum
 os interius magis propellerent. Quocirca Soranus sic tradit:
 lanis oleo calido imbutis partes operiantur, deinde intercosta-
 le linteolis implicitis impleatur, ut plana per orbicularem cir-
 cumductum ueluti in pectore fiat fasciatio. Cuncta autem
 perinde atq; in lateris dolore, pro amplitudinis ratione fieri
 debent. Quod si necessitas aliqua compellat, ex nimia mem-
 branæ costas succingentis punctura, diuidenda eo in loco cu-
 tis est, fractaq; costæ pars detegenda: deinde subiecta custode
 tunica, ne ea feriat, costam accuratè excindere, pungētiaq;
 fragmenta educere expedit. Post hæc, si inflammatio desit,
 coniungere, & cruentorū modo curare competit. Si inflam-
 matio

matio adsit, linamentis oleo madentibus conteges, alimenta
& medicamenta quæ inflammationem arcent, exhibebis.
Decumbant ægri modo quem leuius perferunt.

De coxendicibus, pubis ossibus. Cap. 98.

Oxarum aut ilium ossa rarius quidem rumpuntur, sed
Ceasdem quas scapulæ fracturarum differentias subeunt.
franguntur enim iuxta fines, & per longitudinem abrumpun-
tur, & in medio finduntur, seu exprimuntur. comites ipsorum
sunt, dolor loci, punitionis pulsusq; sensus cruris repentinus,
facta expressione stupor, adaptationem eadem cum scapulis
requirunt, præterquam quod in abruptionem, incisionem, fra-
gmentorumq; exemptionem ob exteriorum corporum peris-
culū auersantur, ut quæ si opus sit, digitis coaptari possit. De-
inceps autem etiam aliam curationem moliri consentaneum
est, asperginibus utendo, & illorum cavitates linamentis du-
plicibus replendo, quo fasciatio orbiculariter æquabilis effi-
ciatur. Badem de pubis ossibus dicenda sunt, cum nihil pecu-
liare habeant quod memoretur.

De uertebriis, spina dorsī & osse sacro. Cap. 99.

Vertebrarum noduli contusionem aliquando, raro fractura
ram sustinent. Spinalis medullæ igitur membranulis com-
pressis, uel ipsa etiam medulla, nerui per consensum afficiun-
tur, & pernix obitus subsequitur, præcipue si iuxta ceruicis
uertebrias acciderit fractio. quare medici officium est, pericu-
lum prædicere, siquidem fieri potest, audere etiam: factaq; se-
ctione osiculū, quod comprimebat, auferre: sin minus, aliqua
saltem ratione qua arcetur inflammatio, malum lenire. At si
aliquis uertebraꝝ processus, unde extuberatio ea quæ spina
propriè nuncupatur, constat, abruptus fuerit, quod digitis
tentantibus intelligetur, ossis fragmento promptius huc illuc
sublabante, motu ac transpessitu. Oportet autē hoc quod fra-
ctū est, incisa foris cute eximere, suturisq; adhibitis, præsidio
vulneribus dicato adesse. Si uerò os sacrum fracturam expe-

Kk 5 riatur,

riatur, indice sinistrae manus digito in anum demisso, dextera manu fractura, quatenus licet in naturalem figuram componenda est. Si quid abruptum sentiat, hoc quoque similiter per sectionem diuisum auferendum est; apposita fasciatio, cui ratioque adhibenda est.

De brachio. Cap. 100.

IN brachio fracto Hippocrates quidem intentionem ita molitus est. Oportet, inquit, lignum praelongum columella instar, summis capitibus fune excoptum de trabe aliqua transuersum suspendere: deinde collocato in alto aliquo sedili laborate erectius, uel ea saltē figura, quae recta ceruice dormiendi occasionem praebet, quam orthocatheuton dicunt, manum ipsius unā cum brachio supra id lignum traducere, quoad medium ligni alae eius per transuersum inferatur: manuum autem cubito ad rectum angulum inflexo, famulum procumbens sustineat: deinde pondere aliquo graui, uerbi causa, lapide, uel plumbo, uel istiusmodi aliquo, ex cubito suspensio, ita, ut sublimē depēdeat, sic fracturam conformare conandum est: uel famulus in poderis uicem brachium deorsum trahat. quidam etiam loco columellae scalarum gradu usi sunt. Soranus uerō ita scribit: homine in sedili collocato, uel, quod praestat, resupinato, ne molestia afficiatur aliqua, manuque ipsius iuxta articulum quo cum brachio connectitur, fune deligata, & ex ceruice suspensa, ita ut angulosa figura seruetur, famulis duobus praecipimus, huic ut supra fracturam, illi infra, manibus correptum brachium in diuersa contendat. Quod si ualētior opus sit extensione, duos aequales funes, unum supra, alterum infra fracturam brachio circumligabimus: eosque famulis alteri ad caput, alteri ad pedes egrotantis consistenti praebentes, in diuersa distendere iubebimus. Quod si summus humerus fractionem patiat, mediam habenam, quae ciria uocatur, alae subiectam minister à capite stans contineat, alter in oppositum trahat: atque ita, quemadmodum praedictum est, extensionem

extensionem in diuersa, quam antitofin dicunt, perficiemus. Quemadmodum si gibberus cubiti fracturam senserit, tum ipsi uel brachiali, quem carpum uocant, funis injiciendus est. Osibus iam prope compositis, distentio remittetur, sed iuxta legem Hippocraticam deligabitur. Si fractura inflammatione caret, & recens sit, nudis fascijs oblongis utendum est, trium aut quatuor digitorum latitudine, aqua aut posca irriguis. Si inflammatio urget, lanis tenuibus & mollibus oleo madefactis. Et si quidem in medio brachio fuerit latio, prior fasciatio supra fracturam injicietur: ubi bis aut ter ligaueris, fascia sursum uersum uoluta, ut (quemadmodum tradit) sanguinis influxiones excipiantur ac desinant. Secunda porro fasciatio adhibenda est, quæ similiter supra fracturam orsa, per omnia eodem modo ut prior fiat, præterquam quod supernè deorsum tendere, atque iterum sursum debet, inibi que terminari: utraque tamen constructio moderata, & ad nostrum sensum, & ad ægri iudicium esto. At si iuxta summum humerum fractio contigerit, prior fascia cum ipse humerus, tum scapulæ & pectus comprehendantur, ut deligatura gruuarum appellata fiat. Secunda ad cubitum usque ducta, atque inde item ad supraposita reducta, tam humero, quam scapulis & pectori, primæ fasciæ similiter injicienda est. Quod si cubitus fracturam acceperit, idem erit, ita ut anguli figura conseruetur, deligandus. Pari etiam in alijs quoque artubus modò, cubitis inquam, femoribus & tibys. nam cum fractura in parte uel iuxta etiam articulos, & non in medio membri deuenit, post articulum fasciatur. Recentiores igitur à fasciatione statim feculas superinijciunt, ita ut figura aptationis contineatur, astringuntque ipsas cum ad sensum, tum ad inflammationis tumorem. Prisci uerò post diem septimum ferulas accommodarunt: intra enim hoc spacium inflammatione remittente, membrum tenuius efficitur. Quinetiam Hippocrates tertio quoque die ligamentis
ta res

ta resolui præcipit, ne si præter solitū diutius opertæ sinantur
 particule, intendantur, uel dimoueantur: uel eius quod iam in-
 fixum fracturæ sit, difflatio prohibeatur. Vnde non noxia se-
 lum prurigo quibusdam obuenit, sed saniei etiam acrimonia
 erosa, interdum in cute ulcus concitatur. Quocirca locus tan-
 tum aqua temperata foueri debet, quantum ad saniem discus-
 tiendam abunde uidetur. A septimo uero die ex maiore inter-
 uallo resolucendum, tanquam particule saniem amplius ex-
 æcernere non gestiant, quin & in callum obduratio hoc pacto
 melius prouenit. Ferulæ autem ad hunc modum injicienda
 sunt: panniculos triplices oleo madentes fascijs circumdamus:
 siquidem membrum crassitudine fuerit æquale, æqualiter:
 si inæquale, ita, ut cauis partibus magis panniculis repletis,
 membrum æquale undiq; ad suscipiendas ferulas reddatur.
 Deinde lana aut stuppa ferulas mediocriter inuolutas fractu-
 ræ orbiculariter circumdamus, nō minori quā unius digiti
 spacio inter se distantes, leniterq; astringemus: cura diligen-
 ter, quatenus fieri potest, adhibita, ne articulus aliquis, præ-
 fertim iuxta interiorem flexus partem, attingatur. hucera
 enim in ipsis nonnunquam & neruorum inflammationes,
 procreant. Sed laxiores illic esse conuenit, quemadmodum
 & ualentiores in quam partem fractura inclinat. Sati-
 us autem fuerit, ad thoracem brachium leniter deligare, ne mo-
 tum de figura recedat: si quando inflammatio urget (quæ
 ex ambiente tumore ac rubore, tū ex eo quod membrū nunc
 multo magis quā prius coarctatur, colligitur) uel si confractum
 membrum distortum sit, & nihil horum cōpareat, sed
 fasciatio tantū laxior, uel e contrario strictior, quā debeat,
 inueniatur, resolutis his deligatio instauranda est. Supinus
 itaq; laborans reclinandus est, manu supra stomachum posita,
 molli aluta brachio subiecta, ut infusiones excipiat. Insper-
 gatur autem quotidie oleum calidum, præsertim si infestat
 inflammatio. quo etiam tempore cibus tenuis exhibendus,
 postea

postea plenior, ad calli generationem. Quiescendumq; donec membrum confractum, callum obduxerit, occallescit autem am brachium, quàm tibia, intra quadraginta dies. Post quos esoluendum est, & lauacro utendum, emplastrisq; ad fractus accommodatis, reliqua curatio prosequenda. Hæc utique administrationis ratio omnibus alijs ferme cōfractis artubus ptime congruit.

De cubito & radio.

Cap. 101.

Vbitus & radius nunc quidem uterq; simul, nunc alter solummodo frangitur, idq; uel in medio, uel in parte qua flexum spectat brachij, uel iuxta brachiale. Omnium potissimum tamen, cum simul franguntur. Post hoc, si cubitus solus. Curatio enim facilius omnium admittit fractus radius. nam quamuis maior cubito sit, habet tamen ipsum suppositum, in quo uelut subsideat. At si alter ipsorum duntaxat comminutus fuerit, in parte ualentioris intensionem moliemur. Si uterq; æquali modo intendemus, inflexa manu ad angulum rectum, ut pollex omnium digitorum altissimus, minimus contrarius, digitus omnium infimus habeatur: sic enim cubitus quoq; radio obicietur. Quod si potentiore intentione opus sit, utrisq; præsertim ossibus fractis, non manibus tantum, sed habenis etiam tendere, ut de brachio relatum est, adgrediemur. Cæterum omnis deligatio, & reliqua præsidia uera, cum ferularum iniectione, usque dum ossa callus obfirmarit, adhiberi debent. Firmantur autem cubiti ossa maxima ex parte triginta dierum spacio. Restauratioq; & collocatio eadem erit cum quam brachium confractum uendicat, exceptis ijs quæ subijciuntur.

De summa manu, ipsiusq; digitis. Cap. 102.

Alma & aduersa eius partis, digitorumq; internodiorum ossa, quum rara fistulosaq; natura sint, collisionem quidem plurimum, fractionem uerò rarenter experiuntur. Labore igitur in altiore sedili collocato, in aduersa quapiam altera

tera sede æquali sedens, imperatoris munere, priusquam manum disponat, fungere: particulisq; confractis per famulum extentis duobus digitis pollice nimirum & indice, pertractare prius ipsas atq; conformare, mox fasciationem adhibere eo potissimum tempore quo urget inflammatio. Nam propter raritatem facile in ipsis nimius callus superincrescit. Si inter nodium aut digitus simpliciter fracturam senserit, siquidem magnum, & qui pollex nuncupatur, fuerit, post convenientem deligaturam ad imam uolam, ut quiescat, scite deuinciendus est. Si uero quispiam ex alijs, siue index siue paruus, cum uicino deligabitur: si quispiam ex medijs, cum ijs qui utrinque existunt: uel etiam omnes deinceps, una deuinciendi sunt melius enim ita conquiescunt, non secus quam si ferulis fracturam experti fuissent colligati.

De femore. Cap. 103.

EA nunc de femore, quæ de brachio superius, dicta sunt proprie autem magis femur fractum in anteriorem exterioremq; partem inclinatur, in quas naturaliter partes dilata- tatur, propendit: reponitur autem manibus uinculis & ante omnis æqualiter intentis, altera supra fracturam, altera infra constitutis. Si altrinsecus fractura obuenerit, idq; ad caput femoris dimidium habentæ lana inuolutum, ne corpus incidat, sub interfemino disponitur, initia que eius ad caput reducta, ministro ut partem contineat, porriguntur. Deinde de infra ipsam fracturam laqueo circumposito, initia alteri famulo ad intentionem traduntur. Si ad genu fractio contingerit, laqueum sane simili modo ad intendendum supra fracturam inijcimus, geniculum uero ipsum quodam fune in nexo continendum est. Atque ægro ita decumbente, crure que extento, partem componimus & restituimus: e medio semper, eo quod aculeis quasi quibusdam ossa pūgit, ut sæpius dictum est, sublato. Reliquam curationem in capite de brachio explicauimus. Caterum femur quinquaginta circa diebus occallescit.

LIBER SEXTVS.

327

occalescit: quo autem pacto instaurari debeat, post absolutam totius cruris disciplinam traditum est.

De genuum patella. Cap. 104.

Patella os rarum est, & laxum, carne ac nervis superiora pre, & ima parte acriter comprehensum: contusionem sæpius quidem, fractionem uero rarius experitur. Sustinet autem rptionem per crassitudinem, & minutim finditur, nunc uulnere, nunc citra uulnus. Buidēs autem indicium (moio enim sublabitur) continuitatis, cum cavitās, tum crepius. Reficitur uero pars cruris extensa, si in duas partes dissiuerit, digitis coniungitur, quoad fracti ossis ora supra sese contingant, & inuicem committantur. Quæ in minuta fragmenta rupta est, manu fingitur. Callo etenim non generatur, propterea quod utraq; pars à femore & tibia super mutuos & nervos connexos, non retrahatur. Longe tamen à naturali distantia cōtrahetur, functionisq; difficultatem affert: inducet, neq; enim si diutius quis fatigetur, sustinere genuum potest: & in deambulando impediuntur, præsertim quum ascendendū est. nam dum in planicie incedunt ac mouentur, surionis difficultas facile latet. Dum ascendunt autem, eo quod genu in sublatione & depositione non flectatur, arguitur. Et si hic etiam osiculum aliquod pungens eleuatum infestet, trahendum est: cæteraq; curatio deinceps adhibenda est.

De tibia. Cap. 105.

Tibiæ cum cubito consona plane ratio est, curatioq; respondens. siquidē hæc quoq; duob. ossibus constat, altero crasso & cognomini: altero tenuiore, quod sura nuncupatur, similitudine, perone à Græcis. Eadem fracturarum discrimina recipit. in omnes enim partes inclinatur: cum utraque infracta fuerint ossa, in treis: cum alterum os fracturam accipit, intra & extra, tibia quidem retro, sura antè. Quocirca tibia etiam ipsa eodem modo quo cubitus, manibus uel quævis superioribus, quàm fracturæ sunt, iniectis ipsi tibiæ modo,

modò, modò femori circumdati. Nam cum genu ualētius sit articulus per tensionem integer permanet: similiter & in humero uel in tibia inferiore quàm fractura, ueluti de cubito cōprehensum est. Cetera eodem modo ut in brachio docuimus, agēda sunt.

De pede summo. Cap. 106.

TAlius fracturam nullo modo experitur, propterea quod undiquaque à tibia & sura, et osse quadrato calcis cybides appellata, muniatur. Scaphoides uerò à scaphæ figuram appellatum os, latine nauiculare, & plantæ ossa, digitorum item pedis, ipsumque quadratum etiam similiter ijs quæ in prima parte palmæ, & ipsa palma, opposita uel eius parte, manusque digitis continentur, frangi consueuerunt. Quamobrem nec eadem cogamus identidem repetere, illinc, quæ diximus huc transferenda sunt.

De instauratione cruris. Cap. 107.

Femori fracto, aut tibiæ instauratione nō minor cura, quam reliquis omnibus adhiberi debet. Siquidem fracturarum partium probe facta repositio, æqualitatem potissimum conseruat. Idcirco nonnulli in canalem, alij quidem ligneum, alij uerò testaceum, membrum confractum, uel totum etiam crurum deposuerunt. Alij uerò sola ea quæ cum uulnere fracta existunt, propterea quod nequeant, ut ipsi dicunt, ferulis constringi. Vsum uerò canaliū posteriores in totum respuerunt, pluribus sanè de causis: in primis uerò, quod duritie sua, attendo partibus offensis negotium facerent. Neque enim indecorum usque adeo est, artus cum uulnere fractos ferulis cingere, ceu ostendimus postea. Resupinato igitur laborante, crure eius, & præsertim qua parte fractura exiit, stragulum aliud quod crassum subijcitur, crus in longum referens, quod utrobique colligi & conuolui ita debet, ut canali in medio concauitatem perquam similem efficiat: deinde aluta super ipsam molliuscula ad liquores qui inspergentur excipiendos explicabitur, crus postea in longum cōcauitati huic canali respondet.

alenti accommodabitur, à lateribus utrinque alijs uestimentis
uel lana iniectis, ne membrum in alterutram partem declinet.
Post hæc pedis uestigium, tabellam panniculo circumdatam,
quo mollior sit, erectam assumet, & maioris securitatis ergo,
duorū aut trium uinculorū medijs partibus stragulo canalem
referenti inuolutis, crus ipsum refractum leuiter deuinciemus.
Si autem agrotus impatiens conetur totum pedem contra he-
re, oportet ipsum in superiore parte pedis fasciola media blan-
dè ad tabellam deligare, ne inuitus inter dormiendum, ut so-
let, pedem contrahat. Non desunt, qui lecti etiam culcitram
medio pertundunt, ut prorsus immobiles sint, & per id forra-
men, quousq; fractura occallescat, lotiū & oletulū reddatu

De fracturis, quæ cum uulnere accidunt. Cap. 108.

Fractura cum uulnere illata, siquidem sanguinis profluiū
sit, hoc prius coercendum est: si inflammatio, auxilijs ei mu-
neri dicatis occurrendum est. Si carnes cōtusæ, pars eadem
quo gangrenæ periculum auferatur, scarificanda est: sin ea
quoque accesserit, uel aliqua alia serpens putredo, conuenien-
tibus similiter remedijs succurrendum est. Habes autem ho-
rum singulorum medicationem uolumine quarto à nobis tra-
ditam. At si nihil horum adsit, neq; magna ossis pars denuda-
ta sit, hamulis & suturis adhibitis præsidys, medicaminibus
quæ cruentis uulneribus accommodantur, medebimur: ita, ut
ossium fragmenta quæ uel pungunt, uel ut solet, innatent, ex-
trahantur. Si uerò amplum aliquod os emineat, in extensione
propter amplitudinem non commissum, huic prospiciendum
est. Hippocrates nanq; femore & brachio fracturam exper-
tis, ossa eminentia uniuersum eicere prohibet, periculum in-
flammationis ex intensione, uel conuulsione musculorum ner-
uorumq; ut uerisimile est, prædicens. Tempus tamen admini-
strationem nonnunquam haud inutilem reperit. Quodcunque
igitur os elapsum tractare aggredimur, unice cauendum ne
id inflammationis tempore moliamur, sed primo statim die
ll priusquam

priusquam inflammatio ingruat, uel nono, finita iam inflammatione. Restauramus autem ipsa uediculo, quod mochliscon Græci appellant (est uerò id instrumentum ferreum, septem, octo uel digitorum longitudine, mediocriter crassum, ne in impulsione flectatur, in summo acutum et latum, leuiter incuruum) huius acuta extremitate sub ossis eminentiam subiecta in aduersum impellimus, et mediocri membri diuulsione facta, capita fracturæ inuicem committimus, si hoc quidem facere integrum sit, scalpris excisiorys, obuersis, quicquid eminet auferemus, uel serra excindemus, ueluti superius capite de fistulis explicauimus: osiumque scabritie postea leuigata, et membro directo, linteolis conceptis medendirationem persequemur. Summa autem coniunctis et biugis nuncupatis partibus diligentia adhibenda est, ut in ipsis ossibus particulatim defecto, membrum incontractum persistat. ubi exquisita etiam opus erit intensione. Deligatura uerò sic est faciunda: Orbiculares fasciarum inuolutiones ab utraque bulceris parte injici debent, obliquæ uerò supra bulceris longitudinem, ut per decussationem ex omnibus hiatus nullus locus pateat. Quod si bulcus etiā dum sordidum appareat, quæ expurgandi uim habent: si purum, quæ carnem producunt linamentis illita, aliæque ex usu probata materia adhibeatur. Hippocrates uerò pissera emplastro per linamenta utitur, quod tetrapharmacum basilicum esse ferunt. Carne autem inducitur et instaurata, ferulæ injiciendæ sunt: quanquā nonnulli per initia etiam ipsis, bulceris loco euitato, accommodant, et pro necessitate urgente, ipsas nunc constringunt, nunc rursus relaxant: in quibus autem squamula ex osse soluta repletura est, inde colligemus, quod copiosior, tenuiorque humor excernitur, caro uerò circa bulcus laxa, mollisque et uacua effecta, intumescit: quo in casu deligatura ad curationem laxiore utemur. hamulo autem uel tali quopiam instrumentis squamula eicientes, rursus potentiore deligatura utendum. Per unum uersum

LIBER SEXTVS.

539

uersum porro exulcerationis tempus, motophylax, quod est linteoli custos, ex medicamento aliquo quod inflammationem cōpescit, uulnere est superaccommodandum, deligatioq; simplex adhibenda, quæ singulis subinde curationib. resoluatur, prædictis alijs permanentibus, ut de brachio explicatum est.

De immodici fracturarum calli superexcrecentia. Cap. 109.

Raſurarium calli superexcreſcentiæ indecoram prorsus speciem inuehunt, quandoq; functionis etiam impedimentum, si iuxta articulum coaluerint. Quapropter si recens adunc callus fuerit, præſidijs plurimum astringentibus oppugnemus, compressa fascinatione fingemus: lamina quandoq; lumbæa superaccommodata, id quod res poſcit, efficiamus. Quod si lapidosus ac solidus fuerit callus, diuisa inibi cute deſcendendus est: id quod eminent, scalpris, et terebris etiam, si res exigat, adhibitis, excidendum.

De distortorum membrorum concretione calli. Cap. 110.

In distortionem callus coerit, functionis impedimento haud leui comitante, maxime si in pedibus contigerit, osium in eam sedem restituendorum modus, quoniam extrema adferre pericula, admittendus non est. At si callus etiamdum tenellus, recens radices non egerit, laxantes adſpergines, cataplasmataq; ex ficis pinguib. & fimo columbino, aliaq; callum discutientia, porolitica appellata, adhibenda sunt remedia, per manus ad hæc frictione & confractione hic dissoluetur. Si uero lapideus euaserit, summa cute scalpello incisa, osium consortium scalpris dissoluemus: deinde fracturam, ueluti superius expositum est, curabimus.

De fracturis quæ non occallescent. Cap. 111.

Raſuræ quedam sine callo perseverant, ultra definitum naturæ limitē, uel ob assiduas resolutiones, uel ob immoderas fomentationes, uel ob motum importunum, uel fasciarum multitudine, uel quod totum corpus alimentum non sentit: quo casu membrum gracilius fieri contingit. Conuenit itaq; cum

Ll 2 alias

alias occasiones, tum præcipuè famem hanc tabificam certatim abscindere. Quod partim calidioribus alimentis materiæ membro distribuentes, partim cibum largiorem, balnea item, & reliquam animi hilaritatem subministrantes, efficiamus. Cæterum eorum qui iam callo firmantur, indicio sunt, cum alia quidem, tum præcipuè, quod fasciola, quamvis uulnere nō oborto, cruentæ appareāt: id quod fortasse hinc accidit, quod calli substantia, cum coalescit, in osium fistulas, hoc est cauiernosos meatus inspersas sanguinis stillas extundit.

De luxatis. Cap. 112.

Quoniam luxationes fracturas comitantur, sermonem suæ per vjs texere adgrediemur. Est itaque luxatio, ut in uniuersum dicam, articuli è proprio sinu in alienos exitus, quod motio arbitraria præpeditur. Huius differentias alias dicere non habemus, nisi quatenus secundum maius uel minus accidit. Quum enim ex toto articulus exciderit, communi generis appellatione luxatio: quum autem aliquatenus modo è sede sua dimotus fuerit, uel usq; ad superciliorum cavitatem superficiem uel prolapsus, subluxatio dicitur.

De inferiore maxilla. Cap. 113.

Rursus igitur à superioribus auspicantes, de inferiore maxilla uerba faciemus. Nam superior, cum sit immobilis, luxationem non experitur. Inferior autem, etsi toto sinu non dimoueat, eo quod capita superiori maxillæ firmiter cardinis instar insinuata habet, subinde tamen subiaxatur, quod muscoli per ipsam continenter assidua mandendi & loquendi exercitatione in mollitiem elanguescentes, qualibet de causa facile relaxantur. Schatæ enim, hoc est deprimitur, apud Hippocratem idem sonat quod chalata, hoc est relaxatur: in quibus citra ullam difficultatem articulus sponte in propriam sedem reuertitur. Cæterum de perfecta maxillæ luxatione satis erit illius uerba apposuisse, compendiosa sine ullo defectu, et perspicua. Ad hunc enim modum inquit: Ma-
xilla

LIBER SEXTVS.

535

xilla rarerit quidem excidit, ſæpius uerò numero oris hia-
 tibꝫ laxatur, id quod aliæ etiã plures muſculorum & neruo-
 rum mutationes aut declinationes efficiunt. Perſpicuum igitur
 hiſ potiffimum notis fit, quandocunq; exciderit: promi-
 net enim inferior maxilla in anteriora, & in contraria la-
 pſus promota cernitur, oſisq; proceſſus iuxta ſuperiorem ma-
 xillam tumidior conſpicitur, affectiq; maxillas ægrè como-
 mittunt. Talem autem repositionem iſſis congruere liquet.
 Debet enim quiſpiam caput continere, alius inferiorem ma-
 xillam hiantem hominem quàm moderatè poteſt, ad mentum ab-
 interiore & exteriori parte, digitis apprehenſam, primũ
 quidem agitare, interpoſito uerò tempore propellere, ægro-
 tantiq; iubere, ut laxam maxillam teneat, ſimulq; ipſe pro-
 pellat & obſequatur. Summa adhibita cura, ut præcipuè tri-
 bus figuris ſimul extemplò moueatur & laxetur. Nam ex in-
 uerſione in naturalem ſitum reducenda, & ſimul in poſterio-
 ra propellenda inferior maxilla eſt: idq; admodum moderatè, quo-
 utraq; ſimul cõmittantur, et nõ hiẽt. repositio igitur hæc eſt,
 quæ in alijs etiam figuris fieri non potuerit. Medicina uerò
 pauca poſtmodum ſufficiet, ſplenium ceratum impoſitum, la-
 ciore deligatura adhibere: tutius autẽ eſt, hominẽ ſupinũ re-
 linare, caputq; eius coriaceis puluinis ſubiedis quàm infar-
 ſimis, ut minimè cedat, ſubfulcire. Eſt autem quod uulnera
 i quiſpiam caput contineat. Quod ſi utraq; luxata fuerit ma-
 xilla, curatio eſt eadem. Cõcludere autem os minus iſtiusmo-
 di poſſunt, prominentiores quippe iſſis ſunt. reſtitutionem autem
 ex dentium ſuperiorum & inferiorum terminis præciſis
 quẽ deprehendes, quos in ordinẽ ſuum quãcelerrimè conſert
 reſtituere. Reſtituendi autem modus expoſitus eſt, niſi aliquod
 uitæ periculũ ex febribꝫ continentibus. & torpido ſopore in-
 siderit. ſoporem enim ij, quum præter naturam alterantur, uel
 intenduntur, inducũt muſculi. Alius ſolet bilioſa, uel mera exi-
 ſta, deſcere. meri itidem, ſi euomunt, uomitus exiſtunt: atq;

Ll 3

ij ſanẽ

ij sanè pariunt. Et nos quoq; hoc potissimū insertionis mo-
subinde usi fuimus, maxillā luxatam spongia prius ex hya-
lao calido fouentes, præsertim si dura ad introitū cōtuma-
ter cedat: tunc humi collocato agrotāte, à tergo nos cōsistē-
tes, eo qui ab Hippocrate traditus est modo, opus exequimur.

De iugulo & summo humero. Cap. 114.

Claucula interiore quidem parte nunquam excidit. pe-
ctori nanque ita inhaeret, ut ne moueri quidem in ipso po-
sit. at si ex uiolento quopiam extrinsecus ictu factū auella-
tur, fracturarum modo restitui debet. Sed neque altero fini-
quo humero inseritur, admodū excidit, à bicipite musculo, &
summo humero prohibita: imò neq; uiolenta aliqua motione
clauicula per se agitur, dilatandi thoracis gratia, qua re-
lus homo inter animalia clauiculam sortitus est: quæ si in lu-
æ, ut par est, subluxetur, manuum conformatione, & sple-
norum multiplicium applicatione unā cum decentibus deli-
gaturis dirigi debet. Eadem curatione summus humerus sub-
luxatus, in proprium locum restituitur. Est autē cartilagineo
sum quoddam ossiculum, quod clauiculā scapulæ colligat, in
exiccatis et cadauerosis corporibus latens: quod si loco dimo-
ueatur, capitis brachij luxati imperitis imaginē præbet. nam
in hoc summus humerus acutior apparet, et sinus unde exci-
dit. Sed signis quæ deinceps subiūgā, ipsa discernere cōuenit.

De humero luxato. Cap. 115.

Brachij caput scapularum cavitati insinuatū, subinde
quidem prolabitur, sed neque in superiorem partem, ob an-
chorarium, hoc est anchoræ similem scapulæ processum: ne-
que in posteriorem, propter ipsam scapulam: neque etiam an-
terius, ob bicipitis musculi tendonem, et summum humerum.
Introrsum uerò & extrorsum rarenter excidit: frequenter
uerò, & præsertim gracilentioribus, non multa carne præ-
ditis, ad imas partes, quibus sanè procliuius prolabitur. &
iterum restituitur: plurima autem carne præditis, è contra-
rio,

LIBER SEXTVS.

918

no, varius quidem luxatur, sed ægrius in sedem propriam
 rursum inseritur. Nonnullis igitur ex idu ualida inflamma-
 tione oborta, humero minimè luxato, luxationis tamen suspici-
 o oritur. Quib. in inferiorem partem humerus luxatus est,
 his notis deprehendes: humerus offensus, si cum sano compa-
 retur, multum diuersus apparet. Exterior enim pars eius un-
 de elapsus est, subsidit, & concava apparet, summusq; hume-
 rus, ceu de eo subluxato diximus, acutior quàm naturaliter es-
 se debeat, cernitur, & brachij caput prolapsum, manifesto
 in alam decubuisse cõparet. Et brachij huius cubitus à costis
 magis recessu: quibus si uim attuleris, cum dolore admoue-
 ur, nequeunt a gri manum ad aurem extenso cubito porri-
 gere, neque aliam motionem multiplicem eadem exercere.
 In pueris igitur, uel quibus recens nec ampla est luxatio, hũc
 in modũ, ut Hippocrates tradit, subinde promineni nodo ma-
 dy digiti flexi, medici manus, uel ægri etiam sanæ, nisi puer
 sit, restituitur. Valētiores aut luxationes, hoc modo reponun-
 tur. Oportet hominẽ adsparginibus laxandi uirtute præditis
 totũ humi resupinare, et pilã mediocris amplitudinis, uel co-
 reaceam, uel alterius generis nõ aded mollẽ, alæ accommoda-
 re: tum sedens medicus aduersus ad læsum latus, siquidem de-
 xter humerus luxatus sit, dextri: si sinister, sinistri pedis cal-
 cem supra pilam alæ subiectam constituat. postea manum af-
 fectũ hominis apprehensam, pedes uersus trahet. simulq; ma-
 na ad calce alã in diuersum repellet, ita ut aliquis post caput
 acētis hominis alterũ humerum urgeat ac resistat, ne corpus
 medici distẽtione circũdiuellatur. Est & alius reponendi mo-
 dus, qui per humeri suppositionem efficitur. adolescentulus,
 uel ægro longior, uel altius, ad latus quo luxatũ est brachiũ,
 consistens, humerũ suum alæ luxati subiciet, & manum eius
 leuatã ad uentrẽ suum deorsum trahet, ut reliquũ ægri cor-
 pus post tergũ sublimius impendeat. Quod si affectus leuior
 existat, leuĩs quispil alius puer ex ipso suspendendus est, ma-

nu quippe & reliquo corpore æquiuallenter deorsum tracti
 alæ subiectus humerus facile elapsus articulum in sedē suā
 reponit: atq; hoc idem hypero appellato efficiamus. Est id au
 tem lignum oblongum, rectum, quod in pauimento supra a
 liud quoddam solidum constituitur. Cuius summa extremitas
 rotunda, quæ nec admodum crassa, neque tenuis adeo existit
 sub alam ægri stantis, uel sedentis, pro hyperi longitudine
 subijciatur: manuq; hypero extenta, & deorsum tracta, relia
 quo autem corpore deorsum uergente, uel sua sponte, uel alte
 ro aliquo trahente, repositio efficiatur. Idem etiam scalæ gra
 du faciendum est, quemadmodum de fracti brachij intensione
 fieri supra docuimus. Hic autem rotundum aliquod corpus
 gradui alligetur, quod ægrotantis alæ inferi, & brachij ca
 put propellere possit. At si ob luxationis uetustatem, aut cor
 poris duritiem restitutio negotium faceffat, uia & ratione,
 quæ per spathulam amben nuncupatam, fieri consuevit, ute
 mur. Est autem ambe lignum, quod longitudine duos circi
 ter cubitos, latitudine quatuor digitos, crassitudine digitum
 æquat: cuius alterum extremum est rotundum, quod etiam in
 alæ sinum promptius sese insinuat, perinde atque summum hy
 peri caput. Hoc igitur capitulum panniculo inuolutum, quo
 lenius sit, capitulo brachij sub alam iniectum accommodabis
 mus: totam uero manum ad lignum intensam deligabimus,
 iuxta brachium & cubitum, & summum eius. Deinde ligno
 obliquo in duas columnas rectas adaptato, uel rursus supra
 scalæ gradum manu traiecta cum ligno, sic ut alia transuersa
 gradui inseratur, manum uero deorsum trahentes, corpus
 in alteram partem suspensum, in sublimi permittemus: tunc eo
 nim articulus in sedem suam reuertetur. Vbi fuerit reposi
 tus, lanea fila mediocris amplitudinis: si inflammationē non
 sentiat, sicca: si sentiat, oleo imbuta alæ subijcienda est, atque
 deuinciendum. Per hanc autem alam, & humerum, & alte
 ram alam fascia circundata, sic, ut inuolutiones decussarum
 iuxta

LIBER SEXTVS.

37

iuxta hiatum appareant, quo hiatus supra humerum lesus, brachium deinde costis & cubitus alligatur, manusq; summa ceruici fascijs deuincitur, ne rursus de integro articulus prolabatur. A septimo die, & serius etiam, ubi resoluerimus, modio cri frictione utemur, quo solidiori reddito corpore, articulus ineptior ad prolapsum efficiatur. Si uerò frequenter articulus prolabatur, uel ob humiditatis uitium, uel ex longa quapiam alia exeundi uia, ad uersionem ueniendum est, quemadmodum expositum est superius. Sed quum in utero foetus, uel educti in lucem, dum etiam dum increscunt, particula aliqua luxationem experiuntur, neque restituitur amplius, in humero quidem carnes nihil noxae à naturali constitutione deficientes contrahunt: neque enim manus, quo minus functionem suam obire possit, impeditur. Sed brachij os, non augefcens, breuius remanet, & appellantur eiusmodi galiancones. In femore autem prolapsio, os etiam absq; incremento permanet, & totum crus corrumpit. nam cum corporis pondus sustinere nequeat, non exercetur: & reliquis in particulis luxatis manentibus, subiectæ omnes offensioni obnoxia sunt.

De cubito. Cap. 116.

Quanto gibber cubiti artificiosius quàm humerus articulo sinuatus est, tanto, cum excidit, plus negotij facit, tardiusq; prolabitur quidem: sed prolapsus difficilius reponitur, propter eminentiarum ac sinuum frequentiam: sustinet igitur interdum subluxationem tantummodo, sæpe uerò ex tota etiam in omnes partes, sed præcipuè in priorem & posteriorem luxatur. Dinoscitur id tum uisui, tum tactu, citra negotium. nam quod excidit, prominens: & unde prolapsus est, siue apparet. Atq; hoc sani cubiti affectio potissimum arguit. Est autem priusquam inflammatione tentetur membrum, citissime restituendum. nam si inflammatione occupetur, curari difficulter potest. Non raro etiam, nullo remedio eliditur, resertim si in posteriora recesserit. Omnium quippe luxa-

L l 5 tionum

tionum cubiti, hæc quæ in posteriora fit, dolorifica magis
 & periculofior existit. Mediocres igitur articuli peruersio-
 nes, moderata quoque intensione restituantur: sic, ut ministri
 manum ad brachium cubitumque porrectam apprehendant, &
 in diuersa extendant: medicus autem manus suæ palma, quod
 prolapsum est, in naturalem sedem compellat. Hippocrates
 uerò luxationem in priorem partem, repentino cubiti flexu
 instaurabat, ita ut palma ægri in humerum rectum pulsaret.
 Si in posteriorem luxatus est, subita rursus & diuina exten-
 sione curabat. Nam luxatio in anteriorem partem, ex uiolenta
 lenta potissimum intensione: in posteriorem, ex uiolenta
 similiter inflexione euenit. Quod si perseverat luxatio, ua-
 lentiore intentione utendum est, ad eamque ueniendum in primis
 quæ Hippocrates de brachio fracto exposuit, ubi columella
 lam adhibebat. Cæterum recentiores nonnulli hunc in mo-
 dum reponunt: duobus ministris, altero sursum ad alam, ma-
 num, ut diximus, continente, altero deorsum ad brachiale, ex-
 tendentibus, medicus è regione ægrotantis consistens, utrisque
 palmis brachium iuxta articulum comprehendit, iubetque ue-
 stimento contracto in oblongo, uel fascia manus ipse pariter
 & ægri brachium inuoluere, & in exteriorem, imamque
 partem ad summam manum retrahere, ipse sequens cum in-
 tentione, constrictus ipsas trahit, usque dum cubiti articulus
 transgrediantur. Manus uerò prius oleo oblinienda est, quo
 lubrica fiat, & medici palmis facile obediat. Ita enim prola-
 psa, trahentium manuum uiolentia impulsæ, in suum locum
 reuertuntur. Post repositionem, angulum rectum figuratam
 manum, splenis & apposita deligatura curabimus.

De brachialis & digitorum luxationibus. Cap. 117.

Brachialis & digitorum luxatio, nisi cum hulcere accidat, ni-
 hil negotij exhibet. De hac igitur in capite de luxationib.
 cum hulcere factis dicitur. Absque uerò hulcere luxatis, medio-
 cri intensione, et remedijs inflammationem arcentibus succurremus.

De

Si uertebre spinæ exactam luxationem experiuntur, perniciosissimam mortem inferunt: nequit enim ullam quamlibet leuem spinæ medulla, compressionem sustinere, quādo uel solus neruorum, qui ex ipsa manant, processus, si comprimatur, hominem in discrimen abijcere abunde potest: subluxationibus subinde affliguntur, nunc in anteriorem partem, nunc in posteriorem, interim in latera etiam torquētur. Quorum prius uitium lordosim, alterum cyphosim, tertium scoliosin Græci nuncupant. Quum igitur plures simul uertebre paululum peruersæ fuerint, plurimum simul peruersio iuxta orbicularem flexus rotunditatem apparet: quem specie quidam decepti, ex unius tantum uertebre ingenti prolapsu, fieri opinantur. Magnus quippe prolapsus non circulare, sed angulatum spinæ flexum efficit, multoq; periculosior existit. Spinæ igitur introrsum peruersio, restitui nullo modo potest, eo quod per uentrem in priorem partem repellendi facultas nulla datur. nam qui in scala eos qui sic afficiuntur, extendunt, uel cucurbitulas applicant, uel sternutamēta, uel ussum, uel inflationes excitant, quid remediū inuenisse credunt, satis ab Hippocrate redarguti sunt. Siquidē subinde accidit, ut spinæ osiculi cuiusdā refractio facta, cauum locū efficiat, ueluti de fracturis expositū est. Sūt qui uitium hoc lordosim esse opinati sunt. deinde celerius hoc malo curato (propterea enim occallescit) facile sanari posse lordosim affirmarunt: tū tamē nullo remedio id malū elidi, uel certē difficulter admodum queat. Suppressio namq; urinae aluiq; his accidit, corpusq; frigescit, postea uerò inuoluntaria etiā excrementorum corruptio, quæ sane ex neruorum musculorūq; consortio eueniunt, et breui intereūt, præsertim si summæ et ceruicis uertebra luxationē senserint. Si gibbus aut uertebrarū iam inde à ueritatis factus sit, uitium diuturnū esse, neq; præ maturā mortē consciscere, sed morbum accersire, et irremediabile esse, Hippocratis

pocrates testatur. Sed quibus recens gibber ex casu prouene-
 rit, omnes alie machine, quas isti per scalas, & rectam cor-
 poris suspensionem, utriq; inflammationem moliuntur, ridi-
 culæ sunt, solaq; Hippocratis ratio sufficiet. Oportet, inquit
 ingens aliquod lignum tantæ lōgitudinis latitudinisq; ut pro-
 stratum hominem excipere queat, uel scamnum huic æquale,
 prope parietem apponere: ita quidem, ut per longitudinem pe-
 de ab eo non amplius distet, & stragula aliqua super ipsum
 explicare, ne hominis corpus contundatur. Conuenit autem
 hominem prius lotum, supra ipsum prouum constituere: dein-
 de corrigia pedus ipsius gemina inuolutione circumdati, per
 alas supra deorsum uincire, capitibus corrigiæ ad prælongū
 fustem pistillarem deligare, in soloq; iuxta ligni aut scamni
 extremum erectum statuere, & ministro à capite ægrotantis
 consistenti in superiore parte continendum tradere, ut ima
 parte solo innixa, superiore supra caput tracto, obseruata oc-
 casione corpus opportunè extendat. Altera adhuc corrigia
 pedibus utrisq; supra malleolos inijcitur, & rursum alia su-
 pra lumbos & coxas innexa, iunctura firmatur, tum corri-
 giarum capita inter se iuncta alteri fusti pistillari prædicto
 deligantur. Simili modo ad pedes in extremo ligni seu scam-
 ni pistillum priori æquale rectum constituitur, postea ligna
 hæc ministris in diuersa intendere iubebimus. Nonnulli autem
 asellis appellatis hoc efficiunt. Sunt autem aselli, axes, qui
 ad rectum lignum infixi conuertuntur. His utrinq; magni li-
 gni aut scamni ad pedes caputq; corrigiarum extrema inuol-
 unt. Facta in hunc modum intensione, manuumstrarum
 palma gibbum constringemus: siq; usus postulat, etiam super
 ipsum insidebimus, nullo prohibente timore. Quod si ne hac
 quidem ratione spina instauretur, & æger compressionem su-
 stineat, oportet appositum parietem canaliculatim in longum
 è regione gibbi excauare, ut neq; longitudinem cubiti exce-
 dat, neq; alior, neq; multo humilior ægrotantis spina sit, imò
 sculptura

culptura prius præparanda est. huius enim causa, lignum iusta parietem ab initio collocandum ordinauimus. Deinde assis iustæ magnitudinis, alterum terminum ad ima comprimemus, donec spinæ directio sensu etiam percipiatur. Sed uemadmodum Hippocrates tradit, sola extensio absque assere, uel per asserem rursum sola curatio ad restituendum gibbum abunde sufficit. Quod si uerum est, haud ab re fuerit etiam rudi et scoliosi, à principio statim supradictum intensionis modum, citra compressionem tamen, moliri. Post repositionem assula lignea, quæ latitudine tres digitos æquet, longitudine gibbo respondeat, et aliquas sanas uertebras contegat, nea fascia, uel stappa, propter duritiem inuoluta, uertebris imponi, et commodè deligari, uictusq; tenuis adhiberi debet. Quod si his adis aliqua gibberi reliquia supersint, laxantibus mollientibusq; remedijs, cū assulæ ualētiori impressione, diu utendū est. Nonnulli uerò plumbeā assulam adhibuerūt.

De coxæ luxatione. Cap. iiij.

Ubi alia mortalium ossa interdum sublucationem, interdum exactam luxationem experiantur, coxæ et humeri articulus solus consummata luxationis peruersioni obnoxius est: atque adeo magis coxæ articulus, quoniam profundam ac rotundam concauitatē obtinet, et altioribus aggeribus, quas Græci ophrioſeis dicunt, circumunitus sit. Si quando autem articulus uiolenta quadam ui impulsus, sinu suo exciderit, multas pro maioris minorisq; ratione luxationū differentias facit. in quatuor enim modos, imò locos coxæ luxatio efficitur. Vel nim in interiorē, uel exteriorē, uel anteriorē, uel posteriorem partē promouetur: sed intrò quidē et extra frequētius, frequētissime tamen intrò, in priora et posteriora rariū. Quibus igitur coxa intrò promota est, ijs offensus crur. si cum sano compararetur, longius, et genu uastius cernitur, et ad inguen crur inflecti minimè potest: iuxtaq; inter femineum euidentis tumor occurrit, tanquam illi capite femoris impactio ac deficiente.

Quibus

Quibus in anteriorem partem prolapsa est, ijs contraria indicia cōtingunt. siquidem crus breuius cōspicitur, et sub inter femineo sinus debiscit, nates intumescunt, et genu interim demergitur, crus flecti potest. Si in posteriorem partem excidit, crus sine genu dolore extendunt: sed implicare id, interiusq; reclinare, dum incedere nituntur, non possunt: urina in hoc casu supprimitur, inguē inturgescit, clunis rugosa et ex carnis spectatur, et calce tantū inter ambulandum terram cōtingūt. Si in posteriora, breuius itidē crus est, poples, genuq; neq; extendi, neq; inflecti potest, priusquā inguina fuerint inflexa, quæ sanè laxiora sunt, femorūq; caput per nates protuberat. Quibuscunq; igitur iā inde à puero, uel longiore deniq; temporis spacio, articulus prolapsus neglectus fuerit, remediaq; nihil profecerint, membro iam in orbē coactō, nullā amplius curationē recipit. Quibus uerō recens excidit, ij Hippocratis curatione adiuuādi sunt. Protinus igitur adgredienda est repositio: quoniā coxæ luxatio inueterata, incurabilis omnino efficitur. Cōmuniter igitur in quatuor luxationū generibus concinna reaptatio quadrabit. cuius gemini sunt modū alter, qui conuersione articuli et inflexione seu circumductione: aliter, qui extensione confit. Nam si recens affectus sit, et ægrotus iuuenis, femur nonnunquam apprehensum et huc illuc circumagitatum, articulum in sedem suam restituimus. Si uerō luxatio intro declinauerit, crus etiam solum repente et ualenter ad inguinis intimā partem flectentes, ut res postulat, repositum. Sin autem his non proficitur, extensione utendum, quæ primū manibus molienda est, alijs crus ab inferiore parte trabentibus, circa femur ac tibiā constringant, alijs ex superiore parte sub alis comprehensum corpus circulantibus. Quod uehementior desideretur intensio, uinculis textilibus, aut tortilibus, aut habenis deligabimus, omnino quidē supra talos, et supra genu etiam, ne id aliquā oblesionem experiatur. Pectoris uerō regionē, uinculis excipere opus

re opus non est: sed manibus tantū, ut dictum est, sub alis datis comprehendatur: corrigia deinde mollis, & ualida media sua parte, iuxta penem, aut interfœmineum subiecta, anterius per inguen & iugulum, posterius per dorsum ad humeros reducenda est, ministroq; duobus capitibus tradenda. Postea omnes simul eodem tempore in diuersa coniectant, sicut ægro tantis corpus à terra subleuetur. Atq; hæc quidem intendendi ratio omnibus quatuor luxationū generibus communis est: priuatim uerò ossa in sinū suum restituendi modus in singulis uariat. Intenso namq; ita homine, si intro articulus promotus est, corrigia iuxta interfœmineum sitæ mediū, inter femoris caput ipsumq; interfœmineum dispensatur, sursumq; per inguina ac iugulum corrigia remittitur. Deinde robustus aliquis iuuenis utrisq; suis cubitis affectum femur, qua crassius est, comprehendens, in exteriora fortiter trahet. Hic quidem instaurandi modus alyis expeditior est. Cui si articulus non obtemperauerit, alyis utendum, qui sicut maiorem uarietatem, ita & plus efficaciam habent. Extendendus quidē supra granilius lignum, seu scamnum affectus est, in quo etiam spinæ gibberum habentes, intendendo componimus. In sculpentur autē prius per totum ferè oblongæ quædam ueluti fossulæ, altitudine et latitudine non amplius trium digitorum, inuicem quatuor ad summum digitorum spacio distantes, ut in utramque partem conueniat restituatur, uelut iuxta extremum ipsis obiecto. In medio autem ligni siue scamni, alterum lignum impingatur pedis longitudinē, columnulæ crassitudinē æquās, ut sub hoc extenso homine, inter caput femoris, & interfœmineum porrigatur. Simul & impediatur, ne dum trahitur ad pedes, sequatur. Quocirca nec usu utiq; frequēter uenit, in contraria ex superiore parte retractio, simul autē intenso etiā corpore ipsum lignū femoris caput ad dexteriores partē propellet. Extensio uerò iuxta superius traditum modum admistrabitur, præcipuè pedis. Quod si neque ita quidem os in naturæ

naturalem locum redierit, impactum lignum rectum eximen-
 dum est, ex latere autē huius situs utrinque duo alia ligna, quae
 si limina, pedali longitudine infigenda sunt, quibus aliud li-
 gnum gradus scalae modo inferendum est, sic ut trium ligno-
 rum figura H literam repraesentet: quod fiet, si paululum in-
 ferius summis capitibus medium hoc lignū accommodabitur.
 Deinde in sanum latus homine collocato, sanum quidem crus
 inter haec limina infra gradum ducemus, affectum uerò crus
 supra ipsum gradum ex superiore parte ponemus, ut ipsi fe-
 moris capiti adaptetur. Substrato tamen prius ei multiplici
 quopiam panno, ne femur duritie laedat: aliud autem lignum
 mediocris latitudinis, cuius longitudo à femoris capite ad
 malleolum subiectum usque pertineat, interiori cruri parte
 ligabitur. Facta hac intensione, uel pistillis, ut in gibbero spi-
 ra dictum est, crus una cum alligato ligno ad ima tractum, uel
 lenta hac impulsione, femoris caput in propriam sedem co-
 gat. Est uerò adhuc alia reponendi ratio, citra extensionem
 supra lignum ab Hippocrate commendata. Oportet, inquit,
 egrotantis manus ad costas leniter deligare, cruraque ambobus
 ualidiore loco ac molli ad malleolos, & supra genua fasciari
 re, sic ut quatuor circiter digitorum spacio inuicem distent
 crure uidelicet laeso, supra alterum duobus ferè digitis exten-
 so, hominem in caput suspendere, duos cubitos à terra subla-
 tum. Adolescens uerò aliquis rei peritus, suis cubitis affectum
 femur, qua breuissimum est, comprehendens, ubi et caput fe-
 moris, subito appendere sese illi conetur: facile enim ita artis
 eulū in locum suum compellet. Atque haec quidem inferen-
 di ratio ceteris simplicior est, utpote quae non multo appa-
 tu peragatur: plerique tamen ipsum tanquam miserabilem, mi-
 nus abdominantur. At si in exteriora coxa prolapsa sit, exten-
 datur homo, ueluti superius: habena autem interfemineo
 subiecta, per oppositas partes, inguina uidelicet & clauiculis
 lam, ferri debet, tum medicus ab exteriori parte introrsum
 propellit,

propellit, iuxta conuenientem foueam ex ijs quæ insculptæ
 unt, famulo uectæ obiecto in sanam natem, ne cedat obniten-
 e. Sin autem in priora facta sit luxatio, homine intenso, ro-
 bustus aliquis uir dextræ manus palmam supra affectum in-
 uen imponens, altera manu comprimet, simulq; deorsum,
 idq; genu constrictione faciat. At si in posteriorem partem
 promotus est articulus, non opus est hominem in sublime usa-
 que à terra extendere, sed supra solidum aliquod iacere, per-
 inde ac si extra articulamentum luxatum sit. Quemadmodum
 autem in gibbo expositum est, homo superq; lignum aut scam-
 um pronus extendatur, uinculis non lumbo, sed cruri, ut nu-
 per dicebamus, iniectis. Post hæc uerò affere quoque utendū
 est, ad clunium regionem, ubi articulus excidit, comprimen-
 dam. Ac de ijs quibus ex euidente causa coxendix prolapsus
 est, hæcenus. Quandoquidem autem ob redundantem quoque
 humiditatem, quemadmodum humerus, sic etiam coxendix
 de sede sua prolabitur, uestione utendum est, ueluti de ipsa suo
 loco explicauimus.

De genu luxatione. Cap. 120.

Genu in tres partes luxatur ac prolabitur, interiorē ui-
 delicet, exteriorē, & in poplitem. Nam in priorē pro-
 moueri, opposita patella prohibetur. Easdem igitur intensio-
 nis neruorum rationes usurpantes, solis interdum manibus,
 funiculis etiam interdū adhibitis, conuenienter deuincimus,
 & reliquam curandi rationem admouebimus: cura studiose
 adhibita, ut membrum diutius immotum custodiatur.

De malleoli luxatione, inibi q; etiā de pedū digitis. Cap. 121.

Malleoli articulamentum si modicè prolabitur, modica co-
 mtiā intensiōe curatur. Si integrè luxatum est, poten-
 tiore indiget præsidio. Conandum igitur etiam hic est per ma-
 nus uehementiorem intensiōem adhibere. Quod si non fiat
 repositio, hu ni resupinādus homo est, interq; duo eius femo-
 ra iuxta interfœmineum, longus aliquis ac ualidus palus alo-

M m tins

tius in terram rectus defigendus est, quo ei corpus renitens ad pedis intensionem non cedat. sed priusquam ita homo collocetur, defigendus est. Quod si magnum illud lignum ad maximum est, in cuius medio pedale, uti diximus, lignum infixum fuerat, hoc super intensionem moliemur, famulo uno femur continente ac trabente, aliter manibus, uel habena pedem trahet. Medicus autem luxatum articulum reponat, alterumque pedem alius deorsum continebit. Post repositionem tutò deligandum est, fascijs ad plantam et ad malleolos distributis, cautione adhibita, ne posterior calcis tendo constringatur. Præcipiendumque homini, ut in quiete perseverans, intra quadraginta dies non ingrediatur. nam si ante absolutam curationem incedere quispiam tentet, inutilem particulam ad sua munia obeunda reddit. Si cui uerò ex saltu, ut solet, calcis os è loco suo promotum, uel aliquam aliam ad inflammationis naturam tendentem dispositionem expertum fuerit, leni quadam intensione, cōformatione, fotu, inflammationi arcendæ dicato, deligationeque firma id restituendum est, indeque homini similiter in quiete, donec consanuerit, perseverandum. Digitorum autem pedis luxatio, sicut de manus digitis dicebamus, mediocri intensione haud difficulter emendatur. In omnibus autem luxationibus, subluxationibusque, facta iam restitutione, elapsisque, præscriptis ad quiescendum diebus, si qua, ut credibile est, inflammatio in articulis perseverat, seu tumor, unde à functionibus diutulè impediuntur, his mollientibus remedijs subueniamus, quorum materia neminem qui hanc artem exercet, fugere potest.

De luxationibus cum hūcere. Cap. 122.

In luxationibus cum exulceratione, plurima opus solertia est. Nam cum hæc reponuntur, extrema pericula, et mortem quandoque inferunt. Quum enim adiacentes nerui ac musculi ex intensione inflatione tentantur, cruciatus intensi, conuulsiones, et febres acutæ superueniunt, præcipue in cubitis

bitis ac genibus, superioribusq; particulis: quanto enim principibus propinquiore sunt, tanto maius periculum adferunt. Quocirca Hippocrates horum repositionem & ualidiorem deligationem penitus respuit, solisq; ijs quæ inflammationem arcent, placantq; auxilijs uti inter initia mandat: sic enim ip sis forsan euadere datur. Id quod ipse in solis digitis fieri suadet, id nos in cæteris etiam articulis facere conabimur, ac in principio statim cum nondum infestat inflammatio, luxatum articulum moderata intensione reponemus. Si ex animi sententia successerit, in sola ratione quæ inflammationem abigit, lenitq; persequemur. Si inflammatio quæpiam, uel conuulsio, uel ex iam pridem memoratis quippiam urgeat, rursum ipsos, siquidem citra uim potest, sede sua propellere necessitas est. Quod si hoc quoque periculum ueremur (haud enim inflammata fortassis facile cedent) præstat inter principia in maioribus articulis repositionem protelare. Simulat quæ uerò inflammatio cessauerit (quod septem aut nouem dierum spacio contingit) tunc præfati, quod ex repositione secuturum sit periculum: & si non reponatur, hominem ea parte claudum ac mutilum omnino reliquum uitæ tempus futurum, manuum operam clementer adgrediamur, uediculo etiam, propter commoditatem, adhibito. Huculceris postea curationem, quemadmodum in fracturis cum hulcere traditum est, tractabimus.

De luxatione cum fractura. Cap. 123.

Quod si luxatio cum fractione citra hulus acciderit, communis intendendi ratio, & per manus conformis instauratio, adhibenda est, ueluti in capite de simplicibus fracturis expositum est. Si uerò cum hulcere, rursus ex his quæ de fracturis cum exulceratione & luxationib. priuatim explicauimus, conueniens repetenda est administratio.

FINIS LIBRI SEXTI.

MM 2 HYPO.

HYPOTHESIS LIBRI SEPTIMI.

In hoc volumine uniuersi operis septimo & ultimo, de medicamentorum, cum simplicium, tum compositorum omnium, quorum potissima superioribus sex libris facta est mentio facultatibus agitur. Est autem eius series in hunc modum digesta.

CAPITA LIBRI SEPTIMI.

De temperaturis, quæ a saporis qualitatibus reperiuntur.	1	Arida & siccata	18
Cap.		Vnctiones quæ ori inserviunt.	
De temperamentorum ordine	14		
atque a media temperie excessu	15	Suaues & utiles potiones	15
su	2	Collyria & conglutinamenta	16
De simplicium medicamentorum uiribus particulatim	3	Emplastra, modi coctionis eorum, & de iusta ceræ ad olei proportionem.	17
De purgantium habentibus medicinis simplicibus	4	Malagma & epithemata	18
De compositis medicinis purgantibus	5	Acopa, & synchrismata, & dro- pices, & sinapi mi	19
De observatione eorum qui purgantur, & quomodo adesse oporteat his qui sumpto pharmaco non purgantur	6	Oleorum & unguentorum præ- parationes diuersæ	20
De his qui plus æquo purgantur	7	De nanthariorum præparati- one	21
De sacris antidotis	8	Thymiamata & cyphi	22
Vnctiones sedis & umbilicalia purgantia	9	Præparatio masuchæ, quod ma- suaphion quidam appellant	23
Medicamina uomitoria, modi heileboris mi	10	De pessis ex Antyllo	24
De differentia antidotorum	11	De succedaneis, ex Galeno	25
De pastillis	12	De ponderibus & mensuris.	26

FINIS.

LIBER SEPTIMVS. 149
PAVLI AEGINETAE

LIBER SEPTIMVS, ALBANO

Torino interprete.

De temperaturis quæ ex saporis qualitatibus deprehenduntur. Cap. I.



B Q V E odoratu cōiungi tutò satis de sensibilibus corporum temperamēto potest. nam quæ odoris ne minimum quidē, de se præbēt, crassarum quidem partium sunt, sed quantā caloris aut frigiditatis habeāt uim, intelligi non est. Quæ uerò fragrantem odoris fluxum emittunt, etsi natura nō paucam quodammodo habeant substantiam in se tenuem & calidam, tamen propter inæqualem eorum essentiam certū uel tenuitatis, uel caliditatis suæ modum nullum ostendunt. Magis adhuc lubricum ex colore iudicium est, quādo calida, frigida, humida, sicca in unoquoque deprehenduntur. Gustu autē, quia æqualiter gustabilium omnium partes linguae incidunt, & sensum eum pariter mouent in tantum, ut manifestè ex hoc temperaturæ eorum uis deprehendi queat. Astringens igitur, cogere, constringere, desiccare, repercutere, incrassare, atq; ad hæc omnia tum refrigerare, tum exiccare sua naturæ aptitudine solet. Acutum uerò incidendi, diuidendi, attenuandi, aperiendi, & expurgandi citra calorem uires obtinet. Acre autem, communem cum acuto sortitum est facultatem, attenuando nempe & purgando: hoc uerò dissident, quod acutum frigefacere, acre calfacere natum est. præterea quod illud ad exciendum, hoc ad extrahendum, distrahendum, rumpendum, penetrandumq; & crustam inducendum natura comparatum est. Eodem quoq; pacto amarum, expurgat meatus, abstergit, extenuat, lentos crassosq; humores secat absq; caliditate insigni. Aqueum ue

M m 3 rō frīo

ro frigidū, sistit, cogit, obturat, roborat, ac stupefacit. Salsum autem contrahit, stringit, condit, siccāt, sine euidenti uel calore uel frigore. Dulce laxat, digerit, mollit, ac rarefacit. Oleosum humectat, emollit, et relaxat.

De temperamentorum ordine, atque excessu. Cap. 2.

Medium inter extrema pharmacum, symmetron à Graecis appellatum, ita ut aqualis cum eo cui admoetur, temperaturā existat, eo quod neque exiccandi, neque humectandi, neque refrigerandi, aut calfaciendi uim obtineat, neque aridum, neque humidum, neque frigidum, nec calidū nuncupari par est. Siccius uerò, humidius, calidius uel frigidius, à potentia et qualitate praedominante appellationē sortitur. Abunde aut fuerit in unaquaq; praepollēte facultate, quatuor ordines pro usus necessitate constituisse. Calidum quidem in primo ordine uocatur, quod nos tā obscure calfaciat, ut eius rationalem quandā demonstrationē requirat. Pari etiam modo gelidum, aridū, et uidū, quod indicatione indiget, nondū ualidā efficaciam ac euidentiē obtinens. Certē quaecunq; manifestō iam arefacere, aut humectare, aut calfacere, aut refrigerare possunt, secūdi excessus esse dicenda sunt. Sed quae manifestē quidem, non tamē ad extremū, tertij. Quae usq; adeo, ut crustam inducēdi uim habeāt, calfaciunt, ad quartū ordinem referuntur. Sic quae tantā refrigerādi uirtutem sortita sunt, ut iā stuporē concilient ac mortificēt, haec itidē in quarto à temperatis abscessu censentur. Exiccatorium uerò nullū quarti ordinis inueniri potest, sine exustione, nā quicquid extremē siccāt, id omnino exurat necessū est. Ex eo grege sunt, chalcitis, mysis, calx. Tertiae aut arefaciētiū distictae aliquid esse potest, nec exurens interim: cuiusmodi sunt, quae uehementer astringunt omnia: ē quorum albo omphaciū, rhus, atq; alumen habetur.

De simplicium medicamentorum uiribus, particulatim. Cap. 3.

A Brotono, uis est calfaciēdi et exiccandi in tertio à mediā temperie recessu habetq; distrabentē, et nō instrenuē secundū potētiā: minima nāq; acerbitalis particeps est, quod cum oleo

oleo toti corpori infricatum, rigorib. qui per circuitum ingruunt, succurrit: cæterū infesta est stomacho. Crematū uolētius arefacit, quā igne intactū. Defluuijs capillorū ex alopecia medetur, cum oleo quopiam rararum partium illitum.

Agallochum, lignum est indicū thuyæ ligno non dissimile, odore bene fragrati. Quod dū mādatur, oris et animæ suauitatem cōciliat. Odoris gratia uaporatur, et ad suffimēta incenseditur. Cuius radix in potu unius denarij pōdo sumpta, flaccidū ex humiditate stomachū resolutūq; corroborat. Remedio insuper est iocinorosis, intestinorū torminib. oppressis, pleureticiq;. Agaricū, radix est, quæ arboris trūco adnascitur, laxi corporis & friabilis, ex aerea & terrestri essentia coalita. Distrabēdi, crassitudinem secandi, infarctusq; ex obturationibus maximè uiscerum repurgandi potentiam obtinens. Ageraton naturā habet discutiendi, & præter id clementer quadantenus inflammationes arcendi.

Agnus, uel lygus, qui latinis uitex dicitur, calidæ et siccæ potestatis est, in tertio ordine. Cōstat ex partib. tenuib. Flatus peditusq; discutit: qua ratione non tantū comestus potusq; uerū substratus etiā castitatem tueri creditur. Haustū plantæ huius semen, obturatis iocinoribus, lienibusq; succurrit: frictus minus inflat, digestusq; longe facilior est.

Agrostis, grāmē Parnassi, maximæ utilitatis est, siccificæ, mediocriterq; frigoricæ facultatis, & tenuis essentiae, leue quoddam acrimētum gustu præferens, & proinde cruenta hūlcera conglutinat: calculos decoctum eius atterit.

Anchusæ species quatuor, non eiusdem facultatis omnes sunt. nam cui onocleæ nomen est inditum, astringentem pariter & subamaram radicem continet: cuius ergo lienis renūq; dolores adiuuat. Cum polenta illita, ignibus sacris, qua erysipelata dicuntur, opitulatur. folia herbæ imbecilliorē radice refrigerandi arefaciendiq; uim possidēt: quare contra alui fluores in potu sumitur. At quæ lycopsos appellationem habet, pari modo erysipelatis subuenit, ma-

iore quodammodo quàm onoclea astringendi potentia, & onochilos & alcibiadios medicamentosior, à uisera demorsis eximie conducit, illita, pro amuleto appensa, & in cibo deuorata. Quarta anchusæ species reliquis est exilior, & tantum non anonymos, alcibiadio uehementiorem habet amaritudinem, tencis alui necandis acetabuli mensura pota magis est accommoda.

Adarce spumam quandam falsilaginis, in harundinetis stercoraq; ac cremis concretam præfert, summam habens acrimoniam, tantamq; in calfaciendo uim, ut parum absit quin forinsecus corpori cum alijs applicatum adurat. Eoq; intra corpus ipsam assumere minimè conuenit.

Adiantum exiccandi, attenuandi, modiceq; dysciendi potestate præditum est: medium quodammodo locum calore & frigidityte sortitum. quamobrem caput ex alopecia glabrum capillis conuestit, tumores discutit, uescicæ renumq; calculos comminuit, si potetur, excreationes pulmonis desiccet, et uentris compescit profluuium.

Aizoon, semperuiuum, maius & minus est, utrunq; in terra refrigerat distantia. Exiccet uerò & astringit aliquantulum: ignitis igitur cum inflammatione rubedinibus, hucerbis item, quæ à serpendo herpetas nuncupant, & inflammationibus quæ ex destillatione oriuntur, succurrit.

Aetonychi inter lapides preciosos mentionem facere instituimus.

Athara, uel athera, pulicula sorbilis est, ex zea triticois mollitis confecta, puerulis idonea: eadem cataplasmatibus accommodatur.

Aegilops auena, dysciendi potestate prædita est. Ea propter inflammationes induratas, & sui nominis qui in maiore oculi hirquo oriuntur abscessus, medetur.

Aegyros, populus nigra calide est potentia in primo temperatorum ordine, arefacit moderatè, & raris est partibus.

Cuius

cuius folia cataplasmati more cum aceto impasta, dolores
ui miseram pedum ualeitudinem sequuntur, amouent. Quæ
erò ex ipsa destillat resina, maiorem calfaciendi uim ha-
ens, acopis inseritur, malagmati q; inditur. Fructus cum ace-
to in potu sumptus, morbo comitiali opitulatur.

Aedæon, hoc est pudendum maris cerui arefactum, uino
exigatum, si potetur, moribus uiperinis subuenit. Compos-
itis præterea facultatibus confunditur.

Aethales, hoc est fuliginis & lignos historia, in litera
pertrahitur.

Aethiopidis herbae folia uerbasco sunt similia: radicis des-
ectum potu sumptum, coxendicis doloribus, laterali dolo-
re cruentum sputum eicientibus succurrit. Arterias & fau-
cium scabredines cum melle leuat.

Hæma, sanguis frigidus nullus est: suillus quidem humi-
ior, minusq; calidus cæteris est, tēperatura ab hominis san-
guine nihil discrepans. Colūbinus, palumbinus, & turturis,
pedy ferme tēperamēti: oculorum uitis, quæ Græci hypo-
bhamata dicunt, opitulatur, si calidus instilletur. Crassiori
cerebri membranula infusus, in his quorum calua perforata
est, inflammationes profligat. Aduersus spiritus angustias, ma-
na cum utilitate sanguis noctuæ non tam è uino, quàm ex as-
ua potatur. Vesperilionum sanguis uirginum mammas tue-
ur. Ferunt illitum hunc, incremēta pilorum prohibere. Eius-
dem facultatis esse affirmant sanguinem ranarum, chamae-
leontis, et ricinorū qui canibus usq; adhærent. Galenus uerò
nēdadium hoc esse asserit, facto rei periculo. Caprillus cum
melle potus, ob ariditatem aquis inter cutem medetur, & res-
um calculos comminuit. Aluilium gallinarum sanguis, eru-
siones sanguinis ex cerebri membranulis supprimit. Agni-
us comitiali morbo auxiliatur. Hædinus recens concretus,
olus minus dimidiatae heminae mensura, cum tantundem acce-
i haustus, cruentū è pectore sputum reicientibus opitulatur.

Vrsinus, caprearum, hircinus, atque taurinus, si abscessibus imponatur, maturationis munia probè exequi perhibent.

Sanguis crocodili terrestris oculorum speciem exacuit.

Sanguis equorum admissariorum medicamentis exedentibus commiscetur. Cæterum antidotus ex sanguinibus contra letalia uenena exhibetur. suscipit hæc autem, sanguinem anatinum, hædinum, & anserinum.

Aera, lolium calfaciens & desiccans in tertio fermè à temperatis recessu, iridi æqualis in medendo uires obtinet.

Acalis, fructus est plantulæ in Aegypto prouenientis. Cuius dilutum collyrijs, quæ claritati oculorum officientia discutiant, commiscetur.

Acacia, siccificæ uirtutis est in ordine tertio, frigorificæ uerò in primo: ubi lota fuerit, secundo. Est porro peracribæ & terrestris.

Acalyphe, urtica, nō tā semina q̄ folia tenuiū sunt partiū, citraq; erosionē desiccant. Quæ tumores præter naturā omne genus distrabūt, abstergūt, deiciūtq; per aluū, inflādī etiā potentiā mediocrē obtinēt, eoq; in uenerē tāto pere proritat.

Achanthus, à quibusdam melampylon, à nonnullis pæde rota nuncupatur. Est autem ex eorum albo, quæ digerendi arefaciendiq; potentiam habent.

Achantium subtiliorum est partium, ex calfactoriam facultatem obtinens, proinde his qui conuelluntur remedio est.

Acanthes, spinæ candidæ radix, exiccatoricæ et modicè adstringentis est potentia: quapropter nō cōtinentib. cibū, quos Græci stomachicos appellāt, et cruētis eiectionib. auxilio est. Dētiū cruciatus sopit. Semē huius tenuis essētiæ, calorificæq; potestatis est. quāobrē ijs qui cōuulsionib. infestātur, cōuenit.

Acantham, arabicā spinam Aegyptiam quidam nuncupant, quæ ualidam astringendi & arefaciendi uim possidet: quare sanguinis & alias quoq; fluxiones cobibet.

Ocimsastrum, acinus ocimo similis, mediocres astringendi uires

uires continet, eoq; pota aluum mensesq; comprimit. Passis, sacrisq; ignibus, illita medetur.

Aconitū, quod pardalianches appellatur, exedendi & deutoriam seu uirulentam facultatem obtinet, quam ob causam intro in corpus assumendum non est. Foris tamen carnis is quas exedi oportet, adbibetur.

Quod uerò lycoctonum nuncupatur, similis propemodum priori facultatis est: sed peculiariter lupos interficit, ceuroximum illud pantheras.

Acorum, calfacit & exiccat in tertia distantia. Probarad radicis eius usus ad proritādum lotium, & ad lienis scirroum. Extenuat membranæ ceratoidis crassitiem.

Acrides, locustæ, suffitæ meiendi difficultatem, præcipueulierum, sanant: sed alis destituta, scorpionum morsibusum uino pota succurrit.

Adæ, cum magna, tum humilis (ebulum hanc, illā sambucum Romani uocant) utraq; exiccandi, et temperatè disyciēi, conglutinandiq; facultatem obtinent, & non tam bibitæuam comestæ aquas per uentrem inferiorem pellunt.

Sales in uniuersum omnes magnopere deficcāt atq; stipant. Ideoq; quicquid humoris in corporib. cōtinetur, id totum uel epascēdo cōsumūt, uel subducūt. Proinde salsamēta cōdiunt, t a putredine uindicāt. Sed cremati, ualentius dissipant.

Alibæa, uel ebiscus, maluæ syluestris genus est: cui uis dissipandi, laxandi, inflammationes arcendi, placandi, & phynata panos maturandi inest. Radix porro & semen cæterauidem ex intensiōe maiore possident, sed uirilignes deterunt, & semen calculos confringit.

Halimō, dissimilariis est essentiae, sapore saluginoso, atqueabastringēs. Plurima eius pars tēperate calida, cum uiditateffreni existit: lac pariter & genituram procreat.

Alcæa, agrestis maluæ species est, q̄ cū uino pota intestinoū torminib. ac morsionib. medetur, præsertim ipsius radix.

Alcyonio.

Alcyoniorum omnia genera detergunt ac distrabunt, quod tatem habetia acere: sed Malesium, quod uermiculosum ac pureum, bonitate post se cetera relinquit: quod combustum m detur alopecijs, lichenis & uutiligines exterit. Sed quod ex ma superficie laui, uehementer acere existit, non modò cute extergit, sed excoriat etiam. Quod lanis succidis est simile non parum reliquis omnibus habetur imbecillius.

Alme, muria salsugine expers alterius essentiae, consin les sali facultates, non tam ualidas uerò, aqua temperata possidet. Muria autem salforum piscium, oliuarumque sale conditum, quas colymbadas dicunt, in extergendo maiorem uim continet, atque ob id quidem contra coxendicum dolores, & intestinorum tormina, clystere infunditur.

Aloe primi ex calfacientium ordinis est, exiccantium uerò tertij. Et stomacho gratissima, abstergendi, distrabendi, aluo oletulum eieciendi uires continet: elota imbecilliores exterendi uim possidet: atqui magis amica uentriculo est & inflammatione leuat, bulceribus cicatrices conciliat, potissimum his quae ani & genitalium loca torquent.

Halos anthos, hoc est salis flos, liquidum medicamentum est, subtilioris essentiae quam sales cremati, acris qualuatis, & admodum distrabentis potentiae.

Halosachne, solumosa salis efflorescentia, salis spuma est, subtiliorum illo partium, uehementius quidem digerens, sed ad contrahendum minus efficax.

Alsine, quam nonnulli auriculam muris appellant, contra parem helxinae potestatem sortita est, frigoris scilicet, & humectantem: quamobrem feruentibus inflammationibus congruit.

Alypy herbae semen per inferna atram bilem expurgat, sumptum cum pari epithymi pondere, adiectis salibus & acetum, laui tamen exulceratione intestina afficit.

Alysson frutex inde quidem nomen clatur a sortitus est, quod rabidorum

bidorum canum moribus succurrit. Habet uero facultate
cificam, distrabentem, & abstersoriam potestatem obia
t, infarctos renum meatus obstructione liberat: et ephelin,
c est asperitudinem, et decoloratam tanquam à solis ardo
cutem, exterit.

Alopex, uulpes: oleū in quo tota uulpes uiuens uel extincta
xa est, tāta discussoria facultate præditi est, ut qui in imo
rent humores, in summam cutem extrahat. Quæ ratione
tricularum doloribus laborantes in solium huius olei de
ndere iubeamus, in longum tempus, si morbus quidem inci
ens, finitur: si inueterat, moderatior redditur.

Amaracum, maiorana, terty calfacientium ordinis est, are
cientium uero secundi.

Amarantum extenuantis & incidentis est naturæ. cum
no itaq; potum menstrua agit, sanguinem in minima frustra
conglobatum liquat: cum ænomelite haustum, omnes fluxi
es desiccet, stomacho interim infestum.

Ambrosia potentiam habet conspiciantem & repellentem,
ata plasmati modo illita.

Ammi calfaciendi & exiccandi uim habet, in tertio gra
u, tenuioris consistentiæ, discutientis & urinam proliciē
is naturæ: cuius semen utilissimum est.

Amiantum nascitur in Cypro insula, scissilis præferens
luminis faciem, inflammatur quidem ab igne, non tamen
omburitur. Utuntur nonnulli ad siccifica depilatoria.

Ammos, sabulum in littoribus maris potentioris, est pote
tis exiccatoris: feruens igitur sole succensum, aquosa are
acit corpora, si eo aggeris modo obruantur & sepeliantur.
correfactum uero, somentum siccum, milij salis que loco,
præstat.

Ammoniacum thymiana, gutta ammoniaca, quæ ad odo
rem uaporatur, liquor est ferulæ, intensam emolliendi facul
tatem obtinens, ad id ut duritias non sensiles, quas scirrhus
uocāt,

uocant, & articulorum topbos dissoluat.

Amurca è secunda classe est potenter calfacientium, siccantium intense: quo nomine corporum siccioris temperamenti bulceribus medetur, reliqua omnia contēdit et irritat.

Ampeloprasum, seu sylvestre porrum, acerrimū existit, lidiſſimæq; facultatis in extremo à temperatis recessu. Quod circa exulcerat, & uiscidos humores incēdit, organa obstrata obſtrictione liberat, & stomacho perniciosum est.

Ampelos agrias, hoc est, uitis sylvestris, cum racemi, tunc uirgulta, abstergentis sunt potentiae, nonnihil tamen stipitatis obtinent.

Ampelos hemeron, uitis satiuā, eandem fermē quam uitis sylvestris facultatem habet, nisi quod imbecillior est.

Bryonia, quam Græci ampeloleucen quoque, id est uitem candidam, & philotron à depilandis corijs, quem usum habet, nominant, ramuli ueluti stomacho accommodati, manū ducantur, & lotium proliciunt. Radix extergendi uim habet, & subtilium est partium, ac temperate calida: quā ratione splenes induratos, si bibatur, liquat. Cum caricis eadem foris illita, scabies, leprasq; medicatur.

Ampelos melæna, uitis nigra, quæ et ipsa bryonia nomen habet, per omnia prædicta refert, nisi quod inefficacior est.

Amygdala amara extenuant, & ab obturatione tenaciorumq; humorū qui in alto corporis hærent, uindictam cutem extergendi potentiā obtinent. Eiusdem etiā facultatis ipsa arbor est. Sed dulcia moderatam caliditatē sortita sunt.

Amylum, expurgato tritico ad hunc modum conficitur: triticum aqua ut madescat, sub Sirij stellæ ardoribus irrigatur, aqua transfusa & commutata per diem quinquies. Vbi autem teneritudinem contraxerit, colata aqua, denuoq; infusa, furfures supernatantes cribro excepti separantur, & quamprimum sub sole priusquam acescat siccantur. Hoc moderate refrigerat, siccatur, & acria lenit.

Amomum

Amomū uiribus acoro cōpar est: praterquā quod acorus
maiorē siccandi, amomum uerō coquēdi potestatem obtinet.
Anagallis utraq; admodum extergentis est potētia, caloris
iam nonnihil, & nonnullas attrahendi uires continet, adeo
t surculos, spicula euellat. Succus ipsarum caput per nares
iucum exugendo purgat.

Anagyrus teterrimi odoris frutex est, acris, calfaciens &
attrahens, semen ualde tenuium est partium, & ciendæ uo-
itioni dicatum.

Andrachne, portulaca ex tertia classe refrigeratiū est, hu-
edantiū uerō secūda: qua de causa febre æstuantib. aluo im-
posita opitulatur, fluxus expellit. Dēiū stuporē, qui ab acido
i cōtactu cōtrahitur, suo lēto planat atq; emēdat. Ob stipe-
citātē uerō opē dysenterijs & sanguinis eruptionib. cōfert.

Androsæmon duplex est: alterum quidem ascyrrhon, siue
scyrroides uocatur, & est species hyperici: alterum uerō
ionysius. Vtriusq; semen expurgandi uim continet, sed fo-
a potentius desiccant.

Androsarces, herba, amarorem & acrementum habet,
naturamq; distrahendi & arefaciendi. Potest non tam ipsa
uam semen eius, potu urinam ducere.

Anemonæ, omnes acris, absterforiæ, euellentisq; & ora-
isorum aperientis naturæ sunt. Pituitam itaque euocant, &
pras detrahunt appositæ, lacq; suppeditant.

Anethum, calfaciēdi extensam habet facultatem in recessu
temperatis secundo, arefaciendi uerō remissius: oleo elixa-
um discutit, dolores sedat, somnū conciliat, crudos et matu-
ationi rebelles tumores concoquit. Crematū tertiam calfaci-
ndi siccandiq; distantiā induit, qua de re hūlceribus humo-
de flaccescētibus impaetum subuenit: humidius, minusq; calis-
um, eoq; maturatiuum magis est uiride.

Anthyllidis duo sunt genera, sed utraq; hūlcera desiccant.
uæ camæpityi non absimilis est, tenuioribus constat partis
bus,

bus, aded ut comitali morbo obnoxios iuuet. Postremo in
tergendo maiorem efficaciam exerit, quàm altera.

Anisi semen acrius existens, calidū & siccum in tertia
stantia est, eoq; lotium elicit, & flatus discutit.

Antirrhinum, uel anarrhinon, bubonio, hoc est inguina
herbæ similem sortita est potentiam, sed imbecillio rem: ex
lo igitur etiam huius coniecturam facito.

Anonis, ononis' ue excalectoricæ uirtutis est, præsertim
dix: cuius succus cū uino potus, non lotiū modò proritat,
lapides etiā dissipat, crustis frāgit, ac dentiū cruciatus leni

Aparine, sunt qui phlanthropon, qui omphacocarpon
cant, moderatam habet abstergendi & exiccandi potentiam
& subtilioris substantiæ quippiam.

Apios, pirus, disparis tēperaturæ est, partim terreæ, pa
tim aqueæ naturæ compos. Quapropter esu stomachum ad
iuuat, suum sedat, cataplasmatīs modo inducta exiccāt, &
moderatē refrigerat.

Apocynum, uel cynocrambe, hoc est canina brassica. V
catur autem et cynomorum (id est canum mors) quod cano
enecet ocysimè: sed & homini letale uenenum est, satis terri
odore spirans, citra ariditatem calida. Quocirca illitu im
pacta, d. strabit.

Apochyma, resina xopissa, uetus à nauigijs derasa pix est
diffundendi et desiccandi uirtute donatum, tumores discutit.

Araneus animal, autore Dioscoride, in emplastrum emol
litum, fronti q; & temporibus impositum, tertianarum febr
um circuitus persanat. Tela eius adbibita, sanguinis eruptio
nem compescit. Et hulcera in extima cute ab inflammatio
nibus uindicat.

Argemões herbæ potestas in abstergēdo et dissipādo sita est.

Arisarum multo minus quàm aron est, & acrius, radicē
oli uē instar obtinens.

Artstolochiæ (id est, mali terræ) omnes species calidæ sunt,
peteno

LIBER SEPTIMVS.

562

potentiæ, & subtiliorum partium, in astringendo efficaces, amarulentæ, subacres, atq; ad medicationes utilissimæ. Vesum rotunda tenuitatis longè plus, & ad omnia vires efficaciores continet. Sed quæ clematidis (hoc est sarmentacea) appellatur, fragrantior quidem, sed imbecillior. Longa intertramque medium facultatis locum obtinet, nisi quod caliditate sua rotundæ nihil concedit.

Arceuthos, iuniperus calfaciæ siccificæq; in tertio ordine facultatis est. Fructus eius pari quidem modo calfacit, sed in prima distantia siccatur.

Arcion herba, quam et prosopiten cognominant, folia corymbidis similia continet, ampliora uerò & duriora. Naturæ distrabentis, exiccantis, & astringentis est. Quæ ratione omnia uetustis huiusmodi succurrunt.

Arctium uerbasco respondet: radicem uerò teneram, candidam, & dulcem possidet. Attenuantis, siccatoris, mediocriterq; extergentis potentiæ est.

Armeniacum abstergeri uirtute cum leuiuscula acredine, & exigua stipticitate præditum est: quæ de re ocularibus inditur in medijs. Prodest itidem ad pilorum in palpebris incrementum.

Arnabo in odoramentorum cõsu est, cuius rei gratia unguentis subinde inseritur, tertij calfacientium & arefacientium ordinis, cassiæ carpesioq; simile. Quamobrem in eius penuria, Podonius cinnamomum in locum ipsius substituendum censuit.

Arnoglossum, plantago frigoris pariter et siccificæ facultatis est, secunda à temperatis distantia, mixtoq; temperamento, partim quidem terrena, partim uerò aquosa substantia constans: obtinet austerum quiddam, atq; astringens. Eam ob causam aduersus malefica huiusmodi, fluxiones ac putredines idonea, symmetria temperiei, & hæmorrhagias cõpescit, & multo uicis usus est, et plurimis cõferens: siccitatis etenim absq; erone particeps est, frigiditatem torporis expertem obtinet.

Arum ex prima calfacientium & desiccantium classe est.

N

terrestre

terrestrem & ipsum consistentiam calidam atque extergentem sortitum. Radices eius maiorem calfaciendi uim, sed dracunculo inferiorem possident.

Arsenicum, auripigmentum urentem habet potentiam, quo ad denudandam pilis quamuis corporis partem utuntur. Quod nisi maturè detrahatur, ne cuti quidē ipsi parcat. Cæterum ustione subtilioris redditur essentia.

Artemisia, utraq; species artemisia calfaciendi uim habet in secundo à medijs recessu, exiccandi uerò in primo. Cõstat ex partib. raris, subtilib. q;. Qua ratioe renū lapides cõfringūt, et ad muliebriū locellorum fomētationes accommodatæ sunt.

Artos, panis cataplasmatīs modo illitus, potentiozem habet in distrabendo facultatem quàm triticum, id quod ad salis & fermenti naturam referendum est. Præditum enim extrahendi facultate ex alto fermentum existit.

Asarū, acoro asimilis est potētia, sed paulo magis intēscit.

Absbole, fuligo qua pictores utūtur, ex uitriarijs officinis colligitur, distrabētis & acris est potētia. proinde nō tā adurit, q̄ exedit. Vulnerib. cicatricē cū cerato rosaceo cõciliat.

Ascalobotes, stellio animal ad alia quidem nihil adfert momenti, à scorpij tamen iclu compunctos iuuare perhibent, si plagæ imponatur. Commiscetur etiam intendendi facultatem habentibus medicamentis.

Asclepias calidæ et aridæ facultatis, subtiliūq; partiū, torminib. cum uino sumpta succurrit, illita uenenatorum iclus, utriq; & mammarum maligna hulcera medetur.

Ascyrrhi, in androsæmo facta est mentio.

Aspalathi facultas ex dissimilaribus constat partibus, acri pariter & astringente. Ex utriusq; ratione siccificæ est potentia, atq; ob id quidem medendis putredinibus & defluxionibus est utilis.

Asparagus petræus siue myacanthinus, abstergendi uim possidet, media inter caliditatem & frigiditatem temperie.

Renum

LIBER SEPTIMVS. 563

Renum & hepatis meatus ab infarctu & obturatione uindictat, præsertim radices ipsius ac semen: quinetiam dentium cruciatibus medetur.

Asplenū, facultatis quidē attenuantis est, non tamen calida, quo utiq; nomine calculos atterit, & renes comminuit.

Astaphis, uua passa, satiuā quidem concoquit pariter & astringit, moderateq; dysicit. Syluestris uerō tantæ acrimoniæ est, ut pituitā capitis per os deducat, et ualēter abstergat.

Atticus asier herba, quā alij buboniū, id est inguinariā ob hoc ipsum appellāt, quod nō solū cataplasmatīs more impaēda, uerū adalligata etiam bubonib. prodesse creditur. Mixtam facultatem, discutientem et refrigerantem sortitus est.

Astragalus, pusillus est fruticulus, radice astringente, arefaciens non instrenuē. Hūlceribus itaq; diuturnis cicatricem inducit, alui fluores cohibet radix in uino elixa & pota. In Phæneo Arcadiæ, plurimo prouentu nascitur.

Asphaltus, bitumen secundi ordinis arefacientium & calfacientium est, qua de causa uulnera cruenta glutinat.

Asphodeli, hastulæ regiæ, radix cū abstersione, discutiēdī facultatē obtinet. Deustæ autē cinis calidior, siccior, et tenuioris substantiæ redditur. Quā de re capillorū defluujs medetur.

Atractylis, colus rustica, uel cnicus syluestris, ex spinarū existit genere, persiccatoriæ et mediocriter calorificæ potētiae.

Atriplex humida quidem in secundo excessu, gelida uerō in primo, ideoq; uentrem ocysimē permeat. Semen huius abstergit, quamobrem contra morbū regium ex iocinoris præfarctu, utilis est.

Aphace, modo lentis astringit: comesta concoctioni quā lenticula contumacius renititur. Potentius cum moderato calore deficcet.

Aphronitrū, tantæ digerentis et abstergetis est potētiae, ut non sordida quæq; tantum detergere, sed prurigini etiam opitulari possit. Laedit autem, si potetur, stomachum.

N n 2 Spuma

Spuma nitri eiusdem cum nitro facultatis est, nisi quod subtilioris est essentia, ac proinde contritum triticeæ farine speciem exhibet.

Achras, pirum sylvestre, æqualis cum piro potentia est, sed magis quam reliqua pirorum genera intensa: cuius rei gratia ampliora committit hulcera.

Absinthium, ex prima calfacientium classe, exiccantium uero tertia astringente, amarulenta, & acri simul qualitate pollet, qua biliosos uentris humores cum per aluum, tum per lotium exhaurit. Quibus uero pituita in uentre retenta redundat, his ob uim adstringentiam nihil opis præstiterit. Succo eius longe in cal faciendo præstantior uirtus est.

Balani myrepisicæ, hoc est glandis unguentariæ internum seu carnosum, abstergentis & incidentis cum astringente facultatis est. Ob hæc sanè non uomitiones modo cõcit, sed per egestionem alui excrementa largiter deiecit, cum mulsæ drachmæ unius pondere sumptum. Cæterum cum posca contra uiscerum obstructionem remedium est. Quin & foris cutis etiam uitia cum aceto illitum exterit. Cortex eius uehementem adstringendi facultatem possidet.

Baccharis, fragrantior est herba, cinnamomum referens, coronaria, acrimoniam gustu relinquens. Cuius radix elixa, obstructiones recludit, lotia ducit, & menstruas purgationes promouet. Folia eius quoniam adstringendi facultate pollent, cohibendis fluxionibus accommodata sunt.

Balaustium, sylvestris mali punici flos est, ualenter adstringens, sicca & gelida facultatis. Hulcera igitur quæ summam occupant cutem, cicatrice obducit, & fluxiones cohibet.

Balsamum, quod instar ligni existit, calfaciendi et arefaciendi uim habet, secunda à medijs distantia, & attenuantis est substantia. Opobalsamum, hoc est liquor balsami, longè subtiliorum est partium. Carpobalsamum, quod est fructus balsami, eiusdem quidem facultatis, sed partium subtilitate inferior est.

Baloten

Baloten alij marrubium nigrum uocant, acrem & detergentem habet potentiam. Cataplasmatibus modo cum sale impadum, iactibus rabidi canis opitulatur.

Bati rubi fruticosum, potentē adstringendi siccandiq; uirtutē obtinet, quo nomine uulnera conglutinat, et destillationes fluoresq; cōpescit. Radix eius præterquā quod constipat impensius, non exiguam habet consistentiæ subtilitatem, qua lapides renum confringit. Fructus, siquidem maturus sit, cū moderata quadā astringitione calidior, et ob hoc etiā uescus est: immaturus uerō cōstringit, & potenter exiccat, præsertim desiccatus. Congeneres etiam facultates flos obtinet.

Batrachi, ranunculi quatuor sunt speciatim discrimina, omnium iusto calidior et siccior est potentia, acris uidelicet & urens, adeo ut non sine dolore exulcerationē excitent. Quibus si intra modū utare, cutis tantū uitia abstergūt. Radix autē eius arefacta medicamentum sternutationi ciendæ præstabit.

Batrachi, ranæ in iure esculento elixæ, à uirulentis moribus percussis utiliter eduntur: combustarum uerō cinis quoniam deustione siccissimus euadit, sanguinis eruptiones sistit, admixtaq; liquida pice alopecias sanat.

Bdelliū tā Scythicū quā Arabicū, ad indurata emolliendū quodāmodo natū est, præsertim uerō recētia. Arabicū uerinā quoq; proritat, lapides cōminuit, & cruda concoquit.

Betonica persubtilibus admodum ramulis herba est, frondes pulegio similes sortita, sed graciliores, & tantum non qualitatibus expers gustantibus. prouenit frequenter locis saxosis, qua et in renū medicaminibus utuntur. Est uerō apud Romanos adhuc alia quædā betonica cognominata, quæ à Dioscoride cestrō uocatur, ab alijs uerō psychrotrophon, eo quod gelidissimis gaudeat locis, excepta efficacia, nihil possidens affine superiori. ad prouocandum lotium, & alia bene multa egregie prodest. Porro radix ipsius uomitiones irritat, si cum hydromelite bibatur: folia autem aluum deijciūt.

Nn 3 Bechium

Bechiū, tuſſilago, ſunt qui bechicō nūcupent, inde adeo quod bichas, hoc eſt tuſſes, & non niſi recta ceruice ſpirandi anguſtias perſanandi praeſerogatiuā quādam habere uideatur ſuffitum. Conſtat uerō ex calida & aquea ſubſtantia.

Blitum eſui idoneum olus, humidum & frigidum eſt in ſecundo à temperamento reſeſſu.

Bulbus, qui edendo eſt, leuem quādam amaritudinem, pariterq; adſtriſtionis puſillum continet: deſiccāt, abſtergit, & conglutināt uulnera. Bulbus autem uomitorius eſt, cuius lento longē calidioris eſt potentia.

Botrys, quam ambroſiam nonnulli, quidam artemiſiam nūcupant, planta eſt inſigniter odorata, quae cum uino ſumpta, orthopnoicis opitulatur.

Buboniū, aſter Atticus nūcupatū, in aſteris hiſtoria traditū.

Bugloſſum, lingua bubula, calefacit & humectat. quam obrem in uinum deieſtam, animi uoluptates lētitiāq; conciliare perhibent.

Bunium, quod aliqui arſtion dicunt, calidum eſt, urinam menſesq; promouet. Falſo uerō banium, quod pſeudobuneon nominant, illi eſt aſimile.

Bupreſtis, beſtiola eſt, cantharidi non aſimilis, eamq; ob cauſam haud aliter quā illa reconditur.

Butyrum, maturat, & mediocriter diſtrahit, in tenellis corporibus. Bubonibus itaque & abſceſſibus circa aurem praſenti eſt remedio, gingiuſ extenuat, praſertim puerorū dentientium. humores pectori impactos, lindum concoquit.

Buphthalmōn, florem gerit chamæmelo ſimilimū, uerū multo grandiore & acriore, qua de re diſcutiendi etiam uim obtinet, ita ut duritias quoq; cerato mixtum curet.

Brathry, ſabina cupreſſo ſimilis eſt, calefacit & ſiccāt in tertio à temperatis exceſſu, & tenuiſſimis eſſentiae partibus conſtat. extenuat itaq; & digerit pota. Putredinibus cupreſſi more accommodatur.

Bretanica

Bretanica astringit pariter & conglutinat, sylvestri ru-
mici facie & figura similis. Expressus ex bretanica succus,
oris putredinibus subsidio est.

Bromus, auena legumen uirib. hordeo respondet. Arefacit
aut, & moderata citra uellicationem distrahit, stipticitatisq;
nonnihil obtinet, ac proinde uentris fluoribus remedio est.

Bryon thalassion, muscus marinus refrigerantis & astring-
entis est potentie, feruentibus itaque inflammationibus il-
litum subuenit.

Bryon, quod splanchnon à quibusdam nuncupatur, in
quercubus albisq; populis pariter & piceis repertum, dige-
rentis simul & emollientis mediocriter potentie est, præse-
tim quod in cedris inuenitur.

Bryonia, in uitis candidæ historia explicata est.

Gala, lac omne è trib. conflatum est essentys, caseosa, sero-
sa ac pingui, qua comprimis abundat bubulū, unde & bu-
tyrus efficitur. Serum ipsius abstersoria præditum est poten-
tia, qua de causa aluum quoque subducit, si ipsum decoctio-
ne secernas: caseosum uerò lac, crassum que magis obstru-
it, atque ob id quidem acridinem retundit. Lac cum litorali-
bus lapillis candentibus, alias ue decoctum, inculpatius fit, &
præstantissimum intestinorum torminibus, & acribus uentris
fluxionibus remedium. In totum uerò lac, contra acria oculo-
rum rheumata, & alias quasq; acrimonias competit. Tem-
peratissimum autem omnium lac est humanum, mox capri-
lum, deinde asininum pariter & ouinum, postremò bubulum.

Gales, mustelæ crematæ cinis abunde distrahit: cū aceto itaq;
illitus, misera pedū ualetudine arthritideq; oppressos medica-
tur: torrefacta aut et inueterata magno etiā morbo opitulatur.

Galium, appellationem ab eo quod lac coagulet, obtinuit:
aparinæ non absimile, uires desiccandi cum acrimonia qua-
dā leni sortitum est. Flos eius contra sanguinis eruptiones &
combusta est præsidio.

Nn 4

Galipsis

Galipſis, alij galibidolon nuncupant, urticae neutiquam abſimilis eſt herbula, leuorem tamē maiorem, uiroſumq; & graueolentum emittit odorem, diſcutit, & ſcirrhoſos tumores emollit. opem hulceribus quæ depaſcendo ſerpunt, cataſmatis modo illiis confert.

Garum excellenter calefacit & exiccat, qua de cauſa medendis putreſcentibus hulceribus foris quidam adhibent. Infunditur item utiliter his, qui inteſtinorum torminibus, & dolore coxendicis tentantur.

Gentiana radix, magna ſatis efficacia expurgare, attenuare, detergere, & ab infarctu deniq; uindicare poteſt.

Geraniꝝ una quidem ſpecies, folijs eſt anemone ſimilibus prædita, radice eſculenta, quæ in uino drachmæ unius pondere ſumpta, inflationes uteri diſcutit. Altera uerò huius herbae ſpecies, ad medicinas inutilis eſt.

Ge, terra quælibet exiccandi uim habet: quæ uerò nulli alteri mixta eſſentia eſt, id etiam ſine corroſione præſtat. Quod ſi ignea quædam illi qualitas admiſceatur, hanc etiam lotionem exuit. Terræ cultæ quælibet pinguitudo, ad cuiuſuius membri exiccatione opus habentis medelam, utilis eſt. Luti Aegyptij ad aquaticeas & lienofas afflições in medicina uſus eſt, tum ad laxos quoq; tumores haud obſcurè proficit. Ex terra medicaminofa, Lemnia rubrica, quæ ſphragis, hoc eſt ſigillum appellatur, deſiccat, & aſtringit moderatè, uirulentis medicaminibus præſentaneum amuletum exiſtit. Medetur itidē maleficis hulceribus, admixto aceto, ſeu uino. Sanguinis eruptiones quaſcunq; ſiſtit, & inteſtinorum tormina, depaſcentium quoq; hulcerum naturam imitantia, inteſtino mulſa prius, mox ſalſilagine etiam eloto ſedat. Minium, rubrica Sinopica, maiorem habet uim quàm Lemnia: emplaſticis inferitur remedys, tæniaſq; uentris in potu ſumpta interficit. Samia terra mitior quàm Lemnia eſt, ceu glutinans & uiſcoſa. Utendum itaq; ea eſt, quotiens mitigationem

tionem res ipsa postulat: quibusvis sanguinis, quacunq; parte erumpat, reiectionibus auxiliatur. Selusina terra, Chiaq; uim absterforiam multo potentiores obtinent: qua de causa mulierculæ quædam ea ad lenocinium faciei inducendum, cutim læuigandam & erugandam utuntur. hucera carnis expleat, & ad cicatricem perducit, præsertim ambusta. Creta cimolia mixtam facultatem obtinet, frigoricam & diaphoreticam illota. Abluta uerò refrigerat uehementius, & ambustis ex posca subuenit. Ampelitis à uineis nomen sortita est, quod illita innascentes uitibus uolucres uermiculos enecet. Habet insuper arefaciendi & discutiendi strenuas non sine erosione uires. Cretica terra aërosa est, et citra moradicationem absterforia. Eretria terra euidentem adstringendi uim possidet. Cremata uerò arefacit sine morfu. Probatur magis cinerulenta. Pnigitis terra, eadem potest quæ cimolia, sed est non paulò nigrior. Armenia, quam bolum dicunt, summè persiccata: proinde intestinorum torminibus, alui profluuijs, reiectionibus sanguinis, tabi, difficultati anhelitus ex humiditate, humetibus hucerbis, & pestiferis deniq; affectionibus egregiè subuenit. Interdum cum uino tenui diluto: si febris infestat, cum aqua potatur. Alana uerò gleba æqualem habet Armeniæ effectum. Ochra, distrabentis & exedentis est potentia. Quapropter carnes lasciuientes, & huceri supercrefcentes compescit, & uacua explet, si cum cerato mixta adhibeatur.

Geras, senecta, exuuiæ anguis summè desiccata: quare cum aceto decoctæ, dentium cruciatus adiuuat. Aspidis senectus oculorum aciem plus alijs exacuit, si trita cum melle oculis illiniatur.

Ges entera, intestina terræ (uermes terrenos quidam uocant) læuigata, & neruis saucijs impacta, maturrimè ad miraculum usq; succurrent.

Gigarta, nuclei acinorum uuae exiccant ordine secundo, refrigerant uerò primo, gustuq; abundè acerbi sunt: affatim

fluxibus idcirco quibusq; conueniunt.

Gingidium non admodum euidentis calfactoriae facultatis est. Exsiccat autem in tertio à temperatis excessu, atq; astringit: proinde gratum est stomacho.

Glaucium astringit cum insuauitate quadam, refrigerat non obscure, sacrosq; ignes non adeò ualidos sanat.

Glaux herba, temperaturae calidae est atq; humida, & proinde nutritibus lactis ubertatem generat.

Glechon, pulegium excalfacit & attenuat potèter, quod propter emplastri modo impositum, rubrificationem inducit: ex pectore & pulmone, humidos, crassos, atq; tenaces humores, excreta faciles & ductiles reddit.

Glaeos, hoc est, strigmentum sordesq; balneorum modice calfaciendi, emolliendi, discutiendiq; uim habet, rhagadibus & condylomatis confert.

Glycyrrhiza tepida & humida est temperamento, cum leuiuscula quadam ui adstrictoria. Qua de causa asperitates lenire solet, neque tantum in arteria, sed etiam in uesica scabra. Siti extinguendae habilis.

Glycyfiden quidam pentomoron, nonnulli paeoniam uocant, cuius radix acrimoniam habet, & leuem amaritatem cum ariditate coniunctam, nonnihil astringionis quoque obtinens. Mouet itaque menses, renes, iecurq; emundat, amygdali quantitate è uino sumpta. Si uerò uinum, in quo potatur paeonia, fuerit austerum, alui profluvia sistit. Alligata, pusillum comitialibus medetur.

Gnaphalium, centuncularis herba, inde à Graecis nomen sortita est gnaphalion, quod folijs eius subtilibus, & ob molliem sequacibus, tomenti loco utantur. Sunt autem candida, & leuiter astringentia. Qua ratione cum uino astringente contra intestinorum tormina bibuntur.

Gongilidis, rapi non tam radix, quàm semē inflandi uim retinent, semen genitale procreant, ueneremq; excitant.

Gorgyo

Gorgylum, sunt qui sceli appellant, calidum est, urinam
 & menstrua ciens: radix eius cum melle linctā, uitiosos pe-
 ctoris humores educit.

Gyris pollen farinaceus, uires habet amylo congeneres,
 sed calidior quadantenus.

Gypsum præterquàm quod exiccat, opplendi facultatem
 obtinet. Quo fit, ut sanguinis eruptionibus opituletur, dilue-
 um cum polline & oui albore. Crematum non tantam op-
 plendi uim obtinet, sed exiccandi maiorem, retunditq̃, potis-
 simè cum posca.

DAdes, tedæ nonnihil acredinis habet, & uim concoquen-
 di, & detergendi. Proinde in aceto elixā, iureq̃ eius, ore
 dentibusq̃ collutis, cruciatus dentium placant. Quòd si cum
 melle sumantur, caput pituita per palatū exonerant. Lincti-
 bus permixtæ, quæ in pectore hærent, ductilia, excreta uq̃
 facilia efficiunt.

Damascenorum uberior fiet in Prunis mentio.

Damassonium abstergentis est potentia, ac proinde cal-
 culos cōfringit, & quæ per aluū diffluūt, ad urinas deriuat.

Dauci (quem & staphylinum nuncupant) duæ sunt spe-
 cies. Satiui radix flatuosa est, eoq̃ ad uenerem excitat. Syl-
 uestris uerò dauci semē, nihil flatuosi habet, sed lotij & men-
 sium proritandi uim continet. Eiusdem facultatis ipsa exis-
 tit etiam herba.

Daphnes, lauri arboris folia siccant, & excellenter cal-
 faciunt, sed bacca magis quàm folia. At radicis cortici ama-
 ritudinis & acerbitalis nonnihil inest, lapillosq̃ comminuit.
 Si potetur ex uino fragrante, triobolari pondere, iocinorosis
 est præsidio.

Daphnes herba, quæ & Alexandria uocatur, tempera-
 mentum est calidum, gustus acris pariter & subamarus.

Quamobrem menses & lotia proritat. Cæterum daphnoi-
 des, hoc est, laureola, potentia persimilis Alexandriæ est,

quæma

quemadmodum sanè & quæ Chamædaphne nomē claturā obtinuit, quæ utiq; etiam ipsa esculenta est.

Derma, pellicula ouis recens detracta, & etiamdum calida, his qui quocunq; modo uapulauerunt circumposita, mirificè succurrit.

Hippopotami, hoc est, fluuiatilis equi pellis combusta, atq; cum aqua trita, & superinducta, panos discutit. Pellis uiperina leuigata, & impacta, in alopecie glabretis, pilos cum admiratione reuocat.

Solearum ueterum coria, igne cremata, cinerem ualde exiccatorium reddunt. Quamobrem ex calciamentis, pedum attritibus nōdum inflammatis et ambustis, intertriginibus, carniūq; excrecentiis medetur.

Dictamnus subtiliore potentia constat quā pulegiū, cætera similis. Verū quæ pseudodictamnus, id est falsa dictamnus appellatur, imbecillior est.

Dionysias, in dictione Androsæmon explicata est.

Diphryges mixtam sortita potestatem est. Complectitur enim in se acerbi nonnihil, & acremēti aliquantulum. Quo nomine bulceribus malignis præsens est remedium.

Dipsaci spinæ radix exiccatoria est, in secundo abscessu cæterum abstergentis nonnihil potentie habet.

Dorycnium frutex papaueri & mandragoræ, æquipolentem habet temperaturam, extremæ frigiditatis. Cuius sanè si modicum sumatur, stuporem conciliat: si paulo largius, interficit.

Dracunculus aro æquale quiddā possidet, sed illo acrior, amarior, calidior, subtiliorisq; substantiæ est, & leuiusculam quandam adstrictionem permixtam habet. Radix ipsius uiscera, si in potu fuerit hausta, expurgat. Saluberrimū per uisceribus & maleficis bulceribus est præsidium. Folia similem facultatem sortita sunt. Fructus efficacior est.

Dryopteris, quærna filix, gustantib. mixtam exhibet qualitatem,

itatem, dulcem & subamarulentam. Radix acerba est, & uim habet exedendi, qua glabreta inducit.

Drys, quæ cum non tam folia quàm glandes exiccatoria et epida facultate participant. Ob hoc uulnera nõ uetusta ceu glutino compingunt, inflammationes iam primùm inchoantes sanant. Porro mēbranosum quod sub corio glandis latet, & carnem fructus conuestit, quoniam astringentis multo plus continet, supprimendis sceminarum fluxibus, & alijs quibus unq; profluuiosis & gritudinibus exhibetur.

Benus lignum, uim habet ex-calfaciendi & extergendi, tenuioribusq; partibus cōstat. Quo nomine quæ tenebras pupillis offundunt, extergere & stimatur. Inscritur item alijs medicamentis ocularibus.

Encephalos, cerebrum leporis elixum & lauigatum, scitur, pueris dentientibus prodesse dicitur. Nec desunt, qui id comosum tremoribus succurrere memoriæ tradiderunt. Cerebrum gallinacei in uino bibendum, contra serpentium ictus exhibetur, autore Dioscoride. Sanguinis eruptiones à cerebri membrana profluentes compescit. Cerebrum cameli, ut tradit Galenus, aridum cum aceto potum, comitialibus medetur. Idem præstat mustelæ cerebrum. Hirundinis cerebelum melle temperatū, oculorum suffusionibus suffragatur. Quinum cerebrum similiter præparatum, infantium dentitionibus exquisitissimè subuenit.

Elea, germinationes oleæ tantum refrigerant, quantum stringunt. Oliuitas uerò siquidem ex ædè maturuit, temperatè calfacit. Immatura acerbior & frigidior est. Lachryna oliuæ Aethiopica, subtile ammoniacum præferens, nasuram habet absterforiam. Hinc cicatricibus medendis, albuginibus, obtusæ item oculorum aciei succurrēdæ adhibetur.

Quin & dentium cruciatus arcet, si cauīs ipsorum inferatur.

Nonnulli uerò hanc oleastrū, id est oleū syluestre autumanta

Bleon, oleum quod ex oliuīs drupis conficitur, dulce, calidumq;

dumq; moderatè, magis uerò humectans. Oleum, quod e
 crudis & nondum inchoatè maturitatis oliuis expressum
 est, à Græcis omotribes & omphacinum nuncupatum, quap
 tum in se habet adstridionis, tantæ etiam frigiditatis parti
 ceps est. Oleum uerò elotum, rostonis exors minimè mordi
 cat. Oleo ueteri quantum diurnitatis, tantum etiam calidi
 tatis accedit, & potentiores ad discutiendum uires acqui
 rit, potissime si initid ex tenuioribus partibus constiterit: ex
 eo autem censu habetur purum atq; pellucidum, & cuius ue
 momentum, magnam corporis partem inungit, promptissi
 meq; penetrando à cute imbibitur. Huiusmodi autem præci
 puè Sabinum existit. Quod ex oleastro funditur, astringit
 mul & abstergit. In omni oleorum genere id omnium planè
 squalidissimum est. Veteri oleo uiribus omnino a quipolle
 rhicininum. Reliqua olea, sesaminum uidelicet & raphani
 num, & quæ id genus sunt alia, pro cuiusque unde constan
 essentia, uaria etiam uirium discrimina sortiuntur.

Elæomeli in Syria, oleomel ex quodam arboris caudice
 sua spôte manat, melle crassius, sopore dulci, quod crudos hu
 mores & biliosos per aluū detrabit, duorū cyathorū mēsurā
 cum aquæ hemina potiū. Veruntamen qui hauserunt, in ueter
 num torporē deficientibus uiribus incidunt: quod tamen ex
 pauescendū non est, uerū à sopore excitandi sunt crebrius.

Elaterium, succus syluestris cucumeris fructus appella
 tur, quod è secundo calfacientiū ordine existens, menses pro
 licit, & fœtus in utero appositū, extrema qua pollet amari
 tudine necat. Expurgat præterea nares cum lacte illitum.
 Deducit ipsam quoq; pituitam per inferna factus ex eo cly
 ster, non rarò etiam sanguinem.

Blate, abies arbor, ut nigra populus, calfacit & exiccat.
 Resinæ ipsius inter cæteras resinas fiet mentio. Blatine her
 ba est helxinæ similis, mediocriter refrigerās et astringens.

Elaphaboscus, ceruiocellus, calfacientis & siccificæ fa
 cultatis

cultatis est, in secundo à temperie excessu, & tenui substantia subastringit.

Eleliphacis, salvia insigniter calfacit, & leuiter adstringit. Helenium, inula campana calfaciendi arefaciendiq; potestatem cum humiditate recrementitia obtinet, eam ob causam linib; permixta lētos humores, qui in pectore hærent, educit. Membra quoq; rubrificat, cuteq; incisa exasperat.

Eleoselinum, hoc est, apium palustre, nascitur locis humidis & aqueis, satiuo grandius, atq; ad eadem efficax.

Elephantis unguū scobes cataplasmatibus modo impatiæ, reduūis remedio sunt. Ossium uerò ac dentium ramēta, excandendi & extergendi facultate donata, in id genus medicamentis frequenter usurpantur.

Helcosmata, argenti recrementa appellantur, ea plumbagini consimiles habēt uires. emplastris fuscis, quæ phæas nuncupant, & ijs quæ cicatricem conciliant, inseritur, quoniam astringunt & euellunt.

Helleborus, ueratrum tam candidum quàm atrum, iuxta calfaciendi siccandiq; uim in tertio excessuum ordine possidet. Est præterea acri & alsterforia ui præditum. Quo fit, ut ad leprosa cutis uitia emendanda conueniat. Nigrum per triduum fistulis infusum, callum detrahit.

Helichryson à quibusdam chrysantho, à nonnullis etiam amaranton nūcupatur, planta coronaria est, comam auræ lucis præferens: quæ in uino pota, angustis urinæ, cōtra serpentium morsus, coxendicum dolores, ruptaq; remedio est. Ciet eadē menses, grumosq; sanguinis hausta ex mulso dissoluit, & à capite in subiectas partes destillationib; opitulatur.

Helxine, parietaria, sunt qui per diciū, sunt itē qui parthenō, nec desunt qui sideritim, et qui heracleā uocēt. uirtus eius est abstergere, & cum humore subgelido leniter astringere.

Helxine alia est, quæ cissampelos appellatur, ea discutienti uim possidet.

Blymus

Elymus, panicum, sunt qui melinen nūcupent, milio simile legumentum est, siccatorium & frigorificum, foris impostum etiam uentris fluores exiccat.

Empetrum etiam prassoides uocatur, medicamentum ad purgationes pituitæ pariter ac bilis est, gustantibus salsum, et propter abstergendi quoque uim habere creditur.

Epithymum, thymo efficacius, ex tertio arefacientium & calfacientium ordine atros purgat humores.

Epimedio cum aqueo humore facultas est mediocriter frigorifica: quod illitum, mammas reclusas turgentes conseruat, fertur etiam sumentibus potu sterilitatem inducere.

Epimelis, quæ unedon etiam à colonis Italicis nominatur, syluestris pomus est, cuius fructus acerbitate linguam tenet, stomacho officit, capitiq; dolores infert.

Epipadis, ab alijs helleborina uocatur, quæ in potu sumpta, iocinoris affectibus & contra uenena utilis est.

Erebinthus, cicer, legumentum familiare & flatuosi spiritus est, copiosi alimenti, aluo ut ile, lotio mouendo idoneum, ad genituræ lactisq; creaturam habile, muliebriaq; promouens. Porro quod crium appellatur, hoc est arietinum, cæteris efficacius urinam prolicit. Decoctum eius lapillos in renibus comminuit, præcipuè nigri. Reliqua uerò cicerum species, quæ orobea uocatur, his calidior est, & amaritatis particeps. Syluestria omnibus numeris satius sunt efficaciora.

Eria, fomentis accommodata sunt lanæ recens ab ouibus detonsæ, necdum à sordibus repurgatæ. pinguetudo nanque earum, quæ æsypon dicitur, in coquendo butyro similis est. Mundata uera lana, nihil præterquam materia, excipiens uidelicet liquoribus, idonea est. Cremata uerò acris est, calorifica, exiccatoria, cum partium subtilitate. Ex uligine itaque flaccescentes bulcerum carnes maturrimè eliquat.

Erice, disciendi uiribus sine erosione pollet, in quem uisum florem eius potissimum ac folia usurpant.

Erinos

Erinos, aquatica herba est, cuius seminis drachmæ duæ, cum mellis drachmis quatuor illitæ, oculorum destillationes istunt. Finit aurium dolores instillatus eius liquor.

Hermodactyli radix facta ad purgationes per se, & decoctum ipsius est. Priuatim aut articuloꝝ doloribus in ipso fluxus tēpore dedicata, uerū stomacho nimium incōmoda.

Serpillum, usq; aded calfactorium est, ut cū menstrua, ium lotia proritet.

Erythrodanum tinctorum rubia, radix est acerba & gutui amara, cū lienem, tum iecur, tum renes ita expurgans, ut interdum urinas etiam sanguinolentas proluciat, mensesq; cieat, cutis rugas sordesq; exerat.

Erysimi, irionis semen, nasturtio similiter facultate igneū & flagrans est, qua de re in fermento tostum, pectus in eclegmatis expurgat, duritias emollit, & latentibus denique cancris illitu auxiliatur.

Eusomon, eruca quoq; eiusdem temperamenti, inflationes facit, quamobrem in uenerem stimulat. Semen lotium proluciat, syluestris tamen multo quā satiaua efficacior est.

Bupatorium cum partium tenuitate incidentis est potentia, citra feruorem manifestum: proinde iocinoris infarctus expurgat, & adstrictoria uirtutis particeps est.

Buphorbium exurendi & attenuandi cæteris liquoribus similem uim obtinet.

Ephemerum non letiferum illud, sed cui iris syluestris nomen est, compositam temperaturæ facultatem habet repellentem, & halitu euaporantem.

Echidnæ, uiperinæ carnes temperamento sunt calido & sicco conspicuè, per cutem uniuersam corporis molem repurgantes: quapropter aliquot multi elephantiasi correpti, cū in cibo, tum in potu sumentes, sanitati restituti sunt. At quæ circa mare, alysq; locis aridis degunt, sitim magis inducunt.

Echinus, herba est acerba, repertuendi atque exiccandi

uim obtinēs. Brinacei terrestris fel, defluentes capillos grollinat. Caro eius exiccata, uehemēter discutit, et exiccata. Quod nomine elephantiafi correptis, maloq; habitu præditis, carisq; pluribus malis succurrit. cutis eius deusta, multo ualentius arefacit, acriusq; discutit. Alopecys eum pice liquida illa auxiliatur. Quicquid in marino echino edendo est, urinam trahit, et bonum aluum efficit. Testa cremata, æqualem testæ restri facultatem induit.

Echion alij doriada, alij alcibiadion appellant: ea spinosa est herba, quæ non tantum serpentium morsus epota cum uino curat, sed præpota etiam ab eorum morsibus tuetur.

Hepsema, mustum decoctum, quod à quibusdam siræon nuncupatur, moderatam calfaciendi et concoquendi uirtutem, atq; emplasticum absq; erosionem obtinet.

Zea eiusdem est cum tritico potentia, medium quodammodo inter calfaciendum et refrigerandum locum possidens, leuiter exiccata, et opplendi uim obtinet.

Zingiberis radix potenter quidem excalfacit, neq; primo tamen statim occursum, in euicta cuiuspiam humiditatis, et crassioris essentia particeps est, ideoq; teredinibus facile tentatur, sed constantem seruat caliditatem.

Zythus, mixtae consistentia est, acrimoniam quandam gustu præferens, utpote ex putredine constans, et frigidus ratione acidæ qualitatis: proinde succi etiam prauus.

Zyme, fermentum etiam ipsum ex contrarijs facultatibus est. aciditatis nanque gelida, calorisq; ex putredine proficiens, præterea eius quæ salis atque farina natura constat. Est igitur haud mediocriter calidum, discutiendiq; potestate præditum.

Zomos, piscium recetium ius uentrem subducit, cum per se, tum uino admixto epotum: peculiariter uero ex phycidibus, scorpionibus, iulidibus, percis, alijsq; saxatilibus molliusculis simpliciter cum aqua, oleo, et anetho, et sale elixis. Eorum
itidem

in idem quibus testa pro cute est, tellinarum, hiatularum, conchularum, & gallinacei antiqui cum sale diutissime elixi, uisculum, uentrem subducit. Et diuerso, gallinae ius cohibet.

Hedysmum, menta, calidum, subtile, acre, ex tertia diuariantium à temperie classe, cum humiditate semicoctum, qua in Venerem stimulat. Præditum item amaritudine quadam, ideoque lumbricos interimit. Acerbitatis uero ratione, non inueteratas sanguinis reiectiones sistit.

Hedysarum, quæ & pelecynus uocatur, gustu amarum, et subacribum: unde si potetur, accommodatum est stomacho, et uiscerum infarctus expurgat.

Heliotropium maius, quod & scorpiuron appellant, calida, sicca, & detergentis facultatis existit. Cuius decoctum pituitam expellit, atque bilem, semen eius instar emplastri superinductum, formicas, & id genus alias uerrucas exiccat. Minus & hæc abolet, & lumbricos latos interficit, cum semine suo nitro, hyssopo, & cardamomo potum.

Blectrum, succinum populi albæ lachrymā perhibent, quæ prope flumē Bridanum destillans congelascit, aurum colore præferens: cuius uis est, si potetur tritum, stomachi, uentrisque fluores & sanguinem coercere.

Hemerocalles, radicem habet lilio æmulam, & uiribus æqualem: neque aliter quam id, ambustis succurrit.

Hemionitis cum stipticitate amaritatem obtinet: quo nomine cum aceto pota, lienosis subuenit.

Hepar, canis rabie agitati, tostum, & in cibo sumptum, morsibus quos idem rabiens canis intulit, opitulari creditur. Capræ, assati iocinoris deciduus aquosus sanguis, lusciosos, si oculis instilletur, iuuare. Prodest præterea, dum id coquitur & torretur, lusciosorum oculos eius fumo uaporari. Confert idem iecur assum. Quod comestum, comitiales arguit. Iecur hircinum eadem præstare dicitur.

Tradunt lacertæ iecur exesorum dentium canis inditum, dolorem

dolorem sedare. Lupinum hepar medicamento iocinoroso quod eupatorio constat, admiscetur. Prodest comitialibus iecur asininum tostum, à ieiuno sumptum. Aprugnum, aut si maius dicere cluninum, recens exiccatum, si tritum cum uino bibatur, serpentium moribus succurrit. Calculos postremo mergi iecur aridum, potumq; expellit.

Brigeron, senecio mixtis constat uiribus, frigorifica nempe, & mediocriter discutiente.

Eryngium calfacit quidem, non euidenter: siccitatis autem neq; clandestinae, neq; exiguae particeps est.

Thalattion hydor, aqua marina, acre, calidum moderate, exiccatorium: stomacho, potum, infestum. Aluum turbat, & pituitam trahit. Quo calido quae extrahenda distrahendaq; sunt, consperguntur.

Thaliotrum herba, uires siccandi absq; erosione habet, diutina igitur hulcera ad cicatricem perducit.

Thapsia, acris est, & uehementer cum humore calfacit. quare è profundo uiolenter euellit: quodq; extrahit, discutit.

Thcio, sulphuri quoq; euellendi uis est, cum essentia tenui usque adeo, ut aduersus non pauca animalia uirus ei aculantia resistat, praesertim turturem marinum, atq; draconem, siue aridum idui inspergatur, siue cum salina mixtum, seu pueri urina maceratum, uel cum oleo, uel melle. Quin & psoris portento se succurrit.

Thermus, lupinus qui edendo est, opplendi uim habet. Inest illi amaritas, cum extergendi, disciendi, & exiccandi uiribus absq; erosione. Lumbricos tum illitu, tum potu interficit. Viscera cum ruta & pipere potus expurgat: quinetiam cutis uitia extergit, tumores ac tubera cum aceto mulso emplastri more impositus, dissipat. Lupinus syluestris amarior est, atq; ad omnia efficacior hortensi.

Thelypteris, quam aliqui nymphæam, aut pterin cognominant, filici non tam forma quam uiribus æqualis est: quae cum

cum uino sumpta, latos & teretes lumbricos interficit. Conceptum uiuum necat, mortuum eijcit, folia ipsius esca aluum molliunt.

Thlapsi semē tam acrem facultatem obtinet, ut internos abscessus potum confringat, mensesq; pellat. Per anum infusum, coxendicis doloribus auxilio est, & sanguinolenta exhaurit: atq; alioqui non tam per superna, quā per inferna, biliosos humores acetabuli mensura epota euacuat.

Thridax, lactuca, holus est non extremē frigidum & humidū, sed pro aquæ fontanæ temperatura: quare inflammatio nibus calidis confert. Sitim restinguit, genituræ profluuium compescit, & uenereas in somno imaginationes coercet. Agrestis lactuca minorem habet quā satia cum refrigerandi, tum humedandi potentiam, uerū succulentior est.

Thymus, calefacit & exiccat, in tertio à temperatis excessu, tenaces ac uiscidos humores incidit.

Thymbra, satureia syluestris, æmula uiribus thymi est: contubernalis uerò, ad omnia quidem infirmior, sed ad edendum potior.

Ex thymelæa granum cnidium, quod semen eius est, colligitur, cui uiribus respondet.

Dæa radix gustu & uiribus acerbæ, ad sanguinis eruptiones, & quasunque rheumaticas affectiones idonea est, siue potetur, siue extrinsecus applicetur.

Hidron, sudorem per se quidem colligere arduum est, miscetur autem in palæstris exercitatorum sordibus cæromati confusis, acquiritq; multum facultatis digerentis. Proinde inflammationibus uberum conflatis, efficaciori sunt auxilio, & ad extinguendum quod flagrat in ipsis conducit. Facit etiā medendis bubonibus. Quod si aridior uidebitur, subiungendus est cum cyprino aut rosaceo.

Ixos, uiscum ex eorū classe est, quæ cū acrimonia quadā calfaciūt, eā ob causam uiolēter ex alto euellit, eosq; dissipat

ad instar thapsiae, præterquam quod illa inefficacius est

Ion, uiola: uiolæ folia aquea & subgelida substantia pluculum pollent:

Ios, ærugo gustu acredinem præfert, discutientis, repugantis, et secantis naturæ: non teneræ tantum carnis, uerum duriusculæ etiā. Quod si quis copiosiori cerato pusillum æruginis cōfundat, medicamentum absque erosione absterforium efficiet.

Hippocampus, animal marinum, perpusillum est, cuius combusti cinis cum liquida pice, capillorum defluuia instaurat.

Hippolapathon, grandis rumex, in palustribus nascitur locis, rumici uiribus proxima.

Hippomarathrum, grande fœniculum canchryi non absimile ualentius quam fœniculum desiccatur. Quo quidem fit, ut alium laticem sistat, lapillos comminuat, & menses proliciat. Semen coriandro simile, sed illo imbecillius existit.

Hippopotami, hoc est fluuiatilis equi testiculus, aridus potius, serpentium moribus subuenit.

Hipposelinum, apio satiuo facultate respondet, nisi quod illo est ignauius.

Hippuridi, equifeto cum amaritate qualitas est stiptica, ualenter simul & absque erosione exiccans, ac proinde grandia quoque uulnera committit, intestinorum ramices iuuat: & affectibus fluidis, uino pota, medetur.

Hippophaes, lappago, uel ut alij appellant hippophaeos, frutex surculosus est, quo uestimenta expoliunt: è cuius radice thapsiae modo liquor colligitur, qui per se, et cum eruacea farina oboli instar exhibitus, tum bile, tum pituita expurgat. Quin uniuersa quanta est planta exiccata, purgandi uim obtinet.

Iris, abunde calefacit, attenuat, abstergit, & concoquit. Quamobrem tussi subuenit. Cōtumaces pectoris humores dures reddit, torminibus circa umbilicum medetur: hulcera sordida expurgat, aluum cum uino sumpta euacuat.

Isatis satiuæ, qua insectores utuntur, desiccatur pariter, & astringit.

astringit. Spaciosa itaq; solidorū corporum uulnera cōglutinat, & sanguinis eruptionib. prodest, tumores aquosos dissipat. Contumacibus ex uitiosa cōsuetudine hūlceribus omnibus obstitit. Agrestis uerò, gustu plus euidentis acrimoniæ præfert, ideoq; quo magis exiccet, humidis putredinibus efficaciter resistit, ad cætera deterior. Sed et spleneticis propter uehementem potentiam utilis est.

Isopyron, uel ut alij uocant, phasiolon, semen gerit amarum atque subacerbum. Crassos igitur & glutinosos humores abstergit & incidit, sic ut corpus contrahat & constringat: quo nomine etiam quæ altius hærent, repurgat. Neque hæmoptoicis noxium est.

Ita, arefaciendi citra morsum potestate salicis folia floresq; obtinent: leuem adhæc constrictionē. Verum his siccior paulo cortex est, cuius cremati cinis ex eorum censu est, quæ potenter exiccant. Clauos & formicas cum aceto extirpat.

Ichthyocolle, glutinum piscosum opplendi & exiccandi uim obtinet. Inditur magna commoditate emplastris conglutinatorijs, & his quæ lepræ curandæ, & quæ ad faciei erugationem lenociniumq; faciunt.

Ancani radix moderatam exiccandi uim obtinet, interdo Crium meatus infarciendi citra mordicationem natū. Eoq; arteriæ asperitates linctæ cum uino sanat, pariter si quis eam modo tragacanthæ atq; glycyrrhizæ mandet.

Cancamum, Arabici ligni lachryma est, myrrhæ similis fragrans, quam ad odorem incendunt & uaporant. Virtutem habet obesos extenuandi, detergendi, & ab infarctu meatuumq; obstructione uindicandi.

Cadmia utraq; species siccant, sed crassioribus constat partibus, quæ botryitis, quasi acinosa, racemosa uel appellatur. Subtilioribus uerò, quæ placitis, quasi glebosa, est nuncupata. Cremata exiccandi facultatem, mordacitatis experte, non sine absterfione retinet. Hūlcera caua carne replet, tã ea

quæ oculos, quàm quæ reliquum corpus occupant, uerùm præcipuè humidiora in corporibus tenerioribus. nam in duriusculis efficacium magis opus est.

Cacalia eandem habet cum cæcano potestatem, æmulamq̃ in omnibus utilitatem.

Calamagrostis, gramē arundinaceū persiccat, quamobrem succus decoctūq̃ radicū ipsius, ocularib. medicamentis inferitur. Semen lotium prolicit, & stomacho accommodatum est.

Calamintha, nepita calida & sicca tēperie est, in tertia diastantia, subtiliū non sine acredine partiū, urib. lōge præstantioribus quàm mentha; nam instar syluestris mēthæ censetur. Facile itaq; in alto hærentia, in summam cutē euellit. Qua de causa sudores mouet, totum corpus digerit. In febriū accessionibus, quæ circuitu fiunt, cū tremore algores sedat. foris cum oleo strenuè infricata, coxendicis doloribus subsidio in clystere est, & prauos cutis humores exterit.

Calamus odoratus ex secundo calfacientium & arefacientium à temperatis excessu, subtilioris nonnihil & astringentis est potentie, urinam ergo proritat. Medicaminibus stomachicis, & quæ iocinori muliebrib. q̃ locellis dedicata sunt, miscetur. Calamus autem pbragmites, abstergit: folia eius uiridia moderatè infrigidant. Cortex combustus, calfacit & exiccat, in tertio propemodum ordine. Sunt qui affirmant radicem eius adiectis bulbis illitā, spicula et aculeos euellere.

Campæ, bruchi, hoc est oleribus innascentes erucæ cum oleo illitæ, à morsu animalium, quæ idu morsu' ue uirus relinquunt, tueri dicuntur.

Cantharides quæ in tritico deprehenduntur, luteis oblique zonis insignes, aceti feruentis uapore suffocatæ, multiplicem usum habent. Nam ungues scabiosos cum cerato eijciunt, clauos & uitia leprosa curant. Exedunt item & deurant: nonnulli autem in medicamenta diuretica momentum ex ipsis adiectum exhibuerunt.

Cannabis

Cannabis semen flatuoso caret spiritu, & exiccatorius est usque adeo, ut semen genitale arefaciat: succus eius uirens, ad aurium dolores ex infarctu & obstructione natos conducit.

Canopum sambuci flos est, de quo in *Ade* memoratum est.

Capnion, siue *capnos*, *fumaria*, hinc sortita nomen est, quod eius herbae succus non parum lachrymas cit, speciem oculorum exacuit, acris & amara est. *Vrina* quoque biliosam streuè promouet. *Iocinoris* obstructiones & infirmitates mediatur. *Stomacho*que robur inducit, & aluum emollit.

Capparidis radix, detergendi, repurgandi, incidendi, dissipandi; facultatem cum quadam amaritate & acredine possidet. Contrahit uerò, stringit, & densat acerbitate: ac proinde *lies* induratos sanat cum pota, tum foris imposita. *Menses* ducit, & noxios capitis humores per os detrahit. *Hulceribus* malignis plurimum prodest, & dentium cruciatibus succurrit. *Tubera* dissipat, & uutiligines. *Vermes* qui in auribus nascuntur, interimit. *Caterum* folia fructusque similem quidem, sed infirmiore obtinent potentiam.

Cardami, *nasturtij* semen, deurentis facultatis particeps est, modo *sinapi*, quo nomine cataplasmatibus instar impositum cum rubificatione exulcerat, crassos humores admixtis quibusdam alijs incidit. *Herba arida* semini uiribus similis est, sed humida moderatior, eoque cruda nonnunquam editur.

Cardamomum acris quoque naturæ est, *nasturtio* tamen non parum imbecillius: neque illi deest amaritas, qua sanè uermes interficit. Et scabiem cum aceto exterit.

Caris cōtrita, cum *bryoniae* radice epota, uermes enecat.

Cancrorum fluuiatilium crematorum cinis, pari *crinaceorum echinorum*, & *cochlearum* modo exiccat. *Proprietate* uerò totius substantiæ, admirando remedio rabidi canis morfibus potu succurrit. *Marinorum* uerò cinis uehementiore arefaciendi ui pollens, nihil his quidem conducit, sed magis

ficcari contendentibus prodest. Ceterum qui in perennib[us] uitam agunt fluminibus cancri, lauigati & cataplasmat[is] impacti, spicula & aculeos euellunt.

Cari semen calidum est & siccum, secundū tertium quodammodo à temperatis excessum. Flatus discutit, & urinam prolicat: neq[ue] id semen modò, uerū tota etiam planta.

Carpesium cum tenuitate partium odoratum est. Hinc uiscerum obturationes aperit, lotia promouet, renes purgatione à lapillis uindicat.

Carya, nux arbor, in germinibus quidem acerbioris aliquid continet, plurimū uerò in nucum putamine. Quare succus eorum in melle elixus, medicamentum fit, quod ori inseruit. Cortex eius interior crematus, tenuis redditur essentia, & exiccatorius absq[ue] mordicatione. Besculentū porro ipsius oleaginum promptissimè in bilem cōuertitur. Quod inde fit oleum, subtilibus constat partibus, & tumores putredinesq[ue] dissipandi uirtutē obtinet. Quæ liquore aliquo condita, propter antiquitatem, flaccescunt, extergēdi habent ea quæ in cute oriuntur uitia, potentiam. Nux uerò Pontica, leptocaryon Græcè, Latine auellana nuncupata, frigidior est atq[ue] austera, cætera magnæ nucis æmula.

Caryophyllon, quasi dicas nucifolium, neq[ue] re, neq[ue] essentia nomini respōdet, uerū ex India arboris cuiuspiā flores stipulæ faciem præferētes, nigri coloris, longitudine ferme digitali sunt, fragrātes, acres, subamari, calorifici et exiccatorii in tertio quadātenus excessu ordine: quorū multiplex usus est cū in obsonijs, tū in cæteris quibuscūq[ue] medicamentis.

Cassamon quidam fructū esse balsami autumant, de quo superius egimus.

Cassia calefacit et siccāt, in tertio ferme ordine partium impense subtilium, acrimoniae & astringentis modicæ pareiceps. Quapropter simul & incidit & discutit, et robur instrumentis indit: ducit suppressos deniq[ue] menses.

Cassia

Castorium, testiculus castoris, cum præpollente & eximia partiū tenuitate calfacit et exiccat. Qua de causa præter alias operationes etiam neruorum ex plenitudine humorum prognatis affectionibus cōgruit, perfrigerata facillimè recalfacit. Foris adhibitum atq; epotum, sic, ut nullam partem cuiuspiam noxam inferat, etiamsi tepidam homo perpetiatur febrem, qualis accidit in ueterno maximè, & alijs inexpugnabilis somni soporibus. Mouet præterea menses, & secundas à partu morantes expellit. In cerebri & pulmonis affectionibus, si quis suffitum eius inspiratu hauriat, magnificè iuuat.

Caucalis, sunt qui daucum syluestrem dicunt: calfacit enim modo daucis, & exiccat, urinam trahit, saleq; ad repositionem conditur.

Cenchros, miliū, refrigerat in distantia prima, siccatur in secunda, & subtilitatis possidet perexiguū. extrinsecus in sacculis excalfactū & cataplasmatibus modo impositū, exiccat.

Cedrus alia quidē fruticosa, iunipero similis: alia arbor est. Vtræq; calfaciunt & siccant in tertio ordine. Quæ inde emanat cedria (quo nomine cedri gaudet oleum) quartum quoq; ordinē uidetur attingere, subtilium abunde partium, quo nomine mollem utiq; carnem promptè et absq; omni dolore liquat, et putrefacit: durā uerò, atq; cadauerū arefacit, et à corruptionibus asserit. Pediculos, lēdes, tineas, ascarades, & in auribus natos uermes interficit, aliaq; infinita designat.

Centaurij grandioris radix, gustantibus acris, calida, et astringentis terreæ particeps est: hinc menstruas mulierum purgationes prouocat, foetum uiuum corrumpit, mortuum extrudit, uulnera glutinat, sanguinè excreatibus et alijs thoracis affectionibus opitulatur. Centaurij minoris radix inutilis est, surculi citra mordacitatē potēter deficcant: quapropter ad singula quæ maius centauriū iuuat, accommodatæ sunt. Decoctū insuper eius in coxēdicū uitij infusum, biliosum humorē expurgat. Nonnunquā et sanguinolenta, quā feliciter iuuat.

Cornu

Cornu capræ & cornu cerui crematum, dentibus nimis adfert, gingiuas humore flaccidas contrahit. Cerui cornu uino læuigatum, deinde illitum, dentes uacillantes stabilis. Post uerò uisionem ablutum, dysenteriam, uentrales sanguinis sputationes, & morbo regio oppressos curat, si ceciliariorum duorum pondere sumatur. Ocularibus induratis collyrijs. Taurinum cornu cum aqua haustum, sanguinis eruptiones cohibet.

Cerasia dulcia quidem citius secedunt, austera stomachicis magis conferunt. Acida, quoniam incidunt, excrementorum et pituitosis stomachis cōferūt. Gūmi cerasi arboris arteria exasperatas lenit, calculis uexatos cum uino pota adiuuat.

Ceratonia, & fructus eius, ceratia appellata, siccandi & refrigerandi uiribus pollēt, et dulcedinis nonnihil obtinent.

Capita menidum sale conditarum cremata, siccificæ facultatis, neque ualentis acrimoniæ sunt. Rhagadibus itaque scindis, & columellæ longo tempore scyrrho indurata succurrunt. Smaridis totum caput combustum, capillorum defluuijs cum adipe ursina adhibitum bene facit. Eadem caput muri crematum cum melle præstat. Caput milui aridū, deplume quantum tribus digitis cōprehendi potest, cum aqua potum dolore pedum uexatis subuenit. Tradunt caput lacertæ, paxillos & spicula euellere, formicas sessiles, & uerrucas angustiore basi pensiles clauosque profligere.

Cecis, galla adhuc immatura, omphacitis adpellata, medicamentum est excellenter astringens, eoque exiccat, fluxiones repellit & contrahit, laxas & imbecillas partes constringit, omnibusque fluxionum affectibus resistit. Ponitur in tertio siccantium, secundo refrigerantium ordine. Altera uerò, flaua illa, & laxa, grandisque, siccatur quidem & ipsa, sed tanto minus, quantum & adstrictione cedit. Coctæ sedis inflammationibus & procidentibus subuenit. Crematæ autem utraq; & aceto restinctæ, sistendo sanguini accommodatæ sunt.

Cepœa,

LIBER SEPTIMVS. 389

Cepœa, portulacæ similis est. Sumpta in uino folia eius, abiei uesticæ succurrunt. Radix uerò eius cum asparago, nem myacanibinum, id est corrudam appellant, pota, filli dijs uesticæ, quæ ex obstructione eueniunt, remedio est.

Cera temperata existit, eoq; ad reliqua medicamenta ueti subiacens materies adhibetur: ipsa uerò per se ex eorum nsu est, quæ imbecilliter detergant. Habet insuper discusantis paululum, & calidæ potentia.

Buccinorum testa cremata, potenter admodum desiccata tra morsum, ideoq; huculceribus contumacibus & malignis ingruit: contra putrescentia uerò hucera, cum aceto, uel no, uel oxymelite, eisdem utendum. Oleum in quo carnes forum etiamdum uiuentium elixatæ sunt, aurium doloris is instillatum opitulatur.

Vt ricini fructus expurgandi, abstergendi, ac distrabens facultatem obtinet, sic etiam ipsius folium: uerum imbecilis. cæterum de oleo ipsius expositum iam est.

Cinnabaris acres moderatè uires, & astringenti nonnisi obtinet.

Cinnamomū perquā subtilissimis constat essentia paribus, non extremi caloris, sed ex tertio ordine neq; sanè quicquam omnium quæ in calfaciendo eiusdem classis sunt, tanto re desiccatur, ob extremam partium tenuitatem. Est præterea in cinnamomorum genere quodpiā ueluti debilius, quod pseudocinnamomum uocant aliqui.

Circeæ radix calidæ temperaturæ est, & fragrantis oris: quæ si cum uino potetur, fœminarum locos expurgat. men in sorbitione sumptum, lac procreat.

Cisseris, pumex, non solum potentia, sed scabrie etiam tergentis facultatis existit, atq; in primis dentiū. Injicitur uerò medicaminib. quæ carne hucera implēt, & cutis uitia abstergūt. Quod si cremetur, essentia quidem subtilioris, sed ordax magis efficitur. Si abluatur, mordicationē exuit.

Cisthos

Cisthos, uel cissaros, fruticulus est stipticus, & leuiuscu-
frigiditatis. Folia eius fruticis & germina adeo desiccant,
& uulnera conglutinent. Flores, utpote in secundo quodam
modo gradu, sicciore, intestinorum tormina & alias flu-
ones humidas compescunt. Extrinsecus impacti, putridis h-
ceribus auxiliantur.

Cissos, hedera, ex contrarijs facultatibus constat: adstr-
gentis enim, refrigerantis item, & acris naturæ cū calori
est. Aquæ substantiæ, & tepidæ, cum uiridis est compo-
cuius folia uino elixata, uulnera conglutinant, ambustis &
lienosis cōducūt. Liquor eius narib, infusus caput pituita cu-
cuat, diuturnis aurium destillationib, resistit. Acrimonie pliq-
habet ipsius lachryma, pediculos interficit atq; deglabrat.

Citri mali, quod & Medicum appellant, medulla acid-
sapore, uel sine qualitate est, cuius semē in tertio abscessu re-
frigerat & desiccatur. Cortex in exiccando secundum ordinem
attingit, non tamen ita refrigerat, acrimonia præditus. Ca-
ro ipsius crassum humorem generat, & pituitam adauget
refrigerat. Semen discutit & exiccatur ordine secundo, folio
arboris siccam & discutientem præferunt potentiam.

Cichorium, uel picris, ueluti syluestris seris est, ex primi
refrigerantium & exiccantium ordine. Habet præterea sti-
pticatam quandam, qua de causa iocinorosis confert dysen-
terijs.

Clematidis, quæ ab aliquibus daphnoides, à quibusdam
myrsinoides, ab alijs polygonoïdes, palmites habet prolixam
ad olochei crassitudinem, folium lauro figura & colore si-
mile, arefacientis potentia. Fluores alui, quos diarrhoeas uo-
cant, & intestinorū tormina, & dentium cruciatus mitigat.
Contra uenenatorū morsus magna cum utilitate imponitur.

Clematidis altera, arboribus, quemadmodum smilax he-
dera circumfunditur, acrem atq; adurentem habens faculta-
tem. Fructus huius cū aqua potus, per inferiore aluū pituita
bilis

LIBER SEPTIMVS.

591

ilio sumq; humorē deducit. Folia eius illita, lepras discutiūt.

Clinopodium excalfaciendi & arefaciendi uim obtinet, & nondum adurendi, uerū in tertio fermē ordine.

Cnici seminis non nisi ad purgationes usus est: si quis ex-
insecus adhibere uolet, tertij fuerit excalfacientij ordinis.

Conchilia, buccinis consimilem facultatem obtinent.

Cœlia, uentrem mergi recens coctū, siue inueteratum &
refactum iuxta prodesse stomacho, si estur, asserunt: quem-

modum etiam de interiore uentris gallinarū tunicula sic-
ita & pota perhibent. utrunq; tamen hoc mendacium esse,

alenus factō periculo deprehendit. Tradit uerō Dioscori-
s, uentrem palumbi alitis modicē potum, per urinam calcie

s expellere. Mustelæ uenter in potu sumptus, adiuuās amie-
tum contra bestias uenenatas esse putatur.

Coccos, granum gnidium semen est, non chamelææ, ut
idam autumauerunt. sed thymelææ, acris adurentis q; fa-

ltatis. Purgat aquam per inferna, si potetur. Granum in-
torium, quoniā citra erosionem desiccatur, amplis & neruo

uulnerib. cōpetit, cū aceto et oxymelite in leuorē cōtritū.

Coccymelea, pruni fructus, aluum recens quidē uehemens
s, minus uerō arefactus subducit. Prunorū decocto inflama-

tionem gutturis & tonsillarum utiliter colluuntur. Gum-
arboris incidendi & extenuandi potentia constat: quod

in uino potum, nonnulli calculos confringere, cum aceto
rō puerorū impetigines exterere perhibent. Syluestria ue-

pruna acerbiora, et ad cohibendā aluū aptiora sunt. Appel-
tur aut hęc plāta in Asia prumnū. Pruna uerō satiuā asi-

latur his, quæ nūc damascena dicūtur, ut Galenus asserit.

Colla, gluten similagineum, siue ex polline factum mea-
opplet, & maturandi uim possidet.

Colocyntha, cucurbita, humidi & frigidi in secundo d-
temperatis abscessu, temperamenti est. Eoq; tota ritu cata-

smatis illita, feruida refrigerat inflammationes.

Colos

Colocynthis purgatoriam facultatem oppidoquàm ualidam possidet. Viridis ipsius liquor infricatus, coxendicum dolores adiuuat.

Comaro, arbutus, arbor pariter & fructus, qualitatem acerbam obtinet. Memycœlum autē hunc ipsum nominant.

Non solum stomacho nocet, sed capitis etiā dolores inducit.

Gummi exiccatoriam habet naturam, & emplasticam atq; nimirum asperitates medicatur.

Conia, lixiuium, ueluti cineris ablutio nominatur, abstergendo & exiccando reliquis omnibus antecellit, quod ex ficulneorum lignorum, & quod ex tithymalli cinere conficitur, ut tantum non iam exedentis sit potentia. Quod si calce etiam cineri adijciatur, deurens reddetur lixiuium, quod pro tustatione nuncupant. Bluentibus id frequenter commiscetur pharmacis. Omnium uerò maximè uehementissimum est quod ex sola calce constituitur.

Conyza & grandior & exilior, siccificæ & excalfactoriæ sunt temperaturæ in tertio ordine. Proinde oleum in quo elixæ fuerint, febrium rigores per circuitum remeantes sedant. Flores similem effectum possident, quorum decoctum menses prouocat, & foetum eicit. Quæ uerò in locis humidioribus nascitur, tetriorem de se emittit odoris fluxum, & uiues continet debiliores.

Copros, stercus omne, calidæ & siccissimæ, atq; summè discutientis est potentia. Variat autem unumquodq; pro excernentis animalis cum temperatura, tum uictus quoque ratione. Canum, qui ossibus pasti fuerint stercus, desiccatum, & cum lacte fisci potum, dysenteria laborantibus succurrit. Salubriter medicaminibus contra hulcera inueterata effecibus miscetur. Idem melle exceptum, anginae, tonsillarum & glandularum inflammationibus illinitur. Bisdem malis praesentiore remedio succurrit pusionum oletulum, qui non excrementosa uictus ratione utuntur. Lupinum albidius, & quod

Et quod non humi, sed in quibusdam uepribus fruticibusq; re-
 peritur, colicis præsentaneo est remedio: non solum epotum,
 sed etiam pro amuleto alligatum. Alligetur autem uinculo
 lana ouis à lupo laniatæ confecto, uel pelle ceruina. Capri-
 nus finus maiorem acrimoniam, uehementioremq; dissipans
 si facultatem continet, aded ut tumores scirrhi instar indur-
 atos, illitu discutiat, potissimum in duriore carne. Baccae ca-
 rinæ combustæ uehementius abstergunt, et extenuant. Ster-
 cori bubulo uis quædam attrahendi inest. Morsibus igitur ue-
 barum ac apium medetur. Hydropicorum corpus uniuersum
 stercore bubulo sub sole delibutum, præsentaneâ opem
 entiet. Ouillum uerò cum aceto, uerrucis, quas formicas di-
 cunt, et acrochordonibus, furunculis, et clauis medetur.
 Stercus palumbinum plus acredinis quàm reliqua habens
 excrementa, cum nasturtij semine corpori applicatū, cutem
 exulceratione rubificat. Fimus gallinarum, cum oxymeli-
 tæ, uel aceto, uel ænomelite potum, suffocantes fungos uomi-
 ni eicit, primi; auxilij remediū existit, nonnulli colicis po-
 tandum ministrabant. Sunt qui ciconiarum excrementum
 non nisi recta ceruice spirantibus opitulari potu asseuerant.
 Muscerda abstergendi maiorem uim obtinens, alopecys sub-
 uenit: et puerorum ano applicatum, ad excretionem promou-
 at. Sturnorum, qui orizam comederint, absterforia facultas
 tantæ efficitur, ut contrahijs uelut ex sole maculas, quas
 ophileis nominant, exterat. Fimus crocodilorum terrestrium
 petigines, quos alphos Græci cognomināt, exterit. Quem
 modum niliacorum, albugines oculorum extenuare credis-
 er. Coraliū ueluti arborea planta est, quæ in lapidis duriti-
 am duratur: crescit non in continēte, sed in alto maris, colo-
 re rufo, lapidi simile, ualenter siccandi, et mediocriter con-
 sumendi uim obtinens. Quo nomine sanguinem eieciantibus,
 et intestinorum torminibus pulchrè conuenit.

Cimices animalcula acris sunt potentia. Sunt qui hæc bio-

pp

rudis

rudines eijcere, si cum aceto potentur, literis prodiderunt.

Coris herba, quam alij hypericon uocāt, acris est, boni odoris. Semē eius potus, mēses urinasq; prolicit, phalangiorum morsibus opitulatur. Opisthotonicis, cum oleo illinitur.

Corianum, siue corion, coriandrū, ex contrarijs constituitur facultatibus, subtilioris essentiae cum terrestri quadā amaritate existit, et aquei humoris tepidi, habet etiā astringentis pauculum. Quamobrem inflammationibus, et ignitis cum phlegmone ruboribus non admodum feruentibus succurrit. Teneriusculos quoq; tumores disijcit, adiecto quopiam huiusmuneri accommodato. Seminis coriandri uel momentū cum passo arcēdis lumbricis, praesenti cum remedio bibitur. Latius tamen sumptum, mentem commouet.

Corydon, uel corydalōn, alaunda auis, elixa cum simpliciter iure, colicis cruciatibus subuenit. Profuerit autem identidem ipso cum iure uesci.

Coronopidis quoq; radix coli dolores comesta sanare creditur.

Costus pauculae quidē amaritudinis, plurimae uerō acrimoniae, et calidae qualitatis particeps est. Quapropter in quibus aliquā corporis partē calfacere, uel ex profundo in summā cutē humorē extrahere instituimus, ad costū cōfugiendū est. Urinā itaq; ciet, et mēstrua ducit, et lūbricos perimit. Habet uerō et flatuosi spiritus nonnihil, quā de causa uenrem cum cœnomelite potus stimulat. Coxendicū dolorib. et resolutis, et circularib. cū tremore algoribus ex oleo infricatus cōgruit.

Cotyledon, umbilicus ueneris refrigerat, repellit, abstergit, et discutit. Folia eius cum radice comesta, lapillos atterere, et lotium mouere creduntur.

Cochlia cremata strenuam arefaciendi uim, calfaciendi mediocrē obtinent. Contra dysenteria in qua ulcera nondum putrescūt, plusculū opis cōferunt, si ad quatuor cochlearum partes miscueris, piperis albi partē unam, et gallarū partes duas.

LIBER SEPTIMVS. 595

ias. Sed quæ exustionis expertes sunt, totæ in puluisculum uigatæ, et uetri impactæ, in aqua subter cutē, et articularū uciatibus, donec ultro deciderint, plurimum expediunt. Et inditus, uno uerbo, humorem quēcūq; ualenter exiccant.

Corni arboris fructus acerbus & uesculentus, aluum potenter compescit. Folia & surculi sua acerbitate impensius rificcant, ita quidem, ut grandia etiam uulnera duriorum rporum conglutinent.

Crambe, brassica quæ edēdo est, exiccat, non solum come, sed etiam extrinsecus imposita, non tamen acris manifestat. Vulnere ob id et hucera extremē malefica conglutinat, mores ad digerendum contumaces curat. Habet uerō aborsionis nonnihil, qua lepræ medetur. Semen eius in potu nptum, lumbricos interficit, & potissimū Aegyptiæ. Cui crematorum cinis deurentis est potentia, cum adipe diu rnis laterum doloribus remedio est. Brassica autem syluehis ad omnia quā horticis potentior est. Hinc intro in corpus impune nō sumitur. Marina, subsalsa, & leuiter amara, utri laxando efficax est.

Cratægoni herba fructus gustantibus acrimoniam præstet, estq; temperatura frigidus, milio consimilis.

Chrethmon, cū exiguo amarore salsum quodāmodo est, coq; uires abstergendi & desiccandi possidet.

Crithe, hordeum calidum et ficcū habetur in ordine priore. Habet etiā quiddam abstersionis: lomento fabuli ad exicandū aliquantulū efficacius, flatuosum uerō minus existit. Polenta aut multo quā hordeū impensius exiccat. Ptisana præter quod liberalius humectat, magis etiā absterforia est.

Quod in tritici et zææ farina crassū & crassiorū partium crimnon appellari cōsueuit. Nutrit ualidius quā polenta renititur uerō concoctioni magis crimnon pullicula.

Crini, lily flos tēperamentū habet cōpositū ex subtili partem terreæq; essentia, & aquosa tēperata. Quocirca oleum

quod ex eo conficitur, discutiente & emolliente ui pollet, muliebriumq; locorum inflammationibus est idoneum. Radix et folia siccant, et detergunt, atq; discutiunt mediocriter, ideoq; ambustis proficiunt. Vulnerationi nervorum opitulatur cum oxymelite sumptus eorundem succus.

Crocodylij semen et liquor facultatem caloricā, exiccatoriam, & digerentem possidet. Lotium itaq; pariter et mentes proritant. Radix thoracis excreationibus egregie subuenit. Et per nares sanguinem trahit.

Crocus in calfaciēdo secundum, in exiccando aut primū sortitus ordinem, astringendi & concoquendi uirtute pollet.

Crōmyon, cæpa ad quartū calfacientiū ordinē refertur, crassioris esētiae. Quapropter hæmorrhoidas applicata aperit. Habet autem etiam uim abstersoria: utiligines quos alphas nominant, cū aceto emēdat, et extergit, ex alopecijs glabreta pilis alcyonio citius instaurat. Succus suffusione laborantes, uel ob humorū crassitudinē oculorū speciē bebetatā adiuuat.

Cyamus, faba in refrigerando et exiccādo nō procul à media tēperie recedit: caro eius absterisionis modicæ particeps est. Idcirco excreationes pectoris et pulmonis adiuuat. Quoniam autem fabuli cortex astrictionis quippiam habet, integrum ipsum in posca elixum cœliacis et dysentericis peridoneum est, inflammationibus præterea & tumoribus illitū auxiliatur. Lac quoq; in uberibus ab eo linimento extinguitur.

Cyano, uis et natura acrior est, detrahēdi et disciendi ualentior quā cinnabari. Astrictionis quoq; particeps est.

Cyclaminus, rapum terræ uariā potestātē obtinet: abstergēdi nimietrū, incidendi, aperiendi, attrahēdi, et discutiēdi. Ac proinde succus ipsius hæmorrhoidas interrūpit, si oris ipsarū adglutinetur, durities cū alijs quæ ad eandē rē faciūt, appositus discit. Suffusis, cū melle illitus succurrit, et per nares caput expurgat: tātæq; est potētiae, ut eo abdomine uncto alui subducat, et conceptū interficiat. Virib. autem radix q̄ succus inferior

inferior est. tametsi ipsa quoque adeo uehementis sit, ut cum aqua nalsa triū drachmarū pōdere sumpta, corporis uiscera expurget, cutisq; uitia detergat. Est et alterū terræ rapū, quod cißāthemō uocāt, cuius utiq; radix admodū inutilis est. Semē uerò efficax, ut in potu sumptum, superiori similia designet.

Cyminum calfacit secundum tertium quadantenus a temperatis excessum. Lotium prouocat, & flatum discutit.

Cynos batus, rubi canini fructus haud segniter astringit, folia uerò moderatē astringentia sunt. Atqui uitandum est illud, quod in meditullio fructus eius lanæ præfert faciem, tanquam malo arteriam afficiens.

Cupressi, arboris pilulæ & turiones exiccatoriam uim obtinent, citra euentem tamen calorem. Ac proinde granadia admodū conglutināt in duriorib. corporibus uulnera, & putrescentiū bulcerū humiditates, in profundo latentes, sine noxa depascuntur, intestinalibusq; ramicibus succurrunt.

Cyperus, iūcus odoratus angulosus, calidus pariter et siccus exēperamēto est, absq; erosione. Quā de re bulceribus quæ præ nimia humiditate ægrè coalescūt, cicatricē mirabiliter inducit. Ad oris bulcera, prodest. Inest præterea cypero secandi quædā facultas, qua lapillos atterit, et lotia mēsesq; prolicit.

Cypri folia atq; uirgulta mixtam facultatem possident, discutientem & stipticam, innoxie & citra erosionem exiccatoriam. Quapropter decocto ipsorum ambusta conspersa fotaq; sanātur. aduersus igneas etiā inflāmationes, et oris bulcera cōmansa prodest. Lienosis ad hæc remedijs cōmiscetur.

Cytisi folia leuiusculam discutiendi & tepidam facultatem obtinent, sicuti etiam malua.

Cicutam extremè refrigerantem habere potentiam, omnibus perspicuum est.

Coni quidem cum cortex tum folia uiribus pino sunt similia, acrimoniæ uerò plus efficaciacq; possident. Fructus autem quem strobilon quidam nominant, si uiridis quidem sit, ha-

bet cum humiditate amarorē quempiā & acredinem, ideoq; affectionibus peccoris purulentis, ad screatus pulmonis facile euocandos congruit. Esculentus in aqua maceratus tantisper dum omnem acrimoniā exuerit, temperatus minus mordax, & emplasticus magis efficitur, & medicamentum denique asperitati leniendæ accommodatissimum.

Lagopus desiccātis est potētia, qua alui fluxiōes exiccat. Ladanū ex cistho ladano appellata, prouenit. Capræ nāq; ipsū depascētes, pinguetudinē atq; succulētū ipsius herbæ, barbis et femorib. suis auferūt. Colledū uerē ladanū medicamentū est calidū, secūdū à tēperatis excessū attingēs, esētia subtili, moderatē emolliēs, pariterq; discutiēs et maturās. Proinde locellorū afflictionib. peculiariter dedicatur. Præter hæc stiptic itatis paululū continet, quocirca fluētes capillos retinet.

Lathyrus tithymalli species est. sunt qui succum eius pariter cum tithymalli lacte purgare affirmant. Semen uerò summa facultate purgatoria pollet.

Lapsina comesta uitiosum humorem generat, illita abstergit aliquantulum, ac disijcit.

Lapathon, rumex moderatē discutit. Rumex acidus, qui oxylapathū uocatur, præter id percussoriā quādam facultatē sortitus est. Semē rumicis, sed potissimū acidi, astringēs, diarrheis et dysenterijs medetur. Contrario autē modo, diuersisq; uiribus quadantenus folia et semē inter se constāt. Folia nāq; manducata aluum commouent, semen potū lubricā cohibet.

Limonū fructum utpote austerum, cœliacis & dysenteriacis, & sanguinem sputo eiectantibus, hæmoptoicisq; cum uino exhibent, ad fluxum item muliebrem acetabuli mensura.

Lichen herba ueluti muscus est, petris adnascēs, quæ abstergit, moderatē refrigerat et exiccat. Impetigines curat, et inflammationes arcet, & ut Dioscorides tradit, sanguinis eruptiones comprimit.

Lichenes equorū lenigatos cum aceto, comitialē morbū

&

omnium uenenatarū bestiarū morsum sanare perhibent.

Leontopetali radix ordine tertio desiccatur, & calfacit, ha-
tuq; digerit.

Lepidium, quam & hiberida nuncupant, ex quarta calfa-
cientium à temperatis distantia est, nasturtio uiribus, præter
quam quod minus eo desiccatur, proximum.

Lepi squama omnis potenter exiccat, astringit, et strenue
nordet. Sed æris squama non paulò maiore arefaciendi uim
obtinet, et subtiliorū magis est partium, habens nonnihil etiā
ubiginis, præsertim ea quæ ex Cypriorum decutitur clauis,
quā propter hoc Heletim tanquam clauarem uocitant. Squa-
ma aut ferri largius astringit, et hac etiā magis stomomatis:
qua de causa ad extremè maligna hulcera præstantior est.
Carnem quoque ualidius purgat, & liquefacit.

Leucacanthum, nonnulli polygonaton, neque desunt qui
chiada nuncupant. Bius radix incidendi & arefaciendi fa-
cultatem habet in tertio ordine, ex calfaciendi uerò in primo.

Leucas, ex tertia quidem ex calfacientium et exiccantium
classe censetur, sed acriore qualitate præcellit.

Leucoion, uiolæ albæ frutex uniuersus extergit, et tenui es-
sentia cōstat, plus tamē flores, atq; inter hos sicciores. Idcirco
menses proritat, fœtū perimūt, et eiciūt. Verū si quis eius
uehementiā aquæ admixtione hebetauerit, ad inflammationes
etiā cōferet, præcipuè uteri. Radices æqualis facultatis sunt,
nisi quatenus crassiore, & magis terrestri substantia. Cum
aceto inflammationibus scirrhis induratis illitæ succurrunt.

Leuce, populus alba, ex aquosa, tepida, & terrestri sub-
stantia constat, absterforiæ facultatis particeps est.

Libanotides tres sunt, sterilis una, ferentes fructum duæ:
omnes extergendi, incidendi, distrabēdi, emolliēdiq; uires ob-
tinent. Quarum succus melle mixtus, hebetibus ex humorū
crassitudine oculis auxiliatur. Coronamentariæ uerò libano-
tidis decoctum suffusus felle, potu adiuuat.

P p 4 Libanotus,

Libanotus, thus ordine secundo calfacit, primo deficcit, Habet aut minimū quiddā astringēdis. Cortex eius euidentius astringit, siccātq; in secūdo à tēperatis excessu exadē, crassioris substantiæ q̄ thus, & minimē acrimoniæ cōpos. Vnde hæc moptoicis, dysentericis, cœliacis, et stomachicis non modō foris applicatus, sed intra corpus etiā sumptus, remedio est. Surculus eius calfacit & exiccat tertia distantia. Extergit item aliquid, proinde oculorum hulcera expurgat & implet.

Lignys, fuligo combustarum quarundā specierū, puta thuris, myrrhæ, terebinthi, styracis, picis liquidæ, et cedri, uel uicinis est ac puluisculus cū fumo ascendens. Siccifica, terrene ac tenuis essentia. Cæterum quæ speciatim ipsius sunt differentia, pro cremata fiunt materia. Vsus uerō eius cum prius cōmendatur in remedijs ocularibus, & honestandis palpebris inferuentibus. Fuligo autem thuris cōmoditate cæteris omnibus præstat, utpote mitior. Vehementior contrā pinis, coni, & picæ. Quapropter ad palpebras glabras, humentes & erosos oculorū hircuos, lachrymantesq; salutaris est.

Ligustici cū radix tum semen aded calfaciunt, ut mensstrua prouocent, flatusq; strenuē dissipent.

Argenti spuma medium inter metallica tenet ordinem, hinc eo ceu materia alijs remedijs mixta subinde utimur. Obtinet autem facultatem siccantem leniter, detergentem et cōstipantem, ideoq; femorum intertriginibus expedit.

Lithi, lapides omnes, perinde atq; terræ, exiccandi uim obtinent. Cæterū hæmatites astringit, & potenter exiccat. Cuius gratia asperitatibus quoq; oculorū competit, his qui nullā inflammationē sentiūt, admixta aqua; qui inflammatione infestantur, cū ouo. Prodest sanguinē sputo reijcientib; potatus, hulcerum immodicas excrescētiās reprimat. Schistus uerō lapis consimilem huic habet potentiam, cæterum ad omnia imbecilliore. Hunc Galactites, id est lactarius comitatur. Melitites cuiusdam etiam caliditatis particeps est.

Myro

Myroxus, seu *morochthus*, à quibusdā *leucographis* appellatus, quanto superioribus omnibus mollior est (expers enim omnium qualitatū est efficacium) tanto temperatior, magisq; indolorius est. Quocirca in corporibus teneris cum terato ad hūcerum sanationem utuntur. *Iaspis* subuirdis, quum potentio rem habeat facultatem, cicatrices & pterygia attenuat. *Virens* autem *iaspis* stomacho prodest, non solum pro amuleto suspensus, uel in annulo gestatus. *Iudaicus* appellatur, renum calculos comminuit, qua de re *tecolithon* recentiores nuncupant. *Pyrites* ex eorum censu est, qui streuē tumores, & sanguinem in minimos globulos concretum dissoluit. Qui si fortē in procinctu non sit, molarem eius loco usurpant. *Phrygius* cum ualida qua præditus est siccandi facultate, stipticitatis quippia et mordicationis obtinet: quod nomen repellit ac discutit, eoq; ocularijs miscetur medicaminibus. *Ageratus* astringentem & diaphoreticam sortitus potentiam, gutturis inflammationibus opitulatur. *Asiae* petra flos adeo subtilium est partium, ut flaccescentes in odore carnes citra erosionem eliquet. *Gagates* lapis admodum exiccatorius existens, inflationibus diuturnis cum prius commodus est. *Magnes*, qui & *Herculeus* nuncupatur, lapidis, consimilem hæmatiti potentiam obtinet. *Arabius* lapidis bori assimilis, arefacientem uim & repurgantem possidet. *Alabastris* cinerem nonnulli stomachicis, id est, cibum in stomacho non continentibus propinant. *Smyris* abstergentis est potentia, qua dentes exerit. *Lapides* qui in spongijs reperuntur, renum lapillos confringunt. Viribus hisce respondent lapides, qui in *Argæo* *Cappadociæ* monte proueniunt. Pari modo etiam *ophites* nomen obtinēs, ad alligatus, contra uiperæ morsus utilis est. *Ostracites*, quod est, crusta maris: et *geodes*, à terrestri qua constat materia, nuncupatus, insignem admodum siccandi uirtutem habere feruntur, eoq; tum moribus inflammationem resipiscentibus mederi. *Naxiæ*

cotis scobem frigorigica ui pollere asserunt, quapropter uirginum mammas & puerorum testiculos ne crescant, contrahit. Oleareæ autem cotis detrimentum, absterforium quum sit, capillorum defluuiò ex alopecia confert. Lapis hieracites & indicus alligati, sanguinem ex hæmorrhoidibus destillantem compescunt. Prodest contra scorpionum ictus saphyrus in potu sumptus. Aphroselinus comitalem morbum arcerere creditur. Armeniacus per inferna quidè aluum expurgat, sed perinfestus est stomacho.

Liθοςpermon, alij liosphoron, alij uerò heraclion, Latini milium solis nuncupant: herbæ Aëtonychi (ab aquilarum ungibus appellationem sortitæ) semen est lapideum & candidum, quod cum uino albi coloris epotum, renū & uesicæ lapides conterit, & lotium prolicit.

Lini semen, caliditatis primum sortitū est ordinem, humiditatis et siccitatis medium. Comestum flatus generat, etiam si frigatur in sartagine.

Sciendum est, quod experimēto comprobatum est semen mercurialis infricatum, corporis præter naturā excrescentias (quæ naphia uulgus ineruditū cognominat) demoliri. Semen autem uiride sit necessum est, quo per sepe tubercula confricentur. Mercuriali herbæ præcipua in deijciēda aluo uis est, sed illita discutit.

Litrum, nitrū, in medio aphronitri et salis uires obtinet. Crematum magis attenuat, ac discutit. Intro in corpus si fuerit sumptū, crassos & tenaces humores incidit, & attenuat. Porro acrimoniæ & siccitatis plus alijs habet chalastron, à Chalestra uico Theffalonice, ubi prouenit, id appellatio nis sortitum. Quamobrem ad capitis destillationes, & ad articularum cruciatus eo utuntur.

Lonchitidis, semen triquetrum, lanceæ cuspidi simile est, radix syluestri pastinacæ, quam daucum nominant, æqualis, urinam mouet. Eius uerò quæ scolopendrio respondet, uiridia

ridia folia, glutināt uulnera. Sicca uerò cum acetò pota, induratis lienibus medentur.

Lycopsidis, lycapsi'ue radicē astringentis qualitatis esse, & illitam cum polēta, sacris ignib. subuenire, tritamq; cum oleo inunctam, sudores prolicere, tradit Dioscorides.

Lycium ex oppositis genere substantijs consistit, alia quidem calida, tenui & discutiente: alia uerò terrestri, gelida, et mediocriter astringente, adeò ut in secundo excessu desiccet. In calore uerò & frigidityate medijs adscribitur. Ideoq; ratio ne abstergerendi ad discutiendas quæ oculis offunduntur tenebras, utuntur. Ratione uerò astringentis potentiæ, cōtra malum celiacum, dysenterias, hulcera maligna: ad inflammationes deniq; propter uim discutientem adhibent. Primas uerò tenet Indicum.

Lysimachium præpollentem habet astringēdi uirtutem, cuius ratione hulcera conglutinat, & sanguinem, tum ipsa, tum succus ipsius reprimat. Pota subinde uel clystere immisssa, dysenteria laborantibus succurrit.

Lychnidis, cuius usus corollis est accommodus, semen, secundum excalfacientium ordinem ad unguem absoluit.

Lotus, herba satiua, quam aliqui triphyllon, hoc est trifolium nuncupant, detergendi ui pollet, moderatè exiecat, caliditate temperata est. Loti agrestis semē calidū est, ordine secundo: cæterum nonnihil interim habet abstersorium. Aegyptiæ semen præter hæc ad panificium assumitur.

Lotus arbor ex subtilibus cōstat partibus, exiecat, & modicè astringit. Quapropter cum uino uel aqua epota, seu etiam aluo iniecta, ad mulierum fluxiones, affectusq; celiacos accommodatur, capillosq; defluentes corroborat.

MAcer cortex est, qui ex India importatur. Arefacit quidem secundū siccatiū ordinē tertiū, in caliditate uerò et frigidityate temperatus. Est insuper cum tenuitate partium astringens, Celiacis itaq; ac dysentericis salutaris est.

Mala-

Malabathri folium, spicae nardi uiribus est proximum.

Malua syluestris quidem, paululum discuit, & emollior domestica uerò, ceu humidior, etiam uiribus inferior est. Semen eius in tantum habetur ualentius, in quantum fuerit etiam siccus.

Mamiras, ueluti cuiuspiam herbae radícula est, geniculi frequentibus nodosis, quae oculorum cicatrices & albugines attenuare creditur, detergendi nimirum donata uiribus.

Mandragora frigida est temperamento in tertio ordine. Pomis uerò eius caloris quiddam et humiditatis inest, qua ratione soporem possunt accersere. Cortex uerò radicis quam sit ualentissimus, non tantum refrigerat, sed etiam desiccatur. Medulla autem ipsa debilior est.

Manna thuris, æqualem thuri facultatem possidet, inefficacior tamen, & paulatim astringentem.

Marathrum, feniculum calfacit in tertio gradu, siccatur uerò in primo. Ideoque lac generat, & suffusos adiuuat.

Mastiche, Chia, calfacit & exiccat in prima à medijs diuersa stantia, ex partibus natura diuersis constans, astringente inquam pariter & emolliente. Quocirca stomachi, uentris, intestinorum, & iocinoris inflammationibus opitulatur. Aegyptia nigrior quodammodo desiccatur, & discutit magis, sed minus astringit. qua ratione furunculos discutit.

Melan, atramentum Indicum, autore Dioscoride, ex clestermenter refrigerantium & astringentium censu est, et inflammationes œdemataque rumpentium, hucera item sordida expurgantium.

Melanteria, atramentum metallicum, creta sutoria, cum tenuitate partium astrictione plurimae particeps est.

Atramentum quoque scriptorium ualide persiccatur, in posca contritum, ambustis illitum succurrit celerrime.

Melanibium, nigella, calfacit & exiccat tertio à temperatis excessu, & est tenui essentia. Hac ratione destillationibus à

us à capite in subiectas partes succurrit. Intra corpus assum-
tum flatus alijs acrius discutit. Habet præterea amaritudi-
nem quandam, qua lumbricos latos enecat, extergit, & inci-
lit. Idcirco non nisi recta ceruice spiritum trahentibus com-
petit, lepras extergit, formicas exterit, & menses cit.

Mel calfacit & siccatur abscessu secundo, summaq; abster-
gendi ui pollet. Coctum non adeò acre, absterforiumq; effici-
tur, aluum ad excernendum proritat, sed aliàs plurimum ali-
menti suggerit. Mel uerò amarum, quemadmodum Sardoum,
mixta facultatis est, terreæ nempe & calfacitoria. Mel etiam
ichar, quod ex felici Arabia inuehitur, non tam dulce quam
nostras est: sed æqualeis uireis possidet, præter quod nec uen-
riculum lædit, nec sitim conciliat, ueluti nostrum.

Melia, fraxinus, nobilis arbor, cuius folia pota, uiperarum
morsibus medentur. Cortex huius crematus, atq; cum
qua inunctus, lepras eximit. Ligni uerò ramenta potu sum-
pta, exitiosa feruntur.

Melilotum, fertula campana, mixta facultatis est, astringit
enim, discutit, & maturat.

Melissophyllon, citrargo, apiastrum, in omnibus marru-
io consimilem facultatem obtinet.

Memacylus arbuti fructus, supra in C expositus est.

Mespila, quæ & tricocca dicuntur, acerbis admodum
fructus est, & uix esculentus, uentrem compefcens. Germina
& folia acerbissima sunt.

Medij radix diuersam à semine facultatem sortita est. Il-
la enim uerò austera est, & fluxus reprimat, ita ut scemina-
um ex locorum destillatione fluxionem sistat. Semen men-
ses concitat, subtili nimirum essentia, & incidendi facultate
præditum.

Mecon, papauer multiplex est hortensis, cui etiam thyla-
itis nomen inditum, semine cibo idoneum: si cum panibus estur,
moderate somniferum est. Rheas uerò papauer, eo quod semine
ipsius

ipsius celeriter defluat, cognominatum, ualētius quā dom-
sticum est: neutiquam igitur impunē priuatim manducatur
sed momētum largiori melle temperatum. Quod uerō caly-
ce suo ueluti depresso & concauo, atrum semē complectitur
admodum medicamentosum & exquisitē frigoricum est.
Quod uerō proceriore & squalidiore calice præditum, om-
nium facile medicatissimum est, usq; adē ut stuporem usq; ad
mortificationem inducat. Nam & ipsum, et liquor eius, qui
per hyperbolen & nimiam excellentiam opium cognomi-
nant, extremi infrigidantium ordinis est. Corniculatum, uin-
um habet absterforiam: qua de causa radicis eius decoctum, po-
tu præsentaneo iocinorosis est remedio. Folia itidem floresq;
sordida hucera expurgant, & crustas detrahunt.

Heracleum, cui & aphrodes, hoc est spumosum nomē est
inditum, semen habet pituitæ purgandæ natum.

Malis omne genus humor excrementitiis ac gelidus inest:
caterum mollia & exoluta, & aquosa, frigidiora & humi-
diora sunt cæteris. Dulcia, aquosa quidem, sed obscurius fri-
gida. Austera, dulcibus quidem frigidiora, sed minus humi-
da. Acida & ipsa quidem naturæ frigoricæ, sed impac-
tos uentri humores incidunt. Acerba, ueluti cydonia, & mala
struthia, gelidam & terrestrem temperiem sortiiti, aluum co-
hibent, uulnera glutināt. Pari quoq; modo folia, succi, corti-
cicesq; arborum inter se discrepant.

Mali Persicæ ramuli, germina & folia uincentem ha-
bent qualitatem amaram: lumbricos idcirco leuigata, umbi-
licoq; impacta, perimunt. Fructus porro ipsius, nempe hoc
quod edendo est Persicum, humidius & frigidius secundo
gradu existit.

Mali Armeniæ fructus, quem hac ætate prococcia in-
digitant, eandē cum pomis Persicis facultatē repræsentat.

Mei radices calidæ sunt tertio ordine, siccæ uerō secun-
do. Quocirca lotium menses que proritant. At si plusculum
sumpse-

impferis, caput tentant.

Milax non modò leuis, uerumetiam aspera, arboribus sue
ue deque circumuoluta, calidæ et acrioris est potentia.

Misy ex eorum medicaminum censu est, quæ cum ualida
strictione crustâ inducunt, atq; deurunt: minus tamen quàm
halcitis, subtilitatis beneficio erodit. Porro chalcitim & so
y Galenus tradit uetustate in misy permutari, à superficie
atim inchoante mutatione.

Molybdæna, plumbago, spumæ argenti uiribus respondet,
media temperie ad frigidius pauxillum declinans.

Molybdos, plumbum algentis est potentia, multam uerò
abet substantiam humidam à frigore congelatam. Quocir
a si triueris in pila plumbum uel cum uino, uel cum oleo ex
maturis oleis expresso, aut quopiam alio succo frigorifi
o, ad huceras pudendorum sedisq; inflammationes, præ
antissimum erit remediū. Lamina adhæc plumbacea lum
is gestata, ueneris insomnia arcet. Quin & glandulas ner
orum, quas ganglia appellant, tenuis plumbi bractea impo
ta dissipat. Plumbum crematum siccus est, & habet nonni
il acrimonia. Vbi lotū fuerit, citra morsum exiccatorium
& hucerb. extremè malignis, præsentaneū est remediū.

Mori fructus maturus quidem, alui deiectionem molitur.
d medicamenta quæ ab ore stomatica dicuntur, & ad alia
uæ mediocri astrictione egent, accommodus est. Immaturus
erò quum aruerit, medicamentum præstat admodum astri
orium. Radicis arboris cortex, quadantenus amarescens,
urgandi uiribus exuperat, ac proinde latos etiam lumbr
os enecat. Folia ac germina mediam quodammodo subdu
entium & retinentium facultatem obtinent.

Myagri semen pingue est: quod uerò in se complectitur
leaginum, opplendi præfert potentiam.

Myaces, mituli cremati, buccinis præstant eadem. Pec
ariet uerò eloti, scabriciem palpebrarum, oculorumq; al
bugines

bugines cum melle exterunt..Caro ipsorum canum morsibus
imposita, auxiliariis est.

Myaron, quam aliqui melampycnon uocitant, herba succu-
culacea est, & pinguis, cuius pinguetudine scabries corpo-
ris laeuigari creduntur.

Myelos, medulla, indurata & scirrhusa corpora emolli-
Prima bonitatis prerogatiuam habet ceruina, proxima
uitulina: taurorum namq; atq; hircorum plus acrimoniae &
ariditatis inest. Quae ex artuum ossibus elicatur, pinguior &
mollior est: spinalis autem durior, ac squalidior.

Mycetes, fungi, frigidi admodum ac udi temperatura sunt
& sanè inter eos sunt, qui comesti enecant, potissimum qui ex
natura putredinis compote consistunt.

Myosote, auricula muris, explicata in Alsine.

Myza arboris fructus est, exilior quidem prunis, uiribus
uero proximus.

Myrice, tamarix, secantem & detergentem potestatem,
citra perspicuam desiccationem sortitur, accedit illi nonnulla
la quoq; stipticitas. Eamq; sanè ob causam, decoctum ipsum
lienosis subuenit potum, medeturq; dentium doloribus. Fru-
ctus eius & cortex, gallae uiribus respondent. Cinis arboris
multo exuccior est.

Millefolium tanta pollet siccandi potentia, ut uulnera
conglutinet.

Myrrha, quae myrrhis quoq; dicitur, secundi est calfacien-
tium ordinis, partium quadam subtilitate annexa. Radix eius
iucundo naribus odore, gustui dulcore blanditur, menses pro-
licit, pectus atq; pulmonem expurgat.

Myrtus ex contrariis constat substantiae partibus, exupe-
rat tamen in ea frigidum terrefere: cuius ergo arefacit impene-
sius. Caeterum myrtula adnascens ramis ac trunco turgida
(quam myrtida appellat) magis exiccat & astringit. Folia
item arida ualidius quam uiridia desiccant. Fructus atq; suc-

us eandem habent facultatem, quum exterius illitus, tum in
ro assumptus.

Moly, quod rutam agrestem uocant aliqui, nonnulli uerò
armalam, Syri besasan, calfaciendo in tertio censetur ab
cessu, cum subtilitate essentiae. Quare crassos, uiscidosq; hu
iores incidit, ac discuit, lotiaq; prolicit.

Ascapthon, alij nacaphthon uocant, odoramentum est in
dicum, aduersus constrictiones muliebrium locorum, ad
ffusus uaporatur.

Napy, sinapi calfaciendo & arefaciendo in quartum usq;
ue recessum peruenit.

Nardi spica radix calfacit excessu primo, desiccatur secun
do. habet aut et astringentis quiddam substantiae, cum acrimonia
et amaritudine leuiuscula. Baniq; ob causam iocinori &
stomacho conuenit. Foris adhibita, uel intra corpus sumpta,
lotium proritat, uentris & intestinorum fluxiones compescit.
Efficacior aut est Indica, quam Syriaca, et nigrior. Nar
dus Gallica, uires praedictae cogenere sortita est: ad cuncta ta
men, praeterquam ad ciendum lotia, debiliores. Calore enim
potentiore, inualida uerò astrictione donata est. Nardus, quae
in montibus prouenit, thylacitis & pyritis nuncupata, uiri
bus commemoratis est inferior.

Narthex, ferulae semine, attenuandi calfaciendiq; uim obti
net. Medulla ipsius uiridis adhuc, astrictoriae qualitatis parti
iceps est. Ideoq; sanguinem excreantibus et coeliacis remedio est.

Narce, torpedo marina uiuens, dolentibus capite adhibita, do
lore ipsius sopit, eodem illo uidelicet torpore, quo membra ho
minis solo contactu torpescunt. Oleum in quo uiua elixata est,
acriores articulorum cruciatus illitum lenit. Sedem praeter
ea procidentem coercere hanc torpedinem appositum asserunt.

Narcissi radix tantum exiccat, ut uulnera etiam grandia
conglutinet, uel ad praecisiones usq; tendinum utilis. Habet et
abstergerendi & euocandi uim quampiam.

Qq

Neuras

Neuras, aliqui poterium nuncupant, citra erosionem desiccatur, ut praecisis nervis glutinadis sufficiat. Radices eadem potissimum efficacia regnant, cum impositae, tum in potu sumptae.

Nerium, uel rhododaphne foris illitum, dissipat, intra ro corpus sumi letale est.

Nymphæa, desiccantis est potentiae absque morsu. Ventrem reprimat, semenque desiccet. Verum candida radice praedita ualentior est, adeo ut muliebri quoque medeatur profluvio, cum uino nigro et austero potata. Cui uero atrii coloris radix est, ea quiddam abstersorium habet: ac proinde uiriliginis, quod apud alios Græci uocant, aqua admixta exterit. Capillorum defluuia, illita cum pice liquida, refarcit.

Xanthion, uel phasganion, semen gerit dissipandi facultate praeditum.

Xiris, siue xyris, cum tenuitate partium dissipandi euellendi; et nimirum exiccandi facultatem obtinet, praesertim semen: quod ex lotium ciere, et lienem in scyrrum induratum sanare potis est.

Xiphij, gladioli radix, attrahendi, dissolucendi, et exiccandi uiribus donata est.

Oe, sorbus arbor, cuius fructus oa, à quibusdam uia, hoc est sorba nuncupantur, astringentia quidem facultate, sed imbecilliore mespilo est praedita.

Othonnam, alij herba cuiuspiam succum esse affirmant, nascique in Arabia ad Aegyptum: alij lapidem Aegyptium esse credunt. Habet uirtutem abstergendi et erodendi: cuncta quae oculis tenebras offundunt, et aciei efficiunt, exterens.

Oenantes, labruscae floris multiplex usus est, siquidem potenter astringit, uentri comprimis robur indit. Caterum Dioscorides aliam huic potestate contrariam describit oenantes, eoque secundas ejicere, et urinæ stillicidio, morboque regeio mederi asserit.

Oenos, uinum calidum est et siccum, in secundo ordine, sed ualde antiquum in tertio, mustum uero in primo.

Oesypus.

LIBER SEPTIMVS. 61

Oesyphus: de lana succida in sermone de lanis explicatū est.

Olymbi, grossi acrem habent & discutientem potentia, ratione succi quem in se continent. Qua de re elixi, duos tumores dissipant, crudi uero formicas & thymos expungunt.

Olostium cum astrictione exiccat, quo nomine medendis ruptis eo utuntur.

Omphacion, succus est ex immaturis uuis expressus, insigniter astringens, & in tertio excessu desiccans. Quamobrem affectibus cum fluxione coniunctis, praesertim stomacho cibum non continenti, succurrit.

Onagra, sunt qui onothera, et onothurin appellant, fruticosa arborosus, cuius radix illita immania ulcera mitigat.

Onoma, uel onomis, uel phlomit, uel ononis, acris & amara est. Quare folia eius e uino pota, foetus in utero interficiunt & expellunt.

Onobrychis, opaca rarifica et discussoria facultatis est. panos itaq; dissolvit, stillicidys urinae medetur, et sudores elicit.

Oni, millipeda q in humetis et sub aquarijs uasis degunt, et in gyru se conuoluunt, dissipant et exiccat. Quocirca cu uino pota, mictionis angustiae et morbo regio opitulatur. Angina uexatis cum melle illinuntur. Cum rosaceo trita, et calfacta in cortice mali punici, contra aurium dolores instillantur.

Onyches, testae sunt conchularum Indicarum, quae suffitu adhibita, praefocatione uteri concidentis foeminas excitant, pariter et morbo comitiali oppressos. Potae uero uentre turbant.

Ononis, radix in calfaciendo tertij quodammodo ordinis est. Cortex eius extergit & desiccet: quo nomine calculos comminuit.

Oxos, acetum mixta refrigerandi pariter et calfaciendi potestate praeditum, utrinque tenuibus constat partibus. Vincit autem caliditatem frigiditas, tanta arefaciendi facultate, ut tertium ordinem absoluat.

Oxyanthus arbor, agresti piro figura & facultate respondet,

spondet, cuiusdam etiam tenuitatis particeps. Fructus uerum ipsius baccis myrti æqualis est.

Opos, succus, tum Cyrenaicus, tum medicus, tum Syriacus per excellentiam uocantur, naturæ calidioris, et per leuitatem digerentis haud ignauiter. Reliquos calore et partium subtilitate exuperat Cyrenaicus.

Origani omnes species incidendi, extenuandi, desiccandi, calfaciendiq; potentiam ad tertium usq; gradum referunt.

Oreoselinum, apium montanum, consimile satiuo est, se ualentius interim.

Orobanche, siccam et gelidam habet temperiem, in ordine primo.

Orobis, cruum in calfaciendo ordinem sortitur primum in desiccando uero secundum: et est gustatibus amarum. atq; ob id quidem dissecat et abstergit, et ab obstructione liberat. Uerius uero assumptum, sanguinem per lotium agit.

Orminum, geminalis, forma et colore marrubio æquale est, modice desiccatur atq; detergit: in Venerem igitur incitat: oculorum crassitudines cum melle illitum expurgat, œdemata dissipat, aculeosq; euellit. Syluestre satiuo non parum est ad omnia potentius.

Oryza, astringentis alicuius est particeps, qua uentrem leniter astringit.

Orchis herba (appellatur etiam cynos orchis, hoc est testiculus canis) bulbosam et geminam radicem obtinet. Maioris quidem facultas, humida et calida, ideoq; in uenerem stimulat: minoris uero, calida est et sicca. è diuerso igitur uenerem extinguit.

Orchis (quæ et serapiada cognominatur, aliqui uero triorchim) uehemētius quam superior desiccatur. Quapropter laxos humores discutit, huceraq; sordida et putrescentia expurgat, herpetibus medetur. Torrefacta multo impetius desiccatur. Quia uero leniter astringit, uentrem quoq; cum uino pota cōpescit.

Osyris

Osyris herba, ex qua scopæ nascuntur, quæ cremata dicuntur, amara, obstructions iocinoris expediens.

Ossa cremata uehementiorē habēt dissipādi exiccādiq; potentia: in primis uerò quorundā sentētia, humana. Talū quippe suillū combustū, inflationibus & strophis mederi asserūt. Si quis ossa deusta propinat, comitali morbo & articulorū dolorib; medetur. Sunt qui talū bubulū crematū labefactatos dētes cōstabilire affirmēt. Cū melle uerò sumptus, rotundos lūbricos profligit. Adiecto oxymelite, lienē induratū liquat, in uenerem excitat. Femora bouis cremata, inq; potu assumpta, sanguinis eruptiones, et alui profluvia reprimunt.

Testæ ex fornacibus leuigatæ, siccificam & absterfōriam uim obtinent. Quocirca dentes exterunt: illitæ cum aceto, pruriginibus, & pustulis, quæ Græcè exanthemata dicuntur, & misera pedum uoletudine laborantibus opitulatur. Cum cerato, strumas abolet.

Ostreorū testa cremata cōgenerē habet cū buccinorū testis effectū, subtilioris tamē est essentia. fœdas itaq; faciei lituras exterit, dētes dealbat. Badē si lauatur, mordacitatē amittit: humida hulcera carne implet, atq; ad cicatricē perducit.

Vrina quælibet temperamēto calida est, et acris. Atqui humana omnium cæterorū animalium, præterquā maialiū, imbecillior existit, ualētius uerò abstergit: cuius potu in peste quidā usi mortē euaserūt. Lepris præterea et putredini obnoxius fœtidisq; capitis hulcerib; q̄ achoras dicūt, furfuribusq; medetur. Pedū attritib; nōdū inflāmatib; opitulatur. Cæterū urina uenerē non experti puelli, omnium primas efficacia tenet, ex qua etiā chrysocolle cōficitur. Vrina mulorū morbo articulari cōuenit. Lotiū caprinū, atq; chamelorum uentrē subducit. Qua ratione aqua inter cutē laborantib; potui præbetur.

PAncratium, scyllæ imaginem refert ac uires, sed imbecillioris est affectus.

Paliuri cū folia tū radix astringūt, proinde alui fluores
Q. 9 3 sistunt,

sistunt, & panos non admodum calentes discutiunt. Fructus insuper tantam habet dissecandi uim, ut lapillos atterat, & pectoris excreationibus subueniat.

Panax Herculeus, unde liquor opopanax appellatus cōfititur, tertij calfacientiū excessus, exiccantiū secundi, emolliendi dissipandiq; facultatē obtinet. Radicis uerò cortex succo uiribus inferior est: habet absterforium quiddam, & carnem procreat. Fructus mensibus proritandis idoneus est.

Panaces Asclepium, atq; Chironium, prædicto calidiora sunt: quapropter floribus eius & semine medendis h ulceribus malignis, & ad panos utuntur.

Papyrus non combusta materia quædam est, cremata arefaciendi uim habet, quemadmodum et charta deusta: sed papyri cinis uiribus inferior est.

Paronychia, ab effectu nomē sortita est, quod reduuijs quæ ad unguis radices coeūt, et paronychiæ dicuntur, remedio sit. Extenuat, exiccat, & mordere nescit.

Quinquefolium in tertio excessu desiccat, minimè acre, eoq; multiplicis est usus.

Peplon, alijs papauer spumosum appellant, & hic fruticulus succum obtinet, & tithymallorum modo expurgat.

Peplion quoq; succum possidet, prouenitq; magna ex parte maritimis locis. Cætera quidem superuacua, semen uerò eius feruens, haud aliter atq; peplum expurgat.

Piperis radix uiribus costo assimilatur: cæterum fructus nuper germinantis, piper longum dicitur, quod humidum est & calidum. Qui uerò acerbus adhuc est, piper dicitur album, quod atro acrius. nam illud iam quasi superassatum uires quodammodo nimia torrefactione exhaustas habet, ambo autem excalfaciendi uim obtinent.

Pepō abstergendi ui pollet, quāobrē eius ueluti caro discolorēs ceu à sole contractas maculas, atq; cōsimiles cutis labes exterit, semen renes obturatos obstructione uindicat.

Periclyo

LIBER SEPTIMVS. 615

Periclymeni, syluæ matris semen et folia, incidētis pariter calfacientis sunt potentia, tātæ quidē, ut senis diebus pota, otium cruentum proliciāt, semen desiccant, lienosis et ægrè birantibus quadragenis diebus pota salutaris est.

Verbenaca, hæcenus desiccatur et astringit, ut uulnera conglutinet, & sanguinis eruptiones sistat.

Persæa, arbor est Aegyptia, cuius folia desiccandi & constipandi uim obtinent, ideoque sanguinis eruptiones ompefcunt.

Petasites tertij in arefaciendo ordinis est, quo fit ut aduersus cacoëthe, et hulcera phagedænica usus eius commēdetur.

Petroselinum semen calfaciendo & exiccando in tertio censeatur ordine, unā cum incidendi effectu: inde mēstrua & lotia copiose promouet, & flatus discutit.

Peucedani succum & liquorē impendio calorificum, dissoluentem at attenuantē usurpamus. Odorata namq; & in potione interius sumpta, iuxta affectibus pulmonū ac pectoris, ex crassitudine & tenacitate humorū prouenientibus, prodesse credūturi: Lienes induratos soluunt: dentiū perforatorū cruciatus, cavitati exesæ impositus liquor extemplō sopit, affectibus neruorū cōgruit. Radix cum ad hæc, tum ad squamulas ossium abscindendas utilis est. Hulceribus dolosis et malignis opitulatur, excalfaciens & desiccans gradu tertio.

Picea, cum pino similem quidem, sed moderatiorem facultatem sortitur.

Peganū, ruta syluestris quarto ordine calfacit & exiccat, hortējis tertio. Crassos tenacesq; humores diffecat et discutit, lotia ducit, & flatus extrudit: hinc ueneris impetum cobibet.

Pix arida distātia à tēperatis secūda desiccatur, minus calfacit. In liquida ecōtrario calor siccitati præstat. habet & non nullā abstergendi, maturandi, dissipandi potentiam, et in gustu acrimoniam: quibus scabros ungues, impetigines exterrit, tumoresq; maturat duriores. Ad hæc omnia liquida po-

tentior est: ut suspiriosos etiam, et pectoris suppuraciones, *phlegma* adiuuet. sicca uerò, ad uulnera conglutinanda efficacior.

Pisselæon, liquidæ picis proles est, quæ natura subtili-
rum est partium.

Pistaciorum fructus manducatus, stomacho moderatè u-
lis est, iocinoris obstruções expedit, atq; in primis summe-
rum, beneq; fragrantium eorundem operimentorum in uino de-
coctum: ad serpentium etiam morsus accommodatus est.

Pityides, fructus sunt picearum mixtæ uirtutis, ueluti acer-
monie et acerbitalis participes. Quare promanantibus e-
pectore spuitionibus conferunt.

Pityocampe, picearum erucæ, iisdem sanè uiribus, quibus
cantharides et buprestes præditæ sunt.

Piceæ cortex ita astringendi facultate præpollet, ut in-
tertriginibus et ambustis illitus, efficacissimè succurrat, et
alui fluorem bibitus cohibeat. Folys inest uis quædam hulle-
rum conglutinatoria.

Pityusan, nonnulli tithymalli speciem esse autumant, eo
quod lac perinde atq; ille habeat, et similiter illi repurget.

Platanus non multo humidiorum et frigidiorum faculta-
tem possidet, hinc et folia eius uiridia inflammationibus na-
scentibus auxilio sunt. Cortex autem et galbuli siccoris sunt
potentiæ, ut in aceto elixi, dentium cruciatus leniant, adustio-
nes uerò ignis cum adipe persanent. Cortex porro crema-
tus, desiccatorius magis et abstergetior euadit, hætenus qui-
dem, ut lepras exterat, bulceribusq; perhumidis medeatur.

Pulmo agninus et porcinus, in pedibus calciamentorum
attritus sanare creditur. Vulpinus sale inueteratus si potu su-
matur, anhelos restituit. Marinus recens in leuorem contri-
tus, podagris et pernionibus proficit.

Polemoniū, quidam philetæron nominant, tenuis est essentia
et exiccatoria. potui igitur nonnulli in coxendicū dolorib.
dysenterijs et indurato lieni radicem eius cum uino exhibent.

Polium

Poliū minus, quo utimur ad antidota, in tertio est calfacien-
 et arefacientiū cēsu. Laxat igitur obstructa intestina om-
 nia, lotiū et menstrua trahit, grandia conglutinat uulnera ui-
 nis. aridum uerò rebellibus inpersum hulcerib. subuenit.

Polygalō modicè austera habet folia: potiū, lac procreare
 letur. Tēperamentū itaq; in eo imperat calidū et humidū.

Polygonatum, fraxinella, multiplici facultate à natura
 natum est, astrictione, acrimento, amaritudine, & insuauī
 gustus fastidiosa, explicatu difficili. unde non admodum
 multa est usui, præterquā quòd radicem eius nonnulli
 lneribus inducunt, & faciei næuos eadem detergant.

Polygonon, sanguinalis, habet quiddam astringens, sed
 incit in eo aquea frigiditas, in excessu secūdo. Quamobrem
 migrantes effreni æstu stomachos, gelida foris inpersa ad-
 quat, quemadmodum & sacros ignes & feruentes inflam-
 mationes lenit. quumq; eiusmodi existat, profluua retundit,
 eoq; siccifica esse uidetur. Antecellit autem in omnibus fœ-
 cinam mas efficacia.

Polynemum calfacit & desiccāt secundo gradu, proin-
 ipsum quoq; uulnera conglutinat.

Polypodium, filicula, citra mordacitatem impensius de-
 siccāt, potu haustum purgat per inferna.

Pompholix arefacit absq; erosione, itaq; carnositas atque
 omnes malignis hulceribus succurrit. Inditur etiam
 ocllyrijs ocularibus.

Purpuræ crematæ æqualem habent ostracis potentiam:
 eterum testæ ipsarū in oleo decoctæ, capillos fluentes con-
 ruant: cum aceto sumptæ, lienes turgentes sanant. Eadem
 ffite, mulieres ex uteri strangulatione concidentes exci-
 unt, secundasq; expellunt.

Potamogiton, fontinalis herba refrigerat & adstringit
 roximè sanguinali, cui uiribus respondet.

Poterij, quod phœcenion quidam uocant, fruticis radices

Qq 5 concise

concisæ, neruorum præcisiones & uulnera conglutinant. Quinetiam potum herbae eius decoctum, neruorum affectibus adiuuat.

Prasion, marrubium, calefacit ordine secundo, sed exiccatur amplius, iocinoris & lienis obstructions aperit, thoracem & pulmonem expurgat, mensesq; prouocat. Illitum autem abstergit ac digerit. Alioqui primaria detergendi & dissecandi facultate præditum.

Porrum, prauum succum generat, et acrimoniam possidet, ut autor est Dioscorides: graua parit insomnia, aluo commodatur, urinam ciet, & attenuat. Habet præterea nihil abstersorium, quo pectoris uitia per excreationes emendat. Semen eius ptisana decoctum, renum inditur remedium. Folia quadam sunt astrictione donata. Qua ratione expressus eorum liquor, sanguinem erumpentem suppressit.

Prinns, ilex, congeneres quercui uires obtinet, multo tamen est ualentior.

Propolis efficaciter calfaciendo secundum sortita est excessus ordinem, abstergit leniter, & substantiam in se habet tenuem, & meatus obturatione asserentem.

Ptarmicæ folia sternutamenta proritant. Vniuersus uero fruticulus uirens, sugillata, liuoresq; alios dyscit. Est etenim calorificæ & exiccatoriæ facultatis. Viridis quidem in secunda, sicca in tertia distantia.

Ptelea, ulmus, exiccantem & abstersoriam uim obtinet, qua uulnera conglutinet. Multo uero amplius cortex, si recens fasciula modo uulneribus circumligetur. Leporam cum aceto exterit. Radices eadem potestate regnantiarum decocto fracturae, quæ tophacia egent substantia, fouendæ sunt.

Pteris, filix, exiccatoriam uim & amarâ præfert. Propterea fœtus in utero interficit, & latos lumbricos enecat, quatuor drachmarum pondere in mulsâ sumpta. quoniam autem paululum habet astrictiōis, hucera sine erosione exiccat.

Pycno-

Pycnocomum discutientis & acris est potentia, proinde
ipsius panos & furunculos discutiunt. Semen ad hæc
corpori infixæ extrahit, radix flauam bilem exhaurit.

Pyrethri radix deurentem uim sortita est, qua dentium
frigeratorum cruciatus lenit, & in febrium cum tremore
algoribus sub accessionis circuitum cum oleo infricatur.
Pidos etiam ac resolutos iuuat.

Pyros, triticum, primi est excalfacientium ordinis, nulla
siccandi aut humedandi insigni potestate, glutinosi etiam
toris & obstructionis nonnihil sortitum est.

Pytia, coagulum quoduis, acrem, attenuantem, dyscien-
tiæ & exiccatoriam facultatem habet. Leporinum uero,
initialibus succurrere, si cum aceto potetur, traditum est
memoria, & foeminarum fluxioni medetur. Lac in uentre
humosum soluit, consimiliter & sanguinolentia pectore ex-
tenuationes compescere affirmant. Equinum uero tradunt,
colicis, intestinorumq; torminibus succurrere: Phoca pa-
castorio uires obtinere.

Eycula quælibet (aut attritarum uestium fragmenta)
combusta, pares lanæ crematæ, ex qua textitur, uires possi-
t. Linteam uero dum crematur, tenuem ex se fumum ex-
halat, ut destillationes à capite in subiectas partes dissipet, et
febrium locorum recursui ad superna auxilietur. iam pan-
culus combustus proximam lanæ facultatem obtinet.

Rhamnus arefacit distantia secunda, refrigerat in pri-
ma. Qua ratione herpes cum ignibus sacris non admodum
uenientes curat. Cæterum tenerorum eius foliorum usus com-
mendatur.

Rhaphanus tertio gradu calefacit, secundo exiccatur: syle-
tris autem in utroq; efficacior est. Amborum semen ualen-
s est: sugillata igitur, & cæteros liuores discutit.

Rheum nonnulli rha nuncupant, constat terrena, frigida
subtiliumq; partium essentia, acra item calida, & leuiter
acri.

acri. Quamobrem conuulsionibus, fracturis, & orthopne
auxiliatur, liuores, quod disyciendi uim habet, exherit. Qu
astringendi, sanguinem expuentibus, coeliacis, intestinor
torminibus prodest. Vtriusq; ratione iocinorosos adiuuat.

Resinae omnes calorificam habent & exiccatoriam
cultatem. Ceterum primas tenet terebinthina. non enim di
cit modò, sed emollit etiam, & tenuem habens insuper es
tiam, eatenus abstergit, quatenus scabiè exherit, & lanx
huiusmodi. Acrior quodammodo est resina tedacea, & h
quoq; magis strobolina, neq; tamè quàm terebinthina mag
distrabunt aut extrahunt. Medium inter has locum tenent
cea & abietina.

Rosarum uis atq; natura conflata ex aquea substantia,
lida, adstringente atq; amara. Flos adhuc ualidius astringi
camq; ob causam exiccando pollet.

Rhodia radix calfacit ordine secundo, tenuium partium
& dissipantis naturæ.

Rhœa, mala granata, dulcia omnia, adstringentem qu
litatem obtinent prædominantem, quapropter refrigerant
& desiccant. Ceterum dulcia minus: austera autem magi
refrigerant, & sicciora sunt, & stomacho minus noxia. Ac
da refrigerant, & ampliorem quandam incidendi faculta
tem obtinent. Acini ipsius succo astringentiores & exiccant
tiores sunt. Iam uerò & malicoria his multo amplius astrin
gunt & arefaciunt. Proximam his naturam habent Cytini,
qui mali punici flores sunt.

Rhoos, qua coriarij utuntur, fructus & succus medicis in
usu potissimum sunt, ualde astringentis quidem & siccifica
qualitatis in excessu tertio, abstergentis autem secundo.

Rhypos, strigmenta sordesitæ ex ære statuarum & uaso
rum in palæstris, in quibus largum oleum inhæret, continēs
aliquid æruginis, disyciendi & moderatè arefaciendi, emol
liendiq; uim obtinent, atq; ob id immaturos panos disyciunt.

Ceterum

cerum de strigmentis ex palæstra cum puluere & decimas
ceromate collectis, quæ pati à quibusdam uocantur, iam
lem de sudore traditum est. Sordeculas uero aurium res
is, optimum remedium esse perhibent.

Agapenum ceu liquor est ferulæ, calidus & subtilis. Ha
et aliquid abstersorium, quo oculorum cicatrices exterit,
usionibusq; eorum accommodatur.

Balamandræ combustæ cinerem nonnulli medicaminibus
identib. & quibus lepræ ac scabiei succurritur, admiscet.
Samsychon, maiorana, calfaciendi & arefaciendi uini
et in tertio excessu. Constat ex tenuitate partium, & disti
te potentia.

Sandaracha deurentem, perinde atq; auripigmentum, fa
tatem obtinet.

Sandix, uel Siricum tenuium est partium, & temperate
exiccatoria, nondum tamen excalfaciens.

Saprotēs, caries lignorum, potissimè ulmi, humida expur
hulcera, & carne implet,

Sapon abstersoria facultate prædita est.

Sarcocolla, arboris in Perside nascentis lachryma est,
uim & naturam habet opplendi, et citra erosionem de
andi, eoque uulnera conglutinare potis est.

Saxifraga urinam prolicit, & calculos comminuit.

Satyrium, uel ut alij nuncupant, trifoliū, temperaturam
et humidam & calidā, & spirituosum est. Quamobrem
uenerem incitat. Tradunt aliqui, id ipsum cum uino astrin
te haustum, non nisi recta ceruice spirantibus succurrere.

Plenus libro de Theriaca: Triphyllū, inquit, hyacintho si
e est, aere intumescens, semē habet syluestri cnico simile.

hæ huius decoctum, phalangij aut uiperæ morsui, si eo fo
tur, opitulari. Sano autem eadem potio exhibita, consimi
affectum his qui ab aliquo horum demorsi sunt, inducit.

Sauræ, lacertæ iocinoris ac capitis, suo loco mentio fa
cienda est.

Est.

Haec est. uniuersa autem dissoluta & imposita, scorpionis idibus remedio est.

Apium tanto calore praeditum est, ut lotia mensesque prioret, flatulentos spiritus extinguat, & semen eius potissimum

Seris, intybum, holus subamarum est, frigidi admodum ac humidi temperamenti, sed astringentioris quoque qualitatis et particeps.

Seriphum calfaciendi in secundo excessu, siccandi in primo, facultate praeditum est, absinthio respondens, praeterquam quod non aequè ut illud astringit, impensius calfacit, & lumbricos interficit. Stomacho nonnihil infesta.

Seselis radix, magisque semen, tanta cum partium, quibus conflata est, subtilitate, ut calfactoria pollet, ut urinam cecat aduersum comitalem morbum & orthopnoeam opem confert.

Sepiae testa consimili quidem ostreo praedita est potentia, sed tenuioribus constans partibus, abstergens. Qua de re cremetur, cum sale fossili, oculorum ungues extenuat. Insuper & infricata, ficosim exierit, & cutis uitia detergit.

Sesamoidis candidi semen calfacit, abstergit, & rumpit.

Sesamium pinguetudinis plusculum, uiscosumque lentoris non parum continet. Eam ob rem opplendi, emolliendi, & calfaciendi non in summo uirtutem obtinet.

Seps, quam aliqui lacertam Chalcidicam appellauerunt, in uino bibita, a se illatis mordicibus succurrit.

Saliua hominis ieiuni potenter dissipat & abstergit. Quod circa infantium impetigines illita exierit, furunculos concoquit, cum tritico nimirum ore praemanso imposita, sugillata abolet: homicidisque feris omnium aduersissimum est.

Sideritis Heraclea, quae & helxine dicitur, explicata est. Sed Achillea sideritis superiori uiribus est non dissimilibus, nisi quod astringentione exuperat. Idcirco fluidis adfectionibus competit.

Sideros,

Sideros, ferrum aqua sæpenuerò extinctum, insignem
nam uim siccificam in ea deponit, pota idcirco lienosis ex-
cedit. Vinum uerò in quo candens ferrum extinctum est, coe-
ret, & intestinorum tormina, cholera laborantes, stomas-
cho dissolutos persanat.

Sicyos, cucumis qui edendo est, uiridē colorem præfert,
refrigerandiq; & humedandi facultatē in secundo excessu.
Stomacho eius feruidas mitigat inflammationes. Semini abster-
gendi & incidendi facultas inest. Quocirca urinas cit, & cora-
pori uenustatem & nitorem conciliat. Siccus arefacit in ora-
mine primo, sed maior abstergerendi uis cum semini, tum radia-
ci inest. Cucumeris sylvestris liquor, Elaterium dictus est. Ra-
dicis uerò foliorumq; succus, haud disparem quidem elaterio
in facultatem, sed debiliorem sortitus est. Radix abstergit, discu-
tit, atq; emollit; succus exiccat.

Sillybum plantula spinosa est, chamaeleonem candidum
referens, esculenta interim. Radicis liquor drachmæ pondus
cum mulsa potus, uomitiones prolicit.

Silurus sale conditus, atq; deglutitus, fauces humiditas ex-
purgat, ad modum cataplasmatiis impositus, aculeos euellit.

Silphæ, blattæ, quæ circa molas & in pistrinis repe-
ritur, interanea elixa & contrita, aurium doloribus me-
dicantur.

Silphium, laserpitii, insigniter calfacit, & flatu creat,
& concoctioni renititur. Exterius corpori applicatum, effe-
cacius agit, præcipuè laser: attrahendi, expurgandi, & ex-
crescentias amolendi uiribus pollens.

Sison calidum, lotia ciet, concoctionem iuuat, menstrua
concoctat, & interancorum oppilationes recludit.

Sium, lauer, exalfacientis est potentia, urinas mouet, di-
scutit, calculos in renibus confringit, & menses propellit.

Sisari radix elixa, stomacho salutaris est, uires eliciendi
urinas, secundoq; excessu calfaciendi obtinet. Semē tenuium
partium

partium est, & discussorium, & præpotens. Quamobrem singultientibus, torsionibus circa umbilicum laborantibus, cum uino propinatur.

Sisymbrium, quod & cardaminem nuncupant, eo quod cardamo præferat quippiam simile, aridum quidē calfacit & desiccatur, ordine primo: rudum uerò secundo.

Scammonia calfacit, discutit, & biliosos humores abstergit, sed potissimū eius liquor, qui & panos dissolvit, conceptum appositum interficit, lepras abolet. Diuturno capitis dolori cum oxyrhodino magna cum utilitate inspergitur. Radix ipsa per se pota, tum eius etiam decoctum repurgat. Cum admixtione uerò aceti polentaq; hordeaceæ decocta, coxendicum doloribus cataplasmatibus superinducitur.

Scandix est syluestrium holerum censu est, calida & sicca facultatis secundo excessu. Urinam ducit, & uiscerum obstructions aperit.

Scingi carnes renibus proxima, potu sumpta, mētulam arrigere, & uenerem accendere creduntur. Contrariam affectionem lactuæ semen cum aqua potum inducit: hoc est, ueneris cupiditates extinguit. Idem præstat lentium elixatio cum melle.

Scilla incidit, calfacit, et desiccatur ordine secundo. Satim autem fuerit eam assam aut elixam sumere.

Scolopendra, centipes marina, oleo elixa & illita, glabreta inducit. Combusta uerò pruriginem quoq; excitat.

Scolopendrium asplenon est.

Scolymon, carduus, calfacit & exiccat classe secunda. Radix in uino elixa, potaq; graueolentē urinā copiose eicit. hircumq; alarū, uniuersiq; corporis uirosos odores emēdat.

Scordium multiformes potentias sortita est, quoniam simul amarum, acerbum, & acre est. Expurgat itaq; pariter, & calfacit uiscera, urinam & menses promouet, omnia perfrigerata calore instaurat, uulnera conglutinat, sordidaq;

expurgat.

expurgat. Aridum ad cicatricem perducit inspersum.

Scorodon, allium calfacit & siccat quarta distantia.

Sylvestre quod ophioscordon, tanquam anguinum alliū nuncupant, efficacius quā satium est.

Scorodoprasum porri & alliū gustu mixtas refert qualitates, pariter atq; uires.

Scorpioides calfaciendo tertium, desiccādo secundum ordinem fortitur.

Scorpius terrenus, crudus impositus uel tostus in cibo sumptus, contra proprios ictus præsenti est remedio. Marini uero fel, suffusionibus oculorum subuenit.

Scoria (hoc est, metalli cuiusuis recrementum) quolibet tempore desiccatur, cum primis ferri, quod excoctum atq; cum aceto laeuigatum, auribus suppurantibus prodigiosum est remedium: ijs etiam qui aconitum hauserunt, cum aceto mulso potum, succurrit. Stercus plumbariū plumbi uiribus respondet, uehementius tamen astringit.

Smilax, uel cactus, taxus, uenenosae facultatis arbor est.

Smyrna, myrrha, calfaciendo & desiccando, in secundo censetur excessu. Capitis igitur uulnera, inspersa glutinat. Inest etiam quidam amaror, quo lumbricos, foetusq; occidit, abstergit praeterea: quo nomine ocularibus collyrijs inferitur, et humores pectori impositos expurgat sic, ut fauces non exasperet. Bœotica uires calfaciendi, emolliendi & dissoluendi obtinet.

Smyrniū, sunt qui hipposelinum, quasi equapium, quicquid equapiū sylvestre nuncupant, calfacit & exiccat, tertio ordine. Apio duntaxat ualentius, petroselino debilius: urinas igitur mensesq; agit.

Sonchus, astringit pariter et manifestè refrigerat, quum lixell estur, uel corpori inducitur. Arefactus, mediocrem calfaciendi uim induit.

Sparganio quoq; uis & natura desiccandi est.

Rr

Sparti

Sparti genistæ quo uites uinciunt, seminis cū floribus oboli quinq; in aqua mulsa epoti, purgant per superna, ueratri candidi modò sine periculo. Semen seorsim deiectionem molitur, uirgultula eius coxendicis doloribus opitulatur.

Specularium (lapis specularis) aliqui per ph, spheclarion scribunt, quod eo uitri uice in fenestris nonnulli utantur: quæ de causa diaphanes quoq; id est pellucidum à claritate appellatur, substantia gypso sum: habet crematis testis, siue ostris similem potentiam.

Spongia noua, maris etiamdum odorem spirans, cum aqua uel uino uel posca superinducta, uulnera cōglutinat. Cremata acris est, ac dissipat. Cum bitumine liquidæ uel pice com busta et applicata, exigue sanguinis eruptiones cohibet.

Spodium, cinerula congenerem habet cum pompholyge potentiam.

Staphilinus, pastinaca urinam agit, menses sollicitat, præcipue radix et semen. Folia autem abstergerendi ui prædita, affectionibus phagedænicis uiridia cum melle salutaria sunt. Pastinaca autem syluestris, ad omnia satiuæ est potentior.

Stachys frutex spicatus, marrubio æqualis, calfacientium tertij ordinis est, ea propter menstrua ducit, fetus occidit, et secundas à partu morantes expellit.

Steata, adipēs omnes hominis corpus humedant, et calfaciunt: pro diuersa uero animantium temperatura, earundem facultas uariatur. Suillus igitur nulli est in humedando secundus, uicinamq; oleo sortitur potestatem: quare etiā rosiones obtundit. Caprillus siccior est, ocysq; congelasse: quæ ratione ad mitigandū recti intestini morsum, ipsum per sedē inuicimus. Anserinus calidior, subtiliorumq; partium est: in medio horū adeps gallinaceorū atq; gallinarū existit. Leonū adeps omnium facile calidissimus est, tenuissimisque essentiæ partibus cōstat, ac proinde præ cæteris discutit. Bubulus mediū inter suillū et leoninū temperaturā sortitus est. Ursinus capillorum

pillorū ex alopecia defluujs medetur. Vulpinus aurīū doloribus, quemadmodū uiperarū pilos abolere et oculorū suffusiones prohibere prodiū est. Porro in omnibus calidior semper ac siccior est mariū, atq; horū magis testiculorū et uia gentiū etate, quā reliquorum. Statuum quoruncunq; pecudum temporis diuturnitate, seipso redditur calidius.

Stimmi præterquam quod desiccet, astrictionis etiā paraticeps est, quapropter ocularibus confunditur collyrys.

Stœbes semen, et folia astrictoria facultate donata, desiccant in tertio excessu. Qua ratione uulnera peringentia conglutinant, eorumq; decedum intestinorum torminibus, sanguinis eruptionibus, et auribus purulentis auxiliatur. Oculos ex idu sanguine suffusos illita iuuant.

Stœchas obstructions recludit, crassa attenuat, extergit, et uiscera omnia, totumq; animalis habitum correborat.

Stratiotes, qui in humidis nascitur locis, frigorificam uim obtinet. Terrestris uerò nonnihil astrictionis habet, qua hūlcera conglutinat. Nonnulli eo ad sanguinis eruptiones compescendas, atq; ad fistulas utuntur.

Solanum hortense esculentum, astringit et refrigerat excessu secundo: cui nomen est Alicacabum, facultate hortensī simile, fructum gerit ciendæ urinæ idoneum, uuarum acinis neutiquam absimilem. Solani uerò soporiferi radicis cortex, in uino drachmæ instar sumptus, somnū acersit. Semen uim proritandi urinam obtinet, ex tertio frigorificorum ordine. Proinde si plus duodecim corymbis hauriatur, furorem adasciscet. Quarta solani species (furiosi nomine gaudens) ad medicinas quæ intra corpus sumuntur, inuile est, exterius autem illitum, hūlcera depascendo serpentia curat, excessu secundo desiccans et refrigerans.

Stypteria, alumē omne uehemēter astringit, crassū est, et attenuat, reliquis tamē subtilius existit, quod appellatur scisile: proximū est rotundū et stragelotes. Crassarū atundē par-

tium est liquidum, placitis, & plinthitis nuncupatum.

Styrax, calfacit, emollit & maturat: quocirca tusibibus destillationibus à capite in subiectas partes, & coryzis succurrit. Fœminarum purgationes ducit bibitus et applicatus.

Syca, ficus aridæ, caliditate sua secundū ordinē attingūt: pinguiore, duos tumores ualidē ad maturationē sollicitat, acriores abstergunt, ac dissipant. Decoctum ipsarum mellis æquale, quod sireon plerique nominant, uiribus melli respondet. Virides imbecillioris sunt potentia: utraq; tamē aluum subducunt. Ficus autem caprifici acris & discussoria potestate donati, perinde atq; ex satiuis grossuli sunt.

Syce, ficus arbor calidam & tenuem temperaturam sortita est, adeo ut liquor eius, & foliorum succus non mordicet modò, uel excellenter abstergat, sed exulceret etiam, ora uasorum aperiat, & myrmecias dissipet. Quin & purgandi uis inest. Syluestris autem ficus, quam caprificum indigitat, ad omnem usum efficacior est domestica.

Sycomori fructus nihil alimēti præstat, stomachoq; noxius est. Liquor uerò sycomori emollit, uulnera committit, et tumores distrabit. Bibitur illiniturq; contra serpentium ictus, duriæ infestatos lienes, stomachi dolores, febriumq; horrores.

Symphyton, petreū ex diuersis uiribus confectum est. partim enim incidit, ut pus in pectore & pulmonibus contentū, renesq; expurgat: partim contrahit, ut sanguinis excretionibus, conuulsis, ruptis, fluxionibus fœminarum rufis, intestinorum que ramicibus medeatur. Obtinet ad hæc calidam humiditatem, qua sitim arcet, & arterie lenit asperitates. Symphytum alterum, nempe grandius, uiscidum quendam lentorem & mordicationem obtinet, scyllæ simile. Utatur eo ut petræo.

Sphondilij uerticilli, fructus atq; radix, acrimoniā habet, & incidendi facultatē. suspiriosis itaq; et comitialib. regioq; morbo succurrunt. Radix eius circumrassa, fistulis imposita,

cala

callos illarum tollit. Floris succus in aures contra diuturniora hucera instillatur.

Schinos, lentiscus secundū omnes suas partes desiccatur secundaria distantia completa, in caliditate uerò frigiditatis, que qualitate medium quadantenus locum obtinet, eò usque astringens, ut astringione succo hypocyssidis propè admodum accedat.

Iunci odorati flos calfaciendi mediocrē, astringendi minorem facultatē obtinet, tenuibus essētiæ partibus. Quibus urinae nam prolicit, menses proritat, et ab oppilationibus liberat, tum in suffitibus, tum potionibus, tum in cataplasmatibus adhibitus. Flore magis astringit radix, hac uerò ille calidior est.

Rotūdi odorati iunci leuissimæ geminae sunt species. Sed oxy-schœni appellata semē somnum cōciliat, minus uerò oligoschœno caput aggrauat. Ambo fricta si cum uino potentur, uentris fluores exiccant, & muliebri profluuio cohibent.

Sory, misy effiacia respondet, multo crassioribus tamen illo constat partibus.

Tymorum sale maceratorum caro acris est, & exiccatoria, quam ob causam à prestere uipera demorsis perquā plurimum eius esui præbetur, uinumq; insuper largius ingurgitatur, & citatur uomitus. Ad drimyphagias, qui acrium esus est, congruit. In modum cataplasmatibus aduersus canum & aliorum serpentium morsus utiliter illinitur. Taurocolla (quasi taurinū glutinū dicas) sunt qui xylocollā, id est ligni glutinū uocāt, ex boū corijs cōfecta, impēse abstergit. Quocirca aceto diluta, impetigines et summæ cutis lepras exterrit: neq; sinit ambusta inflādari, cum calida aqua eliquata. Est præterea medēdis uulneribus oxymelite macerata utilis.

Tellinæ, sale conditæ, crematæ, deurentem reddunt cinerem. Qui cum cedrio liquore confusus, euulsos radicitus palpebrarum pilos nasci iterum alios, si instilletur, prohibet.

Terebinthus, excalfacit in excessu secundo. Desiccatur ue-

Rr 3 rō, si

et si quidē uiridis sit, primo: sin aridus, secundo. Fructus por-
ro aridus tertiæ est arefacientium distantie, propter hæc u-
tiq; urinam prouocat, & lienes adiuuat.

Tettigas, cicadas quidam crudas exiccant, colicisq; po-
tui treis aut quatuor, aut quinq; aut septem, cum paribus nu-
mero piperis granis exhibent; aliqui assas edendas offerunt,
quibus affecta est uesica.

Teutlon, beta nitrosæ potestatis particeps est, per quam
abstergit, discutit, caputq; per nares expurgat, potentius au-
tem candida. Blixata ad leniendum feruores, & inflamma-
tiones arcendum, leniterq; discutiendum redditur efficax.

Teucrium calfacit ordine secundo, desiccatur tertio, disse-
candi & attenuandi facultate præsidio lienibus existit.

Tephra, cinis nō quilibet eandē ad amussim temperaturā
obtinet, sed pro cōbustæ materie diuersitate uariatur. Acer-
barum namq; arborum cinis, utpote quercuum & ilicis, astri-
ctione non modica præditus est: qua sanguinis eruptiones sup-
primit, quum aliud ad manum non est. Acrium uerò, puta si-
cus et tithymalli cinis, a criore ui et abstersione magis pollet.

Telephium in primo calfacientium, secundo autem are-
facientium ordine collocatur, & abstergit. Quare ad putri-
da exedentiaq; hucera accommodatum est. Leucas & uiti-
ligines cum aceto exterit.

Telis, fœnogræcum in calfaciendo ex secundi ordinis cen-
su, in desiccando primi habetur. Quamobrem feruentes phlo-
gmonis irritat, cæterum non adeo calidas, & scirrhum &
mulantes, dissipando sanat.

Tithymalli omnes quarto ordine, cum acrimonia et ama-
ritate intensa calfaciunt. Sed radix quum inefficacior quo-
dammodo sit, aceto elixa, erosorum dentium cruciatus sopit.
Liquores ualentiore potestate præditi, cauis dentium inserun-
tur: uerum ubi aliam corporis partem contigerint, eandē ex-
templo adurunt, ideoq; pilos paululum delibutos abolent, for-
micas,

micæ, acrochordonas item, & id genus uitia auferunt, licet nasq; & quæcunq; cutis uitia exterunt, hucera uitiosa consuetudine et phagedænica sanant. Septenario autem numero comprehensi, uehementissimi sunt: characias, quasi uallaris: & myrsinites, à myrti foliorum figura: & dendrodes, quasi arborefcens, à ramorum copia, qui prouenit inter saxa: dein de uerbasci imaginem præferens, mox à cupressi forma cyparissius. Ab hoc paralius, hoc est maritimus: postremò helioscopios, id est solisequus.

Titanos, calx aqua nō restincta hæcenus urit, ut crustas inducat. Extincta uerò crusta quidē protinus molitur, sed post diem non amplius, calfacit tamē, carnesq; liquat. Quod si lauetur aqua marina, summam dissipandi facultatem induit.

Tragacētha similib. admodū gummi uiribus prædita est.

Tragium planta est, quæ in Creta prouenit, lentisco conformis, tertij calfacientij ordinis, attractoria, discutientisq; facultatis, et tenuis essentia. surculos euellit, lapillos comminuit, menstrua trahit drachmæ instar bibitū. Sed alterū tragium, quod à Romanis cornulaca uocatur, proximo amarulentius, scolopēdrio simile, gignitur multis in locis, tãta astri gloria uirtute donatū, ut fluidis affectionib. accommodatū sit.

Tragoriganus similes origano uires habet, & astriccionis plusculum.

Tribulus modicè refrigerat, sed terrestris siccando uehementior est, aquaticus etiam leuiter humectat. Vtriq; contra inflammationum generationes, cunctasq; fluxiones accommodati sunt. Terrestris fructus, quum ex subtilibus partibus constet, renem calculos confringit.

Tragositodes, tragus frumentaceus zeæ similis est, concoctioni uerò magis resistit, & aluum emollit.

Trigle, mulorum piscium assiduus esus aciem oculorum debetat. idem marini draconis, scorpionisq; & aranæ moribus subuenit, si crudus concisusq; adhibeatur.

Rr

4

Tripoliæ

Tropoliū, radicē habet calidā in tertio gradu, et acrem. Triches, pili cremati consimilem sortiuntur lanis comibustis facultatem.

Triga, pastinacæ marinæ radius, denti affecto impactus, confringit ipsum & excutit.

Tryx, fex uini nondum cremata, uarijs conflata est uirtutibus: uis enim illi ualidissimè desiccandi & dissipandi. Cæterum astrictionem, ex uini, cuius sedimentum est, specie adispiscitur. Utendum igitur est ea in affectionibus humidioribus, & fluidis. Phygella disycit, rigentes lacte mammas extinguit. Cæterum quæ priuatim sphecle, hoc est fex cremata appellatur, deurendi uim induit, atque ob id deurentibus etiam medicaminibus inditur. Scabros ungues cum resina excutit, & ex oleo lentiscino totam noctem illita, capillos flauo colore inficit. Lota abstergentibus oculorum medicamentis commiscetur. Aceti fex per omnia ualētior & astringentior quā uini est.

Troglodytes, passer est, omnium auium, dempto regulo, minima, degens frequenter in sepibus. Is quū assus, tum crudus, sale conditus atq; comestus, calculos renum confringit. Cinis ipsius deusti potus, eadem designat.

Tyros, caseus recens & mollis, percussoriam habet facultatem, refrigerans leniter: quocirca & uulnera committit impositus. Qui autem oxygalaëinus nuncupatur, præter hæc discutiendi etiam lenem quandam uim sortitus est, uulneraq; ualidius conglutinat. Inueteratus autem, atq; in primis pinguis, distrahendi uim repræsentat: qua ad arthriticorum tophos salubre est remedium, potissimum cum decocto carnis suillæ cum salsæ, tum pinguis.

Yacinthi radix bulbosa primo ordine exiccat, secūdo refrigerat. Atq; ob id quidē pueros diutissimè impubes custodire, cū uino pubi illita, creditur. Semen eius leuiter extergit et astringit. Vnde aurugine laborantibus offertur in uino, arefaciens

arefaciens impensius, quàm refrigerans.

Hyalos, uitrum in pollinem friatum, cum uino tenui candidoq; sumptum, calculos uesicæ comminuere perhibetur.

Hydnon, tuber terræ, essentia terrestriore, cum exigua quadam subtilitate constat.

Hydrargyros, argentum uiuum, haud ita multum momenti in re medica præstat, quum sit letale uenenū: sunt quī d comburentes ueluti in cinerem redigunt, quem alys speciebus permixtum, colicis & ileosis potandum exhibuerunt.

Hydropiper herbula est calida, non aded tamen ut piper tirens cum semine superinductum, non sugillata solum, sed induratos etiam tumores discutit.

Hydor, aqua saluberrima, & impermixtæ consistentiæ, propria sua natura frigida est & humida: quæ uerò acquirat caliditatem assumit, tantisper dum eam seruat, calefacit: simulatq; aduentitium calorem amiserit, refrigerat.

Quæ porro commercium habet cum aliquo, quemadmodum uæ nutri uel bituminis particeps est, admixtæ sortitur essentia facultatem. Cælestis uerò etiam astrictionis quippiam obtinet, ea propter collyrys oculorū temperatur. Cæterum cuiusmodi aquam inculpatam esse oporteat, primo uolumine explicatum est.

Hyoscyamos, altercum, non modo cui atrum, sed & cui lauum inest semen, uenenosum est. Ad medicationes, quod colore ac semine candido præditū est, expedit quammaximè, tertio refrigerantium ordine existens.

Hyperici duo sunt genera: Alterum, quod andrasemon & astyrrhon appellatur, superius comprehensum est. Alterum uerò calfacit & siccatur ob subtilitatem suæ consistentiæ: quæ totus herbæ fructus urinis & menstrua prolicit. cum foetore uerò uirens illitum, uulnera ad cicatricem perducit. Arietina uerò applicata, bulceribus medetur. Exhibentur insuper oxendice laborantibus in potu.

R r 5 Hypecoon

Hypecoon refrigerat in tertio gradu, proximū papaueri.

Hypoglossum fruticulus est, cuius cū radix tum liquor
emolliendi facultatem obtinent.

Hypocisthis succus est eorum, quæ ad cisthi citbariꝫ; uoca-
ti radices subnascuntur, puta cytinorum: admodum efficax
contra omnes fluidas affectiones remedium, eximiè desiccans
do, roburꝫ; particulis indendo, existit.

Hypophæstum, fulloniæ spinæ species est, quæ admodum
hypophæses. Huius capitis, & foliorum, aridarumꝫ; ra-
dicum trioboli pondus cum aqua mulsæ sumptum, aquam &
pituitam euacuat, orihopnæis, comitialibus, & neruorum af-
fectionibus maximè proficit.

Hyssopum calfacit & exiccat ordine tertio, cum tenuita-
te substantiæ.

Phaci, lentes, desiccant ordine secundo, inter calorem ac-
frigus mediæ. Habent præterea nonnihil astringentis
quo fit, ut corpus totum exiccet, & uentrem compescat. iu-
uerò irritat, proinde prior aqua defunditur, quando retentio-
nis gratia adhibentur.

Lenticula lacustris, udi ac gelidi temperamenti est, ex-
cessu secundo.

Phalaridis succus folia & semen pota, uesicæ languori-
bus opitulantur, & in se tenuitatis & caloris quippiam con-
tinent.

Phalangites (id nominis sortita est, quod à phalāgiarum
iāu petitis opituletur) numeratur inter ea quæ tenuium sunt
partium. Eoꝫ; circa umbilicum torsionibus subuenire credi-
tur.

Phelli, subera, præsertim quæ ex uasis uinarijs colligun-
tur cremata, siccificissimum cinerem efficiunt, qui dysenteri-
cis maximè permiscetur remedijs.

Philyra, tilie arboris folia, facultate astringentis agre-
stem oliuam referunt, præcipueꝫ; oris huiusmodi remedio
sunt,

unt, si commanducantur, & decocto eorū colluuntur. Quod
tiam potum, lotium ac menstrua prouocat.

Phlomi, uerbasci plura sunt genera, inter quæ numeras
ur & thryallis. Omnium uerò folia siccandi & mediocri
er abstergerendi ui prædita sunt, & potissimum eius quod au
ei coloris est, & acerbi. Fluidis itaq; affectionibus compe
unt. Colluunt quidam vsdem quoq; in dolore dentes.

Phœnix, quam aliqui rhun appellāt, herba lolio non ab
milis, potestatem habet astringendi. Quare cum uino hau
a austero, omnes fluxionum affectus compefcit.

Phœnix, palma arbor, cuius fructus si probè immaturuit,
moderate calefacit, robur indit, & stomacho confert, tam
tura assumptus, quàm extrà adhibitus. Quod reliquū est pal
æ, astringentis plurimum obtinet: qua de causa stomachicis
hepaticis facultatib. cōfunditur. At quod fructus enascen
s ueluti inuolucrum existit, impensius astringit.

Phormium cum partium tenuitate abstergerendi & attra
hendi facultate pollet. Albugines igitur semē ipsius cum mel
attenuat, & surculos euellit.

Valeriana, phu, radix nardo similis est, sed tamen ad ple
q; ignauior: uerū urinas propellit quàm ea ualētius, per
de atq; nardus Celtica.

Phycos refrigerandi & arefaciendi uim habet in secun
ordine, acerbitate item leuiscula præditus est.

Phyllites, quum acerbata quadam qualitate donata sit, non
bre alui profluuijs pota succurrit.

Halbano tantum non terij excalfacientium ordinis est.

In desiccando autem attingit secundum, cum facultate
colliendi & discutiendi.

Chalcitis, cum acrimonia qua prædita est, astringendi,
durendi, & crustas generandi facultatem obtinet. Partium
item subtilitate media inter misy & sory consistit. Combu
a tenuioris redditur substantia.

Chalcan.

Chalcanthon, aqua est in metallis Cypri coalescens, cui calore quodam insigni, uehementissimam habens astringendi potetiam, quod omnium maximè humidæ carnes condenseruat, atq; desiccatur. Cæterum longo temporis progressu chalcitidem transit.

Chalcos, æs crematum, habet acrimoniam quandam, et astringentis compos est. Inducendis itaq; cicatricibus optimus est, potissimum in aridiore corpore. Si abluatur, in mollior carne salubrius est.

Chalcanthus, flos æris, subtiliorum est partium, quàm combustum, uel squama eius. Temperatus in collyria, aspredine et ficosas palpebras exherit.

Chamaædrys, trixago, in tertio gradu calfacientium et arefacientium est: qua ratione lienes absorbit, lotium ac mensures trahit, uiscerumq; obstructions expurgat.

Chamaecissi, hederæ terrestris flos, quum uehementer amarum sit, iocinoris obstructions referat. Exhibetur item ex coxendice laborantibus.

Chamaeleuca uis est calfacere ordine tertio, exiccare secundum.

Chamaeleontis nigri radix calfacit et desiccatur tertio ferme abscessu. Absterforia quoq; facultatis compos est, qua cutis labes exherit, duos tumores discutit et emollit. Quin et phagedænica hulcera oblita medicatur. Intro in corpus sumpta, uirosa est. Chamaeleonis candidi radix uiribus atro respondet, sed amarior est: quæ cum uini austeri mensura acetabuli pota, latos uiridis lumbricos interficit. Conducit etiam aqua intercutem laborantibus.

Chamaemelū, uel anthemis, primo abscessuum limite calfacit et exiccat, tenuisq; particeps est substantiæ, ut discutiendi, laxandi, et redolendi imperat.

Chamaepitys, aiuga, abscessu secundo calfacit, tertio exiccat. Idcirco uiscera expurgat et abstergit, potissimum ictericis.

r. Vrinæ præterea agit, ac menses, uulnera ampla con-
ittit, hūlcera putrescentia sanat, duritias discutit: decoctum
sius, coxendicum morbo confluantibus auxiliare est.

Chamædrops, sunt qui chamædryn, qui teucrion appelli-
nt, trixagini consimilis est potentia.

Chamæsyce, hoc est humilis ficus, detergente pariter &
ri donata est potentia. Proinde tumores ipsius & liquor,
rrucas quas myrmecias dicunt, & acrochordonas aufe-
nt. Crassas oculorum cicatrices cum melle exterunt, aciei
ulorum hebetudinem, suffusionumq; principia adiuuant.

Chamælaea, oleago, abstersoria facultate prædita, hūlcæ
sordida & crustas cum melle exterit.

Chelidonium, hirundinaria, ordine tertio calfacit, & effe-
citer abstergit. Succus grandioris ad oculorum speciem ex-
uendam accommodus est. Radix autē auruginosos obstru-
one liberat, cum uino & aniso pota: commansa, dentium
ociatus mitigat. Chelidonium uerò minus ex quarta calfa-
untium classe, maiore acrius est, ut illiū cutim exhulceret,
guesq; scabros excutiat, succus eius per nares expurgat.

Chelidonium, hirundinum crematarum cinis cum melle
atus, anginarū inflammationibus succurrit, & oculorum
ritatem adiuuat.

Chole, fel, in animalium humoribus omniū calidissimum
, sed colore inter se dissident. Siquidem quod flauum, palli
calidius est: & flauo, quod colore præfert æruginē. Diffe-
nt præterea, pro animalium quæ id continent ratione. qua
us suillum omnibus alijs imbecillimum est: quamobrem au-
um hūlcera absq; mordicatione curat. Ouium non paulò
uiorem habet quàm suillum acrimoniam, & ouillo capril
on ad omnia efficacius est. Vrsinum pariter & bubulum
uibis caprino respondent. Taurinum his potentius, ab hie-
urum tamen felle superatur: hoc rursum à felle piscis cal-
nyni appellati uincitur, & scorpionis pariter marini,
quod

quod suffusionibus oculorum, hebetudinibus, albuginibus congruit, & testudinis marinae. Sed fel capreae, his qui non acutius quàm interdiu prospiciunt, quos nuscitiosos uocant, conferre perhibetur. At omnium uolucrum fel acrius, & are faciendo potentius, quàm quadrupedum est. Inter has uerò ipsas gallinaceorum atq; perdicum alijs est praestantius. Accipitrum & aquilarum maiore quodammodo acrimonia, & exedendi uiribus pollet, uiridi quandoq; & atro colore.

Chondrilla, seris species quum sit, subamarum quiddam in se complectitur, quocirca uiribus est quadantenus siccantioribus quàm illa praedita.

Chondrus non discrepat à tritico, praeterquàm quòd illi plus uisosi lentoris quàm huic ine sit.

Chrysocolla in metallis reperitur, & in pila ex aere rubro praeparatur, pistillo aereo è lotio pueruli uenerem non experti, sub ardentissimo caniculae aestu contrita. Haec itaq; abstergit, discussoria & exiccatoria facultate alijs metallis uehementiore donata haecenus, ut carnem citra morsum colliquet: quamobrem malignis hulceribus commodissimum est remedium. Combustione omnem planè mordicationem deponit.

Chrysocoma, quae & chrysites appellatur, radix, acriore pariter & astringente uirtute praedita est, quapropter haud ita multiplici in medicina usus est, nisi quòd in peripneumonijs & iocinorosis affectibus in mulsis clixata propinatur, menses insuper promouet.

Pseudobunium bunio specie respondet, calfacit, discutit, et detergit: idcirco à torminibus circa umbilicū, urinae stilliticio, laterumq; doloribus, asserit: distrahit & scrophulis, cum sale uinoq; superinducta.

Pseudodictamnium, debilis dictamni uiribus donatum est.

Psithyion, cerussa, refrigerandi opplendiq; illitu facultatem sortita est.

Pulicaris herbae semen refrigerat ordine secundo, arefaciendo

endo & humectando medium obtinet.

Psoricum præparatur, calcitidis binis partibus, argen-
spumæ uni permixtis, utrisq; tamē antea aceto dilutis, dea
de in ollam recentem coniectis, quæ fimo quadraginta die
is obruta tegatur. Ea quippe ratione confectura desiccato
a magis subtilior, minusq; chalcite mordax efficitur.

Vi albumen ac tenue, mordere nescium, moderatè refri-
gerat. Utendum igitur eo ad oculos, ad pudendorum bul-
ra, aliq; omnia cōtumacia, & uitiosæ cōsuetudinis. Tem-
peratur ad hæc medicamentis profluuium sanguinis suppri-
mentibus, emplasticisq;. Oui autem uitellus astimilis poiētia,
medys inflammationē extinguētibz commiscetur. Assum-
tū porro maiorem desiccandi vim, mitigandi minorem acquirit.
Totum porro ouum aceto decoctum, si edatur, uentris fluxio
desiccatur. Quod si acerbi quippiam adiunxeris, puta gala-
nam, aut rhum, uel syluestris puniceæ florem, & sartagine fri-
ctis, redditur multo efficacius. Ignem autem nō expertum,
ustionibus inductum opitulatur. Sorbile assumptum, lena
peccoris humores concoquit atq; solatur, & asperitates
mucium lauigat. Præferendum autem recēs ueteri, & gal-
licarum, reliquorum animalium ouis.

Ocimum calfacit ordine secundo: habet & recrementi-
um quandam humiditatem. Quare non proficit interius as-
sumptum. Exterius autem illitum disijcit & concoquit.

Ocimoides à plerisq; philetarion nūcupatā, nullius pla-
stis frugis radix est. Semen tamen eius attenuat, & citra ero-
sionem desiccatur.

De pharmacis simplicibus, flauam bilem pur-
gantibus. Cap. 4.

Loes drachma cum mulsā manē exhibetur, qui uesperis
ineam propinant, uel à cibo, lædunt, quoniam alimētum in
sombra distrahunt. Flauam bilem minus extrahit, trium obo-
rum pondus, aluum ab excrementis duntaxat strenuè exo-
nerat.

nerat. Quum uerò medicamina quæ corpus purgant, omnia stomacho noxia sint, sola uentriculo amica est aloë: qui amaritudinem ipsius sustinere nequeunt, ijs conformata inde catapotia deglutienda præbeantur. Sciendum autem, quod phlegmatica purgandi facultate prædita, non simplici quadam temperatura, uerbi causa, caliditate euacuant (oporteret alioquin cuncta calidi temperamenti, ueluti pipere, euacuandi uim obtinere) sed insita quadam totius essentiæ proprietate, quemadmodum Magnes lapis ferrum ad se, ceu demonstratū est, trahit. Porro expurgantium medicaminum albo, quæ emolliendi solum facultatem sortita sunt, primo uolumine commemorata habentur. Efficacioribus uerò, uel ad materiam transferendam, uel ad affectionē indurata[m] mouendam, uel ad instaurandum corpus, temperamentumq[ue] ipsius alterandum, aut humorem deniq[ue] officium facientē educendum, uti sumur. Nonnulli uerò modi ex prædictis mixti inter sese inuicem implicati sunt. Iam uerò in uniuersum medicamentis expurgandi sunt, quibus ualidum robur, ac sumendi eas promptitudo expedita inest, & qui primas ætates egressi, nōdum ad extremū ætatis peruenerūt, & qui stomacho minimè imbecilli sunt, quiq[ue] multam in corpore inutilem accumularunt materiam, neq[ue] adeo sanguinolenti existunt. Tēpus uerò purgationis est, nisi materia turgente res urgeat, uernum maxime, & autumnale.

De his quæ bilem proliciunt, & euacuant.

Cholagogis quouis anni tempore, excepta hyeme, utendum: ætate uerò uigente, & iam declinante, constitutionibus siccis, & musculosis, & atrii coloris, uel rufi: maribus potius quam mulierculis, quibus alimenta continuo corrumpuntur, uentrem habent aspidum, amara item bile præditis, iracundis, nec urinae multum excernentibus, et ijs qui alimēta usurparūt arida & calida. In affectis morbo regio, iocinoris debilitate, laterū doloribus, phrenitide, angina, insania, cephalæa;

laea, ophthalmia, igne sacro, lepra, febrib. & ijs quibus bilio-
sus humor redundat. Porrigitur adhuc aloë his quib. caput
grauedine perturbatur, lippientibus subūdis, et qui imagina-
tionib. in somno uexantur absq; febris. His qui horroris in cor-
pore discursum sentiunt, peditus acres excernunt, intestina
nordicantur, & stomachi effreni astu laborantibus, & quib.
lyster ob excrementorum copiam nequit inijci: abunde nan-
que euacuat (nec uniuersum commouet corpus, nisi multo
plus quàm par sit, offeratur) inhaerentem intestinis uentre
& stomacho bilem educit. Veratrum. accommodatum est
rigitudinibus acutis, & diutinis, quæ bilis euacuationem
flagitant: uerbi causa, insania, & heterocrania, oculorum
lustrationibus, & thoracis quibuscunque affectionibus, cæ-
terum uisceribus, locellis item foeminarum, uesicaq; phar-
maco bilem proliciente opus habentibus, appositissimū est.
Vtile item diutinis asperæ arteriæ affectibus felle suffusis,
utque his pariter qui exanthematis, impetiginibus, aut her-
petibus, uel igne sacro, uel lepra conflantur. Veratrum
nigrum bilem, maxime flauam, à corpore uniuerso absque
difficultate elicit. Quapropter non grauius febrientibus, &
febre uacantibus magis, instar drachmæ, radicibus nempe
mulsa & aqua læuigatis, his qui antè ieiunarint: uel cum
melle forma pilularum, prabetur. Sunt qui ei pulegium ad-
misceant, aut satureiam, aut eorum quippiam quæ ocysimè
transseunt, & stomachum adiuuant.

Scammonia ueratři instar purgat, & flauā bilem potissi-
mè. Sed omnium quæ purgatoriam uim habent, stomacho infè-
lissima est. Quocirca febre carentib. stomacho nō imbecillis
exhibeatur instar obolorū quatuor cum sale, aut pipere, aut
gingibere, aut aliquo stomachum iuuante et celeriter transse-
ante, uel cum melle. Conficiunt etiam cū gummi catapotias
Colocynthidis meditullium, hoc est interius farctū, bilem
potissimū euacuat, et muscosa non à sanguine dūtaxat ueratři

Et scammonia modò ducit, sed costas et nervosa purgat corpora, drach. unius pondere, in melicrati cyathis duobus, quibus rata elixata sit. Teratur aut, et subigatur exquisitissimè, quomā asperitates ipsius, interaneorū anfractib. inhærescētes, intestina exulcerāt, et nervales inducūt per cōsensum affectiones. Datur rectè dolentib. caput, ubi cerebri uidelicet tunica, aut per icranios menbrana affecta fuerit, ueluti uertiginosis, heterocranicis, cephalaea cōflictantib. sacro morbo et sideratione infestatis, cynice cōuulsis, diuturnis oculorū destillationibus, non nisi recta ceruice spirantib. anhelosis, longo tempore tussi uexatis: præterea arthriticis, renū item et uesicæ affectionibus. Elateriū cōsimiliter scammonia euacuat: deligendum aut, quod colore uirescit, et leuitatē habet, nec anno est antiquius. Modus est triobolaris tritus cum ladis hemina. Tilby mallus, nō secus atq; elateriū et scammonia bilem prolicet: exhibentur autē liquoris guttæ quatuor, aut quinque, cum polenta macerata, quæ raptim deglutientur: quoniam in ore contenta, linguā et loca uicina quāplurimū exulcerāt. Lathyrides bilem purgant, nō aliter quā ueratrum, aut scammonia: dentur itaq; septem aut octo, et usq; ad quindecim. Quæ robustis et maiorem poscentib. euacuationē, manducandæ: imbecillioribus aut et malo stomacho præditis, integræ deglutendæ sunt. Peplii fruticis germina arida, octo obolorū pondere in mulsa exhibita, bilem bellebori instar expellunt, flatulentosq; spiritus dissipant. Agaricū in euacuando cōpares colocynthidi uires obtinet, lētē efficiaciā suam exerens, neq; stomacho admodum hostile. Propinentur denarij duo triti in melicrato. Esto autem agaricum candidissimum, ualde friabile, non admodum lignosum, et teredinibus minimè corrosum.

Iris illyrica similem purgandi facultatem habet, octo obolorum quantitate in aqua mulsa propinata: potior est minimè antiqua, et teredinibus expers. Centaurium minus quoniam bilem mucumq; expurgat, coxendice laborantibus peculiaris

culiariter succurrit. Bibetur autē iuris cētaurij ſesquidrach.
in aquæ cotyla uſque ad medias decocti. Tragorigani flores
cū fructu duarū drach. pondo in aqua mulſa potui dātur, qui
bus & ueratrum nigrum: cāterū utiliores ſunt ſtomacho
quā helleborus, minus uerō expurgant. Chamæleæ drach.
quatuor in melicrati heminis duabus ad quartam uſq; partem
elixæ, ſimilē helleboro purgandi uim obtinent. Sunt qui cha
mæleæ & abſinthij duplum in pilulas redigunt, et glutiedas
exhibēt. Ariſtolochiæ ſurculoſæ fructus inſtar denarij in mul
ſa propinatus, modo colocynthidis repurgat. Polypodij ari
ſtola radix læuigata, cū melicrato illita, uel cū eo infricata, ea
dem omnino quā colocynthidis perpetrare conſueuit.

Quæ atram bilem proliciunt.

Medicamentis atrā bilē expellentibus poſſimè utendū in
melancholicis, facilē indignantibus, iracundis, homines odio
proſequentibus, reſeſſū queritantibus. et hiſ qui inter cōualeſcē
dū opus habēt purgatione, autūno calidiore, cōſtitutionib. ſic
cis, parūq; muſculoſis. Epithymum præſtantiſſimū eſt reme
diū, eorū quæ atrā bilē prolicere ſolēt. Dādæ aut ſunt drach.
quinq; cū lactis hemina cōtrita. Epithymbrum, quod ſupra
thymbrā naſcitur, haud ſecus quā epithymum euacuat, niſi
quod imbecillius eſt. Pulegiū acetabuli menſura in melicrato
epotū, atram bilē educit. Tragorigani heracleotici tandun
dem, conſimiliter pulegio euacuat, utraq; autem deſiccant.

Alipi ſemen per inferna atram bilem purgare, pari epia
thymo pondere, cum ſale & aceto, traditum eſt: cāterū in
teranea leuiter (ut autor Dioſcorides eſt) exulcerat. Eſt au
tē, ut ego quidem arbitror, hodie atypias appellata. Offe
rendum in mulſa. Parthenium conſimiliter aridum in potu
ſumptum, eadem exhaurit. Alyſſon cum ſale hauſtum, non a
liter quā ſuperiora expurgat.

Quæ pituitam educunt.

Utendum eſt pituitam ducentibus in complexionibus frigē

ſſ

dis

dis, senio confectis, hyeme, in resolutis, attonitis, in ijs qui inturgescunt, & inflata oedemata patiuntur, quiq; multa pituita in uentre, uel pectore, uel stomacho exuberant, & mulieribus defluxionibus, his qui copiosa emungunt, & crassa excreant, cibumq; horrent, & coxendicibus ob mucum incumbentem laborant, uel elephantiasi infectis, & his qui aqua inter cutem, quam anasarca appellant, infestantur, maxime congruunt. Styracis candidi drach. cum aequali resinae rebinthinae pōdere deuorata, pituitam euacuat. Olea radice corticis drach. cum uino seu aqua. Pyrethri oboli nouem cum aqua. Lychnidis seminis drach. duae. Cyclamini radice drach. cum hydromelite. Scordij drach. duae cum melle. Chamapitys leuigata, & in globulis deuorandum exhibita. Squamae Cypriae drach. dimidia, cum resinae tantundem in catapotys deglutita, ualētius pituitam exhaurit. Lauri foliorū uiridiū drach. una cum dimidia. Corticis radice syluestris cucumeris oboli duo. Ricini grana quadraginta. Crotones appellati putaminib. per pugarti eduntur, atq; pariformiter agūt. Apij dimidiū, quod circa radicē est, comestū, quod quidā chamaeraphanō nuncupāt. Bdellij drach. duae cum hydromelite. Gummi autē destillationibus oculorū peculiariter accommodatum est.

Quae aquam proliciunt.

Eorum quae aquam educunt usus est in aqua inter cutem, ascite scilicet, laborantibus, in mulieribus quae albo uexantur profluuiio, in his qui ulceribus infestantur fluidis. Squamae Cypriae drach. cum mulsā pota, aquam prolicit: aceti uerō momentū superforbeatur, ne uomitū eiciatur. Granū cnidiū repurgatum & leuigatum, cum melle decocto epotum, ne ingluuiem adurat, aquā educit. Praebeantur autē grana uiginti, uel uiginti quinque, uel triginta, robustiorib. quadraginta. Euphorbij drach. cum melle decocto pota, pituitā quidē, impensius uerō aquā educit. Lōchitidis seminis oboli octo cum melicrato aquā emolūtur. Cneorō similiter aquā expurgat, cum polenta potum.

LIBER SEPTIMVS.

645

potū. Cnici seminis drach. quinq; simul leuigata, coquuntur
cū ptisana et sale modico, atq; sorbentur. Guttæ ammoniacæ
thymiamatis drach. ex melicrato epota, aquā trahit. Quidā
uero idē medicamentum cum posca, lienosis propinauerunt;
quin & sambuci radicis corticis succus duarum unciarum
mensura potus cum uino, aquam ducit.

De compositis medicaminibus, purgandi facultate
præditis. Cap. 5.

Carapotia ex aloë.

Anterioris colocynthis farcti, succi absinthij, aloes, singulo
rum partem unam, scammoniae partes duas, redige cum a-
qua in pilulis quæ ciceris quantitatem æquent, quarum ex-
hibendæ sunt undecim.

Oxymel Iuliani.

Oxymel quod ad Iulianum refertur, accipit rutæ, origa-
ni, uniuscuiusq; uncias treis, comæ thymi uncias quatuor, ane-
thi sesquiunciam, iridis unciam, mædragoræ radicis fescunciam,
garici uncias duas, tedarū pinguium uncias duodecim, coc-
cyi cnidij uncias quatuor, lathyridum uncias treis, alypiadis
tantundem, polypodij uncias duas, folij costi, spicæ nardi, sin-
gulorum unciam: rhei pontici unciam & semissem, scillæ,
urionū sambuci, canopi (qui est sambuci cortex) cuiusq; un-
cias treis, asari unciam, pulegiij uncias treis, epithymi, ueratri,
cori, cuiuslibet uncias duas, sy, ammonij, hyperici, cymini,
uniuscuiusq; unciam, anisi uncias duas, aceti sextarios decem,
nellis sextarios quinq;. Herbas in aceto per triduum macera-
re: deinde amplius q̄ ad medias decoctis, mel inijce, & proie-
cis herbis, lathyridas, costū, granū cnidiū, & spicā nardi in
uorē contritū adycite: & si uidetur, post exactā concoctio-
nē oxymel. Absoluta datio uncia est, uel pro cuiusq; uiribus.
Oportet autē podagricis, et epilepticis, et ijs quos crassos humo-
res euacuare, & ab obturatione eorum liberare oportet.

Purgatorium aquagium ex caryophyllo.

Aloes, epithymi, caryophylli, grani cnidij, petroselini,
rhei pontici, singulorum uncia dimidia, euphorbij diobol-

8 3 li quas

li quatuor, mellis quantum satis est. Modus est cochliarium.

Purgatorium ex rhodomelite, Alexandrii.

Succi rosarum sextarij duo, mellis sextarius, scammoniae triens. Datio summa, cochliaria quinque: minor, cochliaria duo; media, cochliaria tria. Aliter, mellis, rosarum succi, uniuscuiusque libra, piperis drach. dua, scammoniae octo, mastiches quatuor, zingiberis drach. dua. Aliud, quo ipse utor: Spicae nardi, asari, epithymi, singulorum uncia semisse, irrigato in aqua hemina per triduum, et moderate ubi decoxeris, aquae, succi rosarum, mellis, utrobique sextarium dimidiatum confunde. ubi decoxerint ad crassitudinem, sesquiunciam scammoniae admisceto.

Purgatorium e malis cotoneis.

Malorum cotoneorum decoctorum triens, piperis selibra, scammoniae drach. mellis quincunx: quibus contritis, exhibe cochliario quantitatem unciae, uel pro uirium ratione.

Medicamentum e malo citrio, salubre stomacho.

Corticis pomi medici, et carnis libram, in aqua sextario uno et dimidio usque ad tertias decoquito, deinde mellis sextarium dimidiatum immittito. postquam ad usque mellis crassitudinem incocta fuerint, laeuigati longi piperis unciam, scammoniae in fermento assatae tantundem inspergito.

Buccellatus catharticus.

Scammoniae tostae unciam, piperis et apij seminis, singulorum diobolum, fœniculi, anisi, uniuscuiusque unciam, mellis libram: quum moderate assaueris, dato in condito unciam.

Olium cathartice.

Constant scammoniae uncia, piperis uncia, epithymi, cymini fricti, petroselini, rutae foliorum, mentae uiridis, singulorum drachmis quatuor, laserpitij drach. palmularum, mellis, cuiuslibet quincunce, aceti heminis duabus, oliuarum salutarum sextario, fistilium uidelicet. quidam gari etiam symmetrum adijciunt. Exhibentur quinque, aut septem, aut nouem.

Pastilus purgandi ui praeditus.

Scammoniae, euphorbij, singulorum drach. quatuor, folij duae, piperis totidem, mellis libra. Modus est uncia.

Pbusca

Phusca purgans, & stomacho grata.

Habet cumini, forniculi, singulorum unciam: pulegij, apij, anisi, uniuscuiusque unciam dimidiam: epithymi, scammonia, cuiuslibet unciam, salis sextantem. Datio summa, sunt scrupuli duo in posca. Nonnulli etiam euphorbij scrupulos quatuor adijciunt.

Vinum purgans in laborantibus hydrope.

Scilla quadrans, apij seminis selibra, piperis drach. radice capparis drach. quatuor, grani cnidij cortice exuti drachma, folij malobathri pilulae duae, uini heminae duodecim, mellis sextarij tres. Scillam contusam uino irrigato, reliqua laeuigata admisceto.

Halatia ad purgandum, id est e sale purgatio.

Salis communis assati denarij sex, seminis apij, zingiberis, panis aridi, singulorum dioboli sex, anisi, piperis, uniuscuiusque semuncia, scammoniae, epithymi, cuiuslibet uncia. Datio cochliarium unum.

Podagrica ex hermodactylis.

Hermodactyli quadrans, anisi, cymini Aethiopici, amos, thymi corymborum, piperis candidi, zingiberis, uniuscuiusque dioboli tres, epithymi uncia dimidia. Dantur oboli octo mane cum condito, siue melicrato, uel aqua feruidiore. Aliiter idem purgatorium: Hermodactyli uncia, cymini Aethiopici, anisi, agarici, zingiberis, singulorum dioboli sex, mastiches duo, spicae nardi tantumdem, moschi siliqua, cnici dioboli duo. Dosis, dioboli quatuor cum hydromelo. Scammoniam eo quod stomacho noxia est, damnamus. Quod si copiosior euacuatio fuerit necessaria, admisce dationi scammoniae siliquas tres. Exhibebis autem loto.

Cataportia ex Harmenico lapide, in morbo articulorum principaliter exhibenda.

Aloes triens, scammoniae unciae sex, agarici uncia, epithymi tantumdem, lapidis harmenici dioboli duodecim, cassiae uncia, spicae nardi uncia, scillae assatae sextans, croci grana quatuor, rhodomelite excipiantur. Datio dioboli duo.

Confectura ex coronopodio conducens ad eadē ad quæ
ex hermodactylis præparata, & stomacho salubris.

Zingiberis dioboli duo, piperis diobolus, agarici decem,
cnici interanci dioboli quatuor, coronopij radicis dioboli sex.
Datio denarius, si difficilior est alius, siliquæ uiginti tres,
quæ faciunt omnino obolos septem, aut octo ferme, uentre
euacuata lauabis, ouis & pane alito.

Medicamentum ex succo Cyrenæico ad quartanam.

Sumito succi cyrenæici, piperis, zinziberis, rutæ foliorum,
cuiuslibet drach. exhibetur nucis ponticæ magnitudo.

Puls cathartica cedemate turgidis, elephantia si laborantibus
eximie conducens, & quibus crassum & uiscidum hu-
morem extirpare animus est.

Colocynthidibus binis circumputatis, semen eximito, me-
dulla uerò relicta a ipsas oleo dulci impleto, & operculatas
proprijs operculis, per diē ac noctem finito. Deinde aut oleo
euacuato, colocynthidis in aqua tantisper dum liquecant eli-
xato. Postea abiectis eisdem, oleo aquæ permixto ueratri nie-
gri triobolū adijce, scammonicæ drach. Vbi uerò cum his pul-
ticulā ex similagine, uel panē aridum contritum elixaueris,
post hæc laboranti frugali ac tenui antea uictus ratione uso,
instar nucum auellanarū octo aut decem, uel ad summū qua-
tuordecim propinato. Et potui aquam calidam præbeto.

De obseruatione eorum qui purgātur, & quomodo adesse opor-
teat his qui sumpto pharmaco non purgantur. Cap 6.

IN omni summatim strenua & efficaci purgatione homini
præscripta prius uictus ratione, ieiuno, cōcoctione probè obi-
ta pharmacū præbeto, somnumq; usq; ad consummatā pur-
gationem prohibeto: motionem uerò moderatam si fieri pos-
sit, subire, & ab omni cibo potuq; abstinere, quoad purgatio
suo munere in totum perfundita fuerit mandato.

Ex monumentis Philagrii.

At si quis inediam eiusmodi non sustineat, uel quod os
uentriculi

ventriculi bilem facile, ob longam quæ præcessit inedia, contrahat, uel propter aliam istiusmodi causam, dandus est ipsi ex aqueo uino panis, uel ptisanæ succus, seu chōdri, non dum inchoata purgatione, quo cibus minus corrūpatur, sed protinus à sumpto medicamento potus: sic enim ad celeriores interdum pharMACI motū sua grauitate auxiliatur. Si quis etiam quacūq; sumpta ad aluum emolliendum potione non purgatur, neq; euacuetur, nulla ingruente molestia, satagen dum non est. Sin autem æger morbi uehementia urgeatur, ut dilanietur, distendatur, & fissus crepat, clysterem conestim inijcere necesse est. Si ne sic quidē obtemperet aluus, corpore quidem uellicato, & tanquam euerso, lauare largio oleo illito conuenit. Quod si corpus infartum atq; grauium fuerit, sanguinem detrahito, potissimum si homo sanguinolētus existat, oculosq; rubeo colore infectos, & emissititios non secundum naturam, sed ex aduentitio propter epotum medicamentum habeat. Si horū nihil affligit, morsus autem & laniatio infestat, à balneo quamprimū nutrito, & uinum copulius propinato: atq; inter hæc clysteribus utere, nisi dolores placati sint, denuoq; lauato. Esto autē oleum clysmatis utaceū, uel ex alio quocūq; flatu discutiente præparatū.

De his qui plus æquo purgantur. Cap. 7.

Si purgatio modum excedat, cutis perfricanda est, lauandaq; calida, uinum ante balneum tenue, uermiculum, & lauuum exhibendum. ex templo nanque huiusmodi in corpus ingeritur, panē item eo maceratum, & mala Punica. Quod subductio perseueret, uincire mēbra fasciis à summo deorsum distributis expedit, quæ constringāt, & aliquid sanguinis ac spiritus recipiant. Propinato præterea ex carnibus uenerarum theriacis modicum. deducit enim in cutem, & ceteriter reuellit in uentriculum humorū colluuiem, bebetatq; quod in purgatorio tanquam uenenosum & medicamentosum existit. Si huius non sit copia, theriacis pastillis, præ-

terea confectioe diaspermation, & ea cui cognomentum est Philonium, quin & cucurbitulis supra stomachū. Cataplas-
matis item ex farina hordeacea & ænomelite utendū. Post
quæ astringentia adhibeantur epithemata. potissimum uerò
totius corporis fridionibus, & pharmacorū potionibus adiu-
uantur. Aer ad hæc frigidus, & impendiō calidus, in exube-
ranti purgatione uitandus est. Siquidem materiā ille ab exte-
rioribus ad interna propellit, fluxumq; adauget: hic uerò di-
strahit, uires soluit & prosternit. Quod si ex intestinorum,
quæ medicamento irritantur, uellicatione augeatur euacua-
tio, obliniri præfatis debent. Immittantur per aluum quæ a-
crimoniam retundendi uim obtinent, adeps anserinus, uinum
dulce, nardus, & id genus alia.

De sacris antidotis, quas Græce hieras dicunt. Cap. 8.

Hiera Antiochi.

Trixaginis, agarici, cucurbitæ syluestris interioris parti,
stæchados, singulorum drach. decem, succi panacis, sa-
gapeni, petroselini, aristolochiæ surculosæ, piperis candidi,
uniuscuiusq; drach. quinque, cinnamomi, spicæ nardi, myrrhæ
troglodytidis, croci foliorum, cuiuslibet drach. quatuor, mel-
lis quantum satis est. Alia: Medullæ cucurbitæ syluestris
drach. uiginti, scillæ tostæ, agarici, guttæ ammoniaci thy-
miamatis, corticis ueratri nigri, scammoniae, hyperici, singu-
lorum drach. tres, epithymi, polypody sicci, bdellij, aloes, tri-
xaginis, marrubij, castiæ, cuiuslibet drach. octo, myrrhæ tro-
glodytidis, opopanax, sagapeni, piperis cōmunis, & longi
& candidi, petroselini, cinnamomi, croci, castorij, aristolo-
chiæ longæ, uniuscuiusque drach. quatuor, mellis quantum
res postulat.

Hiera Iusti.

Constat ex epithymi drach. duodecim, marrubij, stæcha-
dos, trixaginis, hellebori atrij, scammoniae, agarici, piperis
longi, scillæ assatæ, singulorum drach. sedecim, euphorbij,
pulpæ

LIBER SEPTIMVS. 651

Hieræ colocynthis, aloes, croci, gentianæ, petroselini, ammoniaci thymiamatis, sagapeni, uniuscuiusque drach. octo, opopanax, poly, cinnamomi, casie, myrrhæ, spicæ nardi, aristolochiæ odorati iunci, pulegi, cuiuslibet drach. quatuor, aristolochiæ cum longæ, tum rotundæ, singulorum drach. duabus, mellis quod satis est. Dantur grāmata duo, aut tria, aut quatuor, cum melicrato & sale.

Hiera Galeni.

Habet trixaginis, piperis longi, piperis albi, stæchadis, stratri nigrioris, scammonia, spicæ nardi, scillæ affatæ, & quibusdā placet epithymi, uniuscuiusque drach. sex (aliis decem) myrrhæ, croci, ammoniaci thymiamatis, euphorbiæ, cuiuslibet drach. octo; quæ cuncta melle excipiuntur.

Hiera Ruphi.

Sicyonia, seu medulla colocynthidos drach. octo, trixaginis drachmas decem, sagapeni octo, petroselini quinq; aristolochiæ rotundæ, piperis albi, singulorum drach. quinq; cinnamomi quatuor; uel casie octo, spicæ, croci, poly, myrrhæ, uniuscuiusque drach. quatuor, mellis quantum satis est.

Archigenis Hiera.

Mar rubij, agarici, trixaginis, colocynthidis medullæ, stæchadis, singulorum drach. decem, opopanax, sagapeni, petroselini, aristolochiæ rotundæ, piperis albi, uniuscuiusque drach. quinq; cinnamomi, spicæ nardi, myrrhæ, poly, croci, cuiuslibet drach. quatuor: arida simul cõtunde, & attamina. Succus sero panacis, atq; sagapenum, myrrhæq; contusa melicrato in pila per noctem macerato, deinde laugato, atq; in iuce arida, et assumpto melle optimo, in uitreo aut plumbeo uase recondito. Hic sanè modus omnibus hieris communis est. Exhibentio integra drach. quatuor: assumantur etiam salis drach. mellis beminæ duæ, aquæ quantum satis est. Quod si ad purgandum efficaciores, quæ scammonia carcè, reddere animus sit, admiscantur & his singulis singuli ipsius oboli.

Illitiones

Illitiones sedis & umbilici purgantes. Cap. 9.

Vnguētum, quod sedi illitum pedibus proritat. Ruta melle exquisitissimè teritur, ita quidem, ut unus succus efficiatur, atq; in intimum ani illinitur: efficacissimum autem fuerit, si momentum cymini & nitri, uel cyclamini succi adijciatur, floccis exceptum sedi, ad laxandam aluum inferitur. Vel glans ex melle facta inditur. flatus enim erumpunt plurimi, leuanturq; affeēi.

Illitio sedis aluum ciens, Chezanance.

Alumen cum melle laeuigatum decoquitur, donec citrinum reddatur, atq; hoc inungitur sedes: promptè nanque multa quidem, non tamen citra laborem extorquet.

Epomphalion, hoc est umbilicale, aluum subducens.

Cyclamini drach. quatuor, nitri drach. tres, hellebori nigri & candidi, uniuscuiusq; duæ, colocynthidis tres, scammoniae duæ, elaterij succi quatuor, grani cniidij totidem, caricarum pinguium uncia duæ, fellis taurini uncia.

Aliud insigne, primi meriti.

Elaterij, lathyridum, galbani, cyclamini, hellebori nigri, singulorum drach. quatuor, colocynthidis carnis drachmæ octo, cucumeris syluestris recentis, scammoniae, grani cniidij, tithymalli, uniuscuiusq; drachmæ duæ, resinae terebinthinae tres. Felle taurino excipe, & perinde atq; unguento utere. Quidam uerò adieētis insuper faui drach. septem, & sicyonij quantum sufficit, ad morem emplastri imposuerunt.

Medicamenta uomitoria, & ratio exhibendi ueratri. Cap. 10.

Vomitionib. non tam secunda ualetudine fruētes, alimen-
ti humorumq; copia grauati, quàm morbis oppressi acutis, utuntur, quum à pituita, uel id genus aliquo infestantur. Cæterum neq; in sanitate, neq; in acuto morbo uomitorijs medicaminibus ui consultiū est, sed in ægritudinibus diuturnis, præsertim induratis, quæ ualidiore opus habent commotio-

ne

LIBER SEPTIMVS. 63.

uerbi causa, podagra, comitialibus à stomacho prouenientibus, elephante, aqua inter cutem, melancholia, atq; id genus alijs. Cauendum uomitu sanguinem eiectionibus, malo stomacho præditis, & suffocationibus obnoxijis. Expeditissimum quoque ad uomitum ciendum cyprinum est, irrigatis in eo digitis, uel pinnis, & in gurgulionem insertis: radicem item nardum Gallicam drach. septem melicrato pota, per superna ualentius purgant, & betonica drach. quinq; aut sex in mulsa pota, & daphnoidis folia uiridia tria, trita, manducata, necnon elaterij obolus in aqua bibitus, uomitu cum pituita, tum melle exinanire consuevit: idem præstat uuarum passarum urana quindecim cum mulsa crassiore. Ex bulbis, esculenti uero crudum deuorati, uomitorij uero (narcissi adpellati) octo superius euacuant. Idem apij radice pars aëri exposita manducata, præstat: appellant autem eam nonnulli chameraphanum: (inferior eius portio deiectionem molitur) uero in uersa uero radix comesta, tam per superna, quam per interna agit. Raphani insuper prædictis minus quidem uiolenter, sed maiore emolumento expurgant. oportet autem easdem acres admodum & recentes adhuc, in pertenuia rammenta dissectas, duabus prius uel tribus horis in oxymelite maceratas, quam plurima fieri potest copia ingerere: tertio quater à cœna, semel uero ieiuni euoment, oxymel interim iugiter sorbendo. Mox ubi horas circiter duas inambulauerint, tepida aqua epota, digitis uel pinnis gutturi immisis euoment.

Ratio exhibendi ueratrum.

Veratrum exhibendum est diutinis pariter & grauibus ægritudinibus correptis, ubiq; aliud omne præsidiorum genus desperauerit, quum omnibus ipsis ægrimonia superior extiterit. Offerendum idcirco, siue incessanter uexauerit morbus, puta aqua inter cutem, elephasia, cachexia, paralytis, & id genus alijs: siue per circuitum temporis repetat, cuius generis

generis est epilepsia, podagra. Quum autem complures sint ueratri porrigendi rationes, simplicior quidem, & præparatio potius ad helleborismū idonea hæc est. Raphanis prius arundine perforatis, hellebori albi optimi radicū præsemina infigantur, noctemq; integram dimittatur: postridie proiectis præseminibus, raphanos minutissimè cōcisos cum oxymelite modo prædicto languēti, procliuiori uidelicet ad uomitus, exhibeto: et interpositis memoratis horis, ad uomendum cogito. Sed helleborismi peculiaris modus is est: ueratri optimi uncias duas in aquæ hemina prius diebus quinq; maceratas, donec aquæ pars tertia relinquatur, decoquito: expresso deinde ueratro, aquæ tantundē mellis admisceto, rursumq; tantisper dum crassitudinem induat, elixatam, uomitu præexercitato laboranti, ieiuno, obita concoctione, ubi alius ultro uel clystere sollicitata respōderit, ad demonstratū antea modum semel atq; iterum pro ratione uiriū præbeto. Efficacissimus uerò omniū modus eiusmodi est: Concisis ueratri radicibus ad instar sesami (nam in pollinē contusæ uirium efficacia suffocationes inferunt) imbecillioribus cum succo ptisanæ aut halicæ, aut id genus aliquo duas drach. ad summū, ad minimum autem drach. ueratri, elixatum potui dato. Robustioribus uerò in aqua calida, siue mulsa. Incipit autē helleboro irritata purgatio, post treis aut quatuor horas. Qui lentius inchoant, melius purgatur. Cunctantibus autem nimium uomitibus, melicrato exhibito ad uomendum impelle, pinnis oleo imbutis ori immisis. Quod si ne tum quidem euomat, in balneū abducendus est. Vbi iam uomere cœperint, si quidem minutatim fiat euacuatio, nihil moliedum negocij: sin autem angantur & conuellantur, hydrelæum potui dato, pariterq; per inferiorem uentrem ipsis subducendi uis quædā inditur, quod alioquin in his qui helleboro utuntur, quandoq; euenit. unde medicamēti aceruationem facilius ferunt. Qui animo deficiunt, eos odorientis & similibus refocillato: atq; alijs

quæ

quæ, ut credibile est, superueniunt symptomatis, consimiliter succurrito. Facta autem exuberanti purgatione, non alere modò, uerùm somnum etiam conciliare expedit: et alia, quemadmodum de his qui nimium purgantur, explicatũ est, agenda sunt. Persistente autem uacuatione, cucurbitula præter hæc stomacho applicanda, membraq; uincienda. Si secundum rationem fiat euacuatio, melicrati symmetrum propinato, quo relicta pharmaci excrementa abluantur, paulo post cibum coctum facilis offeretur. Cæterũ quibus medicamenta per os suspecta sunt, omnino autẽ helleborismo indigẽt, Antyllus eiusdemodi quopiam usus est lauamine: Veratri candidi drach. duas in aqua sextario per diem ac noctem irrigatas, postero die ad dimidias usq; aqua decoquito, deinde per sedẽ immitto, ut uomitũ proliciat: superius purgat paulò hellebori portione imbecillius. Iam uerò post exactam purgationẽ, glandem acrem supponentes, egestionem irriteremus, quo infusum reddatur, & uomere desistant languidi. Post excretionem, mulsam semel aut bis abluendis intestinis immitteremus. Idem uerò tradit, glandem ex helleboro candido cõuso & cribellato, deinde melle despumato excepto concinnatum, pari modo superiore uentriculũ, quemadmodũ & clyster ex ueratro confectus, purgare. Verum præ omnibus hic modus cõmendatur, in quo nobis partiri in uices purgationẽ licet. Pondus igitur hellebori esto drach. duæ. circũformetur autẽ glans, uel circumligetur stuppa solidiore, cuius principiũ foris per sedem recipiatur, ut post sufficientem purgationẽ liceat eximere. hic sanè modus purgat quidem exactissime, sed neque strangulatum, neq; aliquid aliud periculi infert.

De differentia antidotorum. Cap. ii.

Præfatio Galeni de antidotis.

Medicinas, quibus morbis succurritur, quæ nõ extrinsecus imponuntur, sed quæ intro in corpus sumuntur. prisci antidotos appellabant: quarum treis enumerant differentias.

quædam

quædam enim letalium medicamentorum gratia offeruntur, quædam propter feras ictu morsu' ue uirus iaculantes, quædam affectionibus ex praua uictus ratione prouenientibus opitulantur: nonnullæ treis has commoditates pollicentur, è quorum albo antidotus, quæ theriaca uocatur, creditur.

Hedychroi theriacam ingredientis præparatio.

Aspalathi radicis corticis, calami odorati, costi, asari, xylobalsami, pbu, amaraci, mastiches, singulorū drach. sex, fructus balsami duas, mari sedecim, floris rotundi iunci odorati duas, cinnamomi uigintiquatuor, amomi, cassia, rhei, uniuscuiusq; octo, nardi Indica, phylli, cuiuslibet duodecim, myrrhæ uigintiquatuor, croci drach. duodecim, uino præstantissimi mo excipe, & in pastillos cum succo balsami subigēs dirige.

Pastillorum scilliticorum præparatio.

Scillam luto seu fermento, & opere pistorio delibutā moderatè torrefacito. Inde medullæ ipsius partes duas cum eam rui farine parte una conterito, & in pastillos concinnato.

Pastillorum theriacarilum præparatio.

Sumito uiperas quatuor, aut quinq; giluo colore, recēsq; captas: & amputatis à capite & cauda quaternis digitis, detractaq; senectute tota, & exemptis interaneis, reliqua in fasciili noua cū salis & anethi momēto coquēda sunt, tantisper dum spinæ à carnib. separantur, deinde his exemptis, & carnibus exactè à spinis repurgatis, admixtoq; cōpari modo panis puri, omnia pariter conterito, & orbiculos formato, manu opobalsamo imbuta, & in umbra refrigerato.

Theriaces antidoti præparatio.

Pastillorum scilliticorū drachmas quadraginta octo, pastillorum theriacalium, trochiscorū hedychroi, cinnamomi, piperis cōmunis, succi papaueris, uniuscuiusq; drachmas uigintiquatuor, rosarū aridarū quindecim, scordij, napi seminis, iridis Illyrica, agarici, glycyrrhizæ, succi balsami, singulorum drachmas duodecim, myrrhæ, croci, zingiberis, rhei

rheu pontici, radicis quinq; folij, nepitæ, floris iunci rotundi odorati, marrubij, petroselini, stæchadis, costi, piperis candi di & longi, diſtami florũ, thuris masculi, terebinthinae, mastiches, castiæ nigrae, spiciæ nardi, florũ polij, styracis, apij seminis, seseleos, thlaspis, ammeos, trixaginis, chama ptyos, succi hypocistidis, malobathri, nardi Gallicæ, nardi, mei, gentianæ, anisi, fœniculi seminis. Lemniæ sigillatæ, chalcitidis assæ, amomi, acori, fructus balsami, pbu pontici, hyperici, acaciæ, gummi, cardamomi, singulorum drach. quatuor, seminis dauci, galbani, sagapeni, bituminis, opopanacis, castorij, cenotaurij, aristolochiæ sarmetariæ, cuiuslibet drach. duas, melalis Attici libras decem, uini phalerni sextarios duos. Mittito in pilâ succũ hypocistidis, myrrbã, sagapenũ, glycyrrhizã, styracẽ, acaciã, opopanacẽ, mellis pusillũ, instillãs, cõtusaq; dissoluito: postea uini tantũ infunde, ut id cætera superet, per tri duũ macerato, mox reliquas species contusas unito, mel desuper metur. Reponitur aut in uase argenteo aut uitreo nõ admodũ referto, & identidẽ deoperculatur. Vſus ipsius, siquidẽ res urget, in ferarũ morsib. cõmendatur, uenenisq; sumptis, si post ætatis septennij ponticæ nucis quãtitas cũ uini cyathis trib. bis in die potetur. Pari modo facit his, qui citra manifestã occasionẽ periclitantur corporis corruptiõẽ, letalis medicamẽti qualitatẽ imitante, ueluti in pestilentialib. plerũq; accidere cõsuevit, indies semel. In alijs uerò affectionib. usus eius, a decẽnio, ad annũ usq; uigessimũ celebratur. Cõtra tusses aut, & pectoris dolores, seu lateris, febre quidẽ carẽtib. cum ænomete, febricitantib. uerò cũ hydromelite sub noctẽ fabæ Aegyptiæ magnitudo cõducit. Sanguinẽ eieciẽtib. cũctis. si recens malũ, ex posca: si diurnius, ex cõsolidæ decocto, fabuli Aegyptij quãtitas, quũ mane tũ uespere præbetur. Inflatũ aut, et his qui circa umbilicũ torminib. infestantur, aut cœliacis, mane in aqua calida eiusdẽ fabæ instar. Appetentiã præterea intẽsam excitat. Rigore, algere, et bilis uomitu, ante ac

T 6

cessiones

cessiones pota, liberat. Menses cit, et foetus mortuos expellit, fabæ Aegyptiæ magnitudo cū melicrato, uel passo, in quo ruta atq; dictānus elixa sit, pota. Aduersus aut extremā rauces dinē cū seorsim, tū addito dragacāthæ duplo, ex mulso aut passo sumpta, retētaq; sub lingua et colliquata, lienosis et iocinerosis ex posca, si scirrhus urgeat, cū oxymelite uel aceti scillitici sesquicyatho. Datur nephreticis cū œnomelite fabæ Aegyptiæ magnitudine, dysentericis tātundē cū decocto rhu, tā mane q̄ uesperī. Medēdis bebetudinib. uisus summē cōfert, sic tēperata: Antidoti et opobalsami sextans, mellis cyathus, mixta paulatim illinūtur, extergit porrō dēteis. Pleriq; uerō præseruandæ ualitudinis gratiā, fabæ Græcæ instar, noua luna sumunt, ubi coctrix facultas probē officiū peregerit, cū mellis cochliario, et aquæ cyathis duobus. Pari quoq; modo in peregrinationibus eadem utuntur, dum iter faciendo pestilentes quaspiam auras uel aquas suspicantur.

Sales Theriaci.

Sumito uiperas statim ē uenatione quatuor, deinde salis ammoniaci uel cōmunis modium Italicum, quo cum in mortario obiter gentianæ libram et dimidiam, mali terræ rotūdi tantundē, comæ tenuis cētaurij libras duas, cardamomi, marubij, singulorum uncias sex, scordij, apij, chamedryos Cretici, cuiusq; librā, seminis rutæ domesticæ sextarios duos, melle Attico non minutim contundito, mediū ipsoꝝ in ollā nouā conijcito: deinde uiperas uiuētes quatuor, mox squillas tenellas recentes quinq; minutim concisas, illis adijcito, sic aliam mixturæ partem superinijcito: Et ubi ollam accuratē operculaueris, tribus aut quatuor foraminibus eandem perforato, quo per ea uapor concoctionis modum significet. Principio nanque fumus ingens prosilire uidebitur caliginosus, et ualde turbidus, ignem iam feras contigisse significans. ubi summo studio animaduerte, ne huius fumi aerem ex serpentium exhalatione infectum attrahas: deinde ubi uapor euasnerit,

nuerit, & tenuem quandam flammā per foramina eijci con-
 spexeris, tum sanē ipsas quādam optime assatas cōycito, ollaq;
 ita ab igne remota, perq; diem et noctē refrigerata, et aperta
 carbonēs eximito, et accuratē cōtundito, atq; cū hisce mixtio-
 nib. per cribrū trajcito: seminis rutæ syluestris, hyssopi Cre-
 tici, cuiusq; unc. 9. seminis fœniculi, nardi Celticæ, stachyos
 Scythicæ, cuiuslibet uncis sex, petroselini Macedonici, fo-
 liorū malobathri, cuiusque unc. una, racemi amomi, ormini
 seminis torrefacti singulorum uncis tribus, summitatum ori-
 gani, cacuminum thymi singulorum sextante, baccarum iu-
 niperi, piperis albi, fœniculi, singulorum libris octo, laserpis
 tiji radicis dextante, seminis coriandri, zingiberis non corro-
 si, satyrj seminis uel radicis, pulegij, seseleos massaleotici,
 mentæ, cuiusq; sexunce, cassiæ fistulæ sextante, cinnomomi un-
 cia. Ipse quidem bestijs non combustis præparauit, sed ipsa
 rum pastillis, ueluti in theriaca decui, reliquis quæ cum feris
 deuruntur, admixtis, quo amaritudinem, qua prædita sunt,
 per adustionem abijciant: tanta pastillorum mēsurā adiecta,
 quantam uiperas quatuor numero habere coniectura assequi
 licebat, & hoc modo primi reuera meriti euaserunt.

Antidotus Mithridatica ex scinco.

Myrrha troglodytidis, zingiberis, cinnamomi, singulo-
 rum drach. decē, spicæ nardi, thuris, thlaspeos, opobalsami,
 floris iunci odorati, costi, stœchados, seseleos, galbani, resinæ
 terebinthinæ, piperis lōgi, castorij, succi hypocistidis, styra-
 cis, foliorū malobathri, uniuscuiusq; drach. 4. cassiæ nigrae,
 polij, piperis cāddidi, scordij, seminis dauci, fructus balsami,
 cipheos, bdellij, nardi Celtici, gummi, petroselini, opij, car-
 damomi, seminis fœniculi, gētiianæ, foliorū rosarū, cuiuslibet
 drach. octo, didamni, anisi, acori, pbu, singulorū drach. tres,
 mei athamātici, acaciæ, uētris scingi, hyperici seminis, unius
 cuiusq; drachma una cū dimidia, uini mellis q; quod satis est:
 præparato instar theriaca, inquit Galerius. Ad gratiāq; illa

Ti 2 condit

conducit, ad eadē hanc quoque prodesse idem afferit, *præter* quam ad uiperæ morsus: ad hos nanque theriaca efficaciores vires obtinet.

Antidotus ex sanguinibus, ad omnia uirulenta. & ad letalia medicamenta.

Capit piperis candidi, & longi, costi, acori, phu, anisi, diadni Cretici, singulorum drach. duas, amomi, liquoris balsami, seminis rutæ syluestris, fœniculi seminis, cymini Aethiopici, anethi, sanguinis masculi anatis aridi, sanguinis bædi, sanguinis anserini, fœminæ anatis sanguinis, napi syluestris seminis, uniuscuiusque drach. 3. gentianæ radicis, trifolij, floris iunci odorati, thuris, rosarum aridarū, cuiuslibet drach. 4. cinnamomi, drach. duas, scordij drach. octo, petroselini, polij, myrrhæ, nardi, singulorum drachmas sex, cassiæ drach. treis, succi cyrenaiici tantūde, stœchadis drach. 3. asari duas, ammoniaci thymiamatis treis, mei Athamantini duas, agarici tantundem, carpobalsami grana uiginti, mellis despumati quantum sufficit.

Oxymel simplex.

Constat ex acerrimi aceti candidi sextario, aquæ sextarijs duobus, mellis sextario: quæ ad mellis usque liquidioris consistentiam decoquuntur, despumando subinde mel.

Scillæ candidæ tesselatim concisæ, in umbraq; dieb. quadraginta exiccatæ, & rursus purgatæ libras sex, in aceti boni sextarijs duodeci m, dies sexaginta, operculato uase insolato: quib. transactis, scillā manibus expressam abijce, acetū uerò excolatū diffundito. Quidam uerò scillæ libram miscent aceti sextarijs sex, alij aut uiridis scillæ idem pondus in acetū coniungunt, sinuntq; usq; ad menses sex. Et est hoc maiore incidendi uis præditum. Prodest autem acetum illud ad oris fluxiones, collutum, & ad multa interaneorum mala, quæ exhulceratione uacant, potum. Cæteris itidem compluribus subuenit.

Oxymel

Oxymel scilliticum.

Accipit scillæ tenerioris medullæ libras duas, aceti acrioris albi sextarios quindecim, piperis, petroselini Macedonici, singulorum sextantem, dauci Cretici, ammeos, anisi, nardi Gallicæ, lybistici, asari, cardamomi, spicæ nardi, amomi, rheu pontici, uniuscuiusq; semunciâ, fœniculi, seminis cymini, laserpitij, zingiberis, pyrethri, hyssopi Cretici, costi, pulegi, cuiuslibet unc. mentæ uiridis fasciculum, rutæ uiridis teneriores caules quinq; mellis Attici sextarium, sapæ sextarios duos, api; uiridis fasciculum. interanea scillæ candida contusa in acetum conijce, & per dies septem sub ardentissimo canis æstu macerari finito: deinde scilla sublata, arida quidem iam contusa, uiridia uerò integra aceto insere, et post septem dies rursum omnib. exemptis, mel cum sapâ, aceto immitte, quibus decoctis usque ad crassitudinē in uasculo uitreo reconde. Vtere autem eius præsidio ieiunus propinationis loco, & cum cibo, more intinctus: nam multo utilissimum est.

Medicamentum Galene scilla, comitali modo in primis conducibile.

Scillam manibus in puluerem friatam, uasi in quo mel fuerit reconditum inijce, eò que strenue obturato, in locum ad meridiem uergentem sub ardentissimo caniculæ æstu reponito. Post quadraginta Sirij dies, uasis superficie soluta, corpus scillæ effluxisse offendes. Exempto itaque ipsius succo, melle præstantissimo condulcatum, comitali laborantibus singulis diebus cochliari præbeto: pueris quidem paruo, adultis uerò magno. ipsâque scillæ substantia cum melle laeuigata, cochliario exhibetur. Secundum uerò locum hoc obstat potentia.

Philonis antidotus.

Constat ex piperis albi drach. uiginti, alterci drach. octo, succi papaueris drach. decem, croci quinq; pyrethri, euphorbi, spicæ nardi, singulorum drach. mellis Attici, uel alterius primi meriti apprimè decocti, quod satis est. Dato adultis nu

T t 3 c3

cis auellanae quantitatem, minoribus fabuli instar, pueris ciceris magnitudinem. Medicamentum est maximè indoloriū, & somnum concilians.

Athanasia dolorem sopiens, pleuritidi consecrata: Oribasii.

Cassiae drach. octo, spicae nardi, amomi, croci, opij, styrae, myrrhae, costi, singulorum drach. quatuor, mellis despumati quod satis est. Exhibetur modo Philonis antidoti.

Antidotus e duobus piperib. consimilis efficaciz.

Cardamomi, castorij, opij, uniuscuiusque drach. treis, myrrhae, costi, piperis longi, & cãdidi, galbani, cuiuslibet drach. treis, croci totidem, melle decocto excipiuntur, quantitasque fabae exhibetur.

Diacodium, hoc est, ex capitibus papaueris, & defruto.

Capita papaueris uiridia in aquosa octo aut decem, post tria die eius diei quo decerpta sunt decoquito, et glycyrrhizae unciam. Macerata in sape sextario simul quoad tabefiant elixato, quamprimum mediocrem induerint crassitudinem, ab igne remota adseruato. Vtere in his qui febre oppressi uigiliis infestantur, & quando ex capite tenuis in thoracem decurrit fluxio.

Antidotus, ex papauerum capitibus, & melle.

Papauerum capita (quemadmodum praedictum est) & glycyrrhizae unciam, in aqua pluuiæ siue fontana, mensura sextarii usque ad colliquationem decocta, ubi expresseris, in decoctum mellis xestam dimidiam conijcito, adque crassitudinem usque elixato. Dato quibus præter dolorum mitigationem, somni conciliationem, etiam purgationem & abstersionem humorum, pectoris, pulmonis, atque renum, opus est.

Diacodium compositum.

Aquæ in qua papauerina capita decocta sunt, iuxta memoratam convenientiam sextarium, uini dulcis heminas duas, mellis libram, croci, succi hypocistidis, singulorum drachmas quatuor, coquito ad spissitudinem. Stomacho autem salubrior est.

est cōfectio ex melle, & capitū papauerinorū decocto, & malis cotoneis tēperata. Efficacior autem euadit, si cum capitibus papaueris aqua melilotum et glycyrrhizā decoquas.

Ex marrubio linctus, phthysicis in primis efficax.

Marrubij comarum libram in aqua cotylis sex, donec tertia pars relinquatur, elixato, herbam porricito, inducāque melle aque adiecto mellis crassitudine, coctiliariū exhibeto.

Ex marrubio confectura composita.

Marrubij comæ, ireos Illyricæ, hyssopi, pulegij, glycyrrhizæ, apij, singulorū uncias duas, caricarum pinguiū uncias treis, nuclei pinei resinati quadrantem, contunde obiter in crassas partes: arida cum carycis in aqua sextarijs tribus irrigato, & ad tertias coquito. Deinde aque colatæ, mellis libras duas infunde, & ad melleam spissitudinem decoque.

Medicamentum ex eruis.

Amygdalorum amarorum uncia duæ, farine erui uncia quatuor, hyssopi tantundem, ireos uncia semis, nucleorum pineorum frictorum sextans, mellis sextarius, uel quantum res exigit.

Medicamentum Dodecatheon.

Iris Illyricæ uncias quatuor, eruorum tantundem, hyssopi, seminis urticæ, glycyrrhizæ scæno-græci, uniuscuiusq; uncias duas, bulborū unc. quatuor, seminis lini tosti totidē, nigellæ diobolos duodeuiginti, pulegij grāmata sex, nucleorū pineorū tostorum unc. 2. piperis scrupulos sex, mellis quod satis est.

Antidotus Sorira.

Spicæ nardi dioboli undequadráginta, myrrhæ dioboli uiginti septē, croci dioboli triginta septē, castorij dioboli undequadráginta, opij dioboli triginta sex, petroselini dioboli quadrágintaquinq;, anisi octo, apij septē, iunci rotūdi odorati florū dioboli triginta sex, cassiæ dioboli duodecim, piperis lōgi tātundem, seminis sinonis grammata sex, styracis octodecim, amomi, fœlis, utriusq; duodecim, hedychroi, costi, ascri, singulorum dioboli duodeuiginti, mellis quantum satis est.

Tt 4 Exstora

Ex styrace bechicum, tussi medendo.

Amomi, cassiae, singulorum sextans, styracis, spicae nardi, uniuscuiusque sesquiuncia, croci, piperis albi, cuiuslibet uncia, mellis sextarius: detur cochliarium.

Medicamentum Philoxeni, cuius usus est in purulentis & diutinis rheumatibus obnoxiiis.

Resinae terebinthinae drachmas uigintiocto, nardi sedecim, myrrhae stillatitiae sex, cardamomi, bulborum, uniuscuiusque drach. sex, croci duodecim, galbani sedecim, amygdala amara octoginta, mellis hemina: ex aqua potatur fabae Aegyptiae magnitudo.

Esdra, quae multis affectibus congruit, potenter enim desiccatur.

Amomi scrupulos sex, croci scrupulos duodeuiginti, seminis dauci sesquiscrupulū, seminis fœniculi scrupulos treis, cassiae scrupulum unū et dimidiū, florū iunci odorati scrupulos quatuor et semissē, cinnamomi scrupulos treis, succi hypocistidis scrup. quatuor et dimidiū, sulphuris quincuncē, seminis papaueris scrupulos quinq, pyrethri scrup. treis, petroselini scrupulū unū et semissem, ireos Illyricae scrupulos septē et semissē, herbae Apollinaris seminis scrupulos tredecim et dimidiatū, spicae nardi scrupulos septē et dimidiū, rutae seminis scrup. unū et semissem, anethi scrup. treis, cardamomi unc. treis, rosarū exiccatarū scrupulos quatuor et dimidiatū, nerij floris scrupulum unum cum semisse: est autē ueluti lobus ac filiqua unde oritur rosa: rhododaphnes, et rose ipsius. singulorum scrup. tres, rheu, gentianae, uniuscuiusque scrup. sex, bedychroi sesquiscrupulum, tragacanthae scrup. quindecim, licij sex, foliorum citrij tantundem, seminis ocymi scrupulum unum cum dimidio, anisi tres, costi, myrrhae, cuiuslibet scrup. sex, bdellij sedecim, succi artemisiae tredecim, rhu Syriaci uigintiquinq; et dimidium, asari, uentris mergi, lapidis iaspeos, singulorū scrup. treis, piperis quindecim, castorij sesquiscrupulum, cretae cimoliae scrup. sex, sisonis, styracis, uniuscuiusque scrupulos nouem, opobalsami duodecim: intybi herbae

herba scrupulum unum & semissem, mellis uncias uiginti octo, uini quantum sufficit.

Medicamentum ex malorum cotoneorum carnibus.

Malorum cotoneorum purgatorum librae tres decoquuntur in uini peruetusti sextarijs tribus, deinde teruntur, quibus piperis, anisi, lybistici, lauiuatorum uniuscuiusque uncia inijciuntur. Sunt qui zingiberis unciam dimidiam adijciunt, nec desunt qui pro uino acetum indiderunt.

Medicamentum ex succis malorum, appetit a cibis auersionibus, & ægris concoctionibus idoneum.

Succini, malorum cotoneorum maturorum, mellis boni, singulorum sextarij duo, aceti sextarius, zingiberis quadrans, piperis albi sextans, ad crassitudinem coquuntur: hoc Galeanus frigore inhorrentibus præparabat. In quibus autem bilis, inquit, abundat, absque pipere & zingibere conficitur.

Meloplacuntii præparatio.

Pomorum cotoneorum mundatorum librae sex, in uino elixantur, donec contabescant: deinde exempta conteruntur.

Nonnulli uerò affundunt mellis libras octo, et debili igne decoquunt, mouentes subinde ferula, donec impollutum quodammodo totum, ne manus inquinet, euaserit, tum adijciunt contusi piperis quadrantem, anisi tantundem, petroselini unciam. Quidam etiam zingiberis unciam, & mastiches unciam adijciunt: mox commixta finguntur ad semunciae quantitatem, & cum folijs lauri componuntur.

Cydonatum, contusum, fragmentis integris.

Malorum cydoniorum purgatorum, frustulatim concisorum librae octo, in uini sextarijs octo moderatè, ne dissoluantur, decoquuntur: deinde miscentur ipsis mellis despumati librae octo, piperis bes. petroselini, anisi, singulorum unciae tres, zingiberis unciae quinq;, spicae nardi uncia una & dimidia, cariophyllorum uncia. Omnia contusa, & mediocriter decocta ad iuris esculenti crassitudinem, remouentur, & refri-

Tt 5

gerata

gerata pariter cum iure fragmenta componuntur.

E tribus piperum generibus medicamentum.

Piperis communis candidi & longi, singulorum drach. septē, zingiberis, anisi, thymi comæ, cuiusq; drach. dua, mellis quod satis est. Aliud Oribasij: Piperis candidi sextans, piperis nigri & longi, spicæ nardi, cinnamomi, ameos, caryi, hyssopi, feseleos, dauci, petroselini, singulorū uncia, zingiberis drach. quatuor, mellis libræ tres. Aliud: Piperis communis quadrās. piperis albi uncia, longi tantundem, petroselini, cinnamomi, uel cassiæ duplum, zingiberis, uniuscuiusq; uncia, mellis uncia una & uiginti, uel quantum satis est. Ego uerò etiam thymi corymborū unciam admiscere solitus sum.

Diospolites.

Cymini aceto macerati ac torridi unciam, piperis, zingiberis, singulorum sextantem, rutæ uiridis fescunciam, nitri drach. duas cum dimidia, melle excipito.

Ex malo medico, pro his qui ægre concoquunt.

Aceti hemina tres, carnis citriy libra, hyssopi, rutæ, origani, singulorum fasciculus, per diem ac noctem aceto macerata, quousq; euanescat pars tertia, decoquuntur, expressaq; abijciuntur, aceto affunditur mellis sextarius, denuoq; ad mellis crassitudinem decoquuntur: ubi autem constiterint, insecruntur asari, mei, piperis albi, singul. sextantes duo. Datur cochleare manè, & lectum petenti.

Picra, id est amara, Galeni.

Aloes drach. centum, ligni balsami, mastiches, croci, spicæ nardi, asari, cinnamomi, singulorū drach. sex. Sunt qui etiam iunci rotundi odorati floris, & cassiæ, uniuscuiusque denarios sex admisceant. Exhibe drach. in hydromelite.

Picra ex oxymelite, ad stomachicos, locellos, & aquam inter cutem efficax.

Aloes triens, folij sextans, costi, cassiæ, amomi, ireos, singulorum drach. radice corticis foeniculi libra, mastiches, nardi Celticæ, zingiberis, uniuscuiusq; drach. piperis drach. ma,

ma, mei drach. aceti sesquifextarius, mellis tantundem. Fœ-
niculum decoctū prius in aceto proyicitur, deinde infunditur
mel: & ubi decoctum fuerit ad crassitudinem melleam, reli-
qua laeuigata insparguntur.

Medicamentum ex lupino iocinore optimum.

Gentianæ, chamæpityos, petroselini, marrubij succi, ara-
cij, sinapis, scolopēdrj, panacis radicis, minij, rubiæ, seminis
brassicæ, aristolochiæ longæ, piperis albi, spicæ nardi, costi,
seminis erucæ, radicis eringij, polij, echij, eupatorij, bacca-
rum iuniperi, lupini hepatis, enulæ campanæ, æquas portio-
nes melle decocto excipe. Exhibitio est auellana quantitas
cum mulso discocto.

Theodoretus ex anacardiis.

Anacardiorum fescuncia, croci, cassiæ, folij, spicæ nardi,
caryophylli, mei, agarici, rotundi odorati iunci florū, rheu,
epithymi, singulorum drach. quatuor, acori, piperis, unius-
cuiusq; sesquiunciā, aloes quadrans sarxiphagæ, mastiches,
iridis illyricæ, cuiuslibet fescuncia, myrobalanorum uncia,
mellis libræ sex, uel quod satis est.

Theodoretus aliter apparata, absq; anacardiis.

Aloes drach. sexaginta, agarici uingintiquatuor, croci,
cassiæ, rheu pontici, acori, cinnamomi, mastiches, singulo-
rum drach. decem, costi, seminis rutæ, piperis albi, uniuscu-
iusq; drach. octo, spicæ nardi drach. tres, ligni balsami, asari,
trixaginis, mei, uniuscuiusq; drach. quatuor, mellis quod sa-
tis est. Quidam his etiam anacardia duo adijciunt. Dosis dra-
chmæ duæ cum mulsa.

Cyphoides iocinerosos & thoracis uitia emendans.

Vuæ passæ carnis drach. uingintiquinq; croci drach. ca-
lami drach. duæ, bdellij drach. duæ semis, cassiæ denarius u-
nus & dimidijs, cinnamomi triobolus, nardi triobolus, len-
tisci drach. duæ, myrrhæ drach. quatuor, terebinthinæ tan-
tundem, ramenti aspalathi oboli duodecim, mellis drachmæ
sedecim, uini quantum satis est.

Aliud

Aliud cyphoides Alexandri.

Habet croci, cinnamomi, bdellij, singulorum drach. quatuor, myrrhæ, calami, uniuscuiusq; drach. duas, bituminis, florum rotundi iunci odorati, cuiuslibet drach. treis, cassiæ, nardi, singulorū drach. resinæ terebinthinæ drach. sedecim, uuæ passæ carnis drach. centum sexaginta, mellis sesquiminam, uini Chij quod satis est.

Diabacanu hepaticum:

Bacani uncia, costi uncia, folij scrupuli octo, piperis albi scrupuli sex, spicæ nardi tantundem, mellis quantum sufficit. Datur cochliarium cum temperatura conditi.

Zopyrus antidotus.

Myrrhæ drach. quinque, croci, cassiæ, singulorum drach. quatuor, cinnamomi drach. tres, spicæ nardi drach. duæ, rotundi iunci odorati floris drachmæ duæ, piperis albi sesquidrachma, thuris drachma, costi drach. mellis quod sufficit.

Pæonia antidotus, manus medicatrix.

Styracis calamitæ drach. sex, thuris, amomi, croci, singulorum sesquidrachma, spicæ nardi drach. sex, phylli drach. duæ, piperis cædidi drach. sex, & communis drach. octo, myrrhæ, costi, singulorum uncia, mellis quantum opus est.

Dosithei catapota, iecori accommodata.

Aloes uncia, spicæ nardi, folij, costi, singulorum gramma duo, agarici octo, mastiches tredecim, epithymi quatuor, rbeu scrupulum.

Oxymel splenicum, hoc est, ad lienem efficac.

Concinnatur ex cortice radicum capparis, scolopendrij, spicæ nardi, asari, iridis, florum iunci odorati, florum iunci quadrati, anisi, cymini, fœniculi, acori, ericæ fructus, singulorum uncia, foliorum myricæ, foliorum salicis, apij radicis, arboris thuris, scillæ, uniuscuiusq; sextante, aceti, mellis, singulorum sextarijs tribus, ammoniaci thymiamatis. Præparabis ad modum scillitici. Offer cochliaria duo.

Oxymel

Oxymel laborantibus calculo dicatum.

Saxifragæ, betonica, graminis, adianti, spicæ nardi, carpesiæ, asari, eringij, singulorum uncia, petroselini Macedonici, seminis rutæ, uniuscuiusq; uncia semis, fœniculi uiridis, iridis, scillæ assatæ, chamædaphnes, cuiuslibet sextans, corticis radicis capparis quadrans, fîorum sextans, aquæ, accretæ, mellis, singulorum sextarij bini.

Phusca lapides confringens.

Pulegij, mastiches, apij seminis, mētæ aridæ, singulorū uncia, salis cōmunis torridi lib. 1. seminis coriādri, spicæ nardi, anisi, ammeos, uniuscuiusq; scrupuli sex, phylli scrupuli quatuor, piperis candidi uncia semis, uel communis uncia, lithospermatis selibra, betonica tantundē, aceti præstantis sextarij quinq; omnia cōtusa & cribellata, & in laeuorem trita, per triduū aceto macerata, dies quadraginta insolato. Quum uerò usus postularit, in decoctū ciceris nigri, & radicis asparagi, apij item & adianti binas aceti heminas infunde, & in calido bānei alueolo laboranti potui dato. Quidam medicamentū ex prædictis speciebus aridi diobolos duodecim cum posca memoratarum herbarum decocto temperata exhibuerunt, nec quicquam minus proficit pharmacum.

Conditum calculos atterens.

Piperis albi, saxifragæ, spicæ nardi, lithospermi, betonica, singulorum uncia, petroselini, phylli, uniuscuiusq; sescuncia, seminis rutæ syluestris semuncia, mellis sextarius, uini ascalonitis sextarij sedecim.

Medicamentum ex sanguine hircino.

Quādo uuæ præ maturitate nigrore suffundi cœperint, hirci ætate florentis sanguinem colligito, & in sole exiccatum, calculo laborantibus, pondo cochliarij cum passo Cretico præbeto. Sunt uerò qui amomi & phylli singulorū quadrantem cōmisceant: alij myrrhæ etiam scrupulos quatuor.

Medicamentum ex cicadis, renum doloribus expediens.

Lithospermi, raphidis piscis cremati, seseleos, uniuscuiusq; unciam.

unciam, ameos, cucumeris satiui seminis, saxifraga, uuarum
passarum acinis exemptis, seminis althææ, phaseoli candidi,
lyncurij, singulorum unciam dimidiam, spicæ nardi, phu, mei,
lapidum ex spongijs, cuiuslibet drach. adianti, seminis pali-
uri interanci, siorum aridorum, radicis rubi, graminis, poly-
podij, uniuscuiusq; drach. treis, sanguinis hircini exiccati, ut
dictum est, diobolos sex, cicadarum aridarum, amputatis &
abieclis capite, alis, & pedibus, uncia quatuor, piperis albi
drach. sex, mellis decocti quod satis est. Datur nucis auellanae
quãtitas in condito, uel decocto tribuli, uel saxifraga, uel
sinorij, uel radicis asparagorum, uel graminis, aut quinque
folij, aut radicis herbae lanariae.

Ex milio solis.

Lithospermi, betonica, saxifraga, petroselini, piperis albi,
pares singulorum modi cum melle excipiuntur.

Medicamentum ex semine marrubino.

Piperis albi & atrij, dauci Cretici, seminis cucumeris do-
mestici, seminis fœniculi, marrubij seminis, petroselini Ma-
cedonici, pyrethri, zingiberis, phylli, singulorum uncia, mel-
lis quantum sufficit.

Ex lapide Iudaico.

Spicæ nardi, byssopi, lapidis Iudaici, uniuscuiusq; scrup.
ocho, piperis scrup. duodecim, zingiberis, petroselini, costi,
saxifraga, singulorum scrup. sex, cassiæ, seminis apij, cuiusli-
bet tres, cyperi sex, scobis eboris quatuor, ligni cardamomi
scrup. sex, seminis lini scrup. quatuor, mellis quod sufficit.

Medicamentum ex sylvestris maluae semine.

Seminis cucumeris hortulani drach. duodecim, seminis her-
bae Apollinaris drach. sex, seminis cicutæ drach. tres (alij
uerò sex) opij, fœniculi, maluae sylvestris seminis, croci, cuius-
libet drach. treis, seminis apij drach. sex, cassiæ drach. qua-
tuor, amygdala basilica decem, nucs auellanas decem, asari
drach. quatuor, passo Cretico excipe, & triobolũ exhibe fe-
bre

breccarētibus, cum defruto. sunt qui melle excipere malint.

Ex bellariis renum doloribus dicatum, & ad uesicæ renumque exulcerationem conducibile.

Vuæ passæ candidæ exemptis acinīs, nucleorum pinco-
rum recentium, uniuscuiusq; sextās, seminis cucumeris excor-
ticati, myrtorum exosium, amygdalorū amarorum, palmu-
larum pinguium, seminis apij, seminis papaueris, croci, sin-
gulorum drachma, myrrhæ sextans. Ieiuno denarium ex
passo propinato.

Satyriaca antidotus.

Zingiberis, satyrj superioris, singulorum drach. octo,
caudæ crocodili terrestris (quæ Græci scingū appellāt) mei,
asari, petroselini, cardamomi, seseleos, uniuscuiusq; drach.
quatuor, seminis erucæ, cinnamomi, cuiuslibet drach. tres,
ormini, piperis albi, seminis cnici, uniuscuiusq; drach. duæ.
florum rotundi odorati iunci, spicæ nardi, singulorum drach.
sanguinis hirci mystrium. Drachma imbecillioribus cum la-
ctæ offeratur.

Globuli ex ligno maceris, intestinorum torminibus utiles.

Xylomace ris, opij, rhei, uniuscuiusq; scrupulos sex, gala-
læ, myrrhæ, singulorum uncia, uino spathite excipito.

Ex corallio ad podagram.

Habet rheu barbarici, pæonia, myrrhæ troglodytica, spicæ
nardi, singulorū uncias duas, phylli unciam, caryophyl-
lorum grana quindecim, anagallidis florem rhusion, puni-
ceam' ue habētis, quam coralliū nuncupant, semunciam, mali
terræ longi & rotundi, cuiuslibet trientē. Dosis est diobolus
quotidie post bonā cibi concoctionē. Auspicandū autē est à sol-
stitio autūnali, quod est circa uigesimūquartū diē mensis Se-
ptembris, atq; dieb. deinceps quinquaginta accipito: & un-
deuiginti intercalatis diebus, ad eandē te antidotū conuerte,
atq; ita donec dies quib. accipis, trecenti sexagintaquinq; im-
pleantur, peragito. Sub cane autē omnes dies uacuato, hoc est
à uigesimoquarto die lunij, usq; ad Augustum completum.

A ue-

A' uenere porro, & carnibus, maximè procinis, et salsamen-
to, garoq; & beta, dauco, menta, lactucis crudis, & peponis
bus abstinendum est. Ex piscibus uerò, capitonibus, seu gom-
phis, commaris, molli & testacea cute præditi, atq; à legu-
minibus cunctis, & omnibus, ut summam perstringam, quæ
crassum humorem generant. Vino itidè secundario, nigroq;
& multo. Lauandū quotidie, & exercitationibus indulgen-
dum, uel pedibus, uel equo, uel lectica, uehiculoñe. Cæterum
qui habitu sunt aridior, & uberiore uictus ratione utuntur,
nullo incommodo afficiuntur.

Antidotus Agapeti podagrica.

Folij, rheu barbarici, croci, spicæ nardi, myrrhæ troglo-
dytica, costi, trixaginis, singulorum sextans, aloes hepaticæ
quincunx, hyperici, pæoniæ, uniuscuiusq; quadrans, mali ter-
ræ longi, pbu, mei damasonij, anagallidis, cuiusq; triens. Mo-
dus autem utendi idem omnino est cum Diacorallio.

Antidotus Atactos podagrica.

Folij, mei damasonij, anagallidis cyaneum florem habena-
tis, erythrodani, mastiches, croci, cassiæ, aloes hepatidis,
gentianæ, trixaginis, singulæ uncia, caryophyllorum, asa-
ri, piperis albi & atri, singulorum uncia semis, spicæ nardi,
myrrhæ, rheu barbarici, radicis pæoniæ, mali terræ longi,
& rotundi, cuiuslibet uncias duas. Vsurpatio eius superioris
bus similis est.

Procli podagræ, coxendicis doloribus efficax compositio.

Trixaginis dodrans, cætaurij bes, aristolochiæ septunx,
gentianæ selibra, hyperici quincunx, petroselini Macedonis
ci triens, mei quadrans, agarici sextans, pbu uncia, mellis At-
tici heminae duæ.

Medicamen ex septem concinnatum rebus, ad eadem.

Hyperici, aristolochiæ longæ, singulorum uncia, centa-
urij, chamæpityos, agarici, uniuscuiusq; quadrans, trixaginis
uncia sex, gentianæ quincunx. Nonnulli petroselini quoque
unciam inferunt, mellis denarios quinq;. Exhibetur drach.

De

Pastillos Græci ab efformationis figura trochiscos, id est orbiculos appellant. Sunt autem pastillorum genera tria. Alij namq; potimi, hoc est potabiles: alij enetici, id est infusiles, qui per anũ immittuntur: alij catachristi, quod est inungibiles. Potabiliũ itaq; alij retētiui, eo quod alui, uel sanguinis, uel alias quascũq; fluxiones refrigerādo, uel astringēdo, uel infarciēdo, aut desiccādo cōpescant: cuius farinae sunt, pastillus ex spina Aegyptia effigiatus, et ex seminib. concinnatus, atq; id genus. Alij dolorē sedāt, uel quod sensum stupefaciēdo torporē inducāt, ueluti Crocodes: uel quod humores dissipāt, cuius generis sunt qui ex aromatis conficiuntur. Quidam ab meatuũ oppilationibus iecur, lienē, & renes uindicant: e quorum classe sunt, qui ex amygdalis amaris formantur. Ex his aut quæ in aluum infunduntur, aliqui acrimenias obtundunt, ueluti in torminib. intestinorũ: cuiusmodi sunt ex pompholygē, amylo, et terra samia, cum cremore ptisanæ, uel eiusmodi aliquo per clysterē immiſsi. Aliqui uerò astringendi facultate præditi, uētris et sanguinis fluxiōes sistūt, ueluti qui alumine, acacia, & omphacio cōstant: uerbi causa, pastillus Philippi, uel ex acātha Aegyptia cū succo rosarũ, uel plantagine infusi. Aliqui deurēdi uim obtinent, quorũ usus in torminib. intestinorum, quæ hūlcera depascentia experta sunt, probatur, ex sandaracha, auripigmento, calce, charta cōbusta cōpositi. Cũ succo uerò lentium aut oryzæ, ablutis prius muria intestinis, immittātur, ubi alimentũ antea potũq; languētes sumpserint, quo nihil uirium medicamenti ad stomachum rapiatur. Conducunt autem hi qui aluo induntur pastilli, potissimum affectionibus, quæ circa sumen sub umbilico ingruunt: superius enim uires ipsorum non perueniunt. Qui uerò illinuntur, uiribus illis, qui infunduntur, respondent. Caterũ siptici, in herpetibus, exanthematibus, intertriginibus, sanguinis eruptiōe, ac fluidis hūlceribus, conferūt: e quorum numero est, Andro

nis & Polyidæ. Qui uerò hebetant, carbunculis, et maleficis
 bulceribus competunt, ueluti Leucus appellatus & dialota-
 rion. Adurentes autem orbiculi, perinde atque prædicti (cuius-
 iusmodi censentur & phausiani) medendis serpentibus, ue-
 rendorum, sedisq; bulceribus, pterygijs item, & carnosis na-
 rium uitjs expediunt.

Pastillus aster.

Croci, opij, castorij, spicæ nardi, cassiæ, myrrhæ, Lemnij
 sigilli, corticis mandragoræ, singulorum trientem, dauci, a-
 pij, anisi, seseleos, seminis alterci, styracis, uniuscuiusque uno-
 ciam: uino læuigabis.

Pastillus Trigonus.

Seminis apij, seminis herbæ Apollinaris, uniuscuiusque
 drach. duæ, anisi drach. 4. opij drach. tres, aqua diluuntur.

Pastillus ex feminibus.

Seminis anisi, ammeos, fœniculi, singulorum drach. qua-
 tuor, seminis apij, opij, seminis hyoscyami, uniuscuiusque dra-
 ch. duæ, aqua teruntur.

Pastillus crocodes, id est croceus.

Anisi, dauci cretici seminis, uniuscuiusq; drach. quatuor,
 myrrhæ, castorij, singulorum drach. duæ, croci, opij, cuiusli-
 bet drach. tres, seminis apij, styracis, uniuscuiusq; drach. qua-
 tuor, seminis alterci drach. sex aqua conteruntur.

Pastillus diarhodos.

Acaciæ, cômeeos, rosarum floris, balaustiorū, hypocistidis
 succi, gallarum, uniuscuiusq; drach. tres, succi rosarum uiri-
 diū, seminis plantaginis, cuiuslibet drach. lxxij Indici drach.

Pastillus diacoralliu, id est ex corallio.

Seminis alterci, thuris, singulorum drach. octo, terræ
 samiacæ, corallij, rubricæ sinopidis, opij, uniuscuiusque drach.
 quatuor, amyli, balaustiorum, cuiuslibet drach. duæ, succo po-
 lygoni excipiuntur.

Pastillus ex electro.

Herbæ pulicaris quincunx, mastiches triens, scobis suc-
 ci, iridis, croci, singulorum triens, opij sextans.

Pastillus

Pastillus ex spina Aegyptia.

Spinæ Aegyptiæ, rhu, thuris, acaciæ, aluminis fissi, succi hypocistidis, gallæ. Lemnii sigilli, corallij, consolidæ, Samii asteris, aloes, ladani. singulorum partes æquales uino excipiuntur.

Pastillus alius, quem Galenus Aphrodisiasticon clidion inscripsit.

Florum punicæ satiuæ, spinæ Aegyptiæ, florum punicæ agrestis, succi hypocistidis, acaciæ, singulorum drach. sex, lycij, rheu pontici, opij, uniuscuiusque drach. quatuor, myrrhæ drach. duæ, uino ex baccis myrti, uel rosarum, aut myrtorum iure assumuntur.

Clidium Oribasii dysentericum & coeliacum.

Gallæ omphacitidis drach. octo, opij drachmæ quatuor, aqua in pilulas effingito, & deglutiendum treis aut quatuor exhibeto.

Pastillus e cornu cerui, dysenteria & sanguinis excretionem laborantibus accommodatus.

Cochlearum drach. duo decim, cornu ceruini deuisti, gallæ exiccatae, acaciæ arefactæ, uniuscuiusque drach. quinq; obo li duodecim, myrtorum nigrorum drach. quindecim, opij torrefacti, hypocistidis succi, singulorum drach. quinq; florum labruscæ drach. sex, succi radicis mandragoræ, terræ asteris, cuiuslibet drach. duodecim, rhu obsoniorum drach. quatuordecim, maliciorum exiccatorum drach. septem, thuris drachmæ octo, corticis pini arefacti drach. quatuordecim, herbæ Apollinaris tostæ drach. decem, rhus coriarij sextarij duo, uini nigri quantum ad elixandum rhum, ut crassissimum reddatur uinum, satis est: quo percolato, cætera excepta, in pastillos digeruntur.

Pastillus Amazonum.

Seminis apij, anisi, uniuscuiusque drach. sex, comæ absinthij drach. quatuor, myrrhæ, piperis, opij, castorei, singulorum drachmas duas, cinnamomi drach. sex, aqua excipito.

V. 11 2

Pastillus

Pastillus ex amygdalis amaris.

Anisi, seminis apij, asari, amygdalorum amarorum, absinthij comae, æqualia pondera cum aqua coguntur, in pastillos, drach. unius. exhibetur non febrientibus cum œnomelite, febri citantibus uerò cum hydromelite.

Pastillus ex erica, ad lienem.

Erices fructus drach. quatuor, piperis albi, nardi Syriacæ, ammoniaci thymiamatis. singulorum drach. duæ, gutta ammoniaca aceto dissoluitur, et aridis iniicitur. Effigiuntur pastilli, qui singuli denarium pendeant. Dosis orbiculus, cum oxymelitis cyatho.

Pastillus, ex uescagine.

Seminis cucumeris satiui pelle exuti triens, seminis alterici, cicutæ, singulorum sextans, fœniculi, seminis rumicis, croci, nucleorum pineorum, amygdalorum amarorum, opij, uniuscuiusq; uncia, uescaginis sextarii tres, uini quantum opus est.

Pastillus Philippi dysentericis dicatus.

Balaustiorum, acaciæ, hypocistidis succi, opij, rhu, thuris, myrrhæ, croci, gallæ, aloes, rheu pōtici, malicoriorum, myrtorum, uniuscuiusque drachmas quatuor, uino austero subigito, et orbiculos triobolares compingitio. Dato autem febre uacantibus cum uino, febrientibus cum hydromelite.

Pastillus Musæ.

Aluminis, aloes, myrrhæ, atramenti sutorij, uniuscuiusque uncia una et semis, malicoriorum, croci, crocomagmatis, cuiusque drach. sex uino excipiuntur.

Apparatus crocomagmatis.

Croci uncia duæ, rosarum, amyli, myrrhæ, aloes, thuris, gummi, uniuscuiusque uncia una: costi, spicæ nardi, singulorum drachma una, uino excipiuntur. De crocino oleo etiā altera crocomagmatis dicetur concinnatio.

Neri pastillus, ex collectaneis Heræ.

Myrrhæ, aloes, croci, uniuscuiusque drach. octo, aluminis fibilis drach. centum, aqua subiguntur.

Polyide

Polyidæ Sphragis.

Aluminis fisci drach. quatuor, myrrhæ drach. octo, atramenti sutorij drach. duas, florum punice satiuæ drach. duodecim, fellis taurini drach. sex, uel, ut alijs placet, drach. sedecim, aloës uncia, uino astringente excipito.

Pastillus Pasionis.

Squamæ æris denarium pondo duodecim, æris tosti, aloës, guttæ ammoniaci, aluminis rotundi, æruginis rasilis, thuris, uniuscuiusq; denarium pondo octo, uini quantum satis est.

Pastillus Andronius.

Florum mali punici hortensis denarij decem, myrrhæ denarij quatuor, gallarum denarij octo, mali terræ rotundi denarij quatuor, atramenti sutorij, croci, aluminis fisci, crocomagmatis, mysios, thuris, cuiusque denarij duo, uino austero, acetoue diluuntur.

Pastillus Phlaustini.

Auripigmenti denarij duodecim, sandaraches denarios sex, calcis aqua non extinctæ octo, chartæ crematæ denarium, succo myrtilorum uel decocto excepta digere in pastillos, et per anum cum decocto baccarum myrti, lenticularū, & rubi radicem immitte.

Pastillus e charta.

Chartæ combustæ libras duas, calcis, auripigmenti, sandaraches, uniuscuiusq; unciam succo plantaginis excipito.

Thronus Marcellius.

Chartæ crematæ denarij decem, sandaraches, auripigmenti, squamæ æris, aluminis fisci, cuiusque denarij quatuor, florum punice sylvestris denarij treis, opij duo, calcis uiuæ uiginti, omphacij denarius, succi hypocistidis treis, uino ex myrti baccis excepta in orbiculos drach. quatuor pondere æquantes rediguntur, & in uino malicorio, myrti baccis, & rosæ usque ad tertias elixatis, exhibetur in uini cyathis sex pastillus unus, uel summatim quatuor.

Pastillus ex subere.

Gallarum crematarum, chartæ combustæ, fecis uini deu

V u i ste,

stæ, et panis deniq; tosti singulorum denarios decem. In alia etiam cornus ceruini usti denarios quindecim, habetur: auri-pigmenti denarios duos, sandaraches, calcis uniuscuiusq; denarios quindecim, acaciæ, cerussæ, cuiuslibet denarios quinque, spumæ argenti denarios treis, uino subigito.

Pastillus cognomento Bithynus.

Maliciorum denary decem, cadmiæ quadrans, maliteræ, gallarum, panacis radices, ireos, atramenti sutorij, aluminis fisci, chalcitidis, misyos, squamæ æris, mannæ (nonnulli adijciunt etiam costi) cuiusq; fescuncia, aceto leuigantur.

Pastillus ad hucera, nomas, & fluxiones.

Croci, aloes, thuris, singulorum uncia, cytinorum, aluminis fisci, castorij, mannæ, æruginis rasæ, cuiusq; uncia, rubricæ sinopidis libra, uino ueteri excipiuntur.

Pastillus alius, ex febris testiculis colicis dicatus.

Myrrhæ, castorij, cuiuslibet dioboli sex, croci, opij, singulorum scrupuli nouē, anisi, seminis apij, dauci seminis, uniuscuiusq; uncia semis, alterci seminis, scrupuli duodeuiginti.

Pastillus ex uino & oleo, ano & pudendis dedicatus.

Cerussæ dextans, spumæ argenti quincunx, thuris, stercoris plumbi, aluminis fisci, singulorum sextans, uino marina exorte subiguntur. Cæterum quum usus exiget, ænorhodo, hoc est uino rosaceo, uel uino myrtino diluuntur.

Pastillus ex lapide phrygio, pro his qui genitalibus afficiuntur.

Lapidis phrygis combusti, et extincti ter, primum butyro, uel rosaceo, deinde uino, tertio melle, sextans: rosarum floris triens, corticum mali granati uncia.

Pastillus ex loro syluestri, fedi atq; uerendis consecratus.

Cerussæ, amyli, glauci, croci, aluminis, æquales portiones, succo loti syluestris, uino uel diluuntur.

Pastillus leucus.

Terræ asteris uncias quatuor, bullæ (quam Græci pompholyga

pholyga dicunt) cerussæ, amyli, uniuscuiusq; unc. duas, opij diobolos quatuor, aqua conterere.

Pastillusex uesticaria.

Spumæ argenti denarij uigintiquatuor, cerussæ duodecim uel uigintiunus, alicacabi radicis denarij octio, atramenti sutorij denarij quatuor, aluminis fissi tantundem, rubricæ quantū ad colorem inducendum sufficit, aqua subiguntur.

Pastillus ex uiroque ueratro, & idem ex duplici acacia.

Acaciæ nigra & rufa, glutini fabrilis, aliàs ichthyo collæ, singulorum triens: ammoniaci thymiamatis, glaucij, aloes, cuiusque sextans, thuris masculi, ueratri nigri, & candidi, uniuscuiusque uncia, aceto scillitico excipiuntur. Quum utendum erit, eodem uel communi dissoluta, sub balneum, & à balneo rursum illinuntur.

Pastillus Criogenes.

Myrrhæ, æris cremati, aristolochiæ rotundæ, æruginis rase, squamæ stomomatis, uerbenacæ rectæ, aluminis rotundi, cuiusque uncia, aceti quantum satis est. Decerpere autem oportet uerbenacam, quum sol fuerit in ariete. Formatur autem in emplastrum etiam hoc modo. Pastilli huius, ceræ, colophonice, olei pares modi, aceti quantum ad eliquandum pastillum satis est.

Pastillus melanchlorus, hoc est niger ac uiridis.

Myrrhæ, aloes, squamæ æris cremati, auripigmenti, aluminis fissilis & rotundi, ireos, chalcitidis, misyos, salis fossi, chalcanthi, cerussæ, nitri, spumæ argenti, panacis radicis, cadmiæ, malicoriorū, gallarum, aristolochiæ rotundæ, squamæ stomomatis, æruginis rase, uniuscuiusque uncias, aceti quantum res postulat. Pangitur item emplastrum ad hunc modum: Pastilli sextans, colophonice, ceræ, olei, singulorum selibra, aceti quantum ad pastilli subactionem sufficit.

Pantolmios, ad chironia & maligna hulcera, et rheumata:

Cassiæ, æris cremati, cerussæ, spumæ argenti, ferruginis rasilis, aluminis fissi, rotundi, liquidi, et plēthytidos, id est laterij,

Vu 4 panacis

panacis radice, aristolochie longæ et rotundæ, maliciorum,
atramenti sutorij, portulacæ, iridis, astragalitidis, misyos,
ammoniæ thymiamatis, salis ammoniaci squamæ æris, aloës,
diphrygis, thuris, gallarum, sarcocollæ, plumbi densi,
foliorum oleæ, socos, myrrhæ, atramenti metallici liquidi,
balaustrorum, spinæ Aegyptiæ, sulphuris ignem non exper-
ti, nitri, rhu rubei, rhu Syriaci, chrysocollæ, aluminis, rhu co-
riariæ, acaciæ, salis spumæ, omphacij, auripigmenti, æque
portiones: sub ardentissimo Caniculæ aestu, aceto per dies tri-
ginta macerantur.

Pastillus Nymphodoti.

Spumæ nitri uncia, nitri Alexandrini, saponis Gallici,
uniuscuiusque uncia, salis Cappadocici, mastiches, gallarum,
cuiuslibet denarios quatuor, foliorum rosarum, amomi, amy-
li, cuiusque uncia, folij denarius, fissilis aluminis, costi, singu-
lorum denarij duo, uini ex baccis myrti quantum satis est.

Pastillus e thapsia hemicranicus.

Liquoris thapsiæ denarij sedecim, myrrhæ denarij octo,
opopanacis, euphorbij, singulorum denarij sex, nitri, succi par-
thenici, cuiusque denarij quatuor, piperis, sagapeni, uniuscuiusque
denarij duo, aceti quod satis est. Quum autem usus est,
aceto illitos post horas sex abluito. uerum si uoles remissione
uti, cerato pari exceptum illinito, atque per diem ac noctem finito.

Hypothum ad dysenteriam & ani dolores.

Terræ asteris, amyli, singulorum uncias treis, croci un-
cias duas, acaciæ, tragacanthæ, uniuscuiusque unciam, cas-
storij, thuris, lycij, cuiuslibet semunciam: in natura calidiori-
bus etiam opij uncia in dimidiatam, succo pulicariæ excipi-
to, & in longum effigiato.

De pulueribus & smegmatis, Cap. 13.

Ridorum medicaminum, quæ & cataplasmata uocantur,
Alia quidē hūcerib. conueniunt, alia uerō cuti admoventur:
et quæ hūcerib. cōpetunt, quædam cavitates carne replent,
quædam

quædam uerò tumentia supprimunt, & excreſcentias car-
 nium reprimunt: quædam cicatricem inducunt: quædam de-
 urunt & exedunt, & quædam ſanguinẽ comprimunt. Quæ
 igitur cauis carnem inducunt, uel ſordida expurgando, car-
 nem generant, ueluti quæ ex eruo componuntur, & ariſtolo-
 chia, iride, panace, myrrha, thure, aloẽ: aut circumfluam hu-
 miditatem exiccando, quemadmodũ quæ ex ære, diphryge,
 ſquama, charta combuſta, cortice pinus, acantha conficiuntur
 (eadem uerò ipſa cicatricem quoq; inducunt) aut acredi-
 nes & eroſiones hebetando: uerbi cauſa, quæ ex pompholy-
 ge, amylo, ceruſſa, fece toſta, lapide ſpeculari, oſtreis crema-
 tis, terra Samia, & id genus, & quæ ex his compoſitorũ ha-
 bent potentias. Ex his quæ ſupprimendi excreſcentias uim
 obtine nt, mitiora quidem cenſentur ex ſquama æris, miſyos,
 chalcitide toſtis, & galla concinnata. Valentiora ſunt, quæ
 ex atramento ſutorio, ærugine, miſyos, chalcitide, non deu-
 ſtis componuntur. Quæ autem deurendi & exedendi facul-
 tate ſunt prædita, ex calce, auripigmento, ſandaracha, ſphe-
 cle, quæ eſt ſex uini, crematis conſtant. Cæterum hæc om-
 nia in minutiſſimum puluerem friata, hulceribus inſperſa, mi-
 nus mordacia ſunt. Crassarum contrà partium & ſpiſſio-
 ra, acrius mordicant. Quæ ſanguinem coercent, uel aſtrine-
 gendo, uel refrigerando, uel ſiccando, obſtruendo uel, aut de-
 urendo, & cruſtam inducendo, comprimunt, quorum mate-
 riam ſermone de Paſtillis docuimus. Sed eorum quæ cuti ad-
 hibentur, aliqua ſanè detergant & exterunt: cuius farine
 ſunt, ex creta cimolia, pumice, ſiliqua fermenti, bordeo, pe-
 ponum carne, flore ſalis conflata. Aliqua uerò attenuant &
 diſſipant, quemadmodum ea quæ ex ueratro, alcyonio, ſul-
 phure, uua paſſa ſylueſtri, ſinapi, pyrethro, ſemine roris ma-
 rini, lemnia terra, ſepiæ teſta. Quibus ſi calx adjiciatur, &
 auripigmentum cum aliquo liquore, pſilotica redduntur, &
 ſmegmata ſiunt. Quædam capiti applicantur, quo fluxum

ex eo manantem arefaciant: cuiusmodi sunt è nitro, sale, gal-
lis, malicorijs, & id genus alijs contexta. Smegmata postre-
mo omnia cuti sunt non illitæ accommodanda.

Pulvis capiti conueniens.

Erui uncia quinq;, iridis, mannae, aristolochiae, squamae
æris, uniuscuiusq; uncia una cum dimidia. Alius: Corticis pi-
ni denarij sex, thuris denarij quatuor, pumicis tantundem, iri-
dis denarij duo, resinae aridae denarij sex, aristolochiae dena-
rij duo.

Ex aloë.

Aloes denarij sex, erui denarij octo, mannae thuris qua-
tuor, gallæ treis, aluminis fissi denarij duo.

Ex fece uini cremata Manethonis.

Cadmia combusta atq; elotæ uncia, terræ asteris uncia,
fecis uini cremati triens, lapidis specularis tantundem, thu-
ris triens. quidam his amyli quoq; trientem adijciunt.

Melitera Oribasii.

Habet chalcitidis, squamæ æris, galbæ, balaustiorum, ce-
ræ, uniuscuiusque uncias treis, aristolochiae unciam, corti-
cum mali Punici, fissilis aluminis, singulorum unciam dimi-
diam.

Ex ostreis.

Recipit cadmie, thuris, cuiuslibet unciam, ostreorū com-
bustorum trientem.

Ex thure.

Spumæ argenti, thuris, squamæ æris, mali Punici, amy-
li, cerussæ, singulorum partes æquales.

Aphroditarium.

Accipit thuris, squamæ æris, rhoidarij, amyli, cerussæ,
æquas portiones.

Rhodia comprimens sanguinem, ad nomas, & carnis
excrecentias conducens.

Gallæ crudæ denarij sex, gallæ crematæ, & uino extin-
ctæ,

Ææ, aridæ denarij duodecim: squamæ æris atræ, sin minus, rubræ denarij octo, atramenti sutorij uigintiquatuor, aluminis fissi denarij uigintiseptem, læuigantur dies quot satis est.

Flauum medicamentum.

Chalcitidis crematæ denarij quadraginta, atramenti sutorij tosti denarij octo, misyos combusti denarij decem, æris deusti denarij quinq.

A murino colore dictum medicamentum:

Misyos uncie quinq, gallarum uncie quatuor, *chalcitidis* uncie duæ, squamæ æris uncie duæ, *chalcæthi* uncia, fer ruginis rasilis uncie duæ.

Medicamentum *Heliocæs* adurens.

Auripigmenti libram, calcis aqua non extinctæ libras duas, aqua in diebus canicularibus eliquato: deinde, ubi arefeceris, utere.

Antherum.

Sumit *cyper*i denarios octo, *myrrhæ* denarios duodecim, *sandarachæ* denarios treis, floris rosarum denarios duos, croci denarium, *crocomagmatis*, *aluminis fissi*, *iridis Illyricæ*, singulorum denarios duos.

Ad nomas oris potissimum, & naturalium hulcera.

Squamæ æris, chartæ combustæ, uniuscuiusque denarios octo, *auripigmenti*, *sulphuris igne non experti*, cuiuslibet denarios duodecim, *plumbi deusti* denarios sex. Quo medendis humidioribus sepedonibus arido utere. Aridis uerò curandis rosaceo macerabis, interdum etiam melle cum rosaceo.

Dia oxymyrfinis, id est ex *myrto syluestri*, ad eadem.

Rhus coriarij libra, *myrti syluestris foliorum*, *sandaraachæ*, uniuscuiusq; denarij octo, *aridorū foliorū salicis*, *malicorij*, cuiuslibet denarij sex, *aluminis fissi*, *chrysocollæ*, *aloes*, *chalcitidis crudæ*, squamæ, *auripigmenti*, salis communis, singulorum denarij quatuor.

Aridum

Aridum Massaliotæ.

Nitri, opij, chrysocolle, lapidis Asy, sandarachæ, misyos, chalcitidis, aluminis scissilis, diphrygis, æquis portionibus. Arido utere.

Smegma aridum, quod Asclepios appellatur.

Baccarū lauri, nitri Alexandrini, salis fricti, salis Capadocici, ammoniaci thymiamatis, spumæ nitri, pumicis, cuiuslibet libram, ueratri nigri, struthy, pyrethri, speccles, (quæ est uini fex) deusta, uua passæ syluestris, napyos, cypri, aluminis scissilis, floris rotundi iunci odorati, ireos, gal larum, cuiuslibet selibram, sampsuchi libram, uiticis seminis, pulegi, lomenti, & farine lupini singulorum uncias sex. chamæleontis nigri, sulphuris, gummi, thuris, piperis, radice cucumeris agrestis, marruby, cretæ cimolia, pœonia, sepia testæ, fœnogræci, folij, costi, cymini, euphorbij, spice nardi, singulorum quadrantem. Cæterum Alexander hæc insuper adhibuit: Salis nitrosi, & Tragesy, cuiusque libram, adarces unciam, aluminis liquidi, nardi Celticæ, cnicici, grani cnidi, graminis aridi, bryoniæ siccæ, uniuscuiusque quadrantem.

Smegma Peponatum.

Thuris, mastiches, guttæ ammoniaci thymiamatis, singulorum uncia, tragacanthæ sesquiuncia, succi omphacis uncia nouem, recentis feminis peponis uncia tres, similaginis sextarij quinq; ouorum unius & uiginti albumina, iridis uncia quatuor. Sunt autem qui bellebore nigri uncias quoque duas inserant.

Aliter Critonis.

Lomenti modium, similæ sextarios quatuor, trifolij, myrobalani, ireos illyricæ, uniuscuiusque libras quatuor, guttæ ammoniaci thymiamatis, costi, singulorū librā, ouorū tenues albores, peponum carnis sextarios duos, omphacis succi tantundem. Irrigato, & conformans pastillos arefacito, deinde
contusis

contusis & attaminatis utere. Aliud: Tragacanthæ, thuris, mastiches, guttæ ammoniaci thymiamatis, singulorum denarios decē, succi omphacis, simila, uniuscuiusq; denarios quinq; alboris ouorum unciam, carniū peponum dextantem. Preparato quemadmodum prædictum est.

Smegma caput catarrhofum exiccans.

Habet nitri Alexandrini fului quincuncem, salis communis fricti, salis Cappadocici, singulorū unciam. hæc cōtrita, & acerrimo aceto macerata, in iuce lineo sacculo, et in furno donec redigantur in carbones, comburito; deinde refrigeratis, leuigatisq; extere, cum uino instillans in balneo.

Sapo Constantini.

Rosarum aridarum, aloes, gallarum, malicoriorum, fœniculi, sarcocollæ, uniuscuiusq; quadrans, balauftiorum, myrrhæ, sandarachæ, spicæ nardi, singulorum sextans, saponis Gallici libra: lupinorum decocto excipiuntur.

Puluis depilatorius ad podagram.

Mastiches, thuris masculi, herbæ pedicularis, ueratri albi, spumæ argenti, cuiusq; quadrans, folij, amyli, ueratri nigri, lapidis Asij floris, singulorū uncia, alcyonij, pumicis assati, cretæ cimoliæ, sampsuchi, uniuscuiusq; quadrās, spicæ nardi uncia: aliqui uerò indunt etiam aloes unciam. Aridum contusum in uase asseruatur: quum utendum erit, succus oryze & ptisanæ in ollam conijcitur: ubi macerata fuerint, inseritur pulueris fescuncia, saponis Gallici, auripigmenti, aluminis scissi, sandarachæ, uniuscuiusq; sesquiuncia, calcis aqua non extinctæ recentis libra. Utendū unguento ter in mense, nono uidelicet lunæ die, & undeuigesimo, & undetrichesimo usque ad annum. Post hunc semel in mense, luna uigesimumnonum diem agente.

De unctionibus quæ ori inseruiunt, & faucibus. Cap. 14.

Vanto summa oris tunicula cute rarior mollior que est, Quanto etiam usus stomaticorum medicaminum euariat.

Circa

Circa igitur prima inflammationis rudimenta, pharmacis quæ humoris influxum reperiunt, opus est: cuiusmodi sunt arida quidem, omphacium, galla immatura, succus rhu, hypocistidis, aluminis, piniq; & thuris cortex: & flores mali Punici, & summam omnia quæ citra insuauem & uirulem tam facultatem astringendi uim obtinent. Liquida uero, succus mororum batinorū, & eorum quæ sycamina appellantur, uiridiumq; nucum corticis, et malorū granatorum, præsertim acidorum, malorū cotoneorum, mustū & Amineum. Mel autem per initia solum, ut adhæreant medicamenta, admiscetur. Quum autem liquidum constiterit, quæ concoctionem adiuuant, & mediocriter dissipant, admiscenda sunt: cuius generis est crocus, myrrha, & glycyrrhizæ succus. Et uniuerso inter uigorem & decrementum tempore, rectè mixto ex ambobus reperiunt & discutiente utemur: & primò quidem reperiuntia, mox uero distrahentia præpolleant. In uigoris uero remissione solis absque astringentia discutioris utendum est: cuius farine sunt nitrū, & spuma eius, origanum, hyssopum, thymus, nepita, iris, besasa, & consimilia. Liquor autem illo tempore sapa esto, tum id quod à musto decocto, tum quod à ficibus aridis, & datylis conflatur, atq; ipsum etiam mustum dulce cum melle: ubi uero inflammationis quippiam remanserit, sulphuris etiam ignem non experti aliquid admiscendum est. Coquendus autem est ante omnia succus cum melle, ad mellis usq; liquidioris consistentiam: mox arida læuigata inspergantur, deinde tantisper dum omnia in unitatem exactè coeant, moderatè elixentur, ac tum denique medicamentum id in uitrea uasa transfusum adseruetur.

Diamoron simplex.

Mororum succi sextarij tres coquuntur ad tertias, inieciōq; mellis sextario, denuo ad mellis usq; spissitudinem decoquantur.

Diamoron

Diamoron compositum.

Coquuntur mororū succi heminae sex ad strigmeti crassitudinem, deinde admiscetur contriti croci denarius, myrrhae denarij duo, succi uuae acerbæ denarius, aluminis fissi triobolus, mellis hemina : atque donec crassitudinem induat, decoquantur.

De Batinis moris, id est ex rubis.

Ceterum ex moris quoque batinis diamoron consimiliter preparatur, et astringentius est.

Diacaryon, id est ex nucibus, simplex.

Nucum uiridium corticis contusi succi heminae quinque, mellis hemina, ad medias decoquantur.

Diacaryon compositum.

Ab initio quidem et in uigore oris inflammationum miscere oportet croci et aluminis, uniuscuiusque denarium, myrrhae denarios duos; in declinatione autem ad dissipandum, nistri denarium, sulphuris tantundem, cum praefata nucum corticis succi et mellis mensura.

Ex sacco mali punici.

Malorum granatorū acinis exemptis dulcium succi sextarios quatuor, malorum Punicorū acidorum succi sextarios duos, mellis sextarium, myrrhae minneae denarios octo, crocomagmatis, gallae, uniuscuiusque denarios octo, aluminis fissi denarios quatuor, ireos illyricae denarios octo, succi uuae acerbæ denarios octo. Prepara quemadmodum Diamoron. Idem aliter: Succi malorum Punicorum dulcium cum testis combustorum sextarios sex, mellis boni sextarium, aluminis fissilis unciam, myrrhae unciam dimidiam.

Ex musto medicamentum.

Musti, sextarij sex, gallae, aluminis fissi, singulorum denarij duo, croci, myrrhae, uniuscuiusque denarius. si quidem mitigare uolueris, mulsum dulce esto : si uero retundere, austerrum : medium uero inter haec quodammodo existit, quod neutrum est.

Aegyptia

Aegyptiori inferuiens.

Mellis libra, olei unciae octo, resinae terebinthinae unciae duae, croci denarii quatuor, in cacabo eliquantur.

Ex ruta sylvestri.

Seminis anisi, apij seminis, floris rotundi iunci odorati, seminis ammeos, aluminis scissilis, iridis Illyricae, besasa, quod nonnulli hermala nuncupant (est autem ruta sylvestris) cinnamomi, myrrhae troglodyticae, croci, gallae singulorum uncia, aristolochiae longae, cassiae, crocomagmatis, rosarum aridarum, cuiusque uncia, costi, hirundinum cineris recentis, cuiuslibet quadrans, nardi Indicae, amomi, uniuscuiusque uncia, mellis quantum sufficit.

Suaves & frugi potiones. Cap. 15.

Dulcium pariter & utilium potionum aliae quidem ex uino componuntur, missis in ipsam quibusdam speciebus uerbi causa, pipere, absinthio, casamo, & alijs compluribus, unde nomenclaturam nonnunquam mutant, quandoque melle admixto, quandoque non: aliae uero ex aqua, in aqua elixantur mala, uel rosae, uel similia quaedam, puta, uua immatura, mala granata, myrtorij baccae. Mel itaque optimi despumatum, soliditatis gratia & dulcoris, & quod interdum etiam utile commiscetur, praeterquam quod a Cibyria paruis uasculis importatur, austerum, & uinosum hydromali, quod etiam potest sine melle confici: quem admodum est diuerso apomeli ex solo melle & aqua, citra aliquam alterius essentiae miscellam. Quin ex uino etiam compositae potiones, quae & propomata uocant, mellis despumati sextarium, ad uini sextarios quatuor assumunt, & componuntur, ignem non experta. Quae uero ex aqua & liquore constant, si quidem coquantur, unam mellis partem ad tres liquoris in coctura ad duas ferme partes consumpti recipiunt. Sin minus, una mellis ad duas liquoris decoquatur. Quae autem non elixantur, omnino quantum satis est insolanda sunt, praesertim omphacomeli. Decoquere autem

autem congruit potiones ex aqua, quoniam propter imbecillitatem facile alteratur. Omnes porro exiguis testaceis uasis incrustatis reponendæ sunt, accuratè et tuto operculatis in locis apricis, usq; dum decoquantur, collocatis. Attenuantibus autem, & egregiè aqua temperatis utere. Omphacomeli autem, postquam instar musti efferbuerit, & inspissatum cõstiterit, operculato. Quocirca quæ ex uino consistunt, in his qui à febre immunes sunt, maximè utimur, uel solius uoluptatis gratia, nisi ex scammonia, aut grano cnidio, aut id genus purgandi uim habentibus fiant, uel propter istiusmodi affectiones, in quibus aliquis etiam iniectis in illas medicamentis, per os uti queat. His uerò quæ ex aqua aut liquoribus quibusdam confiunt, in febriculis utendum, nunc quidem tanquam dulciarijs, quum morbus languentibus uini usum non permittit, nunc quod affectionibus conueniunt: ueluti apomeli ad sputum agendum, uel ad lotium ciendū, uel uentrem laxandum, uel humorem crassum attenuandum. Hydromalum autem & hydrosatum sitibundis, febre ardente correptis, dissolutis, & stomacho imbecillis. Omphacomeli, myrtites, & mel rosaceum, & rhoetes, non celiacis solum, sed & dysentericis, euomentibus, & alijs fluxionū morbis congruunt. His deniq; lauaminibus, subinde in oris affectionibus utimur.

Hydromalum ex succo malorum cotoneorum:

Succi malorum cotoneorum mundorū, contusorum, sextarij duo, mellis sextarij tres, aquæ sextarij sex: coquuntur despumando usq; ad tertias. Aliud: Malorum cydoniorum concisorum purorum libræ quinq;, in aquæ fontis sextarijs decem, tantisper dum subiuga reddantur, decoquuntur: sublata ab igne, refrigerataq; eximuntur, & expresso cremore mala projiciuntur, aquæ mensuræ mellis quantitas dimidia admiscetur: & rursus assidue despumando, donec octaua pars euanescat, decoquuntur. Sunt uerò nonnulli, qui hydromalum ex malis dulcibus consimiliter composuerunt.

XX

Hydrosati

Hydrososati compositio.

Conficitur ex rosarum detractis unguibus libris quatuor,
aqua sextarijs quinq; mellis sextarijs duobus.

Rhodomali præparatio.

Succi pomorum cydoniorum sextarius, rosarum libræ
tres, mellis sextarij tres, aquæ sextarij quinque. Cæterum
quoniam tempore quo rosæ inueniuntur, cotonea reperiri
non possunt, necessarium fuerit easdem tempore suo melle
conditas reseruare, & quàm primum mala apparuerint, uni
uersam compositionem absolvere.

Omphacomelitis confectio.

Vuæ acerbæ succi sextarios treis, mellis sextarium, mixta
per quadraginta dies in solem exponito, siue igne decoquito.

Myrteti præparatio.

Succi myrterum sextarios treis, mellis sextarium, ad con
sumptionem usq; tertiæ partis decoquito.

Apomeli ex monumentis Philagrii.

Albescentium fauorum melle infartorum libram, aquæ
fontanæ libris tris, cum dimidiata, fauis minutim confræ
ctis, & in unitatem compactis, aquam cum melle decoquito,
donec spuma eius & ueluti cerosum supernatans, particula
tim relinquatur: atque tum refrigerata, summa cura trans
fundito.

Rhodostacti compositio.

Succi rosarum unguibus detractis sextarios duos, mellis
sextarium, decoquito usque despumando, donec pars quarta
coctura euanescat.

Rhoeti præparatio.

Succi mali punici sextarios treis, mellis sextarium: ad ter
tiæ decoquito.

De collyrijs, & agglutinatorijs: Cap. 16.

Cularium medicamentorum materia diuersi generis est,
Oliquores nanq; & succi, semina, fructus, plantarum par
tes, et metallica ipsis injiciuntur: è quorum numero quædam
acredines mitigant, & ueluti obstruunt & opplent, quem
admodum

admodum pompholyx, cinerula, amylum, plumbum, Samius
 aster, cadmia, omnia abluta, & candidum oui aquatum. Qui
 bus utiq; non nisi capite prius euacuato utendum: nam si id re
 fertum humoribus fuerit, ne distentione oculorū lunica rum
 pantur, periculum est. Quædam his contraria, acri uidelicet
 natura prædita, oppilationes diuturnas laxant, & impacta
 euacuant, ueluti liquores, Cyrenaicus, Medicus, sagapenus,
 euphorbiū, & id genus. Quædam sordida abstergunt hulceo
 ra: uerbi causa, squama aris, as, chalcitis, mysi, fori, flos
 aris, et stibi, concremata. Quædam his finitima sunt, quæ ab
 stergētia ab exterendis sordibus uocantur, nepe auripigmen
 tū, sandaracha, lapidis asy flos. Alia astringētia sunt, atq; ex
 his quæ moderatè astringūt, multipliciter ophthalmiys, hula
 ceribus, & fluxionibus auxilio sunt: qualia rosarum folia,
 flores, fructus, spica nardi, foliū, crocus, glauciū, et hypoci
 stis sunt. Quæ uerò stipicitatē potentiorē obtinent, potissi
 mum medicaminibus, quibus oculorum speciē acuendi prouin
 cia delegata est, inferuntur: e quorum classe sunt omphaciū,
 acacia, balauſtia, cytini, gallæ. Alia uerò concoquendi &
 distrabēdi uim obtinet, ut myrrha, crocus, castorium, lachry
 ma thuris, et scenogræci succus. Ex compositis aut oculorum
 medelis, quædam delinuntur, et simpliciter appellantur alia
 arida collyria, alia liquida collyria: proinde quæ illinuntur,
 omnem prædictam materiam admittunt, & omnibus conue
 niunt affectibus. Præparentur potissimū uere, æstate etenim
 uirtus ipsorū exhalat, & euanescit: hyeme uerò, species rigi
 dæ temperari non possunt. Terantur autem ea humore non
 affatim affuso, ne metallica subsidant, odoramenta aut super
 natent, sed modicè, ut tãquam strigmentū conterantur. Aqua
 lierò cœlestis esto, tum quod tenuiū sit par tium, tum quod me
 diocriter astringat: si quidem uino, aut quopiam succo sint di
 luenda: leuigentur etiam ipsa metallica quidem tempore lon
 go, quæ succo constant breui. Post exactam denique colliqua

tionem gummi adjicito: & ubi informaueris, uasis æreis maxime & uitreis reponito. Datur autem ijs quæ liquore constant protinus uti, metallica uetustate meliora euadunt. Ex aridis porro collyrijs alia callosificationes, pterygia, et scabiem eliquant & exterunt, ex chalcitide, ferrugine, & misyos composita. Alia uerò lachrymas proliciunt, oppilationibus & oculorū hebetudinibus idonea, quæ tum ex his, tum ex pipere et spica nardi conficiuntur. Alia uerò præseruant, arcentq; ab oculis humorum instillationes: qualia sunt, ex lapide phrygio, sarcocolla, glaucio, aloë, cadmia, stibio, & croco: omnia in minutissimum puluisculum trita, applicantur oculis. Liquida uerò collyria quidē ex melle Attico, opobalsamo, oleo tenuium propter uetustatem partium, succo fœniculi, fellibus diuersorum animalium, succo Cyrenaico, & alijs quamplurimis præparentur. Opitulantur oculorū hebetudinibus, & inchoantibus suffusionibus, extenuantia, ex calfacientia, & repurgantia præsidia. Vtere his omnibus acribus, capite iam inanito sub dio, aere puro, boreali: neq; supra modum gelido, neq; nimium calido circūfuso. Quæ aut anacolle mata, id est reglutinamenta uocantur, ex his quæ opplendi, glutinandi, constringendi, uel refrigerandi, uel constipandi, uel arefaciendi potestate sunt prædita, contextuntur: uerbi causa, polline, māna, terra Samia, myrrha, cochleis, acacia, opio, cum albore oui. Adglutinantur autem fronti, in quibus non intra caluam abditus humor, sed in aperto existit.

Monemeron ad auspicantes & inueteratas lippitudines.

Acaciæ denarios triginta sex, gummi denarios triginta duos, cadmiæ denarios uigintiquatuor, æris deusti atq; abluti denarios octo, opij denarium: uino austero dissolue, discutit & desiccat.

Chiacum collyrium.

Rubricæ Sinopicæ, gallæ omphacitidis, croci, rosarum recentium detractis unguibus, floris quem thylaca uocamus, commeos,

commeos, singulorum quadrantem, opij unciam, uino Amis-
neo, uel Phalerno, uel Chio astringente conterito. esto autem
uinum marinæ exors.

Cynarium.

Cadmie combustæ atque ablutæ selibram, cerussæ lotæ
trientem, pompholygis trientem, amyli sextantem, tragao-
canthæ, opij exiccati, commeos, uniuscuiusque sextantem, a-
qua cœlesti contere.

Rubeus cygnus.

Accipit cadmie crematæ elotæ uncias duas, terræ asse-
ris tantundem, cerussæ uncias quatuor, pompholygis uncias
octo, amyli, opij, cuiusque uncias duas, acaciæ, tragacanthæ,
singulorum unciam, commeos uncias quatuor, quæ omnia in
aqua pluuiali læuigantur.

Candidus cygnus.

Cadmie uncia quindecim, cerussæ uncia septendecim,
opij denarij octo, thuris septem, amyli septunx, commeos de-
narij tredecim, aqua cœlesti diluuntur.

Pellarium ad hulcera.

Cadmie, cerussæ, uniuscuiusque denarios uigintiquatuor,
acaciæ, opij, singulorum denarios octodecim, commeos, tra-
gacanthæ, amyli, cuiuslibet denarios nouem, myrrhæ dena-
rios treis, æris, croci, cuiusque denarium unum et dimidium, a-
qua dissoluito.

Phœum ad hypopios & ingentes affectus.

Cadmie tenerioris denarios uiginti quatuor, cerussæ se-
decim, æruginis rasæ denarios duodecim, stibij octo, aluminis
fissi, chalcuidis combustæ, singulorum denarios treis, nardij
Indicæ denarios quatuor, omphacij denarios duos, æris dena-
rium, squamæ æris denarios octo, erices fructus denarios tre-
decim, succi papaueris denarios uiginti quatuor, croci dena-
rios quatuor, castorij denarios treis, myrrhæ denarios sex, li-
cij Indicæ, acaciæ, gummi, singulorum denarios quatuor, ro-
sarum recentium denarios duos & dimidium, uino Phalero

XX

3

no, aut

no, aut Surrentino, aut Amineo, aut Chio austero læuigato. Illinitur per triduum, aquosum scæno-græci, cum succo infusum, deinde cum ouo, & lacte, postremò aqua crassius.

Ex decoctis collyrium.

Cadmia uncia sedecim, cerussæ bes, amyli, opij, traga-canthæ, acaciæ, singulorum sextans, gummi selibra, subiunguntur decocto rosarum aridarum, meliloti, capiti papaueris, glycyrrhizæ, æquali singulorum portione.

Diidras percussium.

Liquoris topbi more concreti, qui in cerealibus uasculis reperitur, libræ tres, cadmia cremata et abluta libra, cerussæ lota, pompholygis lota, terræ asteris abluta, singulorum selibra, thuris, myrrhæ, uniuscuiusq; uncia, succi seminis lini, herbæ pulicaris, ptisanæ, scæno-græci, cuiuslibet libra, traga-canthæ uncia sex, gummi libra.

Ilambonis collyrium.

Cadmia uncia, pompholygis triens, cerussæ libra, traga-canthæ, gummi, opij, cuiusq; triens, aqua pluuiali excipiuntur.

Cinereum Spodiaceum ad inflammationes & fluxiones, & chymoses.

Thuris, stibij, singulorum drachmæ centum, cadmia, cerussæ, uniuscuiusq; drach. uiginti quatuor, terræ Samiæ, succi papaueris, cuiuslibet drach. tres, gummi drach. quindecim: conteruntur in succo thaliæ, quod est turionū oleæ. Succū autem hoc modo facito: molliora oleæ folia elota in pipila aquæ, iusta portione affusa læuigantur, et per linteum exprimuntur.

Collyrium ex furetorum oleæ succo.

Thuris denarios quatuor, stibij denarios quindecim, cadmia denarios duodeviginti, cerussæ denarios undequinquaginta, terræ Samiæ denarios octodecim, opij denarios sex, gummi denarium, plumbi combusti & abluti denarios octo, excipe succo turonum thaliæ.

Dia

Dia Thalias.

Aeris cremati denarios duodecim, sandicis unc. uigintiquatuor, foliorum oleæ, opij, singulorum sextantem, gummi sextantem, uino sphaatite uel Amineo contere.

Diasmirnon Claudiacum.

Glaucij, sarcocollæ, singulorum drachmæ quadraginta octo, croci drach. uigintiquatuor, opij, myrrhæ, lapidis hæmatitæ, uniuscuiusque drach. sex, tragacanthæ drach. duodequingenta, gummi drach. sedecim, uino Italico excipiuntur. Vfus eius ex ouo.

Aliud Diasmirnon, ad rhyadas & ad ægilopas.

Cadmie lotæ, lapidis hæmatitis abluti, singulorum drach. uiginti octo, myrrhæ, cinerulæ (quod spodion Græci uocant) cypriæ, uniuscuiusque drach. uigintiquatuor, opij drachmæ octo, croci drachmæ quatuor (sunt qui accipiant octo) piperis candidi grana triginta, gummi drachmæ sedecim, uino Italico subiguntur. Vfus eius cum ouo in recenti uitio aquosi.

Stæticum Prosechii.

Cadmie, gummi, singulorum denarios uiginti, stibij, atramenti sutorij, cuiusque denarios octo, opij denarios quatuordecim, ferruginis rasilis drach. decem. piperis albi denarios sex, croci denarios octo, misyos crudi denarios octo, opobalsami denarios quatuor, aqua diluito.

Hygidium Ammonii.

Cadmie, æris, uniuscuiusque denarios sedecim, cerussæ, castorij, aloes, croci cuiuslibet denarios quatuor, squamæ denarios quinque, florum rosarum, plumbi cremati, singulorum denarios octo, lycij denarios treis, lapidis schisti denarios quatuor, opij denarios decem, acaciæ denarios quadraginta, gummi denarios duodequingenta, aqua subigito.

Olympus, siue olympiacum.

Acaciæ, spicæ nardi, thuris, singulorum denarij octo, æris cõbusti et abluti, stibij cremati et colluti, cerussæ tostæ et lotæ, cadmie, uniuscuiusque denarij 12. myrrhæ, opij exiccati,

XX 4

cuiuslibet

cuiuslibet denarij quatuor, croci quinq;, æruginis rufæ tres, lapidis schisti, squamæ rubæ, lycij Indici, omphacij, cuiusq; denarius, castorij, florum rosarum, uniuscuiusq; denarij duo, phænicobalanorum quatuor; consimiliter etiam ossa dactylo-
rum crematorum numero quinq;, gummi quincunx, aqua cœlesti irrigantur, et macerantur in ea dies naturales treis, calami odorati, alterci seminis, rosarum aridarum, cuiusli-
bet denarij quatuor, folij denarius.

Nardinum.

Cadmia, croci, gummi, singulorum denarij triginta sex, æris cremati octodecim, stibij, acaciæ, singulorum triginta, nardi Syriacæ duodecim, opij, myrrhæ, uniuscuiusque denarij sedecim, cum aqua.

Theodotium paruum.

Stibij, acaciæ, singulorum denarij uiginti, æris tosti denarij octo, cerussæ denarij quatuor, myrrhæ tantundem, æruginis denarios duos, aloes, succi papaueris, lycij, singulorum denarius, aquæ pluuiialis quantum satis est.

Rhinarium.

Lapidis hæmatitæ, lapidis schisti, uniuscuiusq; denarij sedecim, æris cremati, cadmiæ ferruginis, cuiuslibet denarij octo, opij quinq;, chalcitidis duo, gummi octo, uino conteruntur.

Xyster.

Pumicis combusti, misyos cremati, ostrij tosti, singulorum selibra: cadmiæ, opij, chalcitidis deusta, croci, aloes hepatiti-
dis, castorij, folij, cuiuslibet denarij duo, stibij, acaciæ, uniuscuiusq; uncia, æris usti triens, myrrhæ troglodytidis denarij quatuor, spicæ nardi denarius, cerussæ denarij octo, gummi semuncia, aqua pluuiatili excipiuntur. Quidam uinum quosque admiscunt.

Hecatombe, ad cicatrices crassas.

Cadmia crematæ atq; ablutæ, æris combusti pariter et eloti: uniuscuiusq; denarij octo, stibij deusti, acaciæ rufæ, com-
meos, singulorum denarij 15. aloes, gallæ, uermicularis æru-
gins,

LIBER SEPTIMVS. 697

ginis, castorij, lycij, spicæ nardi, croci, opij, myrrhæ, cerussæ, scobis hebeni, chalcitidis, singulorum denarius, rosarum denarij sexaginta, aqua pluuiæ laeuigantur.

Diaceratos, ex monumentis Galeni.

Plumbi combusti, cornu ceruini cremati, singulorum sextans, cerussæ, squamæ æris, amyli, thuris, sepia testæ deusta, æruginis, myrrhæ, gummi, uniuscuiusq; uncia, aqua pluuiæ teruntur.

Collyrium e thure.

Thuris selibra, cadmiæ, pompholygis, terræ asteris, amyli, gummi, singulorū quadrans, cerussæ, selibra, squamæ æris triens, tragacanthæ quadrans, opij uncia sex, aquæ pluuiæ tilis quod satis est.

Libanium.

Cadmiæ lotæ, amyli, singulorum denarij duodecim, cerussæ tantundē, spodij, pompholygis, asteris, plumbi cremati & abluti, tragacanthæ, uniuscuiusq; denarij octo, opij denarios duodecim, gummi quatuor, aqua cœlestis, & ouorū uiginti albores adijciuntur. Quidam etiam adijciunt myrrhæ denarios quatuor.

After Magni.

Pompholygis, cadmiæ, cerussæ, singulorum denarij sedecim, plumbi denarij octo, amyli octo decim, thuris decem, terræ Samiæ duodecim, myrrhæ duo, tragacanthæ, commeos, uniuscuiusq; denarij octo, cum aqua.

Vranium.

Terræ asteris, piperis, cuiusq; quadrās, cinerulæ lotæ uncia, gummitriens, stibij cremati atq; abluti sextans, squamæ lotæ uncia, opij denarij sex, cadmiæ combustæ & elotæ denarij duo, aqua pluuiæ additur. Quod quidem incarnat, atque repercutit.

Collyrium ex succo fœnogræci.

Cadmiæ, tragacanthæ, singulorum bes, cerussæ, amyli,
Xx s unius

uniuscuiusq; unciae triginta, opij uncia, in succo scænograci conteruntur.

Collyrium Cleonis.

Pompholygis, plumbi, singulorū quincunx, croci sescuncia, squamæ stomomatis uncia, gummi sextans, aqua pluuiali subiguntur. Aquosum illinitur.

Diarhodon collyrium e septuaginta duabus uncis.

Rosarum uiridium uncia septuagintaduæ, cadmiæ comæ bustæ & elotæ denarij uigintiquatuor, æruginis rasæ denarij duo, spicæ nardi denarius, squamæ æris lotæ denarij duo, sibi tosti atq; abluti, opij, myrrhæ, uniuscuiusque tres, croci uncia, amyli denarij duo, commeos denarij uigintiquatuor, & aqua pluuialis additur.

Diarhodon album.

Cadmiæ densæ atq; ablutæ, cerussæ elotæ, singulorum libra, amyli, opij, tragacanthæ, uniuscuiusq; quadrans, aloes uncia una & dimidia, commeos quadrans, croci sescuncia, rosarium unguibus detractis uncia sex, & aqua.

Ex aloë collyrium.

Cadmiæ, cerussæ, aloes, singulorum dextans, rosarum uiridiū selibra, amyli quadrans, opij uncia, tragacanthæ sextans, commeos quadrans, aquæ pluuiæ quantum satis est.

Crocinum Diarhodon.

Spicæ nardi, rosarum aridarum, aloes, singulorum denarij duo, alterci albi denarius unus & dimidijs, croci denarij quatuor & semis, glaucij uncia sex, sarcocollæ uncia sex, opij denarij duo, tragacanthæ uncia, aqua pluuiali laeuigatur.

Diarhodon Nili.

Rosarum tenellarum denarij quatuor, croci denarij duo, papaueris obolus, commeos denarij quatuor, aqua pluuiæ admiscetur.

Lynceus uisum acuens.

Cadmiæ, æris cremati, ammoniaci thymiamatis, singulorum

LIBER SEPTIMVS. 699

rum denarij duodecim, myrrhæ, lapidis hæmatitæ, opij Thebæi, uniuscuiusq; denarij sex, aloes hepatitidis, fellis taurini, galbani, sagapeni, singulorum denarij quatuor, ferruginis rafilis, succi panacis, salis ammoniaci, cuiuslibet denarius, gummi denarij sex, aqua pluuialis additur.

Proteus ad eadem, & cicatrices extenuans.

Cadmia, cerussæ, chalcitidis crudæ, singulorum denarij quadraginta, piperis sesquidrachma, succi Cyrenaici denarij octo, croci denarij duodecim, opij Thebani denarij decem, sagapeni sesquiuncia, oliuæ Aethiopica tantundem, auripigmenti, aluminis fissi, singulorum uncia, myrrhæ uncia una cum dimidia, ammoniaci thymiamatis denarij uiginti, opopanacis denarij sedecim, opobalsami denarij decem, commeos denarij uiginti, aqua pluuiali excipiuntur.

Collyrium ex succo foeniculi.

Cadmia denarij septendecim, atramenti librarij Indici denarij sedecim, piperis longi denarij tredecim, & albi duodecim, succi Cyrenaici uncia, opobalsami, spicæ nardi, singulorum denarij sex, sagapeni, opopanacis, cuiusque denarij quinq; opij quatuor, euphorbij denarius, gummi denarius, læuigantur succo foeniculi.

Collyrium ex fuceo balsami.

Cadmia, cerussæ, cuiusq; uncia, omphacij semuncia, piperis albi uncia sedecim, opij semuncia, opobalsami, commeos, singulorum sextans, aqua pluuiali subiguntur.

Thalasserus.

Cadmia bes, æruginis sextans, atramenti librarij Indici besis, piperis albi triens, succi Medici uncia, opobalsami sextans, commeos uncia sex, admixta aqua.

Harmation.

Ammoniaci thymiamatis, æris combusti, corticis thuris, singulorum denarij quatuor, æruginis denarius, gummi denarij quatuor, cum aqua cœlesti.

Malo-

Malobathrinum, quod etiam Isotheum appellatur.

Cadmia denarij sedecim, aeris cremati atq; abluti denarij quatuordecim, opij, lycij Indici, malobathri, nardi Indici, croci, aloes, singulorum denarij duo, castorij octo, myrrhæ quatuor, acaciæ, stibij, uniuscuiusque denarij quadraginta, aqua excipiuntur, usus ex ovo.

Crasius ex uino, dia cœnu adpellatum.

Cadmia, lapidis hæmatitæ & schisti, singulorum denarij quadraginta, aeris cremati denarij triginta, chalcitidis triginta duo, papaueris seminis tredecim. Aqua decoquitur meconium, & succus expressus inijcitur, & uino spatibite, seu Aminæo diluuntur. Aliud dia cœnu: Aeris combusti, cadmia placitidis, singulorum dodrans, lapidis hæmatitæ lotæ selibra, croci, myrrhæ, aloes, ammoniaci thymiamatis, uniuscuiusque quadrans, lycij Indici, spicæ nardi, cuiuslibet fescuncia, piperis albi grana sesquicentena, acaciæ rubentis dodrans, gummi quadrans, uino Phalerno aut Aminæo conteruntur.

Collyrium ex duobus lapidibus contra aspritudinem.

Lapidis hæmatitæ, & schisti, cassiæ, singulorum denarij duodeviginti, aeris, cadmia, opij, æruginis rasæ, uniuscuiusque denarij nouem, gummi tantundem, chalcitidis tostæ denarij sex, aqua adijcitur.

Aridum collyrium Galeni præseruans.

Lapidis Phrygij in tenues partes cōtusi, & in aulula donec ignitæ reddantur, deusti, & butyro recente extincti, deinde denuo cōsimiliter tosti, & uino Phalerno extincti, atq; tertio combusti, melleq; extincti & exiccati libra, aeris cremati, piperis albi, folij, singulorum uncia, stibij uncia una cum dimidia, omnibus læuigatis quum tollere medicamentum uolueris, succū balsami non crassi (prohibet enim illud, ne aridum reddatur medicamentū) sed pellucidissimi unciam inijcias. Vtere aut illo ad solas palpebras, sic specillū adhibedo,

ut

ut tunicae non attingantur, uerum ut palpebris diductis, medicamentum duntaxat instilletur. Illinito autem non semel modò, uerum saepius cum cibo nondum gustato, tum etiam ab ipso, & potissimum quum iam ophthalmia sentitur. Summa quippe admiratione dignum, quum omni alio medicamento efficacius praeseruet, ac tueatur ab iniuria.

Aridum Diacroc.

Glutini carnis, quam sarcocollam dicunt, denarij octo, croci denarij quatuor, glaucij tantundem, illiniuntur saepius in die. Nonnulli uerò aloen quoque adiiciunt.

Aliud aridum ad siccam lippitudinem, ficationem, sepedonas, & carnis supercrescentias.

Cadmiae denarij decem, chalcitidis denarij uiginti, piperis grana quindecim, nardi Gallicae denarius. Cadmia conteritur, chalcitisque cum uino, ubi aruerint reliqua immittuntur, & in puluerem rediguntur.

Liquidum ex caucalide, hoc est, ex pede gallinaceo.

Caucalidis succi, trixaginis, coronopodis, id est pedis cornicis, interdum uerò etiam succi othonnae aequales portiones. Est autem othonna, chelidonium maius.

Aliud ad ficationem palpebrarum, encathidas, & sarcomata.

Misyos assati denarij sex, chalcanti denarij quatuor, mellis Attici sextarius.

Erasistrati multiplicis usus liquidum, admirandi effectus, cum in oculorum, tum glandularum, tum genitalium uirus, & purulentis auribus.

Aeris denarios sex, misyos assati, myrrhae, singulorum denarios tres, croci denarium cum dimidio, piperis denarium, uini Chij, & passi Cretici, cuiusque sesquibeminam. Contere omnia in uino donec aruerint, infundito passum, & ad mellis spissitudinem decoquito.

Agglutinamenta oculorum, qui fluxione laborant.

Terrae Samiae, mannae, thuris, myrrhae, aequae portiones, qui albore exceptae, in linteolis impectae fronti imponuntur.

Aliud

Aliud: Seminis herbae apollinaris denarius, opij tantundem, myrrhae denarij duo, croci denarius, pollinis denarij quatuor, ouorum assatorum lutea duo, oui candido excipiuntur.

De emplastris, & iis quae in decoctiones eorum inferuntur, ex monumentis Antyli, de quibus ceræ modo ad oleum. Cap. 17.

EX medicaminibus quae emplastris induntur, alia sunt terrea, uerbi causa, metallica, lapidumque; & terrae species, feces, cinis, & cōchylia: alia sunt oleamina, alia lachrymae, alia liquabilia, alia liquores, alia succi: semina uerò ac herbas, radicesque paucas accipiunt. Emplastrorum porro quaedam sunt uulneraria, quae enæma (quod cruentis imponantur) & cōglutinatiua, & catagmatica (quae fracturis applicentur) appellamus. Debent autem ex arefacientibus summum exiccandi gradum non attingentibus, sed secundi gradus cōpleri, & tertij inchoantis cōponi: cuius notae sunt, salix, quercus, cū pressus, picea et tædæ cortices, myrrha, thus, bitumen, aloe, aristolochia, cinis sarmentitius, cerussa, spuma argenti, & magna pars ex metallicis. Decoquantur autem usque ad cōsistentiam, à qua nullum recrementum separetur. Quae uerò cicatrice obducunt, & ipsa quidem ex arefacientibus concinnantur, efficacioribus uerò quam cōglutinatoria: cuius utique generis sunt aes ustum, & squama cum ipsius, tum ferri, ærugo, chalcitis, flos æris crematus, alumen, galla, plumbago, cadmia, pumex, & ostrea. Quae uerò discutiendi uim habent, ex calorificis & mediocriter siccificis constant: exempli gratia, aristolochia, thapsia, oleo ueteri & raphanino, melle, opobalsamo, pice, resina terebinthina, galbano, salibus tostis, salis flore. Quae emolliendi uim obtinent, ex spuma argenti fiunt, adipibus, medullis, oleo ueteri, propoli, gutta ammoniacæ, styrace, galbano, bdellio, mastiche, resina terebinthina, uel radice altheae, & cucumeris syluestris. Siccifica, sulphure, nitro, sale, cinere, bitumineque constant. Attractiua ex salibus & nitro, propoli, ærugine, fermento, stercorebus, sulphure, & resina terebin-

terebinthina conficiuntur. Concoquendi munere prædita è cera, ladano, uua passa satiua, amomo, croco, thure, pice, mastiche Aegyptia, styrace, myrrha, galbano, butyro, & sypo, adipe, ferrugine præparatur. Quæ suppurationē inducunt, ex hydrelao, polline, pane triticeo, chondro, butyro, adipe porcino & uitulino, thure, pice, et resina. Quæ uerò dolores mitigāt, ex spuma argēti, cerussa, oleo, anetho, chamæmelo, amylo, ceraq; dealbata. Oportet autē enæma emplastra recentibus etiamdū uulnerib. & fracturis applicare, & suppetias supra emplastella, quæ Græci splenia uocant, spongys poscæ madentibus pariter illigatis, ferre, & soluere die tertio: & eadem rursus splenia, non alia inijcere. Quæ autē molliunt, attrahunt, discutiunt, maturant, & suppurationem faciunt, post cataplasmatum & ceratorum usum accommodantur. Lenientia uerò, circa principia statim, summis potissimum partibus quadrant. Cæterum super decoctione eorum deinceps sermonem faciemus.

Basilicum tetrapharmacum.

Ceræ, colophonie, picis, adipis taurini pares modi.

Emplastrum e succo seminis lini, dissipans & abstergens.

Olei ueteris libræ duæ, ceræ uncia uiginti, colophonie, seu porcini, singulorum libra una & dimidia, spumæ argenti libra, cerussæ selibra, succi seminis lini tantundē, pollinis uncia, thuris triens.

Ex melle.

Spumæ argenti, ceræ, olei, singulorū libræ quatuor, resina terebinthina libræ duæ, mellis, adipis suilli, uniuscuiusq; libra. Aliud: Spumæ argenti libræ sex, olei libræ quinque & dimidia, colophonie libræ septem cum dimidia, ceræ libræ treis & semis, mellis libræ tres.

Emplastrum ex succo.

Spumæ argēti libræ sex, olei, æstate quidem libræ septem, hyeme uerò libræ nouem, fenogræci sextarius dimidiatus, seminis

seminis lini semisextarius, althææ libræ tres. Althæam ac semina in aquæ sextarijs uiginti decoquito, donec parum ex ipso relinquatur. inde succi libris quatuor admixtis, oleo decoque, tantisper dum bullæ defierint; deinde leuissima argenti spuma insparſa, igni clemente usq; dum manus non inquinat, elixato.

Exemplum ex polline.

Pollinis, ammoniaci thymiamatis, singulorum libra, resine piceæ, ceræ, adipis porcini, uniuscuiusq; libræ duæ, succi seminis lini quantum satis est.

Emplastrum Botanicum, id est herbaceum.

Rumicis, rhepelæi, amurcæ ue, anchusæ, chæropelethi, est autem onoclea, septinerui, plantaginis, singulorum quadrans, olei libræ sex, adipis suilli selibra. Herbe oleo coctæ abijciuntur, cætera cum oleo eliquantur.

Emplastrum ex albucis.

Albuci radicis succi libra, rosaceti, chamæmelini, adipis anserini, singulorum sextans, adipis porcini quadrans, ceræ triens.

Emplastrum ex fermento, rumpens abscessus.

Fermenti, axungie, uniuscuiusq; selibra, salis triens, resine pini quadrans, ceræ triens, spumæ nitri uncia, guttæ ammoniaci thymiamatis sextans, mellis uncia sex, saponis sextans.

Dothiene emplastrum.

Guttæ ammoniaci thymiamatis libra, nitri Alexandrini selibra, spumæ nitri tantundem, adipis suilli, ceræ, singulorum libræ duæ, resinæ terebinthinæ libra, olei ueteris uncia, aceti quantum satis est.

Emplastrum diastruthiu, scrophulas discutiens.

Spumæ argenti, radicis lanariæ, mali terræ, singulorum uncias quatuor, galbani, squamæ æris, aloes, uniuscuiusque unciam, manne uncias duas, guttæ ammoniaci thymiamatis uncias sex, resinæ de picea de rasæ uncias sedecim, aceti scilicet sextarios quatuor, quo pulueres diluantur, sumito.

Smilium

Smilium ad abscessus.

Olei ueteris libra una & dimidia, spuma argenti, nitri rubei, salis ammoniaci, lixiu ficulnei protostacti, resinae, cuiusque libra, galbani, guttae ammoniaci thymiamatis, uniuscuiusque quadrans, atramenti sutorij triens, cerae selibra, ceruginis, opopanaeis, cuiusque uncia, aceti quantum satis est. spumam argenti & ferruginem in oleo elixato, quousque digitos nullo recremento inquinant: deinde reliqua inycito.

Ex aliis ruptorium.

Cerae selibra, colophonice triens, pityinae quadrans, adipis taurini triens, nitri rubei fescuncia, allia purgata uiginti, olei sextarius dimidius. Allia oleo decocta proijciuntur, reliqua admiscuntur.

Diapyrhanu, distrahendi uim habens.

Habet adipis anserini & phasianorum, uniuscuiusque quadrantem, olei ueteris uncias uigintisex, pulicaris herbae quadrantem, urticae seminis, radicis apyrani uiridis, utriusque libram, cerae dealbatae dextantem, emplastri diachylon sextantem, resinae terebinthinae unciam. Radicem intenuia frustula concisam in oleo cum herba pulicari, & semen urticae per noctem atque diem macerato. ubique elixata fuerint, ipsa quidem porricito, liquabilia autem oleo admixta resoluito.

Pyriae ad duritias & scirrhomata.

Althaeae, palmularum aut dactylorum Nicolaorum, uniuscuiusque dupondo, faenograeci, seminis lini, singulorum sextarium dimidium, chamemeli, meliloti, corticis palmularum, cuiuslibet uncias sex, uini Aminaei sextarium dimidium, spuma argenti libra, cerussa, colophonice, singulorum dupondo, cerae, resinae terebinthinae, cuiusque libra, olei ueteris libras quinque, aquae libras duas, panis aridi cotusi et attaminati libras quinque. Herbae in uino decoctae in succum rediguntur, & in succo panis irrigatur. postera die spuma argenti & cerussa in aqua laeuigantur, deinde oleo infuso coquitur, donec manus non

X y

inquinant,

inquinent, tum deniq; cætera inijciuntur. sublati autem ab igne immittitur panis. strenueq; rudicula agitur. Postremo æruginis rasæ, & florū salis, uniuscuiusq; uncie sex, ireos, mali terræ, singulorum selibra, resina terebinthinae libra, inijciuntur.

Pelarium ex argenti recremento, ad desquamatis similia.

Cera, adipis taurini, cuiusq; quincunx, recrementi argenti uncie sex, colophonie triens, picis, olei, singulorum sextas. Recrementum argenti aridum uino dissoluitur, uel succo fœnogræci: ubi uero ad manum argenti sterus non fuerit, plumbagine utimur.

Emplastrum ex althæa, podagricis & aliis duriciis utile.

Succi fœnogræci, & seminis lini, althææ, singulorum libris tribus, olei libris duabus, donec succus euanescat decoctas, colophonie libram, resina terebinthina tantundem, hederæ lachrymæ uncias treis infunde: quando resoluta fuerint, & igne ablata, cera libram, galbani uncias quatuor inijce, utraq; simul contusa solutaq; rudicula moueto.

Emplastrum hederaceum siue cissinum, ad neruorum uulnera, puncturas, & maxime uetera.

Squamæ rubentis uncias quatuor cum dimidia, thuris uncia, mysios sescuncia, chalcitidis denarios quatuor, aceti sex: laeuigato sole æstiuo donec consumatur acetum: deinde solutis ceræ uncis octo, olei duodeuiginti admisce: si uero diuisus neruus & nudus sit, pro galbano resina terebinthina sextantem inijce.

Melanchlorum ad eadem, & cruentis dicatum.

Malicoriorū, aris cremati, gallæ, aristolochiæ rotundæ, salis ammoniaci, squamæ aris, aluminis scissi & liquidi (alij pro liquido rotundū accipiunt) iridis, mysios, chalcæthi, chalcitidis, æruginis rasilis, cadmiæ, aloes, myrrha, thuris, radicis panacis, spumæ argenti, cerussa, paria singulorum pondera laeuigantur sub sole æstiuo cum aceto diebus pluscis, & finguntur pastilli. Emplastrū inde fit hoc modo: Pharamaci sextantem, ceræ selibram, olei bessem, in neruis quid ē faucis

faucijs perantiqui, in reliquis uerò communis adyçe.

Ex senecione emplastrum.

Senecionis succi libras duas, olei ueteris librā unā cum diōmidia, olei Cyprini trientē, axungiae ueteris librā, resinae terebinthinae uncia, galbani unciam dimidiā, resinae piceae uncias sex, æruginis, thuris, hyssopi medicamēti, uniuscuiusque uncia, squamæ æris diobolos octo, ceræ dextantem, picis zopissæ uncias quatuordecim. Coquito autē oleum cum adstringenti usq; crassitudinem adiecta adipe suilla, & pulueres cyprino dilue: galbanum uerò cum cera contūde, & cacabo inyçe. pix zopissa si quidem arida fuerit, tritam cribratam ponderato, & inspergito. Quod si nequeat lauigari, cū parte olei dissoluti extrahito, & tum omnia commisceantur.

Mnasei emplastrum discussorium.

Accipit ceræ, axungiae porcinae singulorum libram, colophonie selibram, spumæ argēti dupondo, uini boni libras quatuor.

Ariobarzanium ad easdem affectiones.

Spumæ argenti unciam unam & dimidiam, cerussæ libram & uncias quinque, aquæ marinae uncias uiginti quinque, olei ueteris libram unam & dimidiam, buccinorum cineris uncias septem & dimidiam, ceræ rubentis uncias nouem, resinae terebinthinae uncias sex, thuris quadrantem, grammata tria cum dimidio.

Emplastrum ex dracunculo.

Ceræ, colophonie, picis aride, axungiae, resinae, singulorum libræ quatuor, guttæ ammoniaci thymiamatis libræ duæ, dracunculi radicis libræ quinque. Radix arida leuigata alijs inspergitur dissolutis.

Pistacium.

Habet ceræ, colophonie, adipis porcini, alterci foliorum tenellorum, uel succi ipsorum æquale pondus. In Alexandria uerò ceræ libras binas cum media, alterci libras duas, axungiae libras duas cum dimidia, colophonie libras decem sumunt, & uebementius dissipat.

xy a

Myrsinatū.

Myrsinatum.

Spumæ argenti, cerussæ, sandicis, plumbi combusti et abluti, singulorum unciam, ceræ uncias sex, olei myrsinati libram, uini quantum res postulat.

Emplastrum ex cerussa, uel ouis.

Habet ceræ albatæ selibram, rosacei sesquilibram, spumæ argenti, cerussæ, singulorum sextantem, amyli trientem, albores ouorum quinq.

Liquidum Oribasii.

Spumæ argenti, cerussæ, singulæ fescunciâ, ceræ trientē, pinguetudinis suillæ septuncem, colophonice dodrantem, succi seminis lini, olei, singulorum dextantem. Mirificè conducit ad calcaneorum rimas. In bulceribus autem (inquit) uiuant: graueolentia etenim reddit.

Emplastrum dia cadmias, cicatricem inducens.

Chalcitidis crematæ sextans, cadmiæ, mannae, singulorum uncia, ceræ, colophonice, olei myrtei uniuscuiusq; libra, uini quantum satis est.

Palmularum Phoenicine dicta.

Accipit axungie ueteris libras duas, olei libras treis, spumæ argenti tantundem, chalcitidis crudæ uncias sex. Ante omnia quidem chalcitis cum oleo in mortariolo pulchro læuiget, uel in sole: ubi autem strigmentosum redditur, tum spumam quoque argenti, antè contritam inijcito: deinde uerò adipem. Et ubi iam egregiè læuigata et emollita fuerint, nō acri igne decoquito, quoad nullum recementum per decoctionem separetur, ex uirgulto palmularum rudicula agitans.

Emplastrum ex anchusa, ad igne combusta.

Habet ceræ dealbatæ dodrantem, rosacei uncias octodecim, quibus eliquatis purpureæ anchusæ radicis aridæ læuigatissimæ trientem inserito. Aliud: Anchusæ radicis uiridis, marrubij, gummi, singulorum quadrantem, decoctas in olei dodrante abijcito, oleo ceræ dealbatæ uncias quindecim adijce, et dissolue.

Emplastrum

Emplastrum Pompholygeron.

Bulla, quam pompholyga appellant, sextans, spuma argenti quadrans, laeuigantur cum succo seminis lini, & inijciuntur liquefacta et refrigerata, cerae uncis sex, adipis anserini, uel gallinacei sextanti, chamameli uncis sex.

Philocotylche dolorem sopiens, fedi destinata.

Continet thuris uncias septendecim, myrrhæ septuaginta, opij denarios quatuor, aluminis scissi denarios duos, butyri denarios quatuor, ouorum tenuium lutea quatuor, cadmice crematae atque elotæ denarios quatuor, pompholygis denarios sex, cerae tyrrhenicæ denarios octo, adipis anserini denarios sedecim, medullæ cerui denarios undecim, plumbi combusti et eloti denarios octo, lapidis hæmatitis denarium, hyssopi liquidi denarios quatuor. Pulueres cum uino Italico conterito, & liquabilia admisceto.

Amythaonis ad angulas & articulos conuulsos, est etiam ad extrahendum efficax.

Ammoniacy, cerae, bdellij, uniuscuiusque bes, resinae terebinthinae, ireos Illyricæ, galbani, singulorum drachmæ uiginti.

Aristophanium mollificans.

Picis libræ quatuor, xopissæ libræ duæ, cerae libra, opoponacis uncia, aceti hemina.

Emplastrum ex plumbagine, ad calidos affectus.

Plumbaginis triens, spuma argenti, cerussæ, singulorum sextans, cerae bes, myrtei libræ duæ, arida uino dissoluatur.

Coracum ex aceto mulso, genitalium uitiiis et nomis accommodatum.

Gallæ sextantem, squamæ unciam unam & dimidiam, chalcitidis, thuris, singulorum unciam, macerato in aceto diebus pluribus, deinde mellis quincuncem admisceto. Cerato autem seorsim confectio ex myrtei uel rosacei uncis duabus, adipis taurini unc. octo, cerae unc. quatuor, resinae terebinthinae uncia, mixta simul laeuigato, & utere perinde atque

Yy 3

diacharto,

diacharto cum per Pyulcū, tum per linteolum concerptum.

Ex oleo & aceto.

Habet spumæ argenti partem, olei, aceti, singulorum partes duas, secundum nonnullos uero tres.

Emplastrum ex achate lapide, dissipans & emolliens:

Constat ex achatis lapidis semiusti fescuncia, ceræ quincuncie, picis frictæ quadrante, olei uncia.

His cruentis dicata, conglutinans, incarnans, & expurgans.

Squamæ æris, æris cremati, mali terræ rotundi, uniuscuiusq; denarij octo, aluminis fisci sex, salis ammoniaci denarij octo, thuristantundē, guttæ ammoniaci thymiamatis denarij octo, myrrhæ, aloes, galbani, singulorum denarij duodecim, succi radicis dracunculi uncia, ceræ libra, colophonice libræ duæ, olei ueteris quadrans, aceti quantum satis est.

Athena ad hulcera sordida, cuneationes, neruorumq; uulnera.

Malicoriorū, æris cremati, gallarum, mali terræ rotundi & longi, salis ammoniaci thymiamatis, squamæ æris, aluminis fisci atq; rotundi, iridis, misyos, chalcanti, chalcitidis, æruginis rasilis, cadmiæ, aloes, myrrhæ, thuris, propoleos, galbani, uniuscuiusq; uncia, ceræ, picis, singulorum denarij ducenti, colophonice denarij centum, olei uncie sex, aceti quantum satis est.

Emplastrum diadistamni conglutinatum, ad morsus canum, & omne genus hulcera.

Spumæ argenti libræ duæ, squamæ æris fescuncia (Gal. selibra, æris combusti bes, aloes besis, galbani pondo) olei ueteris sextarij duo, diphrygis quadrans, gentianæ sesquunciacia, aristolochiæ, æruginis rasilis, singulorum uncie duæ & semis, distamni tantundem, colophonice libra, mannæ quadrans, guttæ ammoniaci thymiamatis uncie sex, propoleos sextans, ceræ uncie sex & dimidia. Oportet principio oleū cum spuma argenti, donec syncerum spissiusq; reddatur, & manum nullo recremento inficiet, decoquere: deinde cacabo ab igne sublato, æruginē & squamas injicere, ac denuò tan-
tisper, dum nullum per decoctionem recrementum separetur,
decoquere.

decoquere, lebetesq; rursum deposito resinam, guttam ammos moniacam attaminatam immittere, et quoad feruere cesset, cōmonere, denuoq; igni imponere: Et ubi parum ferbuerint, æs atq; diphryges inferere, Et tertio dū incrassescat decoquere, mox ceram admisceri: qua, dū manus nō coinquinet, discoctā, propolim injcere, Et paulo post refrigeratis admodum his, aloen, mannam, dictamnū, aristolochiam, gentianam, omnia in pollinem lauigata inspergere.

Barbara, emplastrum cruentis dicatum, fracturarum callos consolidans.

Bituminis Iudaici, picis aridæ, ceræ, resinæ, uniuscuiusque libra, terebinthinæ sextans, spumæ argenti uncia, cerussæ uncia una Et dimidia, manna, opopanacis, zingiberis, singulorum sextans, olei quadrans, aceti quantum satis est.

Emplastrum ex salicibus, conglutinans, ad hæmoptoicos, empyos, thoraci impositum utile.

Misyos, chalcitidis, æruginis, cerussæ, gallæ, aluminis fissi, Et rotundi, atramenti metallici, singulorum uncias sex, ceræ, pityinæ picis, cuiusq; libras duas, malicoriorum uncias sex, bituminis libras duas, foliorum salicis tantundem, olei rosarum uncias quatuor, atramenti sutorij uncias sex, aceti quantum sufficit: quidam resinæ quoque terebinthinæ dodrantem adijciunt,

Emplastrum Nicolai ad cruenta uulnera, & lacunas conglutinans.

Squama æris triens, ferruginis rasilis, spumæ argenti, singulorum fescuncia, mali terræ longi, Et rotundi, uniuscuiusque uncia, aluminis scissilis Et rotundi, atramenti sutorij, sulphuris ignem non experti, cuiuslibet uncia, gallæ omphacitidis triens, salis ammoniaci, misyos, origani, chamæleonis, cadmiæ botryitidis, ueratri candidi, singulorum uncia, peucedani quadrans, seminis apij sextans, simphyti radices, cerussæ, singulorum sesquiuncia, succi mandragoræ uncia dimidiata, chalcitidis unciam unam cum

dimidia.

Yy 4

dimidia. Samij asteris, thuris masculi, aloes, singulorum un-
cia: bdellij, opij Thebæi, cuiusq; sextans, zingiberis troglodis-
tidis unciam dimidiam, guttæ ammoniaci thymiamatis un-
cia, fœnogræci selibra, succi perdicidis tantundem, ceræ fla-
uæ quadrans, colophonix dupōdo, resinæ piceæ polentæ, u-
niuscuiusque libra, mastiches selibra, picis atræ sextans, olei
ueteris libra, styracis uncia, opopanacis fescuncia, aceti quā-
tum satis est.

Icelios ad strumas, abscessus, lienem, articulos,
coxendicisq; affectus.

Habet spumæ argenti denarios centum & uiginti, olei
ueteris sextarios duos, aceti sextarium, æruginis fescquidenā-
rium, corticis piceæ denarios octo, chamæleontis cum radi-
ce euphorbiæ, hypocythidis succi, propoleos, zingiberis, enu-
læ campanæ, pyrethri, singulorum denarios sedecim, ceræ
libras, tres.

Emplastrum Neronis ad plagas, & omnem carnosarum
partium dolorem.

Olei ueteris fescquilibra, spumæ argenti libra, ceræ, resi-
næ è picea, uniuscuiusq; uncia septem cum dimidia, ammo-
niaci thymiamatis triens, cerussæ tantundem, galbani, man-
næ, zingiberis, thuris, singulorum uncia.

Oxera, ad multa utilis.

Picis aridæ libræ duæ, ceræ libra, guttæ ammoniaci thy-
miamatis uncia, resinæ terebinthinæ selibra, galbani, man-
næ, singulorum sextans, aceti fescquiseptarius.

Aceratus Galeni, conglutinandi, maturandi hulcera, suppuran-
dique uim obtinens, rhicinino ueteri ue oleo tanquam me-
dicamen, quod linteolis conceptis exci-
pitur eliquatum.

Spumæ argenti libræ tres, olei rhicinini, aut peranti-
qui libræ quatuor, aceti acerrimi libræ duæ, squamæ aris, a-
træ chalcitidis, æruginis, uniuscuiusque uncia duæ. Spumam
argenti ad strigmentosam usq; balneorum crassitudinē cum
oleo decoquito, deinde metallica multis diebus cum aceto ma-
cerata inycito.

Emplastrum

Emplastrum ex metallicis.

Chalcitidis uncia, misyos sextans, squamæ aris, thuris, singulorum quadrans, colophonice sextans, galbani sesquiuncia, ceræ libra, olei uncia quindecim, aceti quantum sufficit.

Harmentia fracturis consecrata.

Chalcitidis triens, squamæ aris uncia duæ cum dimidia, aris combusti uncia, thuris sextans, olei, aceti, singulorum libra. Coquito metallica in aceto & oleo, donec digitos intingentes non coinquent, deinde thus incito,

Melæne Serapionis.

Spumæ argenti libra, ceræ septunx, guttæ ammoniaci uncia tres cum dimidia, galbani, ferruginis singulorum denarij nouem, colophonice septunx, myrrhæ denarius, olei hemina una cum dimidia. coquito spumam argenti cum oleo, tantisper dum digitos non inficiet; deinde immitte reliqua.

Anicetos glutinans, dissipans, squamas remouens, & incuruationibus articulorum succurrens.

Baccarum lauri, iridis aridæ, thuris, singulorū denarios sexaginta, aris cremati uiginti, nitri salis, ammoniaci thymiamatis, uniuscuiusq; denarios uiginti, pyrethri, herbæ pedicularis, seminis roris marini, grani cnidij, sinapis, piperis, stercoris columbini, aristolochiæ, cymini, æruginis, cyperi, seminis erucæ, cuiuslibet denarios octo, aceti heminae duodecim. Contere sub ardentissimo caniculæ æstu, donec acetum euanescat. deinde infunde decocti aridarum ficuū crassissimi dodrantem, quibus confusis pangito pastillos, & arefacito. Quum usus incidit, pastillorū sextans aceto subactus, resinæ quadrans, ceræ Tyrrhenicæ, olei, singulorū sextans miscetur.

Emplastrum ex loliis.

Picis libra, resinæ piceæ dodrans, ceræ Tyrrhenicæ quintunx, olei quadrans, bituminis attaminati sextans, loleaceæ farina sextarius, aceti quantum satis est.

Emplastrum ex succo fycamini.

Spumæ argenti, picis aridæ, seui taurini, singulorū bes.

Yy 5

resinæ

resinæ terebinthinæ quadrans, ceræ quincunx, æruginis rasilis, opopanacis, galbani, singulorū uncia, olei rhicinini uel susini, uel admodū uetusti hemina, picis liquidæ tantundē, liquoris sicamini, cuius fructus sycomora appellatur, hemina.

Emplastrum dichromon, a duplici colore appellatum.

Aeris cremati, aluminis scissi, guttæ ammoniaci thymiamatis, singulorum uncia, ceræ, Colophonice, seui porcini, uniuscuiusq; libra, aceti quantum sufficit.

Indica ad nomas, & hamoptoicos.

Ceræ, resinæ frictæ, picis aridæ, bituminis liquidi, zacynthiæ, singulorum libra, cerussæ, chalcitidis, misyos, atramenti metallici, aluminis scissi & rotundi, gallæ omphacitidis, malicorij, cuiuslibet uncia sex, aceti quantum satis est.

Emplastrum ex cinere aspidum, scrophulas & podagras dissipans.

Resinæ terebinthinæ, lapidis hæmatitis, bituminis Iudæi, singulorū denarios trecentos sexaginta, ceræ, baccarum lauri, guttæ ammoniaci thymiamatis, spumæ nitri, adipis uittulini denarios trecentos quadraginta, lapidis pyritis, calcis aqua non extinctæ, cineris aspidum, uniuscuiusq; denarij centum quadraginta, olei ueteris heminas duas, pharmaco refrigerato cinerem insperge. Præparatur autem & absque cinere, propterea quod implacide ipsum ferunt aliqui, & nihilo minus lapis etiam Asius efficitur.

Lexena desiccans & discentiens.

Guttæ ammoniacæ thymiamatis, plumbaginis, singulorum denarij centum, sinapi denarij octo, radicis chamæleonis sedecim, colophonice centum, squamæ æris, lanariæ radicis, cuiuslibet denarij quinq; euphorbij & æruginis, uniuscuiusq; octo, aristolochiæ sedecim, pyrethri octo, olei ueteris heminam, & raphanini quantum sufficit.

Lexena in superficiem euocans, & humores euacuans.

Atramenti sutorij sextans, auripigmenti uncia, hellebori nigri,

nigri, thoracum cantharidum, singulorum sesquidenarius, sandarachæ quadrans, ceræ sesquilibra, resina frictæ libra, olei hemina duæ.

Macedonicum.

Ceræ, colophonie, picis, seu taurini, lachrymæ thuris, æquis portionibus eliquatis, & ab igne sublatis, lachryma thuris inspergitur.

Pilula ad feruores.

Cerussæ, spumæ argenti, calcis aqua non extinctæ, singulorum quadrans, ceræ sescuncia, bernicarij, rosacei, uniuscuiusq; uncia, liquefacta aridis infusa in orbiculos digeruntur. Vbi utendum est, olei uncias sex cum duabus uncis ceræ eliquato, & inijce medicamento unciam, & rudicula agitato, refrigeratum cum aquæ dodrante contundito. ego rosacei quoque trientem admisceo.

Ex rubrica pictorum, inflammationem arcens, tum ultro, tum in iudicio tortis feruens.

Ochræ Atticæ libræ duæ, cretæ libra, spumæ argenti bes, ceræ uino trita, colophonie, picis, resina picea singulorum libra, resina terebinthina besis, olei libræ duæ. Hoc modo resoluuntur: ceræ libra, olei ueteris libræ tres, medicamento libra, uino diluuntur.

Emplastrum ex liquore cedri, conglutinans, discutiens, & exterens.

Ceræ, picis aridæ, uniuscuiusq; libra, colophonie bes, liquoris cedri selibra, eliquata simul, donec à sordibus, ne manus inficiant, perpurgentur, elixabis. Aliud emolliendi uinis habens: Ceræ, picis singulorum bes, colophonie denarij uiginti quinque, propoleos denarij septendecim, liquoris cedri denarij uiginti.

Emplastrum ex pumice cicatricem inducens.

Myrti lib. duæ, ceræ libra, pumicis cremati et uino extincti denarij sex, squamæ stomomatis tantundem, aris combusti, cretæ

creta cimolia, singulorum denarij quinq; , supra linteolum conceptum, & spongiam ex aqua accommodantur.

Emplastrum Paula, strumis & bubonibus destinatum:

Habet cerae, colophoniae, nitri uniuscuiusq; libram.

Emplastrum ex nitro, ad carbunculos.

Nitri tostii quadrans, cerae, olei, colophoniae, singulorum sesquidenarius, succi Cyrenaici aut Medici denarij decem, imponuntur penicillo uulnerario soluta.

Emplastrum dianemonis.

Anemone unguibus detractis sextans, cerae quincunx, olei triens, resinae unciae quinque cum dimidia, colophoniae sesquilibra.

Emplastrum Macherionis uiride, ischiaadicis, articulorum obstructionibus, & abscessibus efficax.

Opopanacis, galbani, aeruginis, myrrhae, ireos, guttae ammoniaci thymiamatis, aristolochiae, uniuscuiusq; unciae, resinae terebinthinae, cerae, olei omphacini, singulorum septunx.

Aliud uiride simplex.

Resinae librae tres, cerae libra, ferruginis rasilis selibra, thuris denarij uiginti quinque, aceti quantum sufficit.

Aliud uiride, ad humida, & superexcrecentias carnis.

Colophoniae unciae sex, aeruginis rase unciae una & dimidia, cerae sextans, salis Cappadocici uncia, rosacei sextans, aceti quod satis est.

Peganera ad pleureticos.

Rutae uiridis libra, butyri sesquilibra, terebinthinae unciae quindecim, hyssopi medicamenti tantundem, opopanacis, galbani singulorum quadrans, anetibi libra.

Emplastrum ex lixiuio, coxendice, articulariis, tumoreque laxo infectatis idoneum.

Cerae, olei ueteris, lixiui primū destillati, singulorum libra, resinae frigidae, nitri Alexandrini, nitri candidi, resinae terebinthinae, uniuscuiusq; selibra. Nitri utrunq; genus in lixiuio eliquato.

Emplastrū

LIBER SEPTIMVS. 77

Emplastrum ex nitro, ad abscessus, scirrhus, & tumores.

Olei antiqui, cera, spuma, nitri, saponis, lixiuij, cuiusque libra, resina terebinthinae uncia sex, galbani, propoleos, guttae ammoniaci thymiamatis, singulorum uncia. Preparato perinde atq; proximum.

Emplastrum ex sale.

Cerae triens, olei selibra, salis communis triens, spuma nitri tantundem, cerussae bes, aceti sextans: ad lauationem aridorum. Aliter: Salis communis, nitri, singulorum triens, cera, olei ueteris, uniuscuiusque uncia sex, aqua marinae quantum satis est.

Emplastrum ex petasone, tophis expediens.

Pernae porcinae ueteris pinguis, ammoniaci thymiamatis, casei antiqui bouilli aut caprini, adipis taurini, apochymatis, quod est, ramenti nauigij, singulorum libra, medullae cerui beasis, aescypi ceroti quadrans, cyprini uncia sex, uini Aegyptij quantum satis est.

Emplastrum ex cinnabari, ad tophos, & alios omnis generis induratos tumores. Obtinuit autem appellationem Pamphates.

Spumae argenti libra, olei ueteris sextarius, squamae aeris uncia, aeris cremati tantundem, cinnabaris scrupuli duodeviginti, magnitis uiui uncia, lapidis Phrygij denary sex, lapidis pyritis, cadmia, aeruginis rasae, thuris, singulorum uncia, diphyrgis sextans, aloes uncia una & dimidia, galbani sesqui uncia, lapidis onitis Scythici scrupuli octodecim, lapidis hematitidis uncia, propoleos libra, & grammata uiginti octo: cera uncia septendecim, lapidis perdicitis uncia, in alio per dicitati habetur: betonicae uncia, & dioboli octo, gentianae uncia, aristolochiae longae & rotundae denarij quatuor, chamaeleonis nigri uncia, dictamni scrupuli quadraginta duo, resinae siccae libra, adipis struthocameli libra. Lapides cum spuma argenti conterito, adiciens floris salis libras duas particulatim, quo ad totum moletur.

Emplastrum.

Emplastrum ex auellanis, ad tophos articulorum
experientia comprobatum.

Lixiuū quod primū destillauerit fex, nucum Ponticā-
rum interanei sextans, spumæ nitri uncia sex, olei uetusti li-
bra, saponis Gallici triens, mellis bes, ouorum albuminum
paria tria, ceræ dextans, resinæ terebinthina sextans, lixi-
uio protofacto in leuorem conteruntur.

Diatrypænes ceratum, podagræ doloribus sedandis
admirandum.

Martio mense diem quintum agente, in domo subteranea,
olei communis sextarios duos in cacabū inijcito, lignisq; ex
uitibus coquito, & quādo ebullierit, turpænæ marini piscis
libram immittito, & asphalacis animantis, quod quidā mas-
damudan appellant, sanguinis trientem. hæc unā usq; dum
carnes piscis dissoluantur, elixato, uel donec torrescant: dein
extractis illis, olei & ceræ iustam portionem usq; ad spissitu-
dinem infundito, ut mollißimum conficiatur cerotum, quod
linteolo superinductum accommodabis.

Emplastrum ex lotio muli podagricum.

Habet lotij muli masculi sextarios quatuor, spumæ argen-
ti libras duas, olei ueteris mystrum, trita plurimum omnia,
donec strigmentosa reddantur, quoad nullum ex coctura res-
crementum cera secernatur, decoquito.

Emplastrum ex lapidis Afii flore, Phylagrii,
ad scirrhus.

Radiciß peucedani, floris lapidis Afij, si is ad manum non
sit, salis, ammoniaci thymiamatis, lanæ succidæ cōbustæ, cuius-
iusq; unciam, aristolochiæ rotundæ, pumicis canini sterco-
ris, æruginis rase, squamæ aris, misyos, castorij, singulorum
grammata octodecim, myrrhæ uncias treis, aceti acerrimi
mi tantundem, ceræ uncias duodecim & dimidiam, resinæ
piceæ, picis brutiæ, cuiusq; uncias octodecim cum dimidia,
dioboli sex, olei ueteris & aceti acerrimi quantum satis est.

Bx

Ex eodem, Galeni.

Cera, resina terebinthina, uniuscuiusque libra, lapidis
Asij, mannae, singulorum quadrans, cyprini sextans, aquae
lixivia quod sufficit.

Emplastrum ex flore salis, arthriticis in decli-
natione idoneum.

Resina terebinthina, resina fricta, picea, cera, uniuscu-
iusque libram, picis arida, aluminis fisci, salis floris, singulo-
rum libram dimidiam, coquito in diplomate.

Emplastrum huiusmodi carnem nutriendi

Rosacei, resina terebinthina, mellis, singulorum sextans,
cerussa, butyri, uniuscuiusque uncia, alij etiam thuris admis-
cent unciam.

Italicum sordes expurgans, & incarnans.

Brinici (caprifici inquam, hoc est ficus sylvestris fructus)
tenerum corticem in oleo decoctum porrice, & eliquato in
oleo, cerae rubrae quantum satis est, penicillo vulnerario utere.

Entaticum, quod est intensorium.

Satyrii, genitalis ceruini, caudae scinchi, singulorum de-
narii bini, seminis eruae, pyrethri, seminis roris marini, ce-
rae, cuiuslibet denarii quatuor, resina terebinthina denarius,
ova passerum trogloditarum tria, stelliones tres, olei laurini
uel irini quantum satis est. Macerantur uiuentes in aceto stel-
liones, diebus quadraginta uase in fimo sepulto.

Chryse, enemos.

Thuris, aluminis fisci, singulorum unciae duae, colopbo-
niae, resinae, cuiuslibet libra, olei unciae tres, auripigmenti un-
ciae duae, oxelaei quantum sufficit.

Catagmaticum, hoc est fracturis dicatum, Oribasii.

Picis bruticae libra cum triente, spumae argenti tantundem,
thuris bes, resina terebinthinae quincunx, adipis taurini li-
bra & triēs, galbani, opopanacis, cuiusque uncia, cerae triens,
olei ueteris libra, aceti quincunx.

Catagmas

Catagmatice ad fracturas cum uulnere, & sine uulnere, ex
monumentis Heracliti.

Picis aridæ mystrum, spumæ argenti tantundem, mannæ
mystrum dimidiū, adipis uitulini mystrum unum, ceræ Tyr
rhenicæ uncia uigintisex, opopanacis denarij octo, æruginis
rasis, Cyprij æris, singulorū minas quinque, & decima eius
pars, resinæ terebinthinæ mystrum unum cum dimidio, &
quinta eius portio, æris uncia, rbicinini aut ueteris olei hemis
na, aceti hemina dimidia.

Liquidi hyssopi medicamenti præparatio.

Meliloti triens, cardamomi sextans, lanæ admodum sor
dida uncia sex, macerata in uini sextarijs duob. per tridū
coquito, donec pusillum relinquatur. his exemptis, uino ad
misceatur olei quadrans, & denuò usque ad maximæ partis
consumptionē elixetur, uino q; etiam tunc addatur colopho
nicæ dextans, terebinthinæ tantundem. Sunt qui ceræ quoque
uncias decem admisceant, & hyssopi herbe uncia alys cons
coquunt. Alij lanas uino abluunt, desiccatis q; uinum cum sor
dibus, quas etiam Pinon appellant, adiiciunt. Vbi utendum
est, ex eo uncias treis injciunt, & reliqua quemadmodum di
ctum est.

De ceræ modo ad oleum.

Si ungenta, quæ eo quòd lassitudinem demulcent, acopa
uocantur, instruere uolueris, olei quadruplū ceræ admisceas.
sin autem liquidum ceratum, quemadmodū in fracturis ador
namus, duplum. Quod si medicamentum emplastri specie ma
chinari constituerimus, æquis portionibus ceram & oleum
confundemus, si aer ambiens moderatus extiterit. Si uerò ce
ra uetus, aut squallida, & aer frigidus existat, oleum quanti
tate ceram parum excedat: quemadmodum & quando cera
pinguior, et qui circumfunditur aer calidus fuerit, cera non
nihil olei quantitatem exuperet. Esto autem momentum illud,
duodecima medij ad utrūq; portio, undecim enim uerò, uel tre
decim olei uncias cum ceræ libra permiscebis.

Ex

Ex monumentis Antylli, de elixatione medicaminum,
quæ emplastris immittuntur.

In medicamentorum decoctionibus spuma argenti in oleo
elixetur. Oportet autem lauiatam rursus cum oleo, ad sor-
dium consistentiam conterere: deinde clementi igne continē-
ter agitando, decoquere. Principio igitur turget, et bullis ef-
feruescit: imminente uerò iam absoluta decoctione, colorem
feculentiorē præfert. Mensuram autem decoctionis esse
scias, quum tumor et recrementa quæ ex ebullitione separan-
tur, cessauerint. Plumbago spumæ argenti modo elixetur. finis
coquendi erit, non solum dum ex coctura recrementi nihil de-
cedit, sed quum ex igneo colore in uermiculum & ualde flo-
ridum commutatur. Aes crematū ad decoquendum non intra
initia statim inijcitur, sed emplastro iam semidecocto. Modus
aut decoctionis est, quū, si non admodū exiguum imponatur,
colore ipsius induit, atq; rubrum reddit emplastrū. Sori atq;
diphryges, & ipsa cū decoctione immittuntur. finis uerò co-
quendi, diphrygis quidem, quemadmodū & squamæ, dū cæ-
tera colore superat: sori aut nullum peculiarem coquendi mo-
dum habet, sed omnibus communē, dū uidelicet inspissetur, et
emplastrum digitos non inquinet. Chalcitis more aris deco-
quitur, et moderatur eius decoctio, dū aliquantisper rubicun-
dius et puniceum magis efficitur emplastrū. Flos aris instar
aris decoquitur, & rationem decoquendi cæteris commu-
nem obtinet. Atramentum sutorium, mediæ decoctio-
ni immittitur. Decoctum autem acriorem inducit emplastro
colorem: & nisi alia resistent, acrius adhuc reddit empla-
strum. Myrsi ultimo quidem & perfectæ decoctioni immitti-
tur, proprium autem decoquendi modum non habet. Auripig-
mentū & sandaracha in fine decoctionis inijciuntur. Plum-
bum uerò deustum mediæ elixationi immiscetur. Cerussa
in candida emplastra postremò inditur: conseruat enim eo
pacto dolorem, & uehementius albescit. In nigra uerò con-

Z z

festina

festim à principio: decocta enim, multo nigrior euadit.

Aerugo in emplastra uiridia post decoctionem inseritur, in quibusdam uerò neque ab initio statim in lebetem inijcitur, sed cum aceto friatæ & manenti in pila affunduntur cætera, in melinis autem semicocta iam compositione inseritur. Iustam quidem nacta decoctionem, giluum repræsentat colorem. In his autem quæ geminam speciem & bicolorem præferunt, diprosopa & dichroma uocata, post principia statim coquimus rubiginem. postea enim per decoctionem, primum quidem melinum inducit bicipitem factum, postremo autem uermiculum colorem induit.

Alumen magna ex parte post decoctionem inditur, proprium tamen decoquendi modum nullum habet.

Rubrica, quam minium dicunt, in fine, cadmia & pompholyx initio, decoctionibus induntur.

Salia & nitrum mediæ decoctioni, sulphur extremæ tandem inferuntur. Cæterum elixatio eius nigricat emplastra.

Terra quæuis, & lapides cuncti magnâ ex parte in fine decoctionis imponuntur. Pumex item & cõchulæ crematæ.

Oleum siquidem ab initio immittatur resinæ aut pici liquidæ, non inspissetur emplastrum. Postquam igitur decocta in spissata cõstiterint, adijciendum est oleum, reliquas uerò pinguedines insulsas circa mediam decoctionem immittere expedit. Unguentum trinum, decoctionem quidem admittit, cyprinum autem & rosaceum minus, cætera uerò nullam: quocirca in fine decoctionis immittenda sunt. Cera sola priuatim non decoquitur, comburitur etenim, neque cum resina liquida, aut picce liquida. haud enim inspissescit, sed superinijcitur uel oleo puro, uel cum oleoso quopiam ex metallicis decocto, uel resinæ aut pici præelixatæ, & citius alijs quæ possunt inferi, coit.

Resina arida cum cera inditur, liquida uerò ante alia omnia per se decoquitur, nisi admodum exiguum eius momentum accipiatur.

Pix

Pix præ alijs cunctis immittitur: modus autem decoctionis est, liquidæ quidem, dum spissescit: sicca uerò, maxima ex parte, dum inter coquendum nihil amplius neque in bullas at tollitur, neq; turgescit.

Apochyma læuigatum, cribroq; à suis superuacaneis sequestratum, & deniq; decoctū, emplastro inditur: quod si fuerit molle, cum oleo diluitur. Cæterum prior ratio exactior est, propterea quòd in altera pondus non obseruatur.

Bitumen quoque principio ad decoquendum immittitur, neque in leuiorem conterendum est, quoniam scabredines fici et oliuarum acinis similes continet: sed in crassas aded partes confringere, cumq; aceto decoquere, non commouendo interim, quousque non amplius ampullarum modo turgeat, expedit. Nos uerò, inquit Timocrates, in oleo elixantes, uoti compotes facti sumus.

Propolis quoque emollienda & elixanda est, neutiquam enim à decoctione diffunditur. Quod si emplastrum ceram quoq; accipiat, oportet unà cum cera propolim galbani more contusam immittere.

Gutta ammoniaci circiter mediam decoctionem immittitur. Oportet aut hanc læuigatā, si fieri potest, et tenuē inspergere: sin minus, cū liquore quopiā contritā inijcere: si cruentis dicatum fuerit emplastrum, cum aceto aut uino fistulis aut strumis, omnino cum aceto: si uerò molle futurum sit, ut sunt quæ sedi adaptantur, cum aqua, deinde strigmenti crassitudine inducta, alijs refrigeratis ne ebulliat infundere.

Admiscetur opopanax multo serius quàm ammoniacum, omnino autē modica decoctione eget. Est uerò etiam ille cum uino aceto ue antea læuigandus.

Galbanum nullam decoctionem sustinet, sed postquam ab emplastro nil recrementi per cocturā secesserit, ab igne sublato, quo inspissetur, subactum inijatur.

Sagapenum in mortario contunditur, & ubi teneritudinem assumpserit, sublatum ab igne cum emplastro mollicatur.

Aloe emplastris post decoctionem inditur.

Succus papaveris pridie in aquae momento irrigatur, deinde in pila conteritur, mox emplastrum superinfunditur.

Thapsia postremo inseritur, uel liquore aliquo diluitur.

Bdellium quoque laeuigatum emplastro ab igne remoto inditur. at si in pingue admodum incidat, ut laeuigari nequeat, sagapeni more contusum, & in emplastri formam redactum, cum emplastro post elixationem eliquabimus.

Thuris lachryma pariter et manna decoctioni iam absolute insperguntur, strigmenti instar, cum melle pauculo, acetone, aut aqua, aut uino inspissata, si humorem partici pat emplastrum.

Myrrha perfectae decoctioni inditur.

Nulla neque seminum, neque radicum, neque herbarum decoctionem ullam sustinent: qua de causa laeuigatis, & in pila adhuc depositis, liquida infunduntur.

De malagmatis & epithematis. Cap. 18.

EX medicaminibus quae emolliendi uim habent, & ob id malagmata dicuntur, alia quidem medijs regionibus corporis imponuntur, diuturno iam tempore inflammatis, uel induratis, uel aestu feruentibus, uel perfrictione confluentibus, uel defluxione infestatis: alia articulis oppilatis, uel nervis algore uexatis, uel alijs etiam corporis partibus scirrhis oppressis competunt. De his itaque capite de emplastris memoratum est, & de acopis fusius enumerabuntur. Ex his autem quae medijs corporis partibus congruunt (proprie epithemata nuncupantur) quae sane stomacho & iocinori adhibentur, qualiacumque illa fuerint, roborantem potentiam ex adstringentibus requirunt. absque his enim uitae periculum est, quoniam haec membra uitae communia instrumenta sint: quapropter medicamenta huiusmodi, ex aromatis potissimum componuntur. Stomacho igitur pro suo munere non coquenti, imbecillo, inflatio

inflatione uel laboranti, ea quæ ex seminibus & meliloto, aloe, absinthio, sampsucho, nardo & mastiche denique constituntur malagmata, applicanda sunt. Iocinori uero, quæ ex glande unguentaria, gutta ammoniacæ, adipe, & chamæ melino confiunt. Lienem autem, quæ ex calce aqua non extinguitur, auripigmento, cappari, salicibus, cardamomo, ærugine, gutta ammoniacæ, & aceto contexuntur, conueniunt. His uero qui fluxu alui impetuntur, ex cœnanthe, alumine, melino, & alijs astringentibus conflata, quæ per abusionem etiã malagmata uulgo nuncupant, etiam si contraria his quæ emolliendi uim habent potentia constent. Quibus aut uiscera æstu flagent, quemadmodum in febribus accidit ardentibus, his malagmata et epithemata è croco, rosaceo succo, seminis lini, aut sereos, aut herbe sanguinalis, adipe suillo et spuma argenti conducunt. Refrigeratis porro, quæ è succo balsami, folio, cassia, pipere conficiuntur. Pectoris autem, in sanguine nempe excretionibus, astringentia et desiccantia, quæ ex alumine, salice, et bitumine contexuntur. In tabe uero, ex bacis lauri, marrubio, cardamomo, lixiuiq; conflata expediunt.

Malagma ex fertula campana.

Accipit croci, nardi Gallicæ, cyperi, cardamomi, ireos, myrrhæ, singulorum sextantem, meliloti libram, ammoniaci thymiamatis libram, ceræ libras treis, resinæ terebinthinæ libram, olei cyprini libras tres, gleucini libras duas, bdellij uncias sex, quidam etiam cypheos sextantem admiscent, uini quantum satis est.

Poliarchion, ex libris de compositione medicamentorum secundum locos Galeni.

Ceræ, resinæ terebinthinæ, bdellij, ammoniaci thymiamatis, cardamomi, cyperi, singulorum mystrum, meliloti, amomi, nardi Indicæ, croci, myrrhæ, thuris, ligni cinnamomi, uniuscuiusque denarij uiginti quinq; , olei cyprini hemina, uini Italici quantum sufficit. Præpara, & utere, interdum meraco, interdum cerato, oleo cyprino dissoluto.

ZZ 3

Aliud

Aliud Polyarchium.

Ligni balsami, costi, ireos, cyperi, myrrhæ, rotundi odori
rati iunci floris, cardamomi, thuris, spicæ nardi, mastiches,
styracis, bdellij, amomi folij, croci, cassiæ, pyrethri, aristolo-
chia longæ, singulorum uncia, ammoniaci thymiamatis un-
cia una cum dimidia, resinæ frictæ quadrans, terebinthinæ
pondo, medullæ ceruinæ sextans, ceræ dupondo, succi balsa-
mi uncia sex, uini uncia octo.

Malagma Philagrianum.

Croci sesquuncia, aloes, ammoniaci thymiamatis, bdellij,
styracis, uniuscuiusq; uncia, adipis asserini uncia duæ, hyss-
sopi phar maci uncia quatuor, palmularum duæ, ceræ libra,
nardi selibra, amelini uncia sex, uini quantum ad aridarum
specierum eliquationem satis est, macerata per triduum, pala-
meaq; rudicula comouetur ter die; deinde oleo simul decocta,
secundo quidem die cardamomum aqua pridie maceratum,
tertio autem crocus uino: sunt qui croco alium myrrhæ quin-
cuncem adijciunt. Vbi hæc percolata fuerint, oleum synce-
rum reseruatur. sex specierum quælibet in pastillos confor-
mata, desiccataq; id quod crocomagma appellatur, repræ-
sentat.

Mendesium.

Dicitur est mendesium, quod in Aegypto, ubi pascitur mædes,
inueniatur. Recipit aut olei balanini libras decem (in alio habe-
tur, sextarios decem) myrrhæ, cassiæ fistulæ singulorum qua-
drantem, resinæ terebinthinæ librâ (aliâs sextarios decem) cinna-
momi quadrantem. Illud non decoquitur, sed iniectus aridis agita-
tur ad dies 60. deinde terebinthina eliquata in partem olei mit-
titur, mox denuo aloes dies 7. mouetur, et ita reseruatur.

Martianum.

Mastiches, ceræ, styracis, singulorum quadrans, hyssopi
medicamenti semuncia, opobalsami sesquuncia, nardini, gleu-
cini, olei omphacini, uniuscuiusq; quadrans, medullæ cerui-
næ sesquuncia, terebinthinæ uncia.

Diomphacos

Diomphacos iniectio prima.

Aspalathi, rudiculæ palmularū, meliloti, iridis, iunci rotundi odorati floris, xylobalsami, rosarum aridarum, calami odorati, singulorum quadrans (olei omphacini libræ decem, succi uuæ acerbæ sextarij decem.

Iniectio secunda, ex caryophyllo.

Guttæ ammoniacæ, spicæ nardi, costi, caryophylli, cassiæ, cassami, uniuscuiusq; quadrans (in alio legitur, arnabi quadrans) uini quantum satis est.

Iniectio tertia.

Thuris ammoniaci thymiamatis, styracis, bdellij, myrrhæ, mastiches, singulorū quadrans, uini quātū satis est, ceræ albæ quinctū, opobalsami uncia 6. quidā habēt uncias octo. Primæ iniectionis species succo uuæ acerbæ et oleo pridie maceratur: secundæ uerò, in altera pelui, minimè capaci, in uino Aminæo, aut alio ueteri & odorato, moueturq; qualibet die rudicula palmea: tertiæ ad tridū, à quo tēpore in cacabo splendido species primæ iniectionis, tātiſper dū pusillū succi uuæ acerbæ relinquatur, decoquito: deinde alterius iniectionis species confestim cū uino immitte. melius uerò, si prius alijs sublatiſ, sic oleo puro inijciatur, et ad perexiguas uini reliquias decoquantur, ne cōburatur oleum. deposita ab igne colabis, et rursum tertiæ embolas species oleo non impuro inijcito, in pila prius cum uino ueluti diximus, dilutas excepto styrace: is enim iniectus cum alijs prōpte soluitur. Coquito carbonib. haudenus dum tibi bene habere uideatur, remotaq; ab igne, refrigerari finito: postera autem die accuratè exemptis ex oleo, & calfactis abunde super ignem ceram indito, depositaq; rudicula agitato. Vbi refrige, rata fuerint, opobalsamū inijcito, et uitreis uasculis reponito.

Gleucinum iniectio:

Olei sextarios decē, musti Aminæi sextarios sex, aspalathi quadrantē, rudiculæ palmæ uncias sex, floris rotundi iunci odorati tantundem, meliloti trientē, rosarum uncia, myrrhæ quadrantē, foliorū lauri sextantē, arboris thuris, xylobalsa-

ZZ 4 mi,

mi, enulæ campanæ, singulorum uncias sex, aristolochiæ longæ, ireos, cuiusq; quadrantem, simul in musto macerabis.

Iniectio secunda.

Celticæ nardi triens, balsami fructus sextans, cyperi, cassiæ, spicæ nardi, asari, amomi, costi, sampsuchi, singulorum quadrans, calami odorati, caryophyllorū, folij, uniuscuiusq; uncia, cardamomi triēs. Balsamū in uino fragrāte irrigatur.

Iniectio tertia.

Mastiches uncias quatuor, myrrhæ troglodytidis, bdellij, singulorum uncias duas, ladani uncias treis, styracis liquidi, thuris masculi, cuiuslibet uncias quatuor, opobalsami uncias sex, nonnulli admiscunt etiam croci uncias duas. Confice quæ admodum & diomphacos, excepta cera. Hic autem oportet diebus septem duarum iniectionum species macerari.

Nardus Cizicine, Iniectio prima.

Olei primatis sextarios decem, aspalathi, cypæarum, inulæ campanæ, ireos, xylobalsami, mali terræ, cardamomi, rotundi iunci odorati floris, singulorum uncias sex, sampsuchi trientem, herbæ Sabinæ sextantem, quidam adijciunt his calami quoq; odorati sextantem: hæc in uini odorati sextarijs quatuor irrigato.

Iniectio secunda.

Cassia, cassami, arnabo, singulorum sextans, spicæ nardi quadrās, caryophyllorum uncia, costi, amomi, cuiuslibet sextans. quidam etiam nardi Gallicæ uncias duas adhibent; atq; hæc quidem uino excipiuntur.

Iniectio tertia.

Myrrhæ troglodytidis, aloes, thuris, singulorū sextās, styracis quadrans, mastiches triens, opobalsami uncia sex: sunt uero qui etiam croci uino dissoluti unciam admisceant. Preparato etiam illam, quemadmodum dictum est.

Decamyron.

Spicæ nardi, folij, euphorbij, piperis, costi, adarce, singulorum uncia, mastiches uncia una & dimidia, opobalsami uncia

Unciæ sex, nardini libra, ceræ tripondo.

Pentamyron.

Styracis uncia, mastiches sextans, ceræ albæ quadrans, opopanacis tantundem, nardi quincunx.

Odorificum.

Croci, aloes, mastiches, absinthij, styracis, cenanthes, cassami, caryophylli, singulorum quadrantem, nardi libram, ceræ tantundem, melini uncias sex, dactylos palmarum duodecim, uini quantum opus est.

Baium malagma.

Cardamomi, cassiæ, cenanthes, nardi Gallicæ, balaustiorum, propoleos, singulorum scrupuli octo, sabinae, cassami, amomi, cuiusq; scrupuli sex, floris rotundi iunci odorati dioboli octodecim, iridis scrupuli quatuor, caryophylli sesquiescrupulus, thymiamatis crinati sextans, thuris, myrrhæ, cuiusq; uncia, ladani selibra, bdelly, mastiches, aloes, nardi, olei leniscini, cuiuslibet semuncia, resinæ acernæ, piceæ, terebinthinae, cuiuslibet quadrans, opobalsami uncia, ammoniaci thymiamatis dioboli sex, ceræ uncia sex, liquida cenanthino dissoluito, & arida contusa: aliàs etiam piperis scrupulos duodeuiginti reperio. Sunt item qui moschi scrupulum unum adyiciunt.

Galenium.

Croci uncia dimidia, aloes uncia, mastiches quadrans, seminis absinthij dioboli octo, cenanthes tantundem, palmulæ grandiores tres, ceræ quadrans, olei melini uncia sex.

Erythrium.

Styracis quincunx, malorum cotoneorum uncia uiginti, masuchæ uel masuaphij, croci, singulorum denarij decem, psicharum, cypheos, singulorum denarij quinq;, cenanthes uncia duæ cū dimidia, cassami, absinthij, singulorum denarij decem, caryophylli dioboli quindecim, ammoniaci thymiamatis grammata decem, opobalsami grammata sex cum dimidio,

Zz

5

nardi

730 PAVLI ÆGINETÆ

nardi quincunx, colophonie, gleucini, melini, uniuscuiusq; de
xtans, rosacei denarij decem, propoleos quincunx, resinæ te-
rebinthinæ dextans, mellis cochliaria decem, folij denarij de-
cem, spicæ nardi tantundem, ceræ uncia septem & semis, ui-
no Phalerno uel Aminao eliquabis.

Malagma Nili, spleni consecratum, & ad omnem duritiem.

Ceræ libra, ammoniaci thymiamatis libra, olei cyprini
tantundem, croci uncia dimidia, allij uerò uncia, aceti quan-
tum satis est.

Malagma citrinum.

Ceræ, colophonie, uniuscuiusq; libra, gutta ammoniaci
thymiamatis, auripigmenti, calcis, aluminis, aceti, singulo-
rum cyathi o&o, arida contere aceto.

Malagma Curei.

Habet picis siccae libram, ceræ, resinæ piceæ, ammoniaci
thymiamatis, nitri, baccharum lauri aridarū, seu taurini sin-
gulorum libras duas, farine fœnogræci sextarium, pollinis
tantundem, chamæleontis nigri radicis aridæ libram.

Malagma ex stercore caprino, Oribasii, lienosis, hydropicis,
& iocinoris duritia affectis.

Olei cyprini, uel olei antiquissimi libras treis, ceræ libras
duas cum semisse, merdæ caprarum, baccharum lauri decorti-
catarum, ireos Illyricæ, singulorum sextarios decem, resinæ
terebinthinæ libram, sinapis, nitri, cyperi, seminis radiculæ,
corticis radicis capparis, cuiuslibet quadrantem, colocynthi-
dis interanei sextantē, fœnogræci unciam. Arida nunc qui-
dem liquidis excipiuntur, nunc aceto macerata. Atqui si uen-
ter fluore infestetur, non adiungenda colocynthidis est.

Ex stercore, caprillo, spongium hydropicis utile.

Constat ex picis brutiæ libris duabus & dimidia, nitri li-
bra, interanei colocynthidis farctus, pyrethri, opopanax,
grani gnidij, singulorū quadrante, corticis radicis capparis,
thuris,

thuris, ireos, adipis taurini, elaterij, squamæ æris, seminis apij, lathyridum, uniuscuiusq; uncij sex, baccarum lauri sextario dimidio, fœnogræci farinæ semuncia, fellis taurini sextante, olei cyprini sextario dimidio, ceræ libra, resinæ fraxinæ libris tribus, excrementi capræ montanæ, seminis roris marini, cyperi, cardamomi, cuiuslibet uncij sex.

Ex baccis lauri.

Accipit ceræ, resinæ, picis, baccarū lauri, adipis taurini, singulorum libram, nitri, guttæ ammoniaci thymiamatis, cuiuslibet uncias sex, aceti quod satis est.

Malagma ex feminibus.

Cardamomi, cyperi, sabinae, nitri, baccarū lauri, cassiæ, meliloti, fœnogræci, nardi Gallicæ, seminis apij, sampsuchi, anisi, radicis panacis, thuris, guttæ ammoniaci thymiamatis, resinæ terebinthinæ, singulorum quadrans, mellis, ceræ, nardi, adipis tauri, uniuscuiusq; libra.

Tetri odoris pleureticum.

Resinæ piceæ libra, ceræ, rutæ uiridis, cyprini, singulorum uncia sex, sulphuris ignem non experti, opopanacis, sagapeni, cuiusq; denarij quatuor, quibusdam uero placet adiuungere galbani fescunciam.

Malagma ex sampsucho.

Ceræ libra, resinæ terebinthinæ libræ duæ, sampsuchi, baccarum lauri, fœnogræci, singulorum sextarius, nardi quantum satis est.

Malagma Apollophanis ad iocinerofos

Ceræ denarij octoginta, resinæ terebinthinæ, manna, singulorū denarij quadraginta, pila fece irini oblita contunde.

Copton ad stomachi duritiem, & iocinoris.

Propoleos selibra, styracis sextans, mastiches uncia, resinæ terebinthinæ uncia dimidia, fecis nardi quantum satis est.

Malagma ex œnanthe.

œnanthes, aloes, croci, acaciæ, aluminis fissi, rosarum aridarum, absinthij succi, gallæ, omphacij, rhoos Syriaci, manna,

mannæ, cuiusq; denarius, olei myrsinati, ceræ, singulorum libra, dactyli palmæ ingentes quinq; , uini Aminæi quantum satis est.

Antylium.

Aluminis scissi uncia dimidia, aloes uncia, mastiches diobolus, cenanthes grammata sex, omphacij grammata octo, rosarum aridarum tantundem, rhus Syriaci dioboli decem, acanthes Aegyptiæ scrupuli decem, balaustiorū grammata uiginti, gallarum dioboli quindecim, ceræ quincunx, olei melini quantum satis est.

Malagma ex acinis uinaceis.

Continet croci, sandycis, cenanthes, singulorum unciam, aluminis aridi trientem, balaustiorum, omphacij, rosarum floris, myrtorum siccorum, uniuscuiusq; sextantem, ceræ dealbatæ libram, olei melini dupondo, malorum cotoneorum trientem, dactylorū qui Nicolai dicuntur, decem, uini Aminæi quantum satis, acinorum aridorum bessem. In usu autem medicaminis quadranti ceræ unciam temperabis.

Anethina.

Anethi uiridis uncia sex, meliloti sextans, chamæmeli tantundem, capitum papaueris uiridium decem, elixorum decocti tripondo, & olei quod satis est. Quando autem consumptum fuerit decoctum, inijce adipis porcini recentis dupondo, laeuigatoq; seorsim scillæ assatæ interanei sextantem, & medullæ cerui tantundem, omnia misceto.

Ambrosia arcendis febribus.

Habet spumæ argenti libram, adipis porcini recentis uncias sex, succi seminis lini selibram, ceræ dealbatæ dodrantem, rosacei libram, mellis quadrantem, croci unciam. Nonnulli etiam lutea ouorum decem cruda adiungunt.

De Acopis, Vnguentis, Dropacibus, & Sinapimis. Cap. 19.

Copa inde dicuntur, quod præcipuè contra copos, id est **A**lasiitudinis, uerbi gratia, intensiua, hucerosa, & eius quæ

quæ ossa defatigat sensus adhibeantur. Tametsi alijs quoque compluribus affectionibus ex usu sint. nam alia quidem calfaciendi, alia uerò emolliendi facultate sunt prædita. Calorifica, ex pipere, pyrethro, semine roris marini, et id genus alijs contexta, nervorum doloribus, algoribus intensis, & ijs quæ agrè cal fieri possunt, benefaciunt. Emollientia, ad duritias, scirrhus, & articulos infarctos conferunt, quorū materiam in capite de Emplastris enumerauimus. Emollientibus uerò, quæ adarce, semine roris marini, euphorbio, grano cnidio, & consimilibus constāt, in malis diuturnioribus, & difficulter elidendis, quibus sinapismi etiam usus congruit, utimur. Acopa porrò cuncta mediā inter cerota & emplastra consistentiam habere conuenit. Vngēta autem etsi acopis respondeant, spissitudinem tamen liquidiorē quodammodo obtinent. Cæterum dropax duplicem præparationem admittit, hanc quidem emplastro, aliam uerò malagmati asimilem. Nonnulli uerò ipsum quoq; calidū illinunt, materiā autē acopis & emplastris comparē. Vsum autē cataplasmatidis præstat, iisdem languoribus quibus & sinapismus ex usu est, cū ante sinapismum, ut corpus ad sinapi præparetur idoneum, tum post sinapismū, quod affectionis reliquæ amputentur, applicatus. Conficitur autē sinapismus ex materia quidem non uaria: sed efficacissimus est, diutinis potissimū affectionibus, post dictam aliorum præsidiorū facultatem expediens. Magna cum utilitate capiti, cum primis in cephalæa, hemicrania, morbo sacro, quem Græci epilepsian uocant, uertigine, & mania adhibetur: thoraci uerò, in difficultate anhelitus, orthopnoea, tussi diuturna. In diutino uerò catarrho, capiti, & thoraci sinapismus applicandus est. Iam uerò & stomachum ipsum, & uentrem uniuersum in diuturnis eorundem languoribus sinapi oblinimus. Accommodum porrò ischiadicis, podagricisq; & singulis corporis partibus languidis & flaccescentibus, aut alijs quodammodo, ita ut uix ullo calore

lore refocillari queant, perfrigeratis est remedium. Esto autem efficaciae medicaminis finis, quum dolor insigniter afficit, liuidiorē insuper & tumidiorē carnē efficit, cūq; lotionē adhibita, pustulae clementer ebulliant. Quod si sensus etiā perierit, animaduertendū est, quoniam ita affecti, si adurantur, non sentiunt: regione delibuta quantumuis, ungento frequentius detecta. In acutis praeterea affectionibus, inexpugnabili nempe somni necessitate, grauiori ad altiore quietē impetu & catocho sinapi inducitur, principio quidē cruribus. Vbi materia radices egerit, capiti. His uerō qui frigus, quod difficulter calore uinci potest, experti sint, cruribus & inguinibus sinapismus adhibendus est. Auer sandus autem incontinenter febrientibus, hulus habentibus, & cartilaginosis, macilentioribusq; sinapismus est. comburuntur enim interdum, & denigrantur partes non carnosae, sinapi adhibito.

Acopum Bromium.

Cerae, colophoniae, resinae, singulorum libra, seui suilli triens, butyri unciae sex, althaeae, fœnograeci, seminis lini, unius cuiusq; dupondo, olei pondo, galbani unciae duae cum dimidia. Succo pariter cum oleo usq; dum maior pars consumpta sit, decocto, reliqua cum cera & galbano inijce.

Acopon Poceillum, hoc est multiplex.

Liquoris althaeae, fœnograeci, seminis lini, ruta, cymini, singulorum dupondo, medullae ceruinæ, olei ueteris, pinguedinis anserinae, opobalsami, nardi, cuiusq; pondo, cerae, colophoniae, resinae, cuiuslibet sesquipondo, euphorbij, resinae terebinthinae, opopanax, cuiusque unciae sex, castorij quadrans, herbarum ex quibus succus exprimitur, singularum libra adnectenda est. Decoque instar proximi.

Acopum Azanitra.

Seui porcini librae binæ, pinguedinis taurinae, resinae, colophoniae, hyssopi pharmaci, cerae, singulorum as, galbani quadrans.

Acopum

Acopum Basilii.

Alibææ, chamæmeli, meliloti, seminis lini, fœnogræci, singulorum sescuncia, amomi quadrans. Hæc in uini Ascaloni, aut Ciliciensis sextarijs octo, per triduum macerantur, et ad mellis usque spissitudinem elixantur, deinde liquoris libræ quinq; cum oleo ueteri, pondo librarũ quatuor cum dimidia, usq; dum liquoris medietas tantum supersit, decoquantur, & immittuntur butyri uncia sex, resina terebinthina triens, adipis anserini uncia quindecim, medullæ ceruinæ cum olei momento læuigatæ quincunx, ceræ candidæ tripondo.

Acopum Lysiponium.

Piperis, castorij, styracis, mastiches, aloes, inulæ campanæ, ireos, singulorum triens, euphorbij, costi, ammoniaci thymiamatis, myrrhæ, sampsuchi, thuris, cyperi, castiæ fistulæ, cachryos, cuiusq; quadrans, adarces, amomi, bdellij, ligni balsami, uniuscuiusq; sextans, malobathri, spicæ nardi, pyrethri, croci, singulorum uncia, succi balsami libra, nardi cyprini, leucini, cuiuslibet libræ duæ, ceræ libra.

Acopum a fœtore dysodes appellatum, ex libris de compositione medicamentorum secundum genera.

Ceræ, resina terebinthina, singulorũ denarij uigintiquatuor, galbani, guttæ ammoniaci thymiamatis, cuiuslibet denarij sex, olei hemina duæ, medullæ ceruinæ denarij octo. Vtere syncero & dissoluto. Aliud dysodes: Resina terebinthina denarij sedecim, ceræ denarij uigintiocto, cœsypi, mellis, singulorum denarij sex, medullæ ceruinæ uncia sex, guttæ ammoniaci thymiamatis, galbani, spumæ nitri, baccarũ lauri, uniuscuiusq; uncia sex, olei ueteris sextarius, uini cyathi duo. Nonnulli castorij quoq; drachmas treis adnectunt.

Acopum barbaricum ex euphorbio, coxendice dolentibus & aliis pluribus utile.

Opopanacis uncia, ceræ Tyrrhenicæ libra, resina terebinthina libræ duæ cū dimidia, galbani uncia, guttæ ammoniaci

niaci thymiamatis unciae duae, euphorbij, castorij, piperis albi, singulorum unciae duae, medullae ceruinæ unciae quatuor, cæsypii unciae quatuor, lemnestidis (est autē adarce) uncia dimidiata, olei styracini, laurini, irini, amaracini, singulorum unciae sex, olei ueteris librae duae, hedychroi unciae sex.

Pyxis acopon.

Colophoniae libra una et semis, terebinthinae bes, guttae ammoniaci thymiamatis quadrans, thuris dodrans, olei ueteris librae duae, succi seminis lini libra, lactis bouilli libra, adipis anserini unciae sex, butyri beßis, ouorum uigintiquatuor albumina, præparatum buxæ uase recondito.

Acopum ex abiete, Galeni.

Seminis abietis cocti modius Italicus, quod est sextarij duo decim, olei librae quindecim, ceræ librae quatuor, resinae strobilinae uel terebinthinae triens. Contusum abietis semen in oleo mittitur: ubi in eo diebus quadraginta permiseris, expressum porrice, atq; reliqua admisceto. Vtere contra spontaneas lasitudinum molestias, resolutiones, et articulorum perfrictiones. Quod si urgeat necessitas, coquendum est abietis semen cum oleo, permiscendo, ne cõburatur, aquæ sextarios quatuor, in podagricis scilicet, et arthriticis affectionibus. Ali ter idem: Olei heminae uiginti quinque, quod est, sextarij duo cum dimidio: fructus abietis mystrum, hoc est sesquilibra, resinae abiegnae librae tres, strobolinae uel terebinthinae tantundem, ceræ libra.

Ex alno, ad eosdem languores.

Loco fructus abietis, alni (quæ populus nigra est) fructus parem quantitatem iniiciens, et cætera eodem cum illo modo præpara.

Zosimi unguentum, ad tremores nobile.

Resina picea unciae sedecim, ceræ triens, olei uetusti libra, opopanax sextans, adarces uncia una, euphorbij tantundem, nitri triens, spumæ nitri tenerioris tantundem. Nitri, euphorbium

bium & adarcem contere cum uino, deinde liquorem panacis indito, simulq; lauigato. Seorsim uerò liquibilia cum arbusa liquefacito ut coloretur, & refrigerata excipe.

Dropax Gallus, Oribasii.

Colophoniam thus referentis, pityinam, & ligneam appellatam, in sola Italia proueniētis, apochymatis, picis aridae, ceræ, singulorum libræ quatuor, resinæ frictæ uncia quindecim, picis brutiæ libræ duæ, nitri libra, bituminis, galbani, adarces, pyrethri, uniuscuiusque uncia sex, opopanacis, euphorbij, hellebori albi, piperis, cuiuslibet triens, sulphuris ignem non experti quadrans, castorei, guttæ ammoniacæ, uuae passæ syluestris, cuiusque sextans, olei sicyonis libra, ligni balsami uncia sex. Aliter simplex: ceræ libra, picis aridae sesquilibra, brutiæ libra, resinæ piceæ sesquilibra, frictæ libra & quadrans. Loco nitro prius absterso imposito.

Sinapismi præparatio.

Ficus arida pridie aqua tepida irriganda sunt, postero die præualida exprimendo strenue laeuiganda: deinde accre sinapi, cuiusmodi Syriacum & Aegyptium est, priuatim conterendum, affuso illarum diluto, & massa confecta miscendum. Siquidem uolentius uoluerimus exulcerare, duas partes sinapis cum una ficuum temperabimus: si uerò mitius, è contrario: sin mediocriter, æquis partibus utraq; confundemus. Cæterum sinapi ante contritionem aceto dilutum, quemadmodum aliqui faciunt, inefficacius redditur. A sinapis purgatione etiam lauacri usus est, si dolor intensus, rubore uel locus suffunditur, et pustulæ oboriuntur, linteolum succo maluæ aut fœnogræci cum rosaceo irrigatum applicemus, deinde rosaceo cerato addita cerussa utemur. In dissolutis uerò, in quibus sensus oblatus est, multum diuq; aduertere oportet, ut membrum subinde retegatur & inspiciatur. admota etenim non sentientes, sæpenumero supra modum exusti sunt, & caprarum baccae cum aceto cas

AAA

taplasmatis

taplasmatibus instar illius efficaciores quam sinapi sunt, potissimum in his qui laborant coxendice.

Acopon ex atramento scriptorio rubrificans proprie, & hemicranicos potissimum, ex monumentis Alexandri.

Euphorbii, atramenti librarii, singulorum denarii quatuor, myrrhae troglodytidis, crocomagmatis, piperis albi, cuiusque quadrans, croci denarii duo, aceti quantum opus est ad haec laeviganda egregie, et ad spissitudinem strigmentorum balnearum. Atque tum illinito, a media superciliarum inchoans usque ad tempus totum, praecipue si pilis denudatus sit: postquam refrigeratum fuerit, rursum illinito: & ubi remedium belle officium suum peregerit, hominem affectum in lauacrum deducito.

Oleorum & unguentorum concinnationes diversae. Cap. 20.

Verborum & unguentorum uel oleorum, quae unguinum naturam resipiscunt, simplicia quidem sunt, quum una oleo species inditur: quae uero ex pluribus praeparantur, composita. Ex simplicibus rursum aliqua ex floribus oleo inditis constituuntur: uerbi causa, rosaceum, chamamelinum, susinum: aliqua uero ex fructibus & seminibus conflantur, quaedam ex germinibus quibusdam: exempli gratia, rutae, quae etiam cum oleo decoquuntur. Quoniam autem flores elixationem nullam admittunt, insolantur potius: uerum si ualentiores habeant odoris fragrantiam & minime euanescentem, pluribus diebus insolata, tenuioris essentiae partium, & usui multo commodiora redduntur, ueluti rosaceum & chamamelinum. Qui autem imbecilliores, promptiusque diffiantur, insolatum minus perferunt, utpote quorum uirtus promptius euanescit, quemadmodum lilium & uiola. Ex his autem quae fructus & semina constituunt, alia quidem ex ipsis integris oleo iniectis conficiuntur, puta melinum: alia uero contusis uel contritis, oleoso, quod in eis continetur, segregato, siue expressis ipsis in cochleas, uel ex aqua calente discernendi gratia, ueluti carinum, seselinum, amygdalinum, lentiscinum, laurinum, rhicinum, raphaninum,

ninū, et id genus alia. Cōposita uerò ex plantis odoratis, magna ex parte oleo cū uino, uel musto, uel aqua decoctis, et inde eisdē exemptis preparantur. cōmixtis aut oleo quibusdā succis, interdū etiā adipib. aut medullis. Ex istiusmodi quædam exacte oleosam consistentiā sortita, simpliciter unguenta uel unctiones dicuntur, ut gleucinum, nardinum, sicyonium, & cyprinum. Quæ uerò spissitudinem acoporum obtinent, ceram aut resinam, aut eiusmodi quippiam suscipientia, myracopa cognominatur: uerbi causa, decamyron, amaracinum, & eiusmodi. Atq; hæc quidem semel simulq; decoquuntur, quæ non admodum ex diuersi generis materia cōstant, quem admodum metopium, mastichinum, sicyonium: alia uerò duabus, aut tribus, aut quatuor iniectionibus: primum contumacioribus decoctis, uerbi causa, aspalatho, spathe, arbore thuris, lauro: deinde uerò aromatibus, folio, spica nardi, amomo, herba sabina: postremo succis, adipibus, & medullis: si uerò contingat, etiam cera & resinis iniectis. Balsami uerò succus nunquam decoquitur, sed post exactam decoctionē refrigerato moderatē unguento immittitur. Quin ex ipsis etiā unguentis, quædam decoctionem minimē admittunt, sed admiscuntur tantummodo, sicuti mendesium. Sin autem qui uiride unguentum facientes, ipsius sextarium ab igne sublatum, in libras quinque olei intingunt, æruginis rasæ diligenter leuigatæ unciam unam & dimidiā iniicientes, quemadmodū in cyprino et amaracino. Iam uerò simplicia quidē unguenta specierū, quæ ipsis indita sunt, uel ex quibus cōtusis cōflata sunt, uires obtinent, ut ueluti materiæ rationē contineat oleū. Quæ ex uarijs constant, uniuersa natura in calidū mutāt, nonnullæ uerò insigniter calfaciūt et emolliunt, sic ut artuū uitio quod angulosin uocāt, et obturationibus eorū congruāt: è quorum classe sunt, metopium, mendesium, marciatū: moderatius aut pētamyron, decamyron uerò uehementius est, ut summa quoq; rodat. Cæterum mediocriter calida, tenuium partium sunt, et

dolores mitigant, & maturant: quale est, susinū, amaracinū, irinum, crocinum, pholeatinum. Quædam autem præterquā quod calfaciunt, desiccant admodum & incidunt, cuiusmodi est cyprinum & sicyonium. Quædam uerò calorifica quidē satis, sed maiorem corroborandi uim obtinent, quo nomine stoma cho potissimum & uisceribus resolutis accommodata sunt: cuius farinae sunt, mastichinū, nardinum, & gleucinū. Valentius adhuc robur indit, quod ex uua acerba confectum est. Nonnullis postremò ungentis mulierculæ solius odoris gratia utuntur: uerbi causa, pholiato, spicato, cōmageno, & quæ mochelæa, id est ex musto oleoq; cōflata nomē obtinent.

Rosacei præparatio.

Rosarum rubearum detractis unguibus, & per diem noctemq; marcescentium quadrans, olei omphacini sextarius Italicus. Summa cura uasculo extrinsecus, ne diffletur, operculato, sub dio ad quadraginta dies insolato: quibus elapsis, non in pauimento, sed in tabula deponito. Quidam loco insolatus ad puteū aquæ frigidae quadraginta dies appendunt, propterea quod ex frigore amœnus ac gratus odor conseruetur. Aliqui sub terram hoc ipsum defodiunt.

Chamæmelini præparatio.

Chamæmelorum floris, sine albis folijs marcescentis per diem naturalem sextans, olei sextarius Italicus, uase raro linteolo operto, quò commodius exhalet, insolatur: idq; ad dies quadraginta, à quibus probè contectum, reponito.

Olei anethini præparatio.

Anethi uiridis, comæ arefcere incipientis unciam, olei dulcis sextarium Italicum, pari modo insolato. Confici autem potest pro temporis ratione anethinum, ubi insolatus denegatur copia: aridi nanque anethi comam cum oleo in diplomate elixantes utuntur, & chamæmelino consimiliter. Minoris uerò efficaciae hæc sunt is quæ ex uiridibus confiunt, præsertim insolatis.

Lilini

Lilini, quod alii eo quod in Sufis forsan inueniatur.
Sufinum appellant, confectio.

Foliorum liliorum candidorum cōsimili modo tabescen-
tium sextans, in Italicū olei sextarium iniectus exactè ne per-
spirent circumstringitur, & insolatur per triduum: quibus
transactis, primis floribus exemptis & proiectis, aliæ duæ
unciae per sequens triduum immittuntur, & sic reponuntur.

Sufinum lilinum ue compositum.

Olei sextarii tres, calami odorati libræ quinq;, myr-
rhæ quincunx, cardamomi libræ tres, foliorum lilij detra-
ctis unguibus marcescētium libra, cinnamomi quadrans, cro-
ci Cilicij quincunx. Præparationem uniuersam in treis in-
iectiones diducito. Primum, myrrham & calamum uino
per quinque dies macerata, ter in die agitemus: post hæc oleo
quamminimum decoquamus. Secundo, cardamomum aqua
maceratum per triduum commouebimus, pari rursum ratio-
ne cum oleo ad horam unam simul elixemus: quibus deinde
exemptis, oleo puro liliorum tertiam partem inijciamus: &
lapso iam triduo, his quoq; exemptis, tertiam liliorum aliam
partem inijcito: quam iterum post triduum exemptis ac pro-
iectis primis, ultimam liliorum tertiam partem cum croco
læuigatam immitte: transactis tribus alijs diebus oleo detra-
cto, cinnamomum contusum indito. Loco huius arnabo, uel
cassia duplum, uel carpesium inijce, & reponito.

Iaton, id est uiolaceum.

Violaceum, alij quidem purpurarum, aliqui uerò cro-
cinorum, alij albarum uolarum, unguibus detractis, folio-
rum uncias treis, in olei omphacini Italicos sextarios quin-
que inijcientes, præparant: & accuratè ne liberius euapo-
ret, undique constringentes, decem diebus insolare solent,
ter ipsa post triduum commutantes, perinde atq; lilia. ad con-
seruandum præterea pauca quadā exacte arida immittunt.

AAA : Melinū.

Melinum.

Conficitur melinum è malis cotoneis,exteriore pāniculo subactis, & cum corticibus suis in frusta concisis: deinde ipsorum uncis tribus in olei omphacini sextarios Italicos decem iniectis, & quadraginta dierum spacio insolatis.

Sesaminum.

Oleum sesaminum fit, contritis aut contusis sesamis, & per fiscellas in testulā expressis, in aqua calida oleo ipso sequestrato, & uitreis uasculis reposito.

Raphaninum.

Raphaninum quodque in Aegypto è raphanorum gracilium radicum confuso & selecto semine, cæterorum more conficitur.

Rhicinini preparatio.

Et illud cæterorum modo in Aegypto fieri consuevit ex semine rhicini, quod ab insecti similitudine croton appellatur, compari more confuso, uel læuigato.

Olei populei confectura.

Veris tempore, quando magna circa semen resinae est copia, præparatur ægininum. grana namque nigrae populi conquassata unc. quatuor, in dulcis olei sextarium immittunt, & dies quadraginta insolant, uel in cacabo tribus horis decoquunt, & ita colata reponunt.

Oleum amygdalinum.

Conficitur etiam amygdalinum prædictorū more: amygdala amara & pura contunduntur, & aqua exigua insparantur, & ceu dictum est, sequestrantur. Quidam autem conquassatorum amygdalorum sextantem in dulcis olei Italicū sextarium immissum, in lebetes elixant.

Amygdalinum quod & Metopium nuncupant.

Aegyptij huius olei inuentores, Metopium ipsum appellauerunt, eo quod galbanum accipiat. planta namq; ex qua galbanum emergit, metopium nuncupatur. Constant autem ex olei omphacini sextarijs uiginti, amygdalorum amariorū

porum libris duabus, cardamomi libra, floris rotundi, iunci odorati, calami odorati, carpobalsami, singulorum libra, myrrha, galbani, cuiusq; uncys sex, terebinthinæ libris duabus, uini perodori ad arida maceranda sextarijs quatuor, mellis Attici libris tribus. Resinam & galbanum læuigata, cum parte olei soluta alijs decoctis injiciemus, & ipsum mel: mixta uerò diligenter omnia, auferentes ab igne, dum adhuc tepidum est, colemus: spissum nanque euadit refrigeratum.

Balaninum.

Balaninum quoque oleum simili cū amygdalino ratione preparatur, ex querneis glandibus.

Carinon, id est ex iuglande.

Nuceum quoque ad balanini instar ex iuglandibus austis conficitur.

Laurini faciendi ratio.

Purum quidem laurinum consimilem faciendi rationem habet, ex bacca lauri. mixtum uerò hoc modo conficitur: maturarum oliuarum sextarius in baccarum lauri sextarios duos inditur, conteruntur omnia, et exprimuntur. Sunt qui utriusq; æquale pondus misceant.

Lentiscinum.

Lentiscinum oleum ut laurinum preparatur, ex fructu lentisci bifariam, quum per se, tū adiectis oliuis non maturis.

Mastichinum.

Mastichinum simplicissimum hoc modo paratur. Mastiches in Chio insula natæ uncia, omphacini olei sextario Italico permiscetur, & in olla decoquitur: nonnulli uerò ab sinib; & styracis, cuiuslibet unciam adijcere consueuerunt.

Mastichinum magis uarium.

Olei sextarij quinquaginta, inulæ campanæ libræ quinque, xylobalсами libræ decem, florum iunci rotundi libræ quinq; cardamomi lib. 7. mastiches lib. 5. xylomastiches lib. 5. terebinthinæ lib. tres, absinib; comæ lib. uini odorati sex

Aaa 4 tarj

tarij quinque, aquæ sextarij decem. Macerata uino res apertæ ante triduum commiscuntur oleo & aqua, & elixantur horas sex, tum: que mastiche & terebinthina injiciuntur, & exacte commixta & infrigidata depurantur, & transfusa reponuntur.

Sicyonium simplex.

Præparatur ex radice cucumeris sylvestris exiccata, uncijis duabus, in olei Italici sextarium iniectis, & in cacaabo decoctis.

Sicyonium compositum.

Olei sextarij decem, cucumeris agrestis radicis deraſæ libra, serpylli, meliloti, singulorum uncia sex, tædarum picearum pinguium, alibæ, singulorum quincunx, scolopendrij unc. sex, fœnogræci sextarij duo. Præmaceratur fœnogræcum aqua primo diem unam, deinde colatur, & immittuntur dictis cum oleo & uini sextarijs duobus: omnibusq; decoctis, adijciuntur med illæ ceruinæ cum olei momento læuigatæ unc. quatuor, adipis gallinarum totidem, ac denud colatum oleum alio uase recondito. Nec de sunt qui ipsum post decoctionem dies quadraginta insolant.

Aliud Sicyonium efficacius.

Blaterij succi sextarios treis: aristolochiæ rotundæ & longæ, styracis, inulæ campanæ, hyssopi, ireos, colocynthidis, pulegij, origani, iunci quadrans, thuris arboris, centaurij, foliorum lauri, uniuscuiusq; sextantem, olei sextarios quinque: mixta, usq; dum succi exiguum relinquatur, decoque.

Cyprinum ex monumentis Posidonij.

Olei sextarius, cyperi, inulæ campanæ, iridis, singulorum lib. ſampuschi, hyssopi, seminis uiticis, saluiæ, cuiuslibet quadrans, floris cyperi lib. Alia quidem omnia uino per diem prius macerata, elixantur cū oleo horis sex: exēpto oleo puro, cyperus injicitur, si quidem ad manum sit, uiridis, cum mollibus tellisq; ramulis inconfusis: sin minus, certe aridus. Confusus cum exigua aqua, coquetur hora una & dimidia. Quod si uolueris

uolueris ipsum tingere, postquam remotum ab igne fuerit, in sere æruginis puri libram unam cum dimidia. Cæterum Posidonius ferruginis uitans acrimoniam, post decoctionem (inquit) per triduum oleum in lebetes perudo finito, tingeturque ita ut uirtus ipsius non lædatur.

Alia descriptio Cyprini.

Foliorum iunci quadrati, foliorum lauri, iridis, cyperi, saluæ, singulorum uncia tres, arboris thuris, aristolochiæ longæ, seminis uiticis, cuiusque uncia quatuor, inulæ campanæ, asspalathi, cuiuslibet uncia sex, rutæ sextans, cupressi tantundem, olei sextarii decem. Hæc antea uino macerata oleo decoque: & ubi colata fuerint, inijce rursum xylobalsami, & ligni cassiæ, singulorum trientem, sampsuchi, cymini, myrti, styracis, mastiches, cuiusque quadrantem, opopanax sextantem, floris cyprini uncias sex, æruginis unciam.

Amaracini compositio:

Inulæ campanæ libræ decem, ligni balsami libræ uiginti, cyperi libræ octo, floris rotundi iunci odorati, asspalathi, herbæ sabinæ, singulorum libræ octo, opopanax, seminis amaraci, cuiusque libræ duæ, olei præcipui honoris sextarii duo, uini odorati sextarii quinque: alia quidē omnia primam iniectionem uino irrigata constituunt: secundam autem, herba sabinæ. & illa quidem sex horis decoquantur, hæc uerò tribus. Quidam autem etiam illam tingentes, ferruginis quadrantem adijciunt.

Irii conficiendi ratio.

Iridis, asspalathi, cyperi, singulorum libræ quinque, succi panacis drans, anchusæ sextans, olei sextarii triginta, aquæ sextarii quindecim. Sunt qui ad hæc floris etiam iunci rotundi uncias sex apposuerint, cassiæque quadrantem, xylobalsami uncias sex, nardi Celticæ uncias sex. Omnia cōtusa aqua & oleo diebus quinque prius macerata, in cacabo horis sex elixentur, & deponantur.

A a a s

Croci

Crocinum, in quo alterius etiam crocomagmatis compositio.

Olei omphacini amoeni odoris libra, calami aromatici librae quinque, myrrhae troglodyticae quincunx, cardamomi unciae septem, croci ex Cilicia unciae sex: primo quidem inciat calamus, et myrrha uino laeuigata, prius reposita uncia, piperis albi grana quadraginta, myrrhae troglodyticae denarius, contusa et cribrata rursum in pila cōtere, adiecta olei nardini libra: quo autē atrius reddatur medicamentum, nucum cortices combustos et cōtritos in pilam conijce, deinde opobalsami cochliaria tria, cerae sesquilibram adijce.

De cœnanthariis. Cap. 21.

OEnanthina non inde appellationem sortita sunt, quod cœnanthen, hoc est labruscā suscipiant (quoniam nonnulla cœnanthen non recipiunt) sed uinum ipsius, liliorum item flos nomenclaturam indidit. Cæterum cœnanthariorū usus à quibusdam solius fragrantiae et deliciarum gratia adhibetur, ita ut eis utentes, post lauacra perfundantur, mensaeque ipsdem cum spongia abstergantur. Cæterum recte utentibus etiam praesidia conferunt, tum in dissolutis, tum syncope oppressis, si roborantibus stomachum cataplasmatibus admisceantur: his item qui ex morbo, maxime febrili refocillantur, si post lauacrorum exitum toto corpore perfundantur, et naribus etiam dum spirantibus adhibeantur. trahuntur namque in altum, et cum animale, tum uitalem spiritum corroborant. Conducunt praeterea his qui praecauere, ne in morbos pestiferos incidant, student, quum aer huiusmodi mutationem habet. Est autē Posidonij, quod mesopotamenon appellatur, unguentum huiusmodi.

Oenanthii preparatio.

Cassiae, myrrhae, thuris, folij, amomi, mastichae, costi, earpobalsami et opobalsami, uniuscuiusque quadrans, styracis pinguis iriens, uini odorati Amineci Italici sextarij decem. Contusa omnia, et per secerniculū traiecta, styracem uerò in tenues partes diuisum, in spaciosi oris lagenam cum folijs liliorum

Liliorum pridie tabefactorum, & unguibus detractis de domo una in alteram composito: sint autem lilia numero trecenta: deinde uinum infunde, & opobalsamum, mixtaq; simul & commota ante iniectionem, obstructoq; ore lagenæ dies quadraginta insolato, & balneo post restitutam sanitatē utere: & domo uasisq; ungento aspersis, & spongiis etiam eodem imbutas faciei adhibeto.

Alia compositio nostra.

Costi quadrans, spicæ nardi, arnabo, cariophylli, singulorum uncia: amomi quadrans: cassiæ, cenanthes, calami, cuiusq; dodrās: styracis, opobalsami, cuiuslibet triens, lilia trecenta, uini Phalerni sextarij decē. Preparantur pari modo.

De thymiamatis & Cyphi. Cap. 22.

Cypbeos materia media inter ea quæ in potu sumuntur, & antidota est. Vfus ipsius existit, nūc quidem grati odoris gratia incensi, quemadmodū & thymiamatū: nunc uerò narib. admoti, quo destillationes à capite in partes subiectas & coryzas cōcoquat, obstructions referet, cerebriq; cauernas expurget: & ad pestilenciales morbos euitandum. Iam per os etiā assumitur, cūm hæc cōtra, tum ut pectoris crassos humores concoquat, & aduersus iocinoris frigidiores afflictiones: unde prisci quoque cyphoides antidotos inuenerunt. Temperatur autem remedijs compositis, sed potissimè epitheimatis & antidotis.

Rhofatum thymiaia.

Habet costi, amomi, myrrhæ, cassiæ singulorum unciam, styracis chiæ, bdellij, conchulæ Indicæ, musci, ladani, uniuscuiusq; denarios duos, rosarum purgatarum uncias undetrīginta, succi balsami momentum, uini quantum satis est.

Thymiaia Crinatum.

Liliorum unguibus detractis libram, styracis primi meriti dodrantem, spicæ nardi quadrantem, costi, caryophylli, amomi, mastiches, conchularū Indicarū crematarū, mellis, singula

singulorum fescunciam, opobalsami quincuncem, uini quantum opus est, leuigato, & in pastillos digerito.

Cyphi magnum, quod Iliacum, id est Solarium cognominant, ex speciebus XXXVI.

Styracis, bdellij, myrrhæ, ladani, aspalathi, inulæ Campanæ, cuiusque uncie sex: nardi Gallicæ, folij, seminis cupressi, guttæ ammoniaci thymiamatis, pinæ nuci nuclei, splanchni, uel loco ipsius conchularum Indicarum ingentium, fructus balsami, singulorum quadrans: cassiæ, ireos, fescleos, sphagni, cyperi, cardamomi, calami odorati, cuiuslibet quincunx: rosarum aridarum, croci, spicæ nardi, herbæ sabinae, asphodeli radicis, alij uero succi, singulorum triens: lacapthi (est autem pini cortex) uel alterius cuiuspiam arboris dodrans, costi, floris rotundi iunci odorati, cuiusque sextans: baccae iuniperi magnæ quadraginta, & parue quinquaginta, amomi, resinæ terebinthinæ, palmularum purarum, cuiusque libra, ficuum aridarum acinis exemptis, uuarum passarum ex acinatarum, uniuscuiusque libræ duæ, mellis despumati libræ quinque. Posidonius uini quoque odorati sextarios treis adijciebat.

Aliud Cyphi ex uigintiocto compositum, Seleniacum, id est Lunare appellatum.

Bdellij, inulæ campanæ, singulorum septunx, rotundi iunci odorati sextas, sphagni quincunx, baccae iuniperi exiliores quinquaginta, cardamomi quincunx, aspalathi septunx, cassiæ fistulæ quincunx, spicæ nardi sextans, cyperi quincunx, radicis albuci, herbæ sabinae, singulorum triens, seminis cupressi, nardi Gallicæ, malobathri, cum folijs rosarum aridarum, cuiusque quadrans, costi, croci, singulorum sextas, ladani, myrræ, cuiuslibet septunx, caricarum pinguium, uuarum passarum uinaceis exemptis, uniuscuiusque libræ duæ, nucleorum pineorum bes, resinæ terebinthinæ libra, styracis septunx, palmularum pinguium libra, mellis libræ quinque, uini fragrantis quantum satis est.

Prepa-

Præparatio Mastucha, quod uocant nonnulli
Masuaphium. Cap. 23.

Sertulæ campanæ deunx, ligni balsami, asphalasti herbæ
sabinae, myrrhæ, amomi, floris rotundi inucio dorati, fo-
liorū lauri, myrrhæ stillaticiae, styracis, calami odorati, sam-
psuchi, singulorū sextans, ireos quincunx, folij, croci, unius-
cuiusq; uncia, opobalsami uncia dimidia, gummi libra, rosæ
rum siccarum uncia sex, uini quod satis est.

De pesis, ex Antyllo. Cap. 24.

Pesi mulierum utero admouentur. sunt autem differentiæ
eorū generatim tres. alij nanq; emolliendi, alij uerò astrin-
gendi, alij deniq; uasa meatuq; apericendi uim obtinēt. Emol-
lientium in fœminarum locellorum inflammationibus, bul-
ceratione, perfrictione, suffocationibus, auersionibus, ac in-
flationibus deniq; usus est. Conficiuntur autem è cera Tyre-
rhenica, cyprino, susino; pinguedine anserina uel gallinae
cea, butyro insulso, resina deusta, medulla ceruina, fœnogra-
co, & id genus alijs. Aperientibus autem utimur, ubi men-
struam purgationem retentam prouocare, uel uteri conui-
uentiam, aut compressionem ipsius emendare statuimus. Fas-
bricatur eiusmodi ex melle, artemisia, diastamno, brassicæ
succo, glycyrrhiza, liquore porri, ruta, scammonia, & cono-
similibus. Astringentes autem contrariam facultatē, his quæ
aperiunt, præstant: muliebri nanq; profluiū comprimunt,
laxum contrahunt uterum, & prolapsum restituunt. Astringen-
tium materia iam pridem capite de Collyrijs enumerata
est. Oportet autem pesi crassitudinem strigmentosam, pau-
loq; crassiorem efficere, deinde lana gracili penicillo tortili,
ex linteolis conceptis simili duplicata, medicamentum exci-
pere, locellorumq; muliebrium ori apponere, sic ut stuppam
oblongam propendentem habeat, quo faciliè, dum uidetur,
liceat pessulum extrahere.

Pessulus croceus, ad inflammationes, uersiones,
duritias, & inflationes.

Ceræ dealbata, medullæ uituli, singulorū denarij sedecim.
medullæ

medullæ ceruinæ denarij undecim, adipis anserini denarij octo, adipis gallinacei tantundē, mastiches denarij quatuor, æsypi pharmaci treis, mellis duos, croci octo, rosacei quantum opus est. Crocum lacte humano diluitur.

Aurei coloris emolliendi uim habens pessulus primi meriti.

Croci, æsypi, singulorum denarius, medullæ cerui denarij duo, resinæ terebinthinæ, ceræ, adipis anserini, cuiuslibet denarij tres, ouorum assatorum uitelli sedecim, irini & rosacei, utriusq; æquali modo quantum satis est.

Pessus Libanius menses ciens, & ad uteri affectiones eximie conducens.

Nardi unguenti uncia sex, ceræ Tyrrhenicæ quincunx, susini unguenti triens, adipis porcini non ueteris quadrans, adipis anserini & gallinarum, medullæ ceruinæ, unguenti amaracini, singulorum sextans, seui taurini, resinæ terebinthinæ, æsypi, cuiuslibet uncia. Eliquatur in diplomate, quem admodum omnes cæteri pessi.

Emnecapharmacus, id est e nouem rebus constans pessus.

Rosacei unguenti, rhicinini, resinæ terebinthinæ, ceræ, mellis, adipis anserini & bouilli, medullæ ceruinæ atq; butyri, æquales partes.

Tianus, emolliendi ui præditus.

Ceræ uncia sex, colophonice uncia quatuor & dimidia, adipis taurini, guttæ ammoniaci thymiamatis, singulorum uncia quatuor. Guttam ammoniacam aqua dissolue.

Pessus cognomento Aegyptia.

Mellis, resinæ terebinthinæ, butyri, rosacei, uel susini, croci, singulæ partes. In his autem quæ inflammatione uacant, & sordidis, ferruginis quoq; semissis inditur.

Gone ad concipiendum.

Habet butyri uncias sex, æsypi pharmaci, medullæ ceruinæ, adipis anserini et gallinacci, resinæ terebinthinæ, aloes, singulorum quadrantem, ceræ Tyrrhenicæ uncias sex, rosacei

cei libras duas, myrrha, cassia, uniuscuiusq; sextantem, spicae nardi unciam, mellis quantum satis est.

De Succedaneis, hoc est quæ inter se commutantur, medicamentis, ex monumentis Galeni. Cap. 25.

QUum in Alexandria mulier quædam (inquit Galenus) graui morbo cum discrimine conflaretur, lychnida mihi postulauit: quæ quum ad manum non esset, nisi cõfestim lychnidis loco acanthij semine, cuius tum copia erat, usus fuisssem, mulier interiisset. Proinde amicorum precibus uictus, hanc de subsidiaria reciprocorum medicaminum commutatione expositionem iuxta alphabeti ordinem aggressus sum.

A

A Brotani loco sumitur Ori-
ganum.

Absinthij, Abrotanum.

Acacia, Lentisci succus.

Acathæ, Cerasiorum acathib.

Acanthij seminis, Semen lychnidis.

Aconiti, Radix ircos syluestris.

Acori, Asari radix.

Alea, Glaucium, aut im-
beris alui excrementum.

Adæ, Acantha.

Adianti, Aphroselinum.

Adipis uulpini, adeps ursina.

Adipis ceruini, adeps anserina.

Aeruginis ferri, excrementum ferri.

Aethiopica oliua, lachryma
acaciae partes duæ.

Agarici, Euphorbium.

Agriostaphidis, Dactyli Syriaci.

Alicacabi, Semen solani.

Aloes Indica, Aloes uiridis
folia.

Alterci seminis, semē rubicani,
uel glaucia, uel ster-
cus ibidis, uel lycium, uel
centaurium.

Aluminis, sal fossilis.

Amianti, aphroselinon.

Ammi, Anisus.

Ammoniaci thymiamatis,
Propolis.

Ammoniaci salis, Sal Cap-
padocum.

Amomi, Acorus.

Amyli, Aridis pollen.

Amygdalorum amarorum,
Absinthium.

Anacard.

Anacardi, Psyscha herba,	Bdellij, sphagnus aromaticus.
Anchusæ, Hyacinthus.	Buccinorum, Ostrea.
Anisi, Daucus.	Buprestis, Blattæ serpentes.
Adeps suillus, adeps uulpin.	Butyri, lactis bubuli congelatum.
Aracis, Sesamum.	
Armoracæ, Cardamomum	C
Babylonicum.	Cadmia loco, leucophragis
Aristolochiæ rotundæ, Aristolochia longa.	Aegyptia.
Argemones, Seriphe, aut Seriphon.	Calaminthæ, Menta sylvestris.
Armeni lapidis, Atramētum	Calami odorati, Sphagnus.
librariorum Indicum.	Calliceræ, Foenogracum.
Asari, Gingiber.	Camili, Antutus.
Asbesti, id est calcis uiuæ, Asdarce.	Conchrij, Baccæ lauri.
Asij lapidis, Gagates lapis,	Cantharidum, Phalangia.
uel sal Ammoniacus cre-	Capparis radicis, Radix ericæ uel myricæ.
matus.	Cardamomi, Ciperis ammoniacæ.
Aspalati, Semen uiticis, uel ericæ.	Castia manæ, cinnamomū.
Asphodeli radicis, Betæ succus.	Castorij, blatarum pedentium interanea.
Atramenti sutorij, Squamaris.	Cadmia, Leucographe Aegyptia, Tyrannia.
Auripigmenti, Sādaracha.	Cedriæ, Cedride.
B	Ceraunini, Leucographis.
Baccarum lauri uice, Serpyllis arida.	Ceruinae adipis, Suilla.
Baccarum cedri, ladanum.	Ceritiæ, Ostrea.
Balaustij, Malicoria caduca.	Ceræ, Sepimētum cum propoli coquitur et cōteritur.
Balsami succi, stillatitia myrrha.	Cerui adipis, Adeps anseris.
	Ceruicornu, Cornu caprilum.
	Cerussa, Scoria plumbi.
	Chal-

- Chalbānes, Sagapenum. nis marini. (ca
 Chalcāthi, Aeris squāma. Crocomagmatis, Aloe Indi
 Chamæleontis succi, Succus Cymini, Semen brassicæ.
 salicis, uel lapathini syluati Cymini Aethiopici, Melan
 cæ radicis. thium.
 Chamædryos, Rumicis sylue Cinaræ radicis, Radix aspa
 stris radix. lathi. (men
 Chamæmeli, Anthemis. Cynosbati, Alicacabi se
 Cicis, Strigmentū palestrarū. Cyperi, Iuniperus magna.
 Cicidis, Myricæ fructus. Cypheos, Carica cremata.
 Cicutæ seminis, Semen cori- Cyrenaici liquoris, Syria-
 andri. cus liquor.
 Cedrini liquoris & fructus, Cucumeris, Anchusa.
 Ladanum. D
 Cineris cypriæ, Cinis folio- Daphnidum loco, Serpil
 rum oleæ. lum aridum.
 Cinnabaris, Rodoides. Dauci seminis, Semen sui.
 Cinnamomi, Cassiæ duplum. Diſamni, Salvia. (us
 Cissebati, Semen alicacabi. Diphrygis, lapis phrygi-
 Clinopodij, Heliotropium. Dorycnij, Semen alterci.
 Cnidij seminis, Viticis semen. Dracunculi, Aphresimum.
 Colocynthidis, Semen ricini, B
 quod est crotonis. Beni uice, Lotinū aridū.
 Colophonie, Apochyma, Ra Ebisci radice, Folia mo
 sura nauigij. ri.
 Comaræ, Ammoniacum thy Elaterij succo, eiusdem her
 miana. bæ succus. (Nepita.
 Corallij, Moly. Elelisphaco, id est salvia;
 Costi, Cedrini fructus. Helleboro nigro, Radix pa
 Cotyledonis, Anacardium. pyri.
 Crinæthemis, Aphrodisium. Eneaphyllo, Potamogitū.
 Croci, Crocomagma. Epithymo, Colocynthidis se
 Crocodyli adipis, Adeps ca men.

Bbb

Ericæ

Erica fructu, Galla omphacitis. *Gongilidi, Heliotropium.*

Brini folijs, Fimus ibidis.

Gryphonis retrimenti, fimus columbinus.

Brisei folijs, Mori folia.

H (cm.

Erucae semine, Brysimi semen.

H *Edera succo, Persici succo*
Hedichroo, Amaracini.

Brysimi semine, Struthium

Humida pice, Succus panac.

Euphorbio, Stercus palubis.

Hyacintho, Flos isateos. (cis

Eupatorio, Chamæpytis.

Hyenæ adipe, Vulpis adeps.

Hyenæ felle, Fel perdicis.

F

F *Ellis cameli uicem gerit,*
Fel ascalabotæ.

Hyoscyami semine, Rubicani ni semen.

Fellis muris aranci, Fel cameli.

Hyperico, Anethi semen.

Fellis hyenæ, Fel perdicis.

Hypocistidis succi, Acaciæ succus.

Fellis simiæ, Fel cameli.

I

Fellis uiperæ, Fel ichneumonis.

I *Ontis uice, sumitur Atramentum.*

Fimi palubini, fimus columbae.

Ippuridis, Chamæpytis.

Fimi æluri, Fimus ichneumonis.

Iridis Illyricæ, Helenium odoratum.

Floris salis, Sandaracha.

Iteæ succi, Succus leisiatri.

Floccium uini, seu feculae, Sandaracha.

Iunci odorati, Cardamomum.

Uici rotundi, polygoni radix.

G

G *Ymnasiorum strigmentum, succedit gallæ.*

L

Galbani, sagapenum.

Lachrimæ papaueris, succus mandragoræ accipito.

Gentianæ radici, Apj odorati radix.

Ladani, Sampsuchum.

Glichoni, Hyssopus.

Lanariæ radicis, ueratri nigri radicem.

Glycyrrhizæ succo, Sicami ni succus.

Lapathi radicis, Pyrethri radicem.

Lapidis pyritæ, Lapidem pyro-

pyrobolum. (argyriten. Meliloto, Lotum syluestre.
 Lapidis Phrygi, Lapidem Melle, Defrutum sapá ue.
 Lapidis magnetis, Lapidem Melle Attico crudo, mel alia
 Phrygium. ud deſpumatum.
 Lapidis aſy, Lapidē gagatē. Meo, Myrobalanum. (ri.
 Lathyridū, Granū cnidiū. Myrſinite uino, Succus mo-
 Lepidij, Erythrodanum. (riſ Mifyi Cyprio, Rubrica piſto-
 Lepidij radiciſ, Folia cappa rum cypria.
 Leporis marini, Cancrum Muſcerdæ, Muſcæ tantundē.
 fluuiale. Molibdæna, Spuma argenti.
 Leucini floriſ, Strution. Mororum ſucco, Rubi folia.
 Libani, Ampeliten. Myrobalano, Peucinum.
 Ligni baſſami, radicem uio- Morrha Troglodytide, Calā
 læ candidæ. mm odoratus.
 Lini ſeminis, Fabæ ſuccum. Myrti oleo, Lentifcinum.
 Loti ſeminis, Betæ ſemen. Myrto, Succus mori.
 Lybiſci, Semen ſtaphylini. Miſy, Succus Cyprius.
 M Miſy aſſato, Diphyrga.
 Malobabri loco, ſumitur N
 Caſſia, uel nardus Indica, Ardi Syriacæ loco, Iune
 Tractylus. (licum. N cus odoratus.
 Magnefena uitrea, labrū Ita Nepitæ, Menta ſylueſtris.
 Malis cotoneiſ, Melilotum. Napyos, Gongylidiſ ſemen.
 Malua, Fcenogræcum. O
 Malo terræ rotundo, Malū Cimi uice ſumitur Siſym-
 terræ Longum. (ma. O brium
 Mandragora, Oleæ lachry Ocimoidiſ, Sylueſtriſ mēia.
 Mandragoræ ſucco, Dorica Oenantheſ ſucci, Ampelini
 Māna, Thuris cortex. (niū. arboriſ.
 Maſſinati, liquor mori. (tex. Oefypi, medula uituli.
 Maſtiche, iunci rotundi cor Olei rhicinini, Oleū laurinū.
 Medulla cerui, Adeps cerui, Olei ueteriſ, Duplū olei coq̃
 uel medulla uituli. aur, eſt adipe ſuillo ueteri.
 Bbb a Oline

Oliuæ Aethiopica, Lachry

mæ acaciæ partes duæ.

Oleæ lachrymæ, Hypocisti

dis succus. (ra.

Omphacis, Galla immatus

Onocardia, Psicolotanis.

Opobalsami, Succus myrsi

tini.

Opocarpasi, Liquor myrti.

Opoponacis, Lac sycamini.

Orizæ, Hordeacea farina.

Ormini, Lini semen.

Oenithogallorū, Anthalli.

P

Papaueris locum supplet

Mandragoræ succus.

Peristereonis, Chameleuce.

Picis liquida, Opopanax.

Pityocampæ, Vespæ in ce

Piperis, Zingiber. (dria.

Poly seminis, Semen erucæ.

Polypody, radix Chame

læ, uel Chamæleontis.

Polytrichi, Absinthium.

Populi nigrae furculorum,

sampsychus.

Propolis, Ladanum.

Psily, Lenticula palustris.

Pterei, Cnecori semen.

Pulegij, Hyssopus.

Pyrethri, zingiber.

Pumicis, terra Cretica.

Phu, Sphagnus.

Phuci, Anchusa.

Q

Ro Quercus uisco, Cha

maleon.

R

L Oco Rapæ, Heliotropiū.

Radicis rumicis, Cinira.

Rhaphanini olei, Rhicininū.

Resinæ piceæ, Resina tere

binthina.

Resinæ colophonæ, Apo

chyma.

Rhodæidis, Sinopi.

Rosarum siccarum, Persææ

folia sicca.

Rotundi iunci odorati, Car

damomum.

Rhu, Centaurium. (mē.

Rubi canini, uescaginis se

Rubiginis ferri, Scoria fero

ri.

Rubrica pictorum, Misi cy

prium.

Rumicis, Pyrethri radix.

Recremēti plūbi, Helcisma.

Recremēti Cyprij, Atramē

tū metallicū Ægyptium.

S

L Oco Sabini, accipitur

Oleum rhicininum.

Sagapeni, Pini resinæ arida.

Salamandræ, Lacerta uiri

dis.

Salis ammoniaci, Sal cappa

docicum.

docicum.	niculi.
Saluiæ, Nepita.	Sphagni odorati, Rotundus
Säpsuchi, Rhus Megaricus	iuncus odoratus cultus.
ficcus.	Sphec le, Sandaracha.
Santonici, Abrotanum.	Sphodeli, Cypriæ cinis.
Sarapoidis, Radix pæonice.	Stapbydis satina, Dactyli.
Satyri, semen Bruce:	Stercoris uulturis, Fimus co-
Scammonia, Crotones rhi-	lumbinus.
cini.	Stercoris turturis, excremento
Schoeni odorati, Cardamo-	tum palumbinum.
mum.	Stimacos secti, Squamae
Schini, Polygoni radix.	Styracis, Castorium. (ris.
Scilla, Bulbus.	Strobilorum, Semen cucume
Scingi, Satyrium.	ris.
Scordy, Caput albi papauca	Struthij radicis, Radix uera
ris.	tri nigri.
Scoriae plumbi, Helcisma.	Strychni radicis, Veratrum
Scoriae Cyprij, Melantheria	nigrum.
Aegyptia.	Succi carpassi, Succus myrti.
Seminis hypocistidis, Traga	Succi peucedani, Succus gly-
canthæ semen.	cyrrhizæ.
Sëperuini liquoris, Laduce	Succi rhododaphnes, Viscus
succus.	quercinus.
Sepiæ testæ, Pumex.	Succi fici, Succus mori.
Serpylli, Potamogiton.	Succi Cyrenatici loco, Succus
Sesami, Semen lini.	Syriacus.
Sesamoides, expressum ama	Succi papaueris, Succus man
racinum.	dragoræ.
Sinapis, Cardamomum.	Succi salicis, Nigræ hederæ
Sisonis, Anisi.	succus.
Sisymbrij, Ocimum uel Basi	Succi gallæ, Succus mori.
licum.	Succi mori, Succus hederæ.
Sparagi Lybica, Radix fœ	Succi Syriaci, Mori succus.

Bbb 3 Succ

Succi panacis, Lac Sycami
 ni.
 Succi polygoni, Succus plan-
 taginis.
 Sulphuris uiui, Sandaracha.
 Symphyti, Centaurium.
 Syrici, Spuma argenti.

T

Vicem terrae Samiae gerit
 Leucographe Aegyptia.
 Terrae Erythriadis, Calx
 Thebaica.
 Terrae apalae, tenerae uae, Plu-
 bago.
 Terrae asteris, Cimolia.
 Thapsiae, Elydrion.
 Thapsiae succi, Chamaleotis
 atri succi.
 Thermutiadis, Lycopsolos.
 Thymi, Satureia.
 Tburis, terra ampelitis.

Tithymalli, Chamaleon.
 Tiscendra, Asphodeli radix.
 Troximi, Maiunium.
 Trixaginis, radix rumicis
 syluestris.

V

Verbasci loco sumitur Cha-
 meleuca.

Veratri nigri, Radix papyri.
 Vini Italici, Vinum Mendesium.
 Vucae passae satiucae, Palmulae
 synacae caro.
 Visci querneci, chamaleon as-
 ter.
 Vulpini adipis, Vrsinus adeps.
 Vulturis stercoris, fumus colu-
 binus.

X

Xylbalsami loco, Violarum
 albarum radix.

Z

Zingiberis uice, Pyrethrum.

De ponderibus & mensuris. Cap. 28.

Ponderis mensura grauitate dydicatur: mensura, conca-
 uitate uasis. Vas autem siccae quantitatis aut humidae me-
 sura est. Est igitur quantitatis quae mensuratur, triplex diffe-
 rentia: una quidem ponderis: altera aridae essentiae, quae ue-
 luti in cumulum potest aggerari: tertia liquidarum rerum est.
 Quum autem plurima & infinita fere pondera ac mensurae,
 pro regionum diuersitate, & eorum qui utuntur consuetudi-
 ne existant, de ijs modo quae in communi maxime omnium usu
 tenentur, mentionem facere instituimus.

De

De ponderum & mensurarum notis.

Quandoquidem autem aliqui non integris literis, sed per characteres, notasque, quum pondera, tum mensuras significatis satius fuerit nos quoque priscos in hac parte sequi, primitusque ipsos characteres explicare. Principio igitur χ litera quotiens α insidet, Chalcum, hoc est, areolum eiusmodi figura χ portendit, si uero \circ incumbat, choan, id est congium signat, hoc modo χ° . Si α , choenicē, $\chi\alpha$. Si μ , chemā, $\chi\mu$. Ceterū K siquidem litera incumbētē habeat, cū recta linea inferius cornu per obliquū secāte, ceratiū, id est siliquū demonstrat, sic K° . Sin' supra K insideat, cyathū, K° . Si \circ , cotylā, hoc est hemianam, K° . Quod si linea utrinque in obliquū circumflexa nihil aliud circūstātē pingatur, obolū ostēdit, ω . Si geminā, quas nihil circūstāt, lineae ponūtur, binos obolos significant, $\omega\omega$. qui grāma, hoc est scrupulū faciūt, quod litera γ annexum habēs ρ , à recta quadā linea dissecū, significat $\rho\gamma$. Duae autē lineae copulae, atque altera extremitate in angulum flexa instar K duorum cornuum ad rectam lineam spectantium, drachmam, qui denarius est, ostendunt, Δ , cui cognominis est quam holcam indigitant. Proprie autem holcam λ cui in medio litera α adiecta est, protendit, hoc modo $\lambda\alpha$. At ubi ipsi λ appositum est, libram declarat, λ . Nonnulli uero eadem litera ab altera litera λ linea oblique diuisa libram significant, λ . Porro quum γ litera in ipso sui angulo \circ adiacentem habet, unciam indicat, $\gamma\circ$. μ uero ubi in uerticis medio superimpositum habet, minam μ° . Sin v habeat, mystrium, μ° . Si e , medimnum, μ° . Si \circ , modium denotat, μ° . Ceterum τ cui g cum apposita est, triblion significat, $\tau\rho$. Si supra se positum habens, xestam, id est sextarium, ξ . Si \circ suprapositum, oxybaphū, id est acetabulū ξ° . Quidā uero xestam per ξ literā recta linea secāda designant ad hunc modū ξ . Si μ incubit litera μ , heminā ostēdit, sic, μ° . μ completa g , incubit litera μ , ceramū significat, hoc modo $K\mu^m$.

Bbb 4

De

De ponderibus.

Mina Attica & Aegyptia	uncias continet	16
Mina Romana	Vncias habet	20
Libra	Vncias	12
Vncia	Drachmas, id est denarios	8
Drachma	Scrupulos	3
Scrupulus	Obolos	2
Obolus	Siliquas	2
Siliqua	Aereolos 2. duasq; tertij partes Ital.	
Obolus	comprehendit Aereolos	8

De liquidis mensuris.

Ceramium Italicum	complectitur congios	8
Congius, siue Chus, Sextarius		6
Sextarius Heminas, quæ & tryblia dicuntur,		2
Hemina, siue tryblium, magna Mystra 3. acetabula uerò		4
Magnum enim Mystrum	habet acetabulum	1
Acetabulum	continet Cyathum	1.5
Cyathus Chemas paruas, aut mystra parua		11

Quod si ponderum liquidarum rerum mensuram dijudicare laboras, permulta quidem in examine suo deprehēdes discrimina, quemadmodum in olei, uini, & mellis exemplo explanabimus. Mel igitur grauius quā uini quarta parte ac decima est, quo fit, ut pars ponderis tantum non tertia melli accedat: habet etenim eadem uini mellisq; mensura totum uini pondus, & insuper eius tertiam. Oleo uerò mel dimidia parte grauius est. complectitur enim totū olei pōdus, & eius præterea dimidium. Vinum uerò nona parte oleum grauitate excedit. totum namq; ipsius pondus et nonam eius partem continet. Quæ res ut dilucidior reddatur, omnium mensurarū pondus, formula subiecta, tanquam in tabula depicta, sigillatim subiungemus, ut quid hæc communiter dissideant, liquidò constet, liquores hosce, oleum, uinum, & mel, ex ordine ob oculos constituentes.

Italicum

Italicum ceramium continet libras

Olei 72. Vini 80. Mellis 108.

Chus siue congius continet libras

Olei 9. Vini 10. Mellis 13.5.

Sextarius continet uncias

Olei 18. Vini 20. Mellis 17.

Cotyla seu hemina continet uncias

Olei 9. Vini 10. Mellis 13.5.

Magnum mystrum continet uncias

Olei 3. Vini 3. scrup. 8. Mellis 4.5.

Acetabulum continet drachmas

Olei 17. Vini unc. 2. scrup. 12. Mellis drach. 27.

Cyathus continet drachmas

Olei 12. Vini 12. scrup. 4. Mellis unc. 2. den. 2.

Mystrum paruum continet drachmas

Olei 6. Vini scrup. 20. Mellis denar. 9.

Cæterum Oribasius secundum Adamantium asserit, sextarium quidem Italicum, mensura uini habere uncias uiginti quatuor, pondere uero libram uncias octo: sextarium autem mellis librarum duarum cum dimidia pondus complecti.

De mensuris aridorum.

Aegyptia Artaba continet Modios 5.

Modius Aegyptius & Italicus Chœnices 8.

Chœnix complectitur Sextarios 2.

Sextarius, semis sextarios, quos & heminas nuncupant, 2.

Hemina comprehendit Cyathos 8.

Atticus Medimnus hemiecta, id est semisextarios 12.

Hemiectum siue Semodius continet Chœnices 4.

Sic Medimnus continebit Minas 48. Sextarios 96.

Istiusmodi autem mensurarum pondus exprimere expeditum non est, quod aridarum rerum discrimina iuxta lancis momentum infinita existant.

Bbb 5 PON.

762 PAUL. ÆG. LIB. VII.
PONDERVM, QVIBVS VSVS
passim interpres est, nomenclatura &
expositio.

Duodecima pars asis	Vncia, græcè οὐνία. 1.	
Sextans	Vncia	2
Quadrans	Vncia	3
Triens	Vncia	4
Quincunx	Vncia	5
Semis uel semissis, & selibra, seu unx	Vncia 6. uel lib. 5	
Septunx	Vncia	7
Bes uel besis	Vncia	8
Dodrans	Vncia	9
Dextans	Vncia	10
Deunx	Vncia	11
As, uel asis, libra, pondo	Vncia	12
Dupondo	Libra	2
Tripondo	Libra	3
Sescuncia	Vncia	1.5
Semuncia	Vncia	5
Denarius	Drachma	1

PAULI ÆGINETÆ LIBRI SE-
ptimi & postremi finis, Albano Torino Vito-
. durenfi interprete..

ERRATA.

Pag. 10. uers. 28. Inflammatoria 14. 3. brumæ et 11. mer-
curiali 22. 5. sedes 24. 9. ipsius 29. 6. noxiam 45. 28. ab-
sorptos 46. 16. obstructos 58. 19. dura et 20. gammari et
24. terrestris 75. 23. naturalis & 25. altitudine 76. 15.
differentijs 77. 3. longum & 8. contractionis 79. 26. au-
tem 85. 26. corpus 86. 7. quietis 107. 17. moliendam
112. 6. inunctiones 113. penult. esculenta 130. 4. ceu 137.
3. elaterium 143. 2. aliquot 147. 4. ex 149. 7. iecur 151.
4. adhibendæ & 19. tardam 153. 21. fit 161. 20. medica-
menta 164. 28. conuulsionib. 168. 30. scarificato 169.
20. Attici 179. antepen. impositi 207. 10. uelut obtorto
209. 13. extrahatur 244. 19. succus 245. 18. refertur
250. ult. huc 363. 7. non inquinat 269. 23. immitte 247.
21. enneapharmacum & 22. Est autē 279. 2. decocta
287. penult. narib. 290. 16. horminum' ue 295. 10. infans
302. 20. humorib. 321. ult. cardamomum 333. 25. pondere
345. 22. Dioscorides 391. 2. eis 396. 9. Ab 418. 12. cele-
rem & 23. summamq; 420. 17. & susp. 430. 17. Mu-
sculorumq; 435. 18. palpebra 439. 2. maiore 451. pe-
nult. sanguinis 461. 28. interuallum 499. 2. regioni et 26.
denudatam 501. 6. catus 511. ult. Tantum 523. 28. ferulas
525. 8. magnus 528. 28. existit.

In cæteris æquus lector minus offendetur.

DE PAVLO AEGINETA, HIERONYMI GEMUSÆI IUDICIUM.

Paulus hic noster, ut propria quidem philosophiæ naturalis principia non attigit, quippe quæ ad superiorem artificem pertinent: ita quæcunque ab hisce deinceps sequuntur, atque artis medicæ peculiaria sunt problemata, ea uniuersa in hanc Epitomen digessit. Eaque propter, nostro seculo hic autor profectò longè est accommodatissimus. Siue enim hominem in Physicis quæstionibus exercitatum accipiat, ab illis ipsis quæ in naturali philosophia is postrema didicerit, exorsus, reliquam artem totam superstruit, & magno certè compendio omnibus modis absolutissimum artificem facit, dum ea quæ multi non sine magno negotio, & nonnunquam cum auditoris fastidio in medium adferunt, in iucundissimam & facillimam breuitatè redigit: siue is ignarus & philosophiæ rudem auditorem sit nactus, tum iubet ut subiectis problematibus, quæ apud Naturales postrema ostenduntur, tandiu fidem illis citra demonstrationem adhibeat, donec inde factò artis initio, compertum habuerit, quo pacto ex ijs problemata & præcepta medicinæ confirmantur, stabilianturque. Quæ sanè sub conditione scientem eum efficient, quatenus uidelicet sint demonstrata. Quòd si postmodum ἀποδείξεις illorum audire cupiat, ad Naturalem artificem accedat oportet. Veluti post οὐρανὸν ἀστρονομία de elementis, de temperamentis, quot sint numero, & quæ sint: de proportionibus elementorum ad constitutionem mixtorum, de facultatibus consequentibus quamque mixtionem: et post definitionem sanitatis, quòd sit symmetria calidi, frigidi, humidi, et sicci, aut omnino mediocritas compositionis. Et morbi, quòd huic sit cōtrarius. Sequitur problema artis, quibus nā sanitas cōseruetur, aut morbus quibus tollatur: et ostenditur illud similibus fieri, hoc cōtrariis. Quo loco deinceps sequuntur quæstiones aliæ, quæ quibus sint similia,

milia, aut quæ quibus contraria sint. Calida frigidis sunt contraria, pleno uacuum est contrarium, salubria symmetris sunt similia. quæ sint salubria aut calida, aut frigida. Vbi mox diuiditur disciplina in partes duas, unam de tuenda sanitate, alteram de curandi ratione. Illam docuit Paulus libro primo, qui respondet sex libris Galeni de tuenda sanitate, & tribus de Alimentorum facultatibus. Hanc uero in sex libris sequentibus, qui respondent reliquis operibus Galeni, quæ iuxta doctrinam compositiuam fuere conscripta, quibus docetur uniuersa medendi ratio. Atq; hæc omnia huius artis uidentur esse propria. Porro ægritudinum aliæ in ambitu totius consistunt: ueluti sunt ex similarium partium ægritudinibus, febrium genera. Aliæ in una parte corporis figuntur, ac pro earum differentia uarias appellationes sortiuntur. Expositio nem febrium habet liber secundus, in quo primum docetur, quomodo sit cognoscendum, utrum salubris an letalis, morbus sit futurus: & num breuis an diuturnus, & omnino quæ ad doctrinam iudiciorum & dierum iudicialium, eorumq; cognitionem & prænotionem pertinent. Quæ omnia respondent libris de diebus Criticis, & de Crisibus. Quæ deinceps sequuntur, aut expositionem habent ipsarum febrium, earumq; differentias & causas continent, & respondent libris Galeni de febrium differentiis: aut signa cuiusq; generis, & tum communem omnibus, tum propriam unicuiq; curationem, & respondent septem, postremis de Methodo medendi, & libro ad Glauconem primo. Postrema pars habet doctrinam accidentium, quæ febres consequuntur. Tertius liber, morborum omnium, per singulas partes corporis grassantium expositionem continet, initio sumpto à capite. is respondet maxime tractationi de Locis affectis, & ijs quæ de Compositione medicamentorum iuxta locos inscribuntur. Liber quartus est de morbis, qui non in sola qualitatum intemperie, sed sub

sed substantia aliqua ijs qualitibus prædita ad partes fluo-
ente, consistunt, & proinde tumorē in corpore excitant, ac
nullum medicorū latere possunt. ut sunt Erysipelata, Phle-
gmone, Oedemata, Phymata, Phygetia, Strumæ, Elephan-
tiasis, Psora, Lepra, Vitilignes, Tumores duri (scirros ap-
pellant) & quæ huius generis cum sint, referuntur ferè ad si-
miliarium partium uitia: uelut unitatis solutio. ex quo genere
sunt quæ de uulneribus, de ulceribus, de sinibus, fistulis, neruo-
rum uulneratione, de uenarum aut arteriarum profluuiio, et
omnino de ijs quæ extra corpus sunt, & sensum propius ad-
mittunt, ac proinde facilius cognoscuntur. E' quibus illa pe-
tuntur ex duobus postremis de morbis curandis, ac libro se-
cundo ad Glauconem. hæc uerò respondēt libris prioribus
de curandi ratione, maximè autem tertio, quarto, et quinto.
Item ijs de compositione iuxta genera, uelut quæ de neruo-
rum uulneribus dicuntur, petita sunt è libro tertio. ulcerū cu-
ratio, è libro sexto. Et differunt hæc inter se, quatenus in me-
thodo medendi inuentionem cuiusq; magis prosecutus uide-
tur, & rationem præceptorum commonstrasse: in hoc au-
tem cuiq; suam materiam accommodasse, & præceptorum
usum frequentioribus exemplis patefecisse. Sequens liber,
tum animalium uenenatorum, tum pharmacorum letalium no-
xas continet. hic ex magna parte desumptus est ex ijs, quæ
Dioscorides de eadem parte tradidit tribus libris, septimo,
octauo, et nono. Sextus ea habet, quæ instrumentis chirurgi-
cis peraguntur, & maiorem apparatus postulāt, uelut sunt li-
xata & fracta, & in uniuersum articulorum & ossium, &
partium instrumentariarum uitia, quæ per chirurgiā emen-
dantur. Hæc sanè sextum librum methodi maximè affinem
habent: quanquam hanc partem post Hippocratem nullus,
peculiares ad id libros instituens, ita absoluisse uidetur, ut fe-
cit Paulus, ut etiam hoc nomine sit ἀνταγωγὴ ὅρα, tota hæc
traditio. Galenus uidetur contentus fuisse editis commenta-
rijs ijs

rys in libros Hippocratis, quibus hæc pars artis continere-
tur, ut sunt, κατὰ ἰατρικὴν liber unus, τὸν ἀπὸ γυν libri tres, et
totidem τὸν ἀντιφάρμακον. quod maius esset operæ præcium relia-
quam artem emendasse quæ rationem haberet difficiliorē,
ac proinde magis ambiguam, et improborum medicorum
udibrijs expositam. Libro septimo, qui postremus est, ma-
teriam exponit et instrumenta, per quæ fit curatio, ac præ-
mum simplicium medicamentorum naturam tradit, quæ pars
respondet libris Galeni τὸν ἀπὸ πλῶν φαρμάκων. post deinde
compositorum medicaminum expositionem facit, docens il-
lorum et modum componendi, et facultatem atq; usum.
In primis autem, quorum aut ipse libris præcedentibus men-
tionē fecerit, aut singulare quodpiam auxiliū cognouerit.
Et primum de purgantib. agit, ac simplicibus. quæ pars re-
spondebit libris Galeni de purgantium medicamentorum fa-
cultatibus, de his quos purgare oporteat, quibusq; medica-
mentis, et quo tēpore. Item locis alijs in quibus finitima hæc
præcepta ab ipso tradita fuere: uelut libro sexto ὑγιεινῶν do-
cet triplicē compositionē hieræ picræ, libro primo δὲ κατὰ
τόπαι, medicamēti quod ex colocynthide et scammonio præ-
paratur. Sequitur pars de Antidotis, ac respondet libro Ga-
leni eodē titulo, necnō ijs quæ de Theriaca ad Pāphiliαν,
quæq; ad Pisonem scripta fuere. Post hæc sunt quæ foris
adhibentur, ueluti smegmata, emplastra, unguenta, acopa,
synchrismata. Horum omnium modi, præpara-
menta et usus, in δὲ κατὰ γινν ferē
petuntur.

FINIS.

BASILEAE, SUMPTI-
bus Ioan. Oporini, 1551. Mense
Martio.

by Gentles of mitter
for a Logd mitter
and a Rapp

Leib no doctor for mitter
Soll toward
I roking and mitter
mutter mitter mitter
oprotor and mitter
mutter mitter mitter
god for mitter
god for mitter

god for mitter
and mitter
mutter mitter

13/10

Handwritten text in a cursive script, possibly a signature or a heading, located at the top of the page.

Handwritten text in a cursive script, possibly a signature or a heading, located in the middle of the page.

Handwritten text in a cursive script, possibly a signature or a heading, located in the middle of the page.

Handwritten text in a cursive script, possibly a signature or a heading, located in the middle of the page.